



مركز دراسات الوحدة العربية

سلسلة تاريخ العلوم العربية (٥)

الجبر والهندسة في القرن الثاني عشر

مؤلفات شرف الدين الطوسي

الدكتور رشدي راشد

الجبر والهندسة

في القرن الثاني عشر

مؤلفات شرف الدين الطوسي

GIFTS 2006
The Swedish Institute
Alexandria



مركز دراسات الوحدة العربية

سلسلة تاريخ العلوم العربية (٥)

الجبر والهندسة

في القرن الثاني عشر

مؤلفات شرف الدين الطوسي

الدكتور رشدي راشد

ترجمة: الدكتور نقولا فارس

الفهرسة أثناء النشر - إعداد مركز دراسات الوحدة العربية

راشد، رشدي

الجبر والهندسة في القرن الثاني عشر: مؤلفات شرف الدين الطوسي/
رشدي راشد؛ ترجمة نقولا فارس.

٧١٨ ص. - (سلسلة تاريخ العلوم العربية؛ ٥)

ببليوغرافية: ص ٧٠٩ - ٧١٢.

يشتمل على فهرس.

١. الهندسة (رياضيات). ٢. الطوسي، شرف الدين. أ. فارس،
نقولا (مترجم). ب. العنوان. ج. السلسلة.

620.004

«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية»

عنوان الكتاب بالفرنسية

Sharaf al-Dīn al-Ṭūsī
Oeuvres mathématiques
Algèbre et géométrie au XII^e siècle

مركز دراسات الوحدة العربية

بناية «سادات تاور» شارع ليون ص.ب. : ٦٠٠١ - ١١٣ - بيروت - لبنان

تلفون: ٨٦٩١٦٤ - ٨٠١٥٨٢ - ٨٠١٥٨٧

برقياً: «مرعبي» - بيروت

فاكس: ٨٦٥٥٤٨ (٩٦١١)

e-mail: info@caus.org.lb

Web Site: <http://www.caus.org.lb>

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز

الطبعة الأولى

بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨

المحتويات

٧	كلمة المترجم
١٥	فاتحة
١٧	تصدير
٣٧	الرموز
٣٩	مقدمة
٣٩	أولاً: ثنائية الجبر والهندسة عند الخيام والطوسي
٤٤	ثانياً: النظرية الهندسية للمعادلات وانبثاق المفاهيم التحليلية
٥٣	ثالثاً: طريقة إيجاد النهايات العظمى
	رابعاً: الرسالة حول المعادلات: الكاتب،
٥٩	تاريخ الكتابة، وعنوان الرسالة
٦٨	خامساً: تحقيق النص
٨٣	سادساً: الترجمة الفرنسية
٨٥	سابعاً: أعمال الطوسي الرياضية الأخرى
٨٦	ثامناً: المصطلحات

القسم الأول

٩١	الفصل الأول: الحل العددي للمعادلات وطريقة روفيني - هورنر
٩٣	أولاً: مسألة المعادلات العددية
٩٤	ثانياً: تحديد الرقم الأول من الجذر الموجب المطلوب

١١٠	ثالثاً: تحديد الأرقام الأخرى للجذر ومخطط احتسابها
١٢٤	رابعاً: تشكيل الجدول
١٣٣	خامساً: الحالة $c > 0$
١٣٨	سادساً: إعادة تركيب الجداول
١٦١	الفصل الثاني: نقل وتعليق رياضي (المعادلات ١ - ٢٠)
١٧٦	تصنيف المعادلات والمعادلات ذات الحدين
١٧٨	المعادلات ذات الحدين
١٨٨	معادلات الدرجة الثانية ثلاثية الحدود
٢٠٠	معادلات الدرجة الثالثة I
٢٤٣	تعليقات إضافية

القسم الثاني

٢٦١	الفصل الثالث: نقل وتعليق رياضي (المعادلات ٢١ - ٢٥)
٢٦١	معادلات الدرجة الثالثة II
٤٢١	تعليقات إضافية
٤٣١	الفصل الرابع: «التصوص»
٤٣٣	● نص رسالة الطوسي حول «المعادلات (١ - ٢٠)»
٥٥١	● نص رسالة الطوسي حول «المعادلات (٢١ - ٢٥)»
٦٨١	● نص رسالة «في الخطين اللذين يقربان ولا يلتقيان»
٦٨٩	● نص رسالة «في عمل مسألة هندسية»
٦٩٩	قائمة التعابير والمصطلحات التي استعملها الطوسي
٧٠٩	المراجع
٧١٣	فهرس

كلمة المترجم (*)

١ - موجز عن محتوى الكتاب

هذا الكتاب المؤلفات الرياضية لشرف الدين الطوسي - الجبر والهندسة في القرن الثاني عشر يدل عنوانه على محتواه. يحقق فيه رشدي راشد الأعمال الرياضية لشرف الدين الطوسي (ما وصل منها إلى عصرنا) ويشرحها باللغة الرياضية المفهومة حالياً، ويُعلّق عليها تفصيلاً. وأهم هذه الأعمال هي رسالة الطوسي المسماة «المعادلات» التي يشير رشدي راشد إلى أن الكتاب «مخصص لها»^(١) ويشرح الأسباب التي جعلتها تمتنع على التحقيق والدراسة من قبل. يتطرق رشدي راشد من هذا التحقيق لكي يضع الرسالة في المكان الذي يعود إليها ضمن المسار الذي يُمثّل تطور الجبر عبر الزمن. وهناك أمران قد تُفيد الإشارة إليهما في تلمّس محتوى هذا الكتاب:

أ - يقدّم رشدي راشد دراسة مُعمّقة لرياضيات شرف الدين الطوسي، للدوافع التي قادته إلى طرق الهندسة - التحليلية، لوسائله الجبرية المتطورة (التبديل الأفيني للمجهول) ولاستدعائه الوسائل والمفاهيم التحليلية (حصر الجذور - النهاية العظمى لبعض التعابير الجبرية)؛ كما يقدّم تحليلاً لطرق شرف الدين الطوسي العددية في الحساب التقريبي للجذور حيث تعود وتظهر المفاهيم التحليلية الموضوعية.

ب - يقدم الكاتب رسماً للمنحنى الهندسي لتطور الجبر بدءاً بالخوارزمي والماهاني والخازن والبيروني وأبي نصر بن عراق... ويتوقف عند القمة في تطوّر هذا المنحنى، التي تُشكلها الأعمال الجبرية لعمر الخيام التي سبق وأن خصص لها كتاباً نجد فيه تحقيقاً لنصوصها مع دراسة وتعليق^(٢). ثم يعرض لوسائل الطوسي الهندسية التي يرتكز

(*) كتبت هذه الكلمة لدى انتهاء الترجمة عام ١٩٩٣، لذا نجد في الهوامش تدقيقاً في بعض ما ورد فيها من توقعات.

(١) الفاتحة، النص الفرنسي، ص IX، هي غير مترجمة.

(٢) عمر الخيام، وسائل الخيام الجبرية، حققها وترجمها وقدم لها رشدي راشد وأحمد جبار،

مصادر ودراسات في تاريخ الرياضيات العربية؛ ٣ (حلب: معهد التراث العلمي العربي، ١٩٨١).

فيها إلى ما بدأه الخيام والتي تتميز عن وسائل الخيام بكونها تستخدم مفاهيم تحليلية، استدعتها عند الطوسي مسألة وجود الجذور لبعض المعادلات المدروسة.

وقد سبق لرشدي راشد أن قدّم للمنحى الحسابي لتطوّر الجبر في مؤلفه الضخم تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب^(٣). والآن وبإصداره هذا الكتاب الذي يرسم المنحى الهندسي لتطوّر هذا العلم، يكون رشدي راشد قد أنجز الدراسة العامة لتطوّر الجبر العربي.

٢ - الأهمية العلمية للكتاب

عندما يقول أستاذ من منزلة رشدي راشد إن «رسالة» شرف الدين الطوسي هي «أهم ما كُتِبَ في الجبر وأصعبه»، فهذا يعني أنها كذلك. واستعمال هاتين الصفتين بالمطلق لا بدّ من أن يُثير دهشة القارئ للوهلة الأولى. فهو يعرف حق المعرفة أنّ العرب هم الذين وضعوا علم الجبر وشيّدوه لبنة لبنة، خلال فترة لم تنقطع، ناهزت الستة قرون، منذ الخوارزمي حتى القلصادي، مروراً بأبي كامل والكرجي والخيام وعلى مساحة بقعة من هذه الكرة امتدّت من سمرقند إلى غرناطة مروراً ببغداد والقاهرة. لذلك، فإن هذا الكلام الذي يستهّل به رشدي راشد كتابه يرتدي أهمية خاصة. إنّه يقتضي وضع هذا الكتاب في مكان معيّن من المكتبة العربية كما يستتبع نهجاً خاصاً في قراءته.

إن كلمة «أصعبه» لا تعني، على ما نعتقد، صعوبة قراءة هذا الكتاب، بقدر ما تشير إلى تلك التي رافقت عملية تحقيق نص الطوسي الأصلي وفهمه وتدقيقه والتعليق عليه. ولقد شرح ر. راشد بالتفصيل، في المقدمة، الصعوبات التي لم تكن ذات طابع تاريخي تقني فقط، بل أيضاً ذات طابع علمي - لغوي^(٤) مشيراً إلى أنها ضاعفت، مرات عدة، المدة التي توفّق تحقيق النص وشُرْحُه خلالها. لكن، وبعد هذا التحقيق المرفق بالتعليقات والشرح، لم تعد هناك صعوبة كبيرة في قراءة الكتاب. لذلك، فكلّمة «أصعبه» لا ينبغي أن تثني همة من تدفعه إلى القراءة أهميّة الكتاب أو أهمية الموضوع.

Roshdi Rashed, *Entre arithmétique et algèbre, recherches sur l'histoire des mathématiques arabes*, collection sciences et philosophie arabes (Paris: Les Belles lettres, 1984),

نقله إلى العربية حسين زين الدين، انظر رشدي راشد، تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب، ترجمة حسين زين الدين، سلسلة تاريخ العلوم عند العرب؛ ١ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٩).

(٤) نسبة إلى السلبية الناجمة من غياب اللغة الرمزية، ونسبة إلى اضطراب الطوسي لإدخال تعابير رياضية جديدة. انظر: «الفاتحة»، ص ١٥ من هذا الكتاب، و«المقدمة»، ص ٧٩، سادساً: الترجمة الفرنسية.

إلا أن تأكيدنا على انتفاء الصعوبة في قراءة الكتاب يستدعي التنبيه إلى أن هذه القراءة لن تكون نزهة تشبه تلك التي نقوم بها عبر كتاب في العموميات، يصف الوقائع ويسردها تبعاً لترتيب زمني أو منطقي معين. إن الصعوبة الباقية في الكتاب «شرعية» أو «طبيعية»، بمعنى أنها من نوع تلك التي تعترض قراء الكتب الرياضية حيث تتوجب اليقظة الدائمة والمتابعة البطيئة الدقيقة. لكن، لا بد من الإشارة أيضاً، إلى أن المقدمة وبعض فقرات الكتاب، كذلك المتعلقة بالحساب العددي أو بالتحليل الرياضي، تتطلب مستوى أعلى بكثير من مستوى الدراسة الثانوية.

إن أهمية «المقدمة» تكمن في كونها دراسة تناولت جميع جوانب رسالة الطوسي وفي كونها ثمرة السنوات التي قضاها ر. راشد لإنجاز الكتاب تحقيقاً وتدقيقاً. ولئن بدت هذه الدراسة صعبة فلأنها محبوبة مكثفة، نعتقد أن الكاتب تجتنب فيها المزيد من الشرح والإسهاب. كما نعتقد أنها وُضعت على هذه الصورة، كدليل يساعد القارئ على تكوين فكرة شاملة عن النص، وتلخيص لعمل الطوسي والتعليق عليه بصورة عامة، ووضعه في إطاره ذي البعدين التاريخي والرياضي. فلا بد من أن يعود القارئ إلى قراءة «المقدمة» بعد أن ينتهي من قراءة الكتاب. ولا بد من العودة إليها من حين إلى آخر خلال قراءة بقية الكتاب. إن التعليقات التفصيلية التي يقدمها الكاتب ضمن كل فقرة من فقرات النص داخل الكتاب، تشكل شروحات أساسية لا بد منها للمضي قدماً في فهم النص. إلا أنها لا يمكن أن تحل في أي حال محل هذه المقدمة التي ستبقى، بتقديرنا، مرجعاً أساسياً لطلاب تاريخ الرياضيات.

ولئن استطعنا التعليق على كلمة «الأصعب» التي يصف بها رشدي راشد عمل الطوسي، فلن نعلق على كلمة «الأهم». ذلك لأن الشرح الذي يورده الكاتب بشأن الأهمية التاريخية والرياضية لعمل الطوسي لا يترك، في رأينا، المجال لأي تعليق على هذه النقطة في عمومياتها. إنما سنسمح لنفسنا بأن نؤكد بعض ما ورد في المقدمة عن المحتوى الرياضي لعمل الطوسي.

إن الأهمية العلمية لهذا العمل تكمن في شموليته. فالمسألة جبرية في الأساس، وهي حل معادلات الدرجة الثالثة. والحل يقتضي إعطاء القيمة الفعلية للجذور؛ فإذا بالطوسي يتعدى إطار الجبر ليعمل ضمن حقل الحلول العددية. كما أن مسألة تبيان وجود الجذور، قادته، على خطى الخيام، إلى العمل في ميدان دراسة القواطع المخروطية ومعادلاتها ونقاط التقائها، فإذا به ينتقل إلى الهندسة والهندسة التحليلية. أما دراسة المعادلات «التي يقع فيها المستحيل» أي التي قد لا يكون لها أي جذر (حقيقي موجب)، فقادته إلى التطرق إلى موضوع أساسي في ميدان التحليل الرياضي هو موضوع النهاية القصوى لدالة بمتغير واحد.

ولئن صح أن الطوسي لم يتخط الخيام إلا قليلاً في مجال صياغة معادلات

المنحنيات، ولئن صَحَّ أن صياغته لمعادلات المنحنيات كانت جزءاً من مشروع بَدَلْ أن تكون مشروعاً قائماً بحدّ ذاته كما هي الحال في رياضيات القرن السابع عشر؛ ولئن صَحَّ أيضاً أن الطوسي عالج قضية النهاية العظمى كفقرة من فصل، بينما كانت فصلاً مستقلاً عند فيرما (Fermat ١٦٠١ - ١٦٦٥))، إلا أن هذا لا ينفي، بل يؤكد، أن الطوسي، كان قد عمّد في نهاية القرن الثاني عشر، إلى طرح ومعالجة مواضيع كان المؤرّخون يُرجعون الفضل في بدء معالجتها إلى رياضتي القرن السابع عشر. إن إظهار هذا الواقع يشكل - على ما نعتقد - إحدى أهم فقرات «مقدمة» رشدي راشد حول رسالة الطوسي.

ولا شك في أن كلاً من الاتجاهات العريضة الثلاثة المتمثلة في الهندسة التحليلية والتحليل الرياضي والحساب العددي، التي تفرعت من مسألة جبرية، سيقود القارئ إلى مسائل تفصيلية لن تكون دون إثارة فضوله أو دفعه إلى طرح أسئلة قد يقتضي الجواب عليها بحثاً في العمق، في كتاب الطوسي نفسه أو خارجه. فالكتاب جديد صدر للمرة الأولى سنة ١٩٨٦، باللغة الفرنسية. ومؤلفه الذي كانت له أسبقية وضع شرف الدين الطوسي في المكان الذي يستحقه بين كبار الأسماء الرياضية عبر التاريخ، يعلم ولا شك، أن ما كتبه عن أعمال هذا الرياضي، وإن كان الأساس، فهو ليس نهاية المطاف. إن ما كتبه عن الطوسي لا بد من أن يشكل بداية نقاش خاص برياضيات القرن الثاني عشر وجذور «عصر النهضة» الأوروبي، بدأ مع صدور الكتاب وقد يستمر عشرات السنين. ونذكر، على سبيل المثال، دراسة مهمة يعدها الأستاذ كريستيان هوزيل حول الطرق العددية في رسالة الطوسي^(٥)، كما نذكر أن الظروف سمحت لنا، بناء على فكرة من رشدي راشد نفسه، بالمساهمة في مناقشة أحد هذه المواضيع التفصيلية التي سبق له أن درسها. هذا الموضوع الذي نأمل بنشره في مجال آخر^(٦)، يتعلّق برصد الطرق والتقنيات التي سمحت للطوسي بالتوصّل إلى تعبير المشتق لدالة حدودية وباستخدام هذا التعبير بشكل منهجي في احتساب النهاية العظمى لهذه الدالة. نسوق هذين المثلين لنؤكد أنه، لا بدّ من أن يجد القارئ المتعمّق في الكتاب مادة أو أكثر للدراسة والبحث، تساهم في إغناء هذا الموضوع سواء على الصعيد الرياضي أو على الصعيد التاريخي.

(٥) نشر المقال بالفعل في مجلة: *Arabic Sciences and Philosophy*, vol. 5, no. 2 (September 1995), pp. 219 - 237.

(٦) نشر المقال المشار إليه بالفعل عام ١٩٩٥ قبل نشر الترجمة العربية لكتاب رشدي راشد. انظر: المصدر نفسه، ص ٢٣٩ - ٢٦٢.

٣ - ترجمة المؤلفات التي تعالج التراث العلمي العربي: الحيشيات والدوافع

وبعد، لا بدّ لنا من كلمة نبدأها بما ينبغي أن تنتهي به وهو اعتذار مسبق، نتوجه به أولاً إلى القارئ العربي حول بعض الاصطلاحات الرياضية التي قد تميز بين بلد وآخر. وكنا، ونحن نقوم بالترجمة، نفكر في وقع كل كلمة على القارئ، منطلقين من تجربة جديدة لنا في الكتابة الرياضية باللغة العربية؛ لكننا كنا نأمل التعويض عن هذا النقص بالمزيد من التدقيق في معاني الجمل العلمية. وفي مجال المعاني، لا بد من أن نعلن، هنا، أسفنا إلى رشدي راشد الذي يصوغ (بالفرنسية) أفكاراً ذات الطابع النظري في جمل مكثفة محبوك، لم نؤفّق غالباً في نقل معناها من دون القضاء على تماسكها أو إخراجها بشكل يكاد يشوهها.

ولقد سبقنا إلى ترجمة رشدي راشد الزميل حسين زين الدين الذي نقل إلى العربية كتاب تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب^(٧) الذي وُفّق إلى ترجمته في عمل نعتقد أنه جميل وشاق فعلاً. وهنا لا بدّ من التعبير عن اعتقادنا بأنه كما صخ القول بأن عمل الطوسي هو «أهم ما كتب في العربية في الجبر وأصعبه»، فإنه يصحّ بأن تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب هو أهم ما كتب في التاريخ العام للرياضيات العربية... وأصعبه أيضاً. نسوق هذا الكلام لنشير إلى تأثير هذا الكتاب في الأوساط المعنية بموضوعه. ونذكر على سبيل المثال أثره في التوجّه الحالي لإحدى المجموعات الجامعية التي أطلّت من خلاله على أعمال مؤلفه وأعمال فريق البحث الذي يرئسه في «المركز الوطني للبحث العلمي» في فرنسا. والمجموعة الجامعية المذكورة تضم بالأساس، أساتذة من الجامعة اللبنانية وزملاء لهم في جامعات فرنسية، آلت على نفسها مرحلياً أن تساهم في ترجمة النتاج العلمي - التاريخي لفريق البحث. وهذا، وهي تسعى لأن تتوسع وتتعاون مع كل من يهيمه العمل في هذا الاتجاه. لذلك يمكن اعتبار ترجمة الكتاب الذي بين أيدينا إحدى مساهمات هذه المجموعة. كما كانت إحدى مساهمات هذه المجموعة، ترجمة الزميلين شكر الله الشالوحي (الجامعة اللبنانية) وعبد الكريم علّاف (جامعة كومياني - فرنسا) لكتاب رشدي راشد: علم الهندسة والمناظر في القرن الرابع الهجري (ابن سهل - القوي - ابن الهيثم)^(٨). إلا أننا نعتقد أنّ

(٧) انظر الهامش رقم (٣) أعلاه.

(٨) Roshdi Rashed, *Géométrie et dioptrique au X^{èmes} - XI^{èmes} siècles. Ibn Sahl-Al-Qūhī et Ibn al-Haytham* (Paris: Les Belles lettres, 1992),

نشرت الترجمة العربية بالفعل، انظر: رشدي راشد، علم الهندسة والمناظر في القرن الرابع الهجري (ابن سهل - القوي - ابن الهيثم)، ترجمة شكر الله الشالوحي، مراجعة عبد الكريم العلّاف، سلسلة تاريخ العلوم عند العرب؛ ٣ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٦).

المشروع الأهم لهذه المجموعة، هو عملها في ترجمة الموسوعة في تاريخ العلوم العربية التي أدار نشرها رشدي راشد وشارك في كتابتها مع عدد من مؤرخي العلوم يتوزعون على عدة مراكز تعليم جامعي ويبحث عبر أوروبا وأمريكا^(٩).

إن اتجاه مجموعتنا إلى ترجمة مثل هذه الأعمال يعزّزه الاقتناع بضرورة أن تنتقل إلى العربية صورة علمية دقيقة عن إنجازات أسلافنا. ذلك أننا نلاحظ في هذا المجال نوعين من الكتابات شديدي الضرر على الحقيقة العلمية وعلى قضية إظهار الصفحات المشرقة من تاريخنا.

النوع الأول هو سردٌ أشبه بسرد المغامرات عن إنجازات هؤلاء، فيه الكثير من المبالغة وتنقصه الدقة غالباً. إن سرداً من هذا النوع يشوّه الحقائق ويُعرّض الثقة، حتى بالصحيح منها للاهتزاز.

أما النوع الثاني من الكتابات التاريخية والذي نجده - للأسف - في مراجع غربية واسعة الانتشار، مشهود بمكانتها العلمية، فيهمّل الإسهامات العربية جهلاً أو تجاهلاً. إنه، في أفضل الحالات، يُصوّر العصر العربي كجسر انتقلت عبره العلوم اليونانية إلى الغرب الذي انطلق منها وطوّرها ابتداءً من «عصر النهضة»^(١٠)؛ وفي أسوأ الحالات يصوّر العصر العربي عصر ركود^(١١)، غفا خلاله العلم اليوناني ولم يصحّ إلا في «عصر النهضة» حيث استلمه الأوروبيون.

وفيما نحن نقوم بما نعتقد أنّه لزام علينا في مجال إحياء تراثنا العلمي، نتوخى، من جهة أخرى، المساهمة في إرساء اللغة العلمية العربية وتطويرها. وجبّذا لو كان بإمكاننا استعادة التعابير والمفردات العلمية العربية الأصلية واستخدامها؛ والعربية غنية بالمصطلحات العلمية؛ فلقد كانت لغة العلم في عالم امتد من حدود الصين إلى إسبانيا. وباطلاعنا (المتأخر) على عدد من النصوص الرياضية القديمة تبين لنا أن المفردات القديمة هي إجمالاً شديدة الدلالة على المعاني والمفاهيم المقصودة. ولا بد من أن يأتي ذلك اليوم الذي تعود فيه للظهور لتحل محل مفردات وتعابير مستحدثة، مترجمة إجمالاً، أقل ارتباطاً بالمفاهيم التي تدل عليها. فنكون قد حصلنا، إضافة إلى

(٩) صدرت هذه الموسوعة بالفعل بالإنكليزية عام ١٩٩٦ عن دار «روتلدج»، كما صدرت بالفرنسية عن دار «سوي» (Seuil). باريس، أواخر عام ١٩٩٧ وبالعربية عن «مركز دراسات الوحدة العربية» - بيروت، في أواخر عام ١٩٩٧.

(١٠) انظر مثلاً: N. Bourbaki, *Notes historiques* (Paris: Hermann, [s.d.]), et J. Dieudonné, *Pour l'honneur de l'esprit humain* (Paris: Hachette, 1987).

(١١) انظر مثلاً: Pierre Edouard Marchal, *Histoire de la géométrie, que sais-je?*, 2^{ème} éd. (Paris: Presses universitaires de France, 1948).

الأناقة والدقة في التعبير على استمرارية في اللغة وعلى استعادة اللغة العربية لإحدى أهم صفاتها، كلغة للعلم. إن واقع تعليم العلوم باللغات الأجنبية في لبنان مظهر من مظاهر الأزمة التربوية - الاجتماعية التي يعانيها وطننا العربي. وهذا الواقع الذي لسنا هنا بصدد الحديث عن أسبابه أو إبداء الرأي بمعالجته، يترك أثره السلبي من دون شك في مشاريعنا في الترجمة. لكن، مهما كانت درجة نجاح هذه المشاريع أو فشلها، فإن ما يشفع فيها أن دوافعها علمية بحتة. لذلك، فإن كل قارئ مدعو - مشكوراً - لكي يكتب لنا ما من شأنه أن يساعدنا على تصحيح الأخطاء أو تنقيح المعاني. وقد نصل إلى ما نرجوه من تنفيذ هذه المشاريع عندما نستطيع أن نحث القارئ على النقد البناء، وعلى الجود بما لا نستطيع في هذا المجال.

وفي الختام لا بد لي من أن أنوه بجهود أخي الأستاذ حبيب فارس الذي تعهد منذ البداية قراءة الترجمة وتنقيحها لغوياً، في ظروف كانت الكتابة العلمية بالعربية بالنسبة لي عملاً صعباً للغاية.

ريمس، نيسان/أبريل ١٩٩٣

نقولا فارس

قسم الرياضيات - كلية العلوم في الجامعة اللبنانية

قسم الرياضيات - في جامعة ريمس - فرنسا

عضو فريق الدراسة والبحث في التراث العلمي العربي

(فريق علمي استشاري لدى المجلس الوطني

للبحوث العلمية) - لبنان.

فاتحة

حين كشفت لأول مرة، منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، عن أهمية ما يتضمنه كتاب المعادلات لشرف الدين الطوسي، كنت قد نهجت له نهجاً مُستتباً ظننت أنني قادر على أن أمشي فيه حتى أنتهي من تحقيق هذا الكتاب وتفسيره والتأريخ له في بضع سنين. وقدّر غير ما قدّرت، فسرعان ما عرفت أن عمل الطوسي هذا هو أهم ما كتب في العربية في الجبر وأصعبه مثلاً. ففيه يعرض الطوسي لما ورثه ممن سبقه في نظرية المعادلات الجبرية ليزيده إحكاماً ويقيناً، وفيه أيضاً يأخذ سبل من خلفهم ليبلغ بها نهايتها، وفيه كذلك يأتي الطوسي بما لم يأت به من ورثهم. ولهذا كله تشعبت الطرق إلى تحقيق الكتاب وتفسيره، فكان عليّ قبل المبادرة إلى هذا العمل تحقيق آثار عمر الخيام التي منها بدأ الطوسي وعليها بنى، حتى لا أثقل نص الطوسي بالإشارات والتعليقات. وكان عليّ أيضاً معرفة سبل الرياضيين العرب قبل الطوسي لتبصر ما قدمه من جديد. وزاد الأمر صعوبة ما بلغه الطوسي نفسه من جهة، وما أصاب كتابه على أيدي المفسرين والنساخ من جهة أخرى. فالطوسي - كما سنرى - لم يصل إلى منهج روفيني - هورنر في الحل العددي للمعادلات الجبرية فحسب، بل حاول صياغة نظرية كاملة لتبرير هذا المنهج نفسه. وصاغ هذه النظرية باللغة الطبيعية دون اللجوء إلى لغة رمزية. فصار حقاً عليّ واجباً أن أدرك ما قصده الطوسي - ولم يكن واضحاً - وأن أبين ما وقع فيه من أخطاء، وكانت خافية مستترة. ولم يكن ذلك بالأمر السهل، إذ تطلّب كثيراً من الجهد والوقت. وسنرى أيضاً، أن الطوسي قد شارف في كتابه هذا، ومن خلال بحوثه الجبرية، بدايات التحليل الرياضي، وانتهى إلى مفاهيم ونتائج، جزم المؤرخون من قبل أنها من نبات أفكار رياضي القرن السابع عشر. وصاغ الطوسي هنا هذه المفاهيم وتلك النتائج باللغة الطبيعية أيضاً صياغة من يلمح من بعيد عالماً جديداً لم تطأه بعد قدماه. فصار لزماً عليّ الكشف عما حواه هذا الكتاب من ذلك النظر الرياضي الجديد، سالكاً في هذا الطريق الذي يؤمنني من كل ريب، فلا أحتمل الطوسي ما لا يطيق ولا أعزو إليه جديداً بلا حجة وبرهان. وهذا أيضاً لم يكن من الأمور المتيسرة.

أما نص كتاب الطوسي نفسه في المعادلات فلم يكن يُعرف أنه له - حين بدأت عملي هذا - إلا في مخطوطة متأخرة النسخ، من أواخر القرن الثامن عشر، كثيرة

الأخطاء. ولما كانت نتائج الطوسي الرياضية قد عزيت - كما قلت - إلى رياضيين متأخرين، أحجبت عن نشر النص المحقق خوفاً من تضمينه لمفاهيم رياضية أدخلت فيه فيما بعد، وتلاشت هذه العقبة عندما وُفقت لاكتشاف النموذج الذي نقلت منه هذه المخطوطة المتأخرة. فهذا النموذج هو مخطوطة من القرن السابع الهجري نسبت إلى مجهول، حتى عثوري عليها وتأصيلي لها.

وبعد زوال تلك العقبات أصبح ممكناً الإقدام على تحقيق هذا النص تحقيقاً متأنياً، وبذل كل ما أستطيعه من جهود لتفسيره وشرحه والتأريخ له. ومما دفعتني إلى مواصلة الجهد والمثابرة عليه، ما يتضمنه كتاب الطوسي من نتائج، وما يحتويه من مناهج، وما يلزمنا به من إعادة التأريخ لبعض فصول الرياضيات.

فسنرى من بين نتائج: منهج روفيني - هورنر، كما سبق أن ذكرنا. وكذلك المشتق لكثيرة الحدود واستعماله له في تحديد النهايات العظمى وحسابها، وأيضاً مميز معادلة الدرجة الثالثة واستعماله له في مناقشة وجود الحل. وباختصار، سنرى في كتاب الطوسي نتائج تُعزى حتى يومنا هذا إلى رياضيي القرن السابع عشر على الأقل، وفصولاً مما سمي فيما بعد بالهندسة التحليلية.

فلإخراج كتاب الطوسي يرفع اللثام عن وجه هام من وجوه الرياضيات العربية لا زال مجهولاً، ويهيئ لنا ما لم يكن ممكناً من قبل، أعني رؤية تاريخية لمن سبق الطوسي ولا سيما الخيام. فلقد ظن مؤرخو الرياضيات العربية أن النظرية الهندسية للمعادلات الجبرية التي صاغها الخيام لأول مرة توقفت بعده حتى القرن السابع عشر، وتحكمت فيهم فكرتان: الأولى أن عمل الخيام لم يؤثر قط في تاريخ العلوم الجبرية، والثانية أن علينا انتظار «هندسة» ديكرات لكي نجد جديداً في هذا الميدان. وهكذا يبدو الخيام في وهم المؤرخين كنقطة مفردة أو كواحة في صحراء. وسيبدد هذا الوهم ما انتهى إليه الطوسي وهو من خلفاء الخيام.

لهذا صار حقاً واجباً تحقيق هذا الكتاب، والتأريخ له، ونقله إلى إحدى اللغات الأوروبية والتقديم له بما يلزمه من دراسة وتحليل، حتى يتسنى لقارئ العربية التعرف على هذا التراث بصورة لائقة، وحتى يستطيع المؤرخون إعادة كتابة تاريخ الرياضيات بحسب ما تقتضيه المعايير العلمية من أمانة وموضوعية.

تصدير

أولاً: شرف الدين الطوسي ومؤلفاته

هو شرف الدين المظفر (أو أبو المظفر) بن محمد بن المظفر الطوسي. أما مولده وحياته ومماته فلم يقع إلينا الكثير من الروايات في ذلك، ولم تسعنا كتب الطبقات والمؤلفين إلا بشذرات متفرقة، أما شيوخه في العلوم والفلسفة والرياضيات بخاصة فلا نعرفهم البتة.

فمن نسبته نعرف أنه من طوس بخراسان، ومن القليل الذي نعرفه من سيرته تردده على طوس نفسها واحتفاظه بجزء من كتبه فيها. ومما ورد عنه نعرف أيضاً أنه أقام في الموصل وحلب ودمشق ومَرَّ بهمدان. فيروي القفطي أن أبا الفضل بن يامين المتوفى سنة أربع وستمئة هجرية (١٢٠٧م): «قرأ على شرف الطوسي عند وروده إلى حلب، وكان الشرف مع إحكامه لعلم الرياضة يحكم أشياء أخر من أصول الحكمة»^(١). وكذلك يحدثنا ابن أبي أصيبعة عند كلامه على أبي الفضل الحارثي المتوفى ٥٩٩هـ - ١٢٠٢م قائلاً: «وكان قد ورد إلى دمشق ذلك الوقت الشرف الطوسي، وكان فاضلاً في الهندسة والعلوم الرياضية، ليس في زمانه مثله، فاجتمع به، وقرأ عليه، وأخذ عنه شيئاً كثيراً من معارفه»^(٢).

ومن ابن أبي أصيبعة نعرف أيضاً أن الطوسي أقام بالموصل، فهو يقول: «ولما كان شرف الدين الطوسي بمدينة الموصل، وكان أوجد زمانه في الحكمة والعلوم الرياضية وغيرها، سافر ابن الحاجب والحكيم موفق الدين بن عبد العزيز إليه ليجتمعا به، ويشغلا

(١) أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، تاريخ الحكماء، وهو مختصر الزوزني المسنى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء، تحقيق يوليوس ليبيرت (ليبترج: [دبتريخ]، ١٩٠٣)، ص ٤٢٦.

(٢) أبو العباس أحمد بن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، شرح وتحقيق نزار رضا (بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٦٥)، ص ٦٧٠.

عليه، فوجداه قد توجه إلى مدينة طوس^(٣). ويروي ابن خلكان^(٤) عن أبي البركات المبارك بن المستوفي صاحب تاريخ إربل أن كمال الدين بن يونس العالم المشهور كان من تلاميذ الطوسي، وقد حل عليه أصول إقليدس والمجسطي لبطلميوس.

وفي هذا الصدد نقرأ لتاج الدين السبكي في طبقات الشافعية ما يلي: «ورأيت بخط الشيخ كمال الدين بن يونس على الجزء الأول من إقليدس إصلاح ثابت بن قرة، ما نصه: «قرأت على الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع شرف الدين فخر العلماء تاج الحكماء أبي المظفر آدم الله أيامه، بعد عودِهِ من طوس هذا الجزء، وكنت حَلَلْتُهُ عليه نفسي مع كتاب المجسطي، وشيء من المخروطات، واستنجزتُهُ ما كان وَعَدْنَا به من كتاب «الشكوك»، فأحضره واستنسخته، وكتبه: موسى بن يونس بن محمد ابن منعه، في تاريخه، هذا صورة خطه، وتاريخ الكتاب المشار إليه، تاسع عشر ربيع الأول سنة ست وسبعين وخمسمائة هجرية»^(٥).

وبالنظر في الروايات السابقة يتضح لنا أن تلاميذ الطوسي المذكورين هم من أبناء النصف الثاني من القرن السادس الهجري (الموافق للنصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي على وجه التقريب). وقد توفوا جميعاً في أواخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع. وُستثنى منهم كمال الدين بن يونس الذي كان أصغر تلاميذ الطوسي سناً وأكثرهم شهرة.

ويتهيأ بنا حديث كمال الدين بن يونس إلى أن الطوسي أقام بالموصل قبل التاسع عشر من ربيع الأول سنة ٥٧٦هـ، أي ١٢ آب/أغسطس سنة ١١٨٠م. وكان ابن يونس نفسه في الخامسة والعشرين من عمره على أكثر تقدير، مما يفسر لنا قراءته على الطوسي أوائل العلوم الرياضية، أي ما كان على الباحث الشاب أن يتقنه. ومن حديث ابن يونس نعرف أيضاً أن الطوسي قد أقام بالموصل أكثر من مرة وأنه كان يتنقل بينها وبين طوس.

ومقابلة الروايات السابقة بعضها ببعض، على الرغم من قلتها، تبين أن الطوسي كان رياضياً ذائع الصيت في العقد الثامن من القرن السادس، يقصده الطلاب ويرحلون إليه. ولم يعمل الطوسي في الرياضيات من جبر وحساب فقط ولكنه كان من أصحاب علم الهيئة، وربما نحا نحو الفلاسفة.

(٣) المصدر نفسه، ص ٦٥٩.

(٤) شمس الدين أبو العباس أحمد بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، حققه إحسان عباس، ج ٨ (بيروت: [د.ن.])، ١٩٧٧، ج ٥، ص ٣١٤، وج ٦، ص ٥٢ - ٥٣.

(٥) تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو (القاهرة: [د.ن.، د.ت.])، ج ٨، ص ٣٨٦.

هذا كل ما نعرفه عن الطوسي، وهو قليل. فبعد العقد الثامن من القرن السادس تختفي آثاره من كتب المؤرخين القدماء. ولم يزد المحدثون على القدماء شيئاً، إلا وهمأ وقعوا وأوقموا الآخرين فيه^(٦)، ألا وهو أن الطوسي كان على قيد الحياة سنة ست وستمئة للهجرة (١٢٠٩م) ويرجع هذا الوهم إلى خطأ ارتكبه أحد النساخ^(٧). فأخبار الطوسي كلها ترجع إلى ما قبل نهاية القرن السادس، فهو إذاً من أبناء النصف الثاني من هذا القرن، بلغ أوج نشاطه وشهرته في العقد الثامن منه.

ففي هذه الفترة على وجه التقريب ألف الطوسي ما نعرفه من كتبه ورسائله، وهي في الرياضيات، باستثناء رسالته المشهورة في الأسطرلاب الخطي أو ما سمي «بعضا الطوسي». وأهم ما ألف الطوسي في الرياضيات: رسالة «في المعادلات»، ورسالة «في الخطين اللذين يقربان ولا يلتقيان» وأخيراً رسالة في «عمل مسألة هندسية». ولنأت على هذه الرسائل تباعاً، ولنبدأ برسالته «في المعادلات»:

لم تذكر كتب المؤلفين والطبقات هذه الرسالة كما لم تذكر رسائل الطوسي الأخرى، ولم يُشر إليها إلا في مؤلفات الرياضيين وكتبهم، ففي رسالة نور الدلالة في علم الجبر والمقابلة للخلاطي نقراً ما يلي: «والمسائل الجبرية تنتهي إلى خمسة وعشرين بمعادلة الكعاب وهو ما أظهره أستاذ أستاذي شرف الدين الطوسي نور الله ضريحه، إلا أنه لم يذكر فيه من الفروع والمسائل التي تقع في تلك الأصول شيئاً»^(٨). ووصف الخلاطي هذا يرسم معالم كتاب الطوسي في المعادلات كما سنرى من بعد. أما النص الثاني الذي يشير مؤلفه فيه إلى الطوسي فهو رسالة نصاب الجبر في حساب الجبر لإسماعيل المارديني المعروف بابن فلوس، ويقول فيه بعد الكلام على معادلات الدرجة الأولى والثانية: «وفي التحقيق إن مسائل الجبر لا تنتهي ولا تنحصر في هذه الست على ما ذكره الطوسي رحمه الله»^(٩). ثم بعد أن عدد معادلات الدرجة الثالثة وزادها على المعادلات الأولى يكتب: «فهذه خمس وعشرون بعضها يمكن إخراجه بتلك الست

(٦) وقع في هذا الوهم كل من آرخ للطوسي.

(٧) بعث الطوسي من همدان برسالة إلى شمس الدين أمير الأمراء النظامية، وهي الرسالة التي نشرها هنا محققة: «في عمل مسألة هندسية». ولقد ذكر الطوسي في أول الرسالة السنة التي حررها فيها. ولكن سقط العقد والسنة ولم يبق إلا القرن، فنقرأ: «بيلد همدان سنة [...] وخمسمئة هجرية» (انظر نص الرسالة). وأخطأ ناسخ مخطوطة ليدن عندما نقل عن الأصل فقراً «سنة»: «سنة»، وحتى تتسق العبارة لديه كتب «ستمئة» بدل «خمسمئة». فأصبحت العبارة: «بيلد همدان سنة ست وستمئة هجرية» وردد هذا بعده المؤرخون.

(٨) الخلاطي، نور الدلالة في علم الجبر والمقابلة (مخطوطة دنشكاه، جامعة طهران، رقم

٤٤٠٩)، ص ٢.

(٩) شمس الدين المارديني، نصاب الجبر في حساب الجبر (استنبول، مخطوطة فيض الله،

١٣٦٦)، ص ١٣.

المشهورة، والتي لا يمكن إخراجها بها لا بد فيها من طريقة عمر الخيام المستخرجة من مقالات ديوفنطس أو طريقة الجدول التي وضعها الإمام شرف الدين المظفر بن محمد الطوسي، وتُخرجها عليه^(١٠).

وينقل لنا ابن الهائم أيضاً ما قاله تاج الدين التبريزي في هذا الصدد عند كلامه على معادلات الدرجة الثالثة: «فلا يمكن استخراجها إلا بالبراهين الهندسية كما ذكره عمر الخيام، أو بالطريق المُجذول كما ذكره شرف الدين المظفر بن محمد الطوسي»^(١١).

وهذه الروايات كلها تثبت من وجه أن كتاب الطوسي كان معروفاً لدى رياضيي القرن السابع وكان في متناول أيديهم وأن «طريقة الجدول»، والمقصود بها الحل العددي للمعادلات بمنهج روفيني - هورنر، تنسب إلى الطوسي نفسه، الذي لجأ إليها في هذا الكتاب، من وجه آخر.

ونعود إلى هذه الرسالة كما هي بين أيدينا الآن. ويبدو لأول وهلة عند النظر فيما نملكه من مخطوطات لها أن هذه الرسالة لم تصل إلينا بتحرير الطوسي نفسه ولكن بعد أن «لخصها» مجهول، على زعمه، كما يقول في الفقرة الأولى من الرسالة.

وإنه لأمرٌ خطير إن صح قول هذا المجهول بحذفه، فالسؤال إذًا هو ما مدى هذا التلخيص وهل أمكن المجهول ذلك؟

حرر الطوسي رسالة أخرى ستتكلم عليها فيما بعد «في الخطين اللذين يقربان ولا يلتقيان»، وهو مما عالجه في رسالته هذه. ومن ثمة، فمقارنة النصين هامة لتوضيح مدى هذا التلخيص. وهذه المقارنة تثبت بما لا ريب فيه أنهما يتضمنان الأشكال نفسها الرياضية بل الجمل والتعابير نفسها في أغلب الأحيان. وهذا الدليل يثبت لنا أن الناقل المجهول لم يمكنه إلا أن يتبع الطوسي عند كلامه على الأشكال الرياضية وبراهينها، ويقوم بنقله. وكيف يمكن غير ذلك؟

والنظر المتفحص لبنية الرسالة نفسها وتتابع فصولها من مقدمات احتاج الطوسي إليها فيما بعد، حول معادلات القطوع المخروطية وعملها، وتصنيف للمعادلات وحل كل واحدة منها، ينتهي بنا إلى أن هذا المجهول لم يمكنه تلخيص أو تهذيب شيء من هذا. فمقارنة أجزاء الرسالة بعضها ببعض تبين تبييناً واضحاً أن ذلك المجهول لم يكن أمامه إلا نقل ما كتبه الطوسي، ولكن ربما حذف فاتحةً لرسالة الطوسي شرح فيها هذا

(١٠) المصدر نفسه، ص ١٤.

(١١) أبو العباس شهاب الدين أحمد بن الهائم، الممتع في شرح المقنع في علم الجبر والمقابلة، (استنبول، مخطوطة شهيد علي باشا، رقم ٢٠٧٦).

الأخير مقصده وسيله. ويحملنا على هذا الاعتقاد بداية الطوسي بالأشكال الرياضية رأساً دون التمهيد لذلك، ولا سيما أن رسالته هذه من مطولات الجبر العربي إن لم يكن الرياضيات العربية بأجمعها. ومما لا شك فيه أنه حذف الجداول التي أقامها الطوسي للحل العددي للمعادلات، مما جعل فهم الرسالة ممتنعاً على الباحثين. فالطوسي لم يتوان في كل معادلة عن إقامة الجداول العددية، وشرح عمل الجداول المناسبة للمعادلات، إلا أنه من الصعوبة بمكان تصوّر ذلك العمل بعد حذف «المجهول» لتلك الجداول. صحيح أن هذا الحذف لم يغيّر كثيراً في حقيقة النص وجوهره، إلا أنه ضاعف من صعوبة فهمه وتحقيقه.

ومما تجدر الإشارة إليه أن نقل هذا المجهول لرسالة الطوسي تم في فترة مبكرة، أعني قبل نهاية القرن السابع الهجري - الثالث عشر الميلادي - على أكثر تقدير، فهذا التاريخ هو تاريخ إحدى مخطوطات الرسالة التي نقلت هي نفسها عن سابقة لها.

لم يعرف حتى عهد قريب لرسالة الطوسي إلا مخطوطة واحدة محفوظة بخزانة المكتب الهندي بلندن، تم نسخها في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. ومنذ سنوات عثرت على مخطوطة أخرى محفوظة بخزانة مكتبة خدابخش بالهند ضاعت منها ورقاتها الأولى ولم يُعرف أنها للطوسي فنسبت إلى مؤلف مجهول، وهكذا ذكرت في سجلات المكتبة. وبمقارنة هذه المخطوطة مع الأخرى، تبين أنها النموذج الذي نقلت عنه مخطوطة لندن. وأخيراً عثرت باحثة إيطالية في فينيسيا على ثمانين ورقة من رسالة الطوسي - توقف الناسخ بعدها عن الكتابة - وهي تمثل خمس الرسالة على وجه التقريب. هذا كل ما نعرفه عن مخطوطات رسالة الطوسي. ولنتكلم الآن على هذه المخطوطات:

١ - المخطوطة الأولى، وهي نسخة خدابخش - باتنا - ورقمها مجموعة ٢٩٢٨، وأشارت إليها بالحرف «ب» وهي أقدم مخطوطة لرسالة الطوسي، كما سبق أن ذكرت، وتاريخ نسخها هو السابع من رمضان عام سبعمائة وستة وتسعين للهجرة، الموافق للتاسع والعشرين من حزيران عام ألف ومائتين وسبعة وتسعين للميلاد، ولا نعرف من ناسخها ولا مكان كتابتها، وهي ضمن مجموعة من رسائل رياضية أخرى.

أما المخطوطة نفسها فعليها آثار رطوبة طمست كثيراً من سطورها وتفسر لنا سبب ضياع الورقات الأولى قبل ترميمها، وهو حوالى ربع المخطوطة. وأما الباقي - وهو ستّ وعشرون ورقة - فحفظ ثلاثة أرباع النص. وقد كتب على كل ورقة تعدادها بالأرقام، إلا أنه عند الترميم على ما يبدو - بدلت الورقة الأولى بالثانية، وظلت الأخريات على حالها. وكتبت هذه الأرقام بعد ضياع الورقات الأولى.

وبما أن ناسخ مخطوطة لندن نقل هذه الأوراق من «ب» وذلك في سنة ١١٩٨هـ - ١٧٨٤م فمن البين أن هذه الأوراق قد فقدت بعد هذا التاريخ. وكل ورقة من هذه

طولها ٢١,٩ سنتيمتراً وعرضها ١٣,٢ سنتيمتراً، وتتضمن ثلاثين سطراً كل منها يحتوي على خمس وعشرين كلمة تقريباً. والأوراق كلها من نوع واحد كتب فيها النص بحبر أسود إلا العناوين والرسوم وعلامات انتهاء الفقرات فبحبر أحمر.

وأما خط المخطوطة فهو نستعليق. وليس في هوامشها شيء غير خط ناسخها، بل الحق بخطه، استداراً لما سها عنه خلال كتابته في مواضع يسيرة. فلقد أضاف في سبعة مواضع إما كلمة أو عبارة، مبيناً بالعلامة المعروفة مكان السهو والاستدراك. ويدل هذا على أن الناسخ عارض ما نقله بالنموذج المنقول منه، وهذا ما يقوله هو نفسه في آخر المخطوطة: «قوبل وصحح بقدر الوسع». أما الأصل الذي نقل عنه فلا نعرف عنه شيئاً.

وتتبع أخطاء المخطوطة، لغوية كانت أو رياضية، وبخاصة ما ينقصها من كلمات وعبارات لاستقامة المعنى، يبين لنا أنها نسخت بعناية وعورضت بالأصل الذي نقلت عنه دون لَحَق اختلط بالنص المنقول. وينقصها كثير من الكلمات والعبارات، موروثه من النسخة التي نقلت عنها كما يتضح عند النظر في كل منها.

٢ - **المخطوطة الثانية** وهي نسخة المکتب الهندي، بلندن، مجموعة لوٲ ٧٦٧ وأشرت إليها بحرف «ل»، وتضم هذه المجموعة رسائل هامة لثابت بن قرة وحفيده إبراهيم بن سنان، والقوهي، وابن الهيثم، ونصير الدين الطوسي، ومن ثم حظي باهتمام المؤرخين منذ نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن كما تبينه سجلات المكتبة نفسها. فمن الثابت إذاً أن صمت المؤرخين إزاء رسالة الطوسي لم يكن عن جهل بها، ولكن لما قابلهم من صعاب لإدراك أهميتها وفهم فحواها. ونسخة رسالة الطوسي تقع ما بين الورقة ٣٥ - وجه، والورقة ١٧٩ - وجه.

أما تاريخ نسخ هذه المجموعة فيمكن تقديره بدقة. فلقد كتب الناسخ تاريخ انتهائه من أول رسالة منها أو معارضتها بالأصل، وهو ١٤ شوال سنة ١١٩٨ هـ الموافق ٣١ آب/أغسطس ١٧٨٤م، ومن ثم يمكن أن نفترض أنه أتم رسالة الطوسي في السنة نفسها أو في الشهور الأولى من السنة التالية على أكثر تقدير.

أما المخطوطة نفسها فقد كتبت على ورق مصقول ناعم حنائي اللون من نوع واحد. ولقد كتب على كل ورقة تعدادها بالأرقام، وذلك بحروف الطباعة، مما يبين أن هذا من عمل المكتبة نفسها. وتجليد المجموعة يرجع إلى القرن الثامن عشر عند كتابتها، وهو في جلد بني عليه زخرفة بماء الذهب. ورسم الناسخ في كل صفحة من صفحات المخطوطة - وطولها ٢٢,٩ سنتيمتراً وعرضها ١٣,٨ سنتيمتراً - مستطيل بماء الذهب طولها ١٦,٦ سنتيمتراً وعرضه ٨,٩ سنتيمتراً. كتب داخله النص، وتضم كل صفحة ١٢ سطراً، يحتوي كل منها على ١٦ كلمة تقريباً. وكتب الناسخ النص بحبر أسود وترك بعض العناوين وعلامات انتهاء الفقرات ليكتبها بالحرمة عند انتهاء النسخ، ولكنه أهمل ذلك.

ورسم الأشكال الهندسية بالحمرة في ورقتين ألحقهما بآخر المخطوطة.

وبمقارنة هذه المخطوطة بالمخطوطات التالية من المكتب الهندي لوث ٧٤٣، ٧٤٤، ٧٤٥ - والأولى تحتوي على بعض المتوسطات من تحرير نصير الدين الطوسي وكذلك ٧٤٤، بينما تحتوي ٧٤٥ على تحرير نصير الدين الطوسي لمخروطات أبولونيوس - يتضح لنا بما لا يدع مجالاً للشك أنها من كتابة الناسخ نفسه، وربما في فترات متقاربة. فقد نسخ على سبيل المثال مخطوطة لوث ٧٤٥ في ٢١ رمضان ١١٩٨، أي قبل ٢٣ يوماً من بدئه بالمخطوطة التي تحتوي رسالة الطوسي. ونوجز كلامنا هنا فنقول: يبدو أن هذه المخطوطات نسخت في الهند في تلك الفترة، وأن الناسخ من أصحاب المهنة لا من طالب العلم. وكتبها، كالأخرى، بخط نستعليق مع الحرص على الزخرفة والتجميل. وإذا اقتصرنا على نسخة رسالة الطوسي فلن نجد في هوامشها إلا أربعة مواضع كتب فيها مستدركاً لما سها عنه مع الإشارة إلى مكان السهو في النص بالعلامة المعروفة. ونظن أن تلك الاستدراكات تمت في أثناء النسخ لا خلال معارضة ما كتب بالنص الأصل. والدليل على هذا هو عدد الكلمات والعبارات التي سها عنها الناسخ عند نقله من النموذج.

وبالمقارنة بين النسختين «ب» و«ل» انتهينا إلى ما يلي:

- كل الكلمات وكل العبارات التي تنقص المخطوطة «ب» لاستقامة المعنى تنقص المخطوطة «ل».

- كل الكلمات والعبارات التي تنقص المخطوطة «ل» فقط حتى يستقيم المعنى لا تنقص «ب».

- كل الأخطاء التي نقابلها في «ب» نجدها أيضاً في «ل»، مهما كان نوعها.

- ونقيض هذا ليس صحيحاً، فهناك عدد كبير من الأخطاء في «ل» لا نجدها في «ب» وهي أخطاء ترجع بلا ريب إلى ناسخ «ل».

كل هذا وغيره يدل دلالة واضحة على أن ناسخ «ل» لم يكن أمامه إلا مخطوطة «ب»، فهي النموذج الذي عنه نقل.

٣ - مخطوطة مدينة البندقية: شريات ١١٩٠٧، Codice CCXXIX مكتبة مرشيانا وأشير إليها بالحرف «ف».

وهي من مجموعة الأستاذ إميليو تزا. وقد عثرت على هذه المخطوطة الباحثة الإيطالية الأنسة جيوزيبيينا فرانسيني (Giuseppina Franchini) وتفضلت مشكورة بإرسال صورة لنا من هذه المخطوطة. وتحتوي هذه المجموعة على ترجمة فارسية لكتاب بهسكرا الهندي ليلافاتي إلى الفارسية، ثم مقدمة تحرير مخروطات أبولونيوس ليحي بن

الشكر المغربي الأندلسي، وقسم من رسالة الطوسي. ونقرأ في القسم الداخلي من الغلاف في أعلى الصفحة ما يلي:

«The Lilavati trans. in Pers. by Fayd, Calcutta 1827»

والمخطوطة تحتوي على ١٢٦ صفحة، منها خمس بيضاء، كل منها طولها ٤٦,٥ ستيمتراً وعرضها ٢٩,٥ ستيمتراً. أما رسالة الطوسي فهي في القسم العربي وكتب على كل ورقة منها تعدادها بالأرقام، وهي بين ورقة ١ - ظهر، وورقة ٨ - ظهر، وعدد سطور كل صفحة يتراوح بين ١٨ - ٢٦ سطراً في الأوراق الأولى ثم يقرب من الستة والعشرين في الأخرى، ويضم كل سطر ٢٠ كلمة تقريباً.

ولقد كتبت هذه النسخة بحير أسود. أما خط المخطوطة فهو أيضاً نستعليق ومن الواضح أن ناسخها لم يواصل النسخ لسبب ما، ولم يعارض ما نسخه بالأصل، ولا نجد في هوامشها أي لُحق سواء من الناسخ أو من غيره.

ولم يمكننا مقارنة هذه المخطوطة بمخطوطة «ب» لضياح هذا الجزء من «ب». ومقارنتها مع «ل» تبين لنا بوضوح أن المخطوطتين مستقلتان. ويكفي أن نذكر هنا أن «ل» ينقصها فقرة كاملة، ١٢ سطراً تقريباً، نجدها في «ف». انظر ص ٢٢، هذا عدا فقرتين أخريين قصيرتين، الأولى سطران والثانية سطر واحد - انظر ص ٢٨ وص ٤٢، زد على هذا أنها تنقص عن «ف» أربع كلمات وست عبارات (من كلمتين على الأقل). أما «ف» فهي أيضاً تنقص عن «ل» خمس كلمات. ثم إن المقارنة بين المخطوطتين تبين أيضاً أخطاء مشتركة كثيرة، منها تكرار عبارة «ضعف المطلوب» في المخطوطتين (انظر ص ٢٦ سطر ١٨) أو كتابة «الجذور» بدلاً من «الجذر» (انظر ص ٢٩ سطر ١٦)، وأيضاً كتابة بغير «يصير» في «ف» «ويصر» في «ل» (انظر ص ٤٠ سطر ١٨) أو «نقل»: «نقله» (انظر ص ٤٥ سطر ١٨).

وبعد النظر في المخطوطتين والمقارنة بينهما يبدو لنا - لكثرة الأخطاء المشتركة، ولما قلناه قبل هذا - أن لهما الأصل نفسه، وهذا يعني أن مخطوطة «ف» قد نقلت عن مخطوطة «ب» نفسها، وهذا هو الأرجح، ومهما كان الأمر فمخطوطة «ف» أفضل من «ل». ففي هذه الأخيرة كما ذكرنا تنقص فقرة كاملة طويلة وفقرتين قصيرتين بينما لا تنقص «ف» - بالنسبة إلى «ل» - أية فقرة. وهذا ضمان للنص المحقق.

ومن ثم قام تحقيق الخمس الأول من رسالة الطوسي معتمداً على «ف» و«ل»، والثلاثين الآخرين منها معتمداً على النموذج نفسه، أي على مخطوطة «ب»، وما تبقى - وهو جزآن من خمسة عشر جزءاً - اعتمد تحقيقه على «ل» فقط.

أما الآن فلا مناص من الحديث عن اسم رسالة الطوسي، الذي لم تذكره الكتب والتراجم من قبل، واكتفت بالإشارة إلى ما تعالجه تلك الرسالة من موضوعات، مثل

«المعادلات» و«طريقة الجدول». ولهذا كان أمامنا أن نختار بين تسمية الكتاب بموضوعه العام والوقوف مثلاً على «رسالة في الجبر والمقابلة» متابعين في هذا تسمية الخيام لرسالته، أو الأخذ بما اختاره ذلك المجهول الذي نقل الرسالة وهو «المعادلات»، فهو يقول «وسميته بالمعادلات»، وكان هو الاسم الذي سميت به الرسالة. فناسخ «ب» يكتب عند انتهائه من الرسالة: «تم الكتاب الموسوم بالمعادلات». ولهذا أثّرنا هذا الاسم الذي ربما يكون من «المجهول»، ولكنه يعبر تعبيراً صحيحاً عن فحوى الكتاب ومضمونه، بل يعبر عن تلك الخطوة النظرية التي انتهت بانبثاق فصل جديد بين الجبر والهندسة، اسمه «المعادلات الجبرية».

ويعد أن فرغنا من صفة مخطوطات الرسالة، بقي أن نصف نسخ مؤلفات الطوسي الرياضية الأخرى. فالأولى هي «في الخطين اللذين يقربان ولا يلتقيان». ولا نعرف لهذه الرسالة إلا مخطوطة واحدة متضمنة في مجموعة من رسالتين، هذه ورسالة أخرى هي شرح «لتذكرة» نصير الدين الطوسي، وهو مخطوطة آيا صوفيا رقم ٢٦٤٦ باستانبول. ومن نهاية الرسالة الأولى - وهي التذكرة - نعرف أن الناسخ هو محمد بن مصطفى بن موسى الإبانلوغي المشهور بالصوفي وكتبها في أوائل جمادى الأولى سنة ٨٢٩هـ، أي في نهاية شهر آذار/مارس أو بداية شهر نيسان/أبريل سنة ١٤٢٦م. وتقع نسخة رسالة الطوسي هذه في آخر ورقة من ورقات المخطوطة - الورقة ٧١ - وهي من الورق نفسه وبالمخط نفسه، وهو خط نستعليق. وطول كل ورقة ٢٧,٦ سنتيمتراً وعرضها ١٨,٥ سنتيمتراً، أما النص فطولها ٢٤,٩ سنتيمتراً وعرضه ١٣,٢ سنتيمتراً وكل صفحة تحتوي على ٣١ سطراً، وكل سطر على ١٩ كلمة تقريباً. وكتب بحبر أسود إلا الأشكال الهندسية فرسمت بحبر أحمر. وليس هناك لحق بالهوامش، وإن كان الناسخ قد عارض الرسالة الأولى من المجموعة - وهي رسالة نصير الدين - بالأصل، فليس هناك ما يدل على أنه قام بهذا في رسالة شرف الدين. وهذه المجموعة من وقف السلطان محمود خان. وسأشير إليها بالحرف «أ». أما الرسالة الثانية من رسائل الطوسي الرياضية، فهي رسالة بعث بها إلى مراسل له يُدعى شمس الدين. وهناك مخطوطتان لهذه الرسالة، الأولى في مجموعة رقم سميث - شرقيات ٤٥ بجامعة كولومبيا بنيويورك بين الصفتين ٢٩ و٣٥، والأخرى في مجموعة رقم شرقيات ١٤ بليدن بين صفحات ٣٢٣ وجه - ٣٢٦ وجه. ولقد بينّا أن هذه المخطوطة الأخيرة ما هي إلا نسخة عن المخطوطة الأولى، كتبت في القرن السابع عشر، ووصفنا حيثنذ المخطوطتين بالتفصيل^(١٢). ولهذا سنأخذ عند التحقيق بالمخطوطة الأولى فقط، والتي سنشير إليها بالحرف «ك».

(١٢) انظر: عمر الخيام، رسائل الخيام الجبرية، حققها وترجمها وقدم لها رشدي راشد وأحمد جبار، مصادر ودراسات في تاريخ الرياضيات العربية؛ ٣ (حلب: معهد التراث العلمي العربي، ١٩٨١)، ص ١٥ - كا.

ثانياً: شرف الدين الطوسي ونظرية المعادلات

تُعد دراسة نظرية المعادلات الجبرية من أكثر فصول الرياضيات الكلاسيكية أهمية. لم يفت هذا جمهرة مؤرخي الرياضيات، وهذا ما حثهم على الرجوع إلى الماضي السحيق لاكتشاف بذور هذه النظرية. وعسر علينا كتابة ذلك التاريخ هنا، إذ أن هذا يرجع إلى التأريخ للجبر نفسه مما يحتاج إلى كتاب آخر قائم بذاته. ويكفي - لما نحن فيه - أن نذكر بأن أول من صاغ نظرية لمعادلات الدرجة الأولى والدرجة الثانية هو محمد بن موسى الخوارزمي في كتابه المشهور المختصر في حساب الجبر والمقابلة. ولا يعني هذا أنه لم يكن قبل الخوارزمي أبحاث في المعادلات. فمن المعروف أن البابليين قد عالجوا خمسة وعشرين قرناً قبل الخوارزمي مسائل من الدرجة الأولى والثانية، ومن المعروف أيضاً أن كتاب الأصول لإقليدس يحتوي على أعمال هندسية لمسائل من الدرجة الثانية، أرجعها الرياضيون العرب لأول مرة - مثل ثابت بن قرة - إلى معادلات جبرية، ومن المعروف كذلك أن ديوفنتس الإسكندراني في كتابه المشهور المسائل العددية قد بحث في عديد من المسائل من الدرجة الثانية، بل من درجات أعلى، تصل إلى التاسعة، ومع هذا لم يسبق أحد الخوارزمي في تصور علم جديد، أعني الجبر، سيتطلب تكوينه عدم الاكتفاء بمجرد التوقف عند لوغريتميات الحلول كالبابليين، ولا عند العمل الهندسي الصرف للمسائل كإقليدس، ولا عند الحل العددي للمعادلات كديوفنتس، بل صياغة لنظرية المعادلات. وإن لم نفهم، بوضوح، هذا الفرق بين ما قام به الخوارزمي وما قام به سابقوه، لم ندرك شيئاً من مساهمة الخوارزمي في الرياضيات^(١٣).

فنظرية المعادلات تظهر منذ البدء وسيلة لتكوين علم الجبر نفسه، وتحتل مكان الصدارة فيه، فهي تحتل الجزء الأكبر والأهم من كتاب الخوارزمي.

أما خلفاء الخوارزمي، فلقد اتجهوا جهة تطوير الحساب الجبري المجرد، وقد أدى هذا الاتجاه - كما سبق أن بينا - إلى خلق جبر متعددات الحدود^(١٤)، وخف الاهتمام بنظرية المعادلات الجبرية في ذاتها. ويكفي النظر إلى كتاب الفخوري للكرجي على سبيل المثال لتبين أنها لم تعد بعد تحتل مكان الصدارة. ومع هذا فإن البحث فيها لم يتوقف. فمن المعروف أن الجبريين من أمثال سنان بن الفتح والكرجي درسوا معادلات الدرجة الثانية بصورة عامة. ومما لم يكن معروفاً من قبل أن الجبريين من

(١٣) انظر: Roshdi Rashed, *Entre arithmétique et algèbre, recherches sur l'histoire des mathématiques arabes*, collection sciences et philosophie arabes (Paris: Les Belles lettres, 1984), pp. 17 sqq.

(١٤) المصدر نفسه.

خلفاء الكرجي حاولوا حل معادلة الدرجة الثالثة بطريقة جبرية، فعادة ما كانت تُنسب مثل هذه المحاولات إلى الرياضيين الإيطاليين من القرن الرابع عشر^(١٥).

ويشرح لنا أبو الحسن علي أبو المسلم بن محمد علي بن الفتح السلمي اهتمام الرياضيين بالحل الجبري لمعادلة الدرجة الثالثة وتوقفهم دونه، فيقول فيما زاد على ثلاثة أنواع يعادل بعضها بعضاً: «فإن أكثره ممتنع وما يمكن استخراجه منها يسير يعسر العمل فيه. فيصعب جداً وتختلف طرق استخراجه، ولذلك لم يذكره كثير من الحساب بل حضروا الممكن منه...»^(١٦). ثم يعرض فيما بعد للممكن منه قائلاً: «كعاب وأموال وأشياء تعدل عدداً. ولهذا النوع شرطان: أحدهما المناسبة والثاني أن يكون ثلث عدد الأموال جذراً لثلث عدد الأشياء، فإذا وجد الشرطان خرجت بالعمل». أما الآخر فكما قال: «كعب واثنا عشر شيئاً تعدل ستة أموال واثنين وسبعين من العدد؛ فهو ممكن لوجود الشرطين، فزادها هنا شرط ثالث وهو أن يكون الأشياء مع الكعب، فلو كانت الأموال مع العدد لم تخرج لها تذكرة بعد»^(١٧). وبالنظر إلى ما ذكره السلمي يتبين لنا أن هذين النوعين هما:

$$x^3 + ax^2 + bx = c \quad x^3 + bx = ax^2 + c$$

ويفرض السلمي منذ البداية أن $a^2 = 3b$ ، ثم يستخرج جذراً موجباً لكل واحدة من المعادلتين:

$$x = \left(\frac{a^3}{27} + c \right)^{\frac{1}{3}} - \frac{a}{3} \quad x = \left(c - \frac{a^3}{27} \right)^{\frac{1}{3}} + \frac{a}{3}$$

ومن ثم فالسلمي يرجع المسألة - باستعمال تحويل أفيني - إلى «الصورة القانونية». ولكن بدلاً من محاولة تحديد «المميز»، فإنه يعادل معامل المجهول ذي القوة الأولى صفراً، وذلك ليرد المسألة إلى مجرد استخراج جذر تكعيبي. فهو على سبيل المثال، يلجأ في المعادلة الأولى من الاثنتين السابقتين إلى التحويل الأفيني:

$$x \rightarrow y - \frac{a}{3},$$

ومن ثم ترجع المعادلة إلى معادلة من الصورة:

$$y^3 + py - q = 0,$$

(١٥) المصدر نفسه.

(١٦) أبو الحسن علي أبو المسلم بن محمد بن الفتح السلمي، المقدمة الكافية في حساب الجبر والمقابلة وما يعرف بقياسه من الأمثلة، (الفاتيكان، مخطوطة مجموعة سباط، رقم ٥)، ص ٩٢^ط.

(١٧) المصدر نفسه، ص ٩٣ ط - ٩٤.

مع $p = b - \frac{a^2}{3}$ ، $q = c + \frac{a^3}{27} + \left(b\frac{a}{3} - \frac{a^3}{9}\right)$ ، فإذا فرضنا $b = \frac{a^2}{3}$ يتج

$$y^3 = c + \frac{a^3}{27} ,$$

ومنه قيمة x .

هذه هي أهم الاتجاهات في نظرية المعادلات في الجبر الحسابي، الذي أصبحت هذه النظرية فيه - كما قلنا - هي إحدى فصول هذا الجبر لا أكثر.

وسيتخلف الوضع اختلافاً كبيراً عندما يبدأ الرياضيون العرب بإنشاء علاقات جديدة بين الجبر والهندسة. ففي القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) بخاصة ترجم كثير من الرياضيين المسائل المجسمة التي لا يمكن عملها بالمسطرة والفرجار بلغة الجبر، وهذا كان لأول مرة في تاريخ الرياضيات. فعلى سبيل المثال ترجمت مسألة تقسيم الزاوية ثلاثة أقسام، ومسألة إيجاد خطين بين خطين لتتوالى الأربعة متناسبة، وعمل المسبوع في الدائرة، وغيرها بلغة الجبر، أي تُرجمت إلى معادلات جبرية. ولم يكتف الرياضيون بترجمة تلك المسائل التي ورثوها عن اليونان بلغة الجبر بل أضافوا إليها مسائل أخرى من النوع نفسه وجدها علماء الهيئة، مثل تحديد أوتار بعض الزوايا لعمل جداول الجيوب، ومن بين من شاركوا في هذا الاتجاه: الماهاني، والخازن، والبيروني، وأبو نصر بن عراق.

ومن جهة أخرى قام الرياضيون بحل المعادلات من الدرجة الثالثة بطريق آخر غير الطريق الجبري، إذ لجأوا إلى ترجمة المعادلات الجبرية بلغة الهندسة، وذلك حتى يمكنهم استعمال القطوع المخروطية وتقاطعها لحل تلك المعادلات. فلقد كانت هذه الوسيلة معروفة منذ الرياضيات الهلنستية وبعدها في الرياضيات العربية عند القوهي وابن الهيثم على سبيل المثال، لمعالجة المسائل المجسمة، لا المعادلات. وبدأ بعض المهندسين من أمثال أبي الجود بن الليث استعمالها لحل معادلة أو أخرى من معادلات الدرجة الثالثة.

ولعل أول صياغة نظرية حقيقية لهاتين الترجمتين، أو لتلك العلاقات الجديدة بين الجبر والهندسة، أو لهذا الجدل بين الجبر والهندسة الذي هو لب الرياضيات الكلاسيكية منذ بدايتها في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) تقريباً، هي صياغة أبي الفتح عمر الخيام.

قصد الخيام - على نقيض من سبقه - تجاوز المعالجة الجزئية إلى الصياغة النظرية، فهو لم يعالج هذه المسألة أو تلك كما فعل أبو الجود، ولكنه رام تأسيس نظرية المعادلات من جديد، أو كما قال: «وليس لواحد منهم < من سابقه > في تعدد أصنافها وتحصيل أنواع كل صنف منها والبرهان عليها كلام يعتد به إلا صنفين

سأذكرهما. وإني ولم أزل شديد الحرص على تحقيق جميع أصنافها وتمييز الممكن من الممتنع في أنواع كل صنف ببراهين لمعرفةتي بأن الحاجة إليها في مشكلات المسائل ماسة جداً»^(١٨).

والنظرية الجديدة هي نظرية للمعادلات الجبرية من الدرجات الثلاث الأولى، يدرس فيها العمل الهندسي لتحديد الجذور الموجبة. ولصياغة هذه النظرية كان على الخيام أن يتصور بصورة جديدة العلاقة بين الجبر والهندسة. ولعل أهم مفهوم لتحديد تلك العلاقات هو مفهوم «وحدة القياس». فلقد عرّفها الخيام في علاقتها مع مفهوم «البعد». وهذا ما أدى إلى إمكان تطبيق الهندسة على الجبر عنده، وصياغة أول نظرية هندسية للمعادلات الجبرية.

كان إذاً لهذه العلاقات الجديدة التي أقامها الخيام بين الهندسة والجبر الفضل في صياغة نظرية تتجاوز تباين الميدانين، وتكون من بعد حقلاً لبحوث مستقلة قائمة عليها فقط. فالخيام يعرض في كتابه لهذه النظرية فحسب، وسيعرض لها دون غيرها من ميادين الجبر. ومعه ستبدأ هذه السلسلة، أعني تلك الكتب المخصصة لمعالجة نظرية المعادلات فحسب.

ولفهم هذا الموقف الجديد نشير إلى الجبريين الآخرين في عصر الخيام. فعلى نقض الجبريين الحسابيين لا يعرض الخيام لأي فصل من تلك الفصول التي كان يتضمنها كل كتاب في الجبر، بل تلك التي كانت تحتل مكان الصدارة في رسائل الجبر هذه، مثل دراسة القوى الجبرية، ومتعددات الحدود والأعداد الصم الجبرية الخ... وهكذا فقد نحا الخيام نحواً جديداً في الكتابة والتأليف ملائماً للمعرفة الجديدة نفسها، وقدم نموذجاً سيأخذ به ويطوره خلفاؤه من بعده. ففي هذا النموذج سيحدّ الجبر بنظرية المعادلات، وسيعرّف الجبر بأنه علم المعادلات الجبرية. ويعرض الخيام، على التوالي، لمفهوم العظم الجبري ليعرف مفهوم وحدة القياس، ثم للمعادلات اللازمة، ولتصنيف معادلات الدرجات الثلاث الأولى، ثم للنظر إلى المعادلات ذات الحدين من الدرجتين الثانية، ثم إلى ذات الحدود الثلاثة من الدرجتين الثانية والثالثة، ثم إلى ذات الحدود الأربعة من الدرجة الثالثة، ثم إلى تلك التي تتضمن عكس المجهول.

وانتهى الخيام في رسالته إلى فئتين من النتائج الهامة في تاريخ الجبر، كثيراً ما تنسبان إلى ديكارت؛ أما الفئة الأولى فتتعلق بالحل العام لكل معادلات الدرجة الثالثة، باللجوء إلى تقاطع مخروطيين؛ وأما الفئة الثانية فهي تخص الحساب الهندسي الذي أصبح ممكناً نتيجة لتعريف «الوحدة» في كل بُعد من الأبعاد الثلاثة: الطول والسطح والجسم.

(١٨) الخيام، رسائل الخيام الجبرية، ص ٢.

وزيادة على هذا فلقد اجتهد الخيام في الحل العددي لمعادلة الدرجة الثالثة. ففي رسالته «في قسمة ربع الدائرة» يصل الخيام إلى حل عددي تقريبي باستعمال جداول حساب المثلثات^(١٩).

كل هذا قد تم في النصف الأول من القرن الخامس الهجري، وفيه نجد أول رسالة خصصت كاملة لنظرية المعادلات الجبرية، وحدها دون غيرها، والتي تعكس بنيتها تصنيف الخيام للمعادلات.

ولقد ظن كثير من المؤرخين أن مساهمة الرياضيين العرب في نظرية المعادلات لا تتجاوز كثيراً ما قدّمه الخيام في رسالته، وأن هذه الرسالة لم يكن لها بعد تاريخي، وعلى هذا فلن يلبث الطريق الذي بدأه الخيام أن يُسد. ولقد سقط هذا الظن عند دراستنا لشرف الدين الطوسي ومؤلفاته.

من الروايات التي نجدها في كتب الرياضيين منذ القرن الرابع عشر وما بعده، وكذلك في بعض التراجم أن تلميذ الخيام شرف الدين المسعودي قد ألف كتاباً في نظرية المعادلات، يتضمن معادلات الدرجة الثالثة، وشهد بهذا كمال الدين الفارسي ومن تبعه مثل جمشيد الكاشي واليزدي وغيرهم. ففي أساس القواعد كتب الفارسي: «لم يُنقل من الأولين شكر الله مساعيهم مع وفر اهتمامهم بتمهيد قواعد العلوم وتدوين أبواب النظريات في أنواع الحكم والرياضيات وأصناف الصناعات إلا مسائل ست، ولا من المتأخرين إلا الإمام المتبحر شرف الدين المسعودي جزاءه الله خير الجزاء، فقد نُقل أنه بين استخراج الشيء في تسع عشرة مسألة أخرى غير الست»^(٢٠). وينقل الكاشي رواية الفارسي فيقول: «وقد أورد شارح البهائية (أي الفارسي) أن الإمام شرف الدين المسعودي استخراج تسع عشرة مسألة غير الست المشهورة، ويّين كيفية استخراج المجهول منها»^(٢١). ولقد روى هذه الرواية عن الفارسي يحيى الكاشي فقال: «وقد حكى الفاضل الشارح (أي الفارسي) أن الإمام شرف الدين المسعودي استخراج تسع عشرة مسألة غير الست المذكورة ويّين كيفية استخراج المجهول منها»^(٢٢). أما عن اليزدي فقد أعاد رواية الكاشي على لسانه^(٢٣).

(١٩) المصدر نفسه، ص ٩٧ - ٩٨.

(٢٠) كمال الدين أبو الحسن الفارسي، أساس القواعد في أصول الفوائد (استنبول، مخطوطة شهيد علي باشا، ١٩٧٢)، ص ٢٣١ ط.

(٢١) غياث الدين جمشيد بن مسعود الكاشي، مفتاح الحساب، تحقيق أحمد سعيد الدرداش ومحمد حمدي الحفني الشيخ؛ مراجعة عبد الحميد لطفلي (القاهرة: [د.و.د.]، ١٩٦٧)، ص ١٩٨ - ١٩٩. ولقد توهم المحققان أن المؤلف يقصد غياث الدين الكاشي لا الفارسي.

(٢٢) يحيى بن أحمد الكاشي، إيضاح المقاصد لفرائد الفوائد (استنبول، مخطوطة جبار الله، ١٤٨٤)، ص ١٢٨ ط.

(٢٣) محمد بن باقر اليزدي، عيون الحساب (استنبول، مخطوطة هازيناسي، ١٩٩٣)، ص ٥٩ ط.

أما في كتب التراجم فينسب إلى شرف الدين المسعودي رسالة وافية في الجبر، هذا ما نقرأه في مفتاح السعادة لأحمد بن مصطفى المشهور بطاشكيري زاده^(٢٤).

فمن رواية الفارسي أصلاً نعلم بوجود رسالة المسعودي هذه. ومن المعروف أن المسعودي هذا من تلاميذ الخيام^(٢٥) فهو من الجيل السابق على جيل الطوسي.

وأسانيد الرياضيين ترجع كلها إلى كمال الدين الفارسي، وربما كان الفارسي أو أحد المتأخرين من الرياضيين هو المصدر الذي استقى منه طاشكيري زاده روايته. ومن ثم لا نستطيع بعد أن نجزم بوجود رسالة المسعودي هذه، لعدم وصولها، أو وصول أية فقرة منها إلينا ولقلة الأدلة ورجوعها جميعاً - على وجه التقريب - إلى المصدر نفسه وهو الفارسي.

ولكن مما لا ريب فيه اهتمام رياضيي القرن السادس، من خلفاء الخيام، بنظرية المعادلات في فترة اشتها الطوسي أو قبلها، بعد الخيام مباشرة، ومن الأدلة على هذا ما نقرأه في إحدى مخطوطات هذه الفترة، أي سنة ٥٨١هـ - ١١٨٥م، وفيها يقول المؤلف: «فأما ما يقع في الاقتراعات المتعادلة بين ثلاثة أصول غير متناسبة، ثم ما زاد عليها، متناسبة كانت أو غير متناسبة، مثل الذي يمكن أن يقع في الحيزين الثلاثين اللذين أحدهما مكعبات وأموال وعدد، والثاني مكعبات وجذور وعدد من المقترنات الستة، أو في الحيز الواحد الرباعي الذي هو مكعبات وأموال وجذور وعدد من المقترنات السبعة أو غيرها، مما يستعمل على ما فوق هذه المنازل، فلا يكاد يطرد ذلك بما قدمنا من القياسات العددية إلا من جهة التقدير المساحية بتقديم القطوع المخروطية»^(٢٦).

فلننظر الآن في رسالة الطوسي نفسها كي نفهم بنيتها وأهم ما جاء به فيها. يفتتح الطوسي رسالته بدراسة القطوع المخروطية التي سيحتاج إليها فيما بعد، وذلك حتى يكتمل العمل ولا يلزم القارئ الرجوع إلى غيره. فيدرس القطع المكافئ والقطع الزائد ويعطي - وهذا هو ما يجب الانتباه إليه - معادلة كل منهما بحسب محاور معينة. ثم يعرض لبعض الأعمال الهندسية التي يلجأ في حلها إلى تلك المعادلات. ويفترض الطوسي في رسالته معرفة القارئ بمعادلة الدائرة.

(٢٤) أبو الخير أحمد بن مصطفى طاشكيري زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور (القاهرة: [د.ن.]، ١٩٦٨)، ج ١، ص ٣٩٢.

(٢٥) كان قد استقر في وهي في أول دراسة عن الطوسي قمت بها أن شرف الدين الطوسي هو شرف الدين المسعودي، لاشتراكهما في الاسم والبحث والمكان.

(٢٦) انظر الرسالة التي نسبت خطأ إلى: أبي كامل شجاع بن أسلم، رسالة في الجبر والمقابلة (مخطوطة آستان، قدس، مشهد، ٥٣٢٥)، ص ٢٤.

يعقب هذا تصنيف المعادلات من الدرجات الثلاث الأول. ولا يبنى الطوسي هنا معياراً داخلياً لهذا التصنيف بل معياراً خارجياً. فعلى نقيض الخيام لا يأخذ فقط عند تصنيفه بدرجة متعدد الحدود المقترن بالمعادلة، ولا بعدد الحدود التي يتضمنها متعدد الحدود هذا، بل - وهذا جدير بالتأمل - يأخذ أصلاً بوجود أو عدم وجود الجذور الموجبة، وهي الجذور المعترف بها في تلك الفترة. وبوجه أعم فمشكلة «الوجود» هذه والبرهان عليه هي التي شغلت الطوسي كثيراً، وفرّقت بينه وبين الخيام. واختار هذا المعيار نفسه أدى ضرورة إلى انقسام الرسالة إلى جزأين متميزين تمايزاً واضحاً.

ويعالج الطوسي في الجزء الأول حل عشرين معادلة. وعند دراسة كل منها يقوم الطوسي كالخيام من قبل بالعمل الهندسي للجذر، وهذا بتقاطع قطعي مخروط أو تقاطع قطع مخروط ودائرة. ولم يبحث عن الحل الجبري إلا لمعادلات الدرجة الثانية فقط، ولم ينس أن يبحث عن العلاقة بين الجذور والمعاملات لمعادلة الدرجة الثانية ذات الجذرين الموجبين.

ولقد درس الطوسي كذلك المعادلات التي لا يمكن إرجاعها إلى معادلات أخرى من بين تلك العشرين معادلة، ودرس الحل العددي لكل منها، واستثنى من ذلك الحل العددي للمعادلات المفردة مفترضاً معرفة القارئ به، أي باستخراج الجذر التربيعي والجذر التكعيبي. وللوصول إلى هذا الحل العددي لمعادلات الدرجة الثانية والثالثة لم يتم الطوسي بتعميم منهج روفيني - هورنر لاستخراج جذور الأعداد على استخراج جذور المعادلات فحسب، بل صاغ نظرية رياضية كاملة لتبرير هذا المنهج. وعلى الرغم مما تتضمنه هذه النظرية من أخطاء - فالمسألة غير قابلة لحل عام حتى يومنا هذا - فإنها أدت إلى بحث عميق في متعددات الحدود. وهدف الطوسي في نظريته هذه بيان الأسس التي يقوم عليها تحديد أرقام الجذر الموجب للمعادلة، أو أكبر جذر موجب إن كان هناك أكثر من واحد. وتبدأ المشكلة عند تحديد الرقم الأول من الجذر. وفكرة الطوسي هي التالية: فبدلاً من اللجوء إلى كل الحدود، علينا استعمال عدد محدود منها، ومن ثم محاولة التعرف على «متعدد حدود مهيمن». أما تحديد الأرقام الأخرى فيقوم على استعمال «مشتق» متعدد الحدود ولا يخفى على القارئ أهمية هذه النتائج التي وصل إليها الطوسي.

وهكذا بعد أن قام بدراسة معادلات الدرجة الأولى والثانية ومعادلة $c = x^n$ ، يعالج الطوسي سبع معادلات من الدرجة الثالثة لكل منها جذر موجب. أما جذورها السلبية فلا يهتم بها الطوسي. فهو كمعاصريه وكخلفائه لا يقر بوجود جذور سلبية. ولدراسة كل من هذه المعادلات، يختار الطوسي قطعين مخروطين أو بصورة عامة مُنحنيين من الدرجة الثانية. ويبين الطوسي بعد هذا معتمداً على الخصائص الهندسية لتلك المنحنيات أنها تتقاطع على نقطة يحقق إحداثيها السبني المعادلة. ويلجأ الطوسي - عن طريق

الحدس على الأقل في مناقشته لتقاطع المنحنيات وللبرهان على وجود نقطة التقاطع - إلى معادلات المنحنيات من جهة، وكذلك لاتصال المنحنيات وتقييرها.

ويتهي هذا الجزء بدراسة المعادلة ذات المعاملات الموجبة:

$$x^3 + bx = ax^2 + c$$

وهي ذات ثلاثة جذور موجبة. وهنا يتبع الطوسي الخيام، فتغيب عنه هذه الحقيقة ولا يستخرج إلا جذراً واحداً.

وقراءة الجزء الأول من رسالة الطوسي تدل دلالة واضحة على ما رامه وما هدف إليه، وهو عمل الجذور الموجبة للعشرين معادلة الأولى، والتي سيرجع إليها ما تبقى من المعادلات بالتحويلات الأفينية. ففي هذا الجزء يتبع الطوسي الخيام في خلق وإغناء هذا الفصل الجديد في عمل الجذور أو بنائها، إلا أنه - على نقيض الخيام - يحرص على البرهان على وجود نقط التقاطع من جهة، ويدخل من جهة أخرى مفاهيم عدة - مثل التحويلات الأفينية، أو بُعد نقطة عن خط - سيكون لها أهمية خاصة في الجزء الثاني من الكتاب.

وهذا الجزء الأخير - وهو أكثر من نصف الرسالة - يعالج فيه الطوسي المعادلات الخمس الباقية والتي قد لا يكون لها أي جذر موجب وهي هذه:

$$x^3 + c = ax^2, \quad x^3 + c = bx, \quad x^3 + ax^2 + c = bx, \\ x^3 + bx + c = ax^2, \quad x^3 + c = ax^2 + bx.$$

وعلى خلاف الخيام، كان على الطوسي - لانشغاله بالبرهان على وجود الجذور الموجبة - أن يبحث عن أسباب اختفائها هنا وعلة ذلك. ولقد أدت هذه النظرة الجديدة، وهذا التساؤل الذي لم يسبق إليه، إلى تغيير المشروع العلمي نفسه واكتشاف وسائل تحليلية لمعالجة المعادلات. حتى تتضح الفكرة، علينا هنا أن نلخص بلغتنا إحدى دراسات الطوسي نفسه ولتكن دراسته للمعادلة:

$$ax^2 = x^3 + c$$

التي يعاد كتابتها على الصورة التالية:

$$c = x^2(a - x) \quad (1)$$

ولنفرض

$$f(x) = x^2(a - x) \quad (2)$$

وهنا يعدد الطوسي الحالات التالية:

$c > \frac{4a^3}{27}$ فتكون المسألة مستحيلة بحسب رأي الطوسي، أي أن لها جذراً سالباً.

$c = \frac{4a^3}{27}$ وهنا يستخرج الطوسي الجذر المزدوج $x_0 = \frac{2a}{3}$ ولكنه لا يقر بالجذر السالب .

$c < \frac{4a^3}{27}$ وهنا يستخرج الطوسي جذرين موجبين للمعادلة :

$$0 < x_1 < \frac{2a}{3} < x_2 < a$$

ويدرس الطوسي بعد هذا «العدد الأعظم» فيبرهن على :

$$f(x_0) = \sup_{a < x < a} f(x) \quad (٣)$$

$$مع \quad x_0 = \frac{2a}{3}$$

ولهذا يبرهن أولاً

$$x_1 > x_0 \Rightarrow f(x_1) < f(x_0)$$

ثم يبرهن بعد ذلك

$$x_2 < x_0 \Rightarrow f(x_2) < f(x_0)$$

ويستنتج من الخطوتين (٣) .

ومن الجدير ببالغ الاهتمام أن الطوسي ، لكي يجد $x_0 = \frac{2a}{3}$ يحل المعادلة :

$$f'(x) = 0$$

ويقوم الطوسي بعد ذلك بحساب «العدد الأعظم» :

$$f(x_0) = f\left(\frac{2a}{3}\right) = \frac{4a^3}{27}$$

وهذا الذي يمكنه من تحديد الحالات المذكورة سابقاً .

ثم يواصل الطوسي بحثه فيستخرج الجذرين الموجبين بالنهج التالي : لاستخراج x_2 ، يفرض $x_2 = x_0 + x$ ، وهذا التحويل يؤدي إلى المعادلة التالية التي سبق حلها :

$$x^3 + ax^2 = k$$

$$وفيها \quad k = c_0 - c \frac{4a^3}{27} - c$$

ولن ينسى الطوسي أن يبرز هذا التحويل الأفيني الذي لجأ إليه .

ولاستخراج الجذر الموجب الثاني ، يسلك الطريق نفسه فيفرض $x_1 = x + a - x_2$ ويؤدي هذا التحويل الأفيني إلى معادلة أخرى سبق له حلها في الرسالة .

وأيضاً لا ينسى الطوسي أن يتحقق من $x_1 \neq x_0$ و $x_1 \neq x_2$ وأن يبرر هذا التحويل

الأفيني . أما الجذر السالب الباقي فلا يعرض له الطوسي كما سبق أن ذكرنا .

فمن الواضح إذاً أن ظهور صيغة «المشتق» في رسالة الطوسي لم يكن محض مصادفة أو مجرد اتفاق . فلقد ظهر من قبل عند تحليل منهج الطوسي للحل العددي للمعادلات ، وظهر عند البحث عن «العدد الأعظم» في الجزء الثاني من الرسالة . وفي كلتا الحالتين اكتفى الطوسي بتطبيق المفهوم دون شرحه وتفسيره . ومن ثم ، تظهر في رسالة الطوسي لأول مرة في تاريخ الرياضيات الفكرة التالية : تحديد النهايات القصوى للمعبارات الجبرية ، ودراسة تغير توابع متعدّدات الحدود في جوار النهاية القصوى ، حتى يمكن حسابها . وعند الطوسي - خلافاً لما قد يمكن أن نجده من قبل في الرياضيات اليونانية أو العربية ، مثل أرخميدس أو القوهي - لا يتعلق الأمر بمساحات وحجوم قصوى ، بل بتوابع متعدّدات الحدود .

ولم يقف الطوسي عند هذه النتائج بل ظفر بأخرى عديدة ، نذكر منها فقط معرفة بأن متعدّد الحدود $p(x)$ يقسمه $(x - r)$ إذا كان r جذراً للمعادلة $p(x) = 0$.

فمن الواضح - كما بينا - أن الجزء الثاني من رسالة الطوسي تحليلي الطابع ، تابعي الاتجاه .

فالحساب جبري صرف ، والأشكال الهندسية لا وظيفة لها إلا إعانة التصور . ولكن علينا ألا ننسى العقبين اللتين حالتا دون أن يكون لهذه الرسالة ما استحقته من أثر في الرياضيات العربية فيما بعد ، وأعني بهذا غياب الأعداد السلبية وعدم الإقرار بها ، وكذلك عدم الوصول إلى اللغة الرمزية . فلقد أدى غياب الأعداد السلبية إلى تعدد الحالات للعملية الواحدة ، كما أدى غياب اللغة الرمزية إلى طول العبارة وغموضها ، وهذا كله جعل رسالة الطوسي صعبة المنال ، فلم تؤت كل ثمارها .

ولا يعني هذا أن رسالة الطوسي قد دفنت مع صاحبها ، فلقد بينّا من قبل ذكرَ الرياضيين لها . وبحسب ما نعرفه الآن من مؤلفات الرياضيين العرب ، وهو قليل ، ورث خلفاء الطوسي منهجه في الحل العددي للمعادلات - أي ما يُسمى بمنهج روفيني - هورنر - أما نتائج الجزء الثاني من رسالته ، وأسلوبه الرياضي الجديد ، الذي يعكس اكتشاف الطوسي للبحث «المحلي» ، أي في جوار النقطة ، فسوف نواجهها من جديد في القرن السابع عشر ، عند الرياضي الفرنسي فيرما بخاصة .

ويُلمزنا هذا بإعادة التأريخ إذاً لعلاقة الجبر بالهندسة ، ولما قدمته الرياضيات العربية في هذا المجال . فلا مفرّ لمؤرخ الهندسة الجبرية أو التحليلية من البدء بما قدّمه الخيام والطوسي بخاصة .

أما رسائل الطوسي الأخرى في الرياضيات ، فهي تعبّر عن أجزاء من المشروع نفسه . فرسالته «في الخطين اللذين يقربان ولا يلتقيان» يعيد فيها ويكمل ما سبق له

تحريره في رسالته في «المعادلات». أما رسالته الأخرى «في عمل مسألة هندسية»، فهي تبين - حتى في هذا النوع من المسائل - لجوءه إلى الجبر للقيام بمثل هذا العمل.

تلك هي الملامح الأساسية لما حققه شرف الدين الطوسي، وما وصل إليه في الرياضيات، بعد أن ظل ذلك مغموراً مجهولاً، مما أدى إلى صورة مبتورة لتاريخ نظرية المعادلات والهندسة التحليلية.

الرموز

- أ آيا صوفيا ٢٦٤٦
- ب خدابخش ٢٩٢٨
- ف البندقية مرشيانا شرقيات ١١٩٠٧
- ك كولومبيا شرقيات سميث ٤٥
- ل المكتب الهندي - لندن - لوٲ ٧٦٧
- / انتهاء صفحة المخطوطة
- < > نقترح إضافة ما بينهما
- [] نقترح حذف ما بينهما

مقدمة

أولاً: ثنائية الجبر والهندسة عند الخيام والطوسي

يعتبر مؤرخو العلوم وفلاسفة المعرفة، بحق، أنَّ مزاجية الجبر والهندسة حددت مسار الدراسات التي هدفت إلى تقويم وتحليل تشكُّل مجالٍ واسعٍ من الرياضيات بدأ مع إطلالة القرن السابع عشر. إن النتائج النظرية لعملية التزاوج هذه جعلتها تتعدى مجالها الأولي (الرياضيات) لكي تساهم في تكوين مجمل الفكر الكلاسيكي. لذلك، وخلال محاولة رسم معالم هذه العملية واستيعاب نتائجها يجد المؤرخ نفسه ملزماً بقراءة يقظة لأعمال ديكارت وفيرما (Fermat) بشكل خاص؛ كما يجد نفسه مدفوعاً لتفحص الحجج المتبادلة خلال تلك الفترة التي تميزت بالنقاشات الحادة والآراء المتضاربة. فمن جهة، على هذا المؤرخ أن يستوعب الوسائل التقنية المتبعة آنذاك، حيث تمتزج الهندسة الجبرية بالهندسة التفاضلية؛ ومن جهة أخرى عليه أن يحصر ويرسم حدود ظواهرية جديدة لموضوع الرياضيات.

إن أهمية هذا الموضوع، إضافة إلى تعقيداته، تدفع إلى المزيد من الحذر والتروّي لأنها تقتضي تعبئة الماضي واستخدامه. فيجب، بادئ ذي بدء، إعادة ترتيب المساهمات السابقة وتركيبها، ليس من أجل رسم التدرّج الزمني أو تحديد تأثير السابق في اللاحق، إنما لكي يأخذ كل مفهوم وكل عائق، موقعه بالنسبة إلى رياضي القرن الثامن عشر ومن سبقهم. فقبل إنجاز هذه المهمة يتعذّر القيام بدراسة تعتمد المقارنة وتحاول الإحاطة بما هو جديد عن طريق تحديد مكانه بالضبط. ولا ضرورة للتذكير بأن إنكار منجزات رياضي القرن السابع عشر عن طريق ردها ببساطة إلى أعمال سابقة، لا يقل خطراً عن اعتبار منجزات من سبقهم وكأنها منجزاتهم هم بالذات. وهنا نرى أنَّ الخطأ المرتكب بحق المعرفة التاريخية، أقل خطراً، إلى حد بعيد، من المجازفة بفقدان نهائي لروح المعرفة العلمية التي نؤرّخ لها. فالذي يستشف منجزات ديكارت من بين سطور كتاب المخروطات لأبولونيوس (Apollonius) حيث لا أثر بتاتاً للجبر، إنما يقفل فكره أمام جميع المسائل التي طرحها العلاقة بين الجبر والهندسة. وفي المقابل، فإنَّ إسناد بداية الفصل المتعلق بـ «البناء الهندسي للمعادلات» إلى أعمال هذا الفيلسوف

(ديكارت) يعتبر تعريضاً أكيداً للمكانة الحقيقية لعمله الخلاق ولإبداعه. وهنا لا يمكن تجنب الرجوع إلى تاريخ الرياضيات العربية حيث نجد المساهمات الأهم في هذا المجال، قبل مساهمات ديكارت وفيرما.

منذ ظهور كتاب الخوارزمي في بداية القرن التاسع للميلاد، سعى عدد لا بأس به من الرياضيين إلى توسيع الجبر وتطويره. ومن بين هؤلاء من قادتهم أبحاثهم إلى التعرف على قضية لم يكن من الممكن تصوُّرها قبل تشكُّل هذا العلم (الجبر). هذه القضية هي إمكانية ترجمة مزدوجة:

- ترجمة مسألة هندسية إلى مسألة دراسة وحلّ معادلة جبرية بمجهول واحد؛

- تحويل مسألة تتعلق بحل معادلة جبرية - بخاصة معادلة من الدرجة الثالثة - إلى مسألة بناء هندسي، وذلك بواسطة ترجمة هندسية، أي بواسطة المنحنيات.

ومن دون شك، لا يمكن تصوّر وجود مثل هذه الترجمة إلا من قبل رياضيين استوعبوا علم الجبر. لذلك لا يمكن بتاتاً أن ترجع بداية مثل هذه الترجمة إلى ما قبل القرن العاشر خلافاً لما قد يوحي به البعض. وفي الواقع، كان لا بد من انتظار انقضاء قرن ونصف تقريباً، لكي يقدم الخيّام هذه الترجمة كوسيلة لمعالجة مشروع علمي يتمتع بتبريراته وشروحاته كافة. ظهرت بدايات هذه الترجمة، إذن، مع تشكُّل علم الجبر إلا أنها لم تتمكن من فرض نفسها من دون الاصطدام بنوعين من العوائق التقنية:

- النوع الأول يتعلق بحل المسائل المجسمة الموروثة منذ القدم، التي لا تحلّ بواسطة المسطرة والفرجار، كمسائل «عمل المسّح في الدائرة» و«تثليث الزاوية» - تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء متساوية - ومسألة «المتوسطين» - إيجاد خطين بين خطين لتتوالى الأربعة متناسبة -؛ كما يتعلق هذا النوع من العوائق بحل مسائل طرحها رياضيون وفلكيون معاصرون كتحديد أوتار بعض الزوايا بهدف بناء جداول الجيوب؛ وفي كلتا الحالتين عمد الرياضيون إلى تحويل المسألة الهندسية المطروحة إلى مسألة جبرية هي حل معادلة تكعيبية. وتعتبر أسماء الماهاني، الخازن، البيروني، وأبي نصر بن عراق، علامات بارزة على هذه الطريق.

- النوع الثاني من العوائق يتعلق بصعوبة حل المعادلة التكعيبية بواسطة استخراج الجذور؛ وأمام هذه العوائق اضطر رياضيون من أمثال الخازن، أبي نصر بن عراق وأبي الجود بن الليث لطرح مسألة البناء «الهندسي» لجذور بعض المعادلات التكعيبية. وفي مواجهة هذه المعادلات، وجد الرياضيون أنفسهم، إذن، يطبقون تقنية استعملت عادة في دراسة المسائل المجسمة وهي تقنية تقاطع المنحنيات المخروطية. هذه الممارسة التي استعملها قدماء اليونان، ملكها رياضيو القرن العاشر وخلّصوها من شوائبها كما تدل، مثلاً، أعمال القوهي وابن الهيثم.

ولسنا هنا، في أي حال، بصدد إعادة عرض الأعمال المذكورة أعلاه وتحليلها، بهدف كتابة تاريخ هذه الترجمة المزدوجة، تاريخ تحولها البطيء من تقنية بسيطة خاصة، إلى وسيلة عملية لمشروع علمي مستقبلي كما أضحت عند الخيام (١٠٤٨ - ١١٣١ م). يجدر، فقط، أن نسجل أن المحاولة الأولى لإرساء قواعد هذه الترجمة المزدوجة رأت النور مع هذا الرياضي. هذا الواقع كان قد أصبح معروفاً في منتصف القرن التاسع عشر؛ فعندما دقق المؤرخ ف. ويكيه (F. Woepcke) وترجم، للمرة الأولى، رسالة الخيام في الجبر كان من المعروف أن هذا الأخير سعى جاهداً لإعادة التفكير في العلاقة بين الجبر والهندسة؛ هذا ما لم يفت المؤرخ إبرازه، حيث كتب بصدد الخيام وسابقه منوهاً بـ «فضلهم»، لأنهم كانوا أول من حاول تطبيق الجبر على الهندسة وبالعكس؛ كما أنهم أرسوا قواعد الصلة التي تربط الحسابات بالهندسة، هذه الصلة التي ساهمت بشكل بارز في تطور الرياضيات»^(١). وصحيح أن الخيام أراد أن يتجاوز إطار البحث الجزئي، أي البحث المرتبط بحل هذه الصورة أو تلك من صور المعادلة التكعيبية، لكي يشرع ببناء نظرية تتعلق بالمعادلات، ويصيح من خلالها نموذجاً للكتابة والتأليف. هذه النظرية الجديدة هي نظرية المعادلات الجبرية من الدرجة الثالثة وما دون، حيث تدرس معادلات الدرجة الثالثة بواسطة المنحنيات المخروطية بهدف إيجاد جذورها الموجبة. إنما، وفي سبيل الإعداد لبناء هذه النظرية، كان على الخيام أن يتصور علاقات جديدة بين الجبر والهندسة وأن يصوغ مثل هذه العلاقات. ولندكر هنا بأن المفهوم المركزي بالنسبة إليه، الذي أدرجه في هذا السياق، كان مفهوم وحدة القياس. هذا المفهوم، الذي يتحديده المناسب وبعلاقته بمفهوم البعد (Dimension) يسمح بتطبيق الهندسة على الجبر^(٢).

ولا بد من أن نستنتج أن هذا المشروع المزدوج يؤمن لنظرية المعادلات وضعاً جديداً: لقد تعالت فوق الحدود الفاصلة بين الجبر والهندسة؛ وأكثر من ذلك، بدا الجبر في أعمال الخيام مختزلاً إلى مسألة المعادلات الجبرية فقط، هذه المسألة التي لم تحتل في الأعمال الجبرية السابقة سوى مكان متواضع. فلقد كرس عدداً من الدراسات لهذه النظرية وكان عرضه الجبري محصوراً في هذا الفصل بالذات.

هكذا، إذن، وخلافاً للجبريين الحسابيين، أزاح الخيام من دراسته الجزء الذي اعتاد أن يحتل المكان الأكبر بل المكان المركزي في أي عمل جبري معاصر: دراسة القوى الجبرية (Puissances algébriques)، وكثيرات الحدود (Polynômes) والعمليات التي

Franz Woepcke, *L'Algèbre d'Omar Alkhayyāmī* (Paris: [s.n.], 1851), p. XII.

(١)

(٢) عمر الخيام، رسائل الخيام الجبرية، حققها رشدي راشد وأحمد جبار، مصادر ودراسات في تاريخ الرياضيات العربية؛ ٣ (حلب: معهد التراث العلمي العربي، ١٩٨١)، ص ١٤ - ١٦، و ٧٩ وما بعدها.

يمكن تطبيقها عليها، والأعداد الصماء الجبرية... إلخ.

فلم يتصور الخيام أو يقترح مشروعاً جديداً وحسب، بل قام بإنشاء نموذج للكتابة يلائم هذا المشروع. إنه يبدأ بمناقشة مفهوم «العظم» (Grandeur) لكي يصل إلى تعريف وحدة القياس؛ ومن ثم يقدم تصنيفه الخاص للمعادلات ويطرح المقدمات (Lemmes) الضرورية، لكي يعالج أخيراً بالترتيب وبحسب تصاعد درجات صعوبتها: معادلات الدرجة الثانية ذات الحدين، معادلات الدرجة الثانية ثلاثية الحدود، معادلات الدرجة الثالثة ثلاثية الحدود، معادلات الدرجة الثالثة رباعية الحدود والمعادلات المتعلقة بعكس (أي بمقلوب) المجهول.

وفي رسالته هذه، توصل الخيام إلى نتيجتين ملحوظتين:

- حل عام لمجمل معادلات الدرجة الثالثة بواسطة تقاطع قطعين مخروطيين؛

- حسابات هندسية أصبحت ممكنة عن طريق انتقاء وحدة قياسية للأطوال.

ويجدر أن نسجل بأن الخيام لم يتوقف عند هذا الحد، بل حاول إعطاء حلّ عددي تقريبي للمعادلة التكعيبية. ففي رسالته حول «قسمة ربع الدائرة»^(٣) مثلاً، حيث أعلن عن مشروعه للمرة الأولى، توصل إلى حلّ عددي تقريبي عن طريق جداول علم المثلثات. هكذا، إذن، في القرن الحادي عشر، بدأت العلاقات بين الجبر والهندسة وبدأ تشكل فصل جديد تركز حتى القرن الثامن عشر لأجل بناء المعادلات، كما بدأت أولى الكتابات التي خصصت، وبشكل كلي، لنظرية المعادلات الجبرية. إن بنية رسالة الخيام هذه تعكس بدقة، كما أشرنا، تصنيفه للمعادلات بحسب درجتها وعدد حدودها.

هنا، أي عند هذا الحد، توقفت ومنذ القرن الماضي، المعلومات التاريخية بهذا الخصوص؛ ففي نظر المؤرخين شكلت مساهمة الخيام آخر ما قدّمه الرياضيون العرب في هذا الموضوع. وأخذوا بهذه الاعتبارات لا بدّ من أن يبدو عمل الخيام مثيراً للاستغراب: فهو بداية ونهاية في الوقت نفسه. فهذا التعبير النظري الأول عن مسألة البناء الهندسي للمعادلات الجبرية يظهر وكأنه لم يتابع جديداً، على الأقل من قبل الرياضيين العرب. على هذا الأساس يظهر الخيام عبقرياً معزولاً في الزمان، ذلك لأن عمله يبدو غير ذي بعد تاريخي لأنه عمل من دون غد.

لكن، منذ نحو خمسة عشر عاماً، استطعنا أن نبين أنّ هذه الصورة ليست صحيحة^(٤)، وبأنّ الخيام لم يكن فقط مفتتحاً لتقليد، بل كان أكثر من ذلك؛ لقد كان له

(٣) المصدر نفسه، ص ٩٠.

(٤) انظر: Roshdi Rashed, «Résolution des équations numériques et algèbre: Sharaf Al dīn = al Ṭūsī - Viète,» *Archive for History of Exact Sciences*, vol. 12, no. 3 (1974), pp. 244 - 290.

خلف واحد على الأقل، سار قدماً في تحليلاته مطوراً ومحوّراً في العمق النظرية الجديدة. فلقد عرف القرن الثاني عشر رياضياً تأثير حالته دهشة واستغراباً. إنه شرف الدين الطوسي صاحب أحد أهم أعمال جبرية رأت النور بين الخيام وديكارت (رسائله حول «المعادلات»). كان اهتمام المؤرخين بهذا الرياضي يعود بشكل أساسي إلى إسطرلابه الخطّي - «عصا الطوسي» الشهيرة - لكن رسائله عن المعادلات، التي أشار إليها أصحاب كتب الطبقات، القدامى منهم والمحدثون، لم تدقق بناتاً ولم تترجم. وأكثر من ذلك، لم يكن هذا العمل موضوع أية دراسة قبل تلك التي خصصناها لها^(٥). ويمكن تفسير وضعيّة فريدة من هذا النوع بالنقص في مجال التأريخ. غير أن هذا النقص، لو وُجد، يعود، بدرجة جزئية على الأقل، إلى إحدى خصائص هذه الرسالة. فحتى بعد قراءات متكررة متأنية يبقى التوصل إلى فهمها صعباً لسببين، يعود أحدهما للنص نفسه، أما الثاني فللتأريخ هذا النص. فاللغة الطبيعية لم تكن مؤهلة لكي تنقل بشكل واضح وفعال بنى رياضية معقدة تترافق مع المفاهيم والتقنيات التي أدخلتها الرسالة. فالطوسي يبحث كما سنرى عن النهايات العظمى (Maxima) للتعبيرات الجبرية، كما يفصل الجذور ويعين حدودها (Limites) ... إلخ. هذه المفاهيم توجد داخل النص ولا شك، لكن من دون أن تكون مقدمة بشكل دقيق، الأمر الذي يجعلها مصدراً لبعض الإبهام ويزيد من صعوبة التعامل معها. وتتسبب في هذه الصعوبة نفسها الحسابات الطويلة التي اقتضتها إدخال هذه المفاهيم بالتعبيرات اللغوية الطبيعية. وإذا أضفنا إلى هذه العوائق أن جداول ضرورية لتتبع العمليات الحسابية العددية قد حذفها أحدهم بأكملها من النص، وأن الناسخ قد ارتكب أخطاء عدة سببها صعوبة النص بالذات، نفهمنا أن القارئ المحتمل لمثل هذا العمل كان محكوماً بالعدول عن هذه القراءة. أسباب كثيرة،

= أعيد نشر هذه المقالة في: Roshdi Rashed, *Entre arithmétique et algèbre, recherches sur l'histoire des mathématiques arabes*, collection sciences et philosophie arabes (Paris: Les Belles lettres, 1984), pp. 147 - 194.

وقد عزّب هذا الكتاب تحت عنوان: رشدي راشد، *تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب*، ترجمة حسين زين الدين، سلسلة تاريخ العلوم عند العرب؛ ١ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٩).

انظر أيضاً: Roshdi Rashed, «L'Extraction de la racine numérique et l'invention des fractions décimales (XI^e - XII^e siècles)», *Archive for History of Exact Sciences*, vol. 18, no. 3 (1978), pp. 191 - 243.

وقد أعيد نشر هذه المقالة في كتاب رشدي راشد المذكور أعلاه بالفرنسية ص ٩٣ - ١٤٦.

انظر أيضاً: Roshdi Rashed, «Al-Bīrūnī et l'algèbre», in: *Volume of International Congress in Tehran* (Tehran: [n.pb.], 1976), pp. 63 - 74.

(٥) انظر: Rashed, «Résolution des équations numériques et algèbre: Sharaf Al dīn al Tūsī - Viète».

إذن، يحتمل أن تكون قد أبعدت مؤرخي العلوم عن عمل الطوسي هذا وجعلتهم يمرّون عليه مرور الكرام.

إن إزالة العوائق من أمام قراءة النص المذكور شكل مهمة شاقة فعلاً. لكن، ما إن أزيلت هذه العوائق حتى بدا الوجه الحقيقي لنهج الطوسي، كنهج موضعي (Local) تحليلي وليس شمولياً وجبرياً فقط كما كان نهج الخيام.

ثانياً: النظرية الهندسية للمعادلات وانبثاق المفاهيم التحليلية

تعود صعوبة النفاذ إلى مشروع الطوسي إلى أصول متعددة أهمها كما ذكرنا إدخال مفاهيم جديدة، لا عن طريق تعريفها، إنما عن طريق استعمالها وتطبيقها من دون أي تقدير. وعلى الرغم من أن مثل هذا الأسلوب ليس نادراً في تاريخ العلوم، إلا أنه يتطلب تعاملًا دقيقاً. فماذا يمكن أن يقال بدقة عن الطوسي عندما يعمد إلى شق العبارات الكثيرة الحدود (Dérivée les expressions polynomiales) من دون أن يحدد المشتق (Dérivée) أو حتى أن يعطيه اسماً؟

ولا شك في أن الترجمة الدقيقة لمفاهيم الكاتب وعملياته الحسابية إلى لغة الرياضيات التي أتت بعده تظهر المعنى الموضوعي للأفكار التي تضمنتها مفاهيمه هذه. لكن الاكتفاء بهذا الحد قد يشكل تنكراً للمعاني التي يعطيها المؤلف نفسه لمثل هذه المفاهيم والعمليات. وتكثر المؤلفات التي نجد فيها أعمالاً رياضية تخص المستقبل، مصاغة بالوسائل المتوفرة في الحاضر. وتجاه مثل هذه المؤلفات يجد المؤرخ نفسه في مواجهة مهمتين ليس من السهل تحقيقهما معاً:

- وضع أفكار الكاتب في مكانها من التسلسل التاريخي لتحديد وإدراك نموذج العقلانية الذي تكتسبه هذه الأفكار مع الابتعاد عن أصولها.

- الانكباب، من جهة أخرى، على تحديد مكان هذه الأفكار في بنية عمل الكاتب أملاً بفك رموز معانيها.

هذا ما دفعنا إلى تخصيص مجلد ننوي فيه، وبشكل رئيسي، دراسة أربعة وجوه: الخيام، ديكارت، الطوسي، فيرما. وسنكتفي هنا بعرض موجز لمحتوى عمل الطوسي بخطوطه العريضة.

يستهل الطوسي رسالته بدراسة منحنين مخروطيين يستعملهما لاحقاً، وهما القطع المكافئ (Parabole) والقطع الزائد (Hyperbole). هذان المنحنيان، بالإضافة إلى الدائرة، التي يفترض أنها غنية عن الدراسة، هي كل ما يلجأ إليه المؤلف من منحنيات. فيبدو أن الطوسي يفترض بالقارئ في عصره الاعتياد على التعامل مع معادلة الدائرة - قدرة (Puissance) نقطة بالنسبة إلى الدائرة. فقد استعمل هذا الجزء التحضيري لكي يجد معادلة القطع الزائد المتساوي الأضلاع (Equilatère) بالنسبة إلى نظامين من المحاور.

ويظهر بوضوح أنه لم يكن يرمي لدراسة هذه المنحنيات إلا بالقدر الذي يكفي لهدفه المرسوم. لذلك، على ما يبدو، اكتفى بمخروط ذي زاوية رأسية قائمة لكي يحصل على هذه المنحنيات. هذا الاتجاه يميز عمل الطوسي عن كتابات أخرى عديدة كرسها رياضيو العصر للقطوع المخروطية.

يلي ذلك تصنيف للمعادلات من الدرجة الثالثة وما دون. وخلافاً للخيام، لم يعتمد معياراً داخلياً، بل خارجياً، لأجل هذا التصنيف. فبينما يرتب الخيام المعادلات انطلاقاً من عدد حدودها، يختار الطوسي تراتبيتها بحسب وجود، أو عدم وجود، جذور (موجبة) لها. هذا يعني أنّ المعادلات منتظمة بحسب احتوائها، أو عدم احتوائها، لـ «حالات مستحيلة». تبعاً لهذا التقسيم نستطيع أن نفهم سبب احتواء كتاب الطوسي هذا على جزأين وحسب.

في الجزء الأول يعالج الطوسي مسألة حلّ عشرين معادلة. وفي كل من هذه الحالات يعمد إلى البناء الهندسي للجذور وإلى تحديد المميز (Discriminant)، فقط فيما يخص المعادلات التربيعية، وأخيراً يعمد إلى الحل العددي بواسطة الطريقة التي تسمى طريقة روفيني - هورنر. لقد احتفظ بتطبيق هذه الطريقة للمعادلات الكثيرة الحدود وليس فقط لاستخراج جذور عدد ما.

يفترض بالقارئ معرفة هذه الطريقة لاستخراج الجذور التربيعية والتكعيبية. وفعلًا كانت هذه الطريقة معروفة في القرن الحادي عشر؛ وأكثر من ذلك، ففي عصر الطوسي على الأقل، كانت هذه الطريقة تستعمل لاستخراج الجذور النونية لعدد صحيح (Racines niènes).

بعد ما تقدم أصبح من الممكن تحديد العناصر التي تُولف نظرية المعادلات في القرن الثاني عشر بحسب التقليد الذي أرساه الخيام:

بناء هندسي للجذور، حل عددي للمعادلات، وأخيراً تذكير بحل معادلات الدرجة الثانية بواسطة الجذور، الحل المكتشف هذه المرة انطلاقاً من البناء الهندسي. إن إلقاء نظرة بسيطة يظهر أن الروابط بين نظرية المعادلات هذه وبين الجبر في مفهوم ذلك العصر، أي الجبر الحسابي كما قدّمه نهج الكرجي، أصبحت روابط رقيقة وهشة. إن أعمال السّلّمي تقدم لنا مثلاً عن الجبر الحسابي في ذلك العصر. فلقد درج الجبريون الحسابيون على تخصيص جزء متواضع من عملهم لنظرية المعادلات التربيعية؛ وعندما كانوا يعالجون المعادلة التكعيبية كانوا يحاولون حلها بواسطة الجذور. هذا الواقع الذي أثبت حديثاً^(٦)، يظهر المسافة التي اجتازها الطوسي في هذا المجال. ففي الجزء الأول

(٦) انظر: Roshdi Rashed, «L'Idée de l'algèbre chez al-Khwārizmī», *Fundamenta Scientiae*, vol. 4, no. 1 (1983), pp. 87 - 100.

أعيد نشره في: راشد، المصدر نفسه، ص ١٩ - ٣٣.

من رسالته، وفي مفهوم جديد لنظرية المعادلات، لم يعتمد الطوسي حلاً بواسطة الجذور للمعادلة التكعيبية؛ أما في الجزء الثاني، كما سنرى، فقد عارض من حيث المبدأ البحث في هذا الاتجاه.

في الجزء الأول، وبعد دراسته لمعادلات الدرجة الثانية وللمعادلة $x^3 = c$ ، يتفحص الطوسي ثماني معادلات من الدرجة الثالثة. لكلٍّ من المعادلات السبع الأولى منها جذر موجب واحد، أما في حال وجود جذر سالب فقد كان الطوسي لا يعترف به. ولدى دراسة كل من هذه المعادلات، كان يختار منحنين (أو بالأحرى، قسمين من منحنين) من الدرجة الثانية. وكان يبرهن بواسطة اعتبارات هندسية صرفة أن أقواس (Arcs) هذين المنحنين لها نقطة التقاء تحقق إحداثيتها السينية المعادلة المدروسة (كان من الممكن وجود نقاط التقاء أخرى). الخصائص الهندسية التي قدّمها الطوسي كانت إلى حدٍّ ما خصائص مميزة (Propriétés caractéristiques) للمعطيات التي يختارها، تؤدي بالتالي إلى معادلات المنحنيات المستعملة. ويفضل استعمال تعابير الـ«داخل» والـ«خارج» يستدعي الطوسي تواصل المنحنيات وتحذّبها (Convexité). ونستطيع، كما يلي، ترجمة طريقته بالنسبة إلى المعادلة:

$$x^3 + bx = c ; \quad b > 0, \quad c > 0;$$

ياخذ في الواقع العبارتين:

$$f(x) = \left[x \left(\frac{c}{b} - x \right) \right]^{\frac{1}{3}} ; \quad g(x) = \frac{x^2}{b^{\frac{1}{3}}} .$$

ويبرهن أنّ وجود عددين α و β يحققان:

$$(f - g)(\alpha) > 0 \quad (f - g)(\beta) < 0$$

يتبع عنه وجود $y \in]\alpha, \beta[$ يحقق $(f - g)(y) = 0$.

ينهي الطوسي الجزء الأول هذا بدراسة المعادلة التكعيبية الثامنة:

$$x^3 + bx = ax^2 + c ; \quad a, b, c > 0.$$

ويمكن أن يكون لهذه المعادلة ثلاثة جذور موجبة. لكنّ الطوسي لم يزد على الخيام شيئاً في هذا المجال، ولم يحدد بالتالي سوى واحد من هذه الجذور. ويبدو أنّه على غرار الخيام لم يتعرض سوى للحالة الأولى من الحالتين التاليتين:

$$a^2 - 3b > 0 \quad \text{و} \quad a^2 - 3b \leq 0$$

وعند قراءة الجزء الأول هذا نرى أن الطوسي يدرس، كما فعل الخيام، البناء الهندسي للجذور الموجبة لهذه المعادلات العشرين؛ وهذا يغني عن دراسة جميع المعادلات من الدرجة الثالثة وما دون، لأن المعادلات المتبقية يمكن إرجاعها إلى إحدى

المعادلات المدروسة بواسطة تحويلات أفينية (Transformations afines). وكان، على غرار الخيام، يعتمد البناء الهندسي المسطح عند إمكانية تحول المعادلة (بعد اختزالها بقدر الإمكان) إلى معادلة من الدرجة الأولى أو الثانية. كما كان يعتمد البناء الهندسي بواسطة اثنين من القطوع المخروطية الثلاثة المذكورة إذا كانت المعادلة (المختزلة بقدر الإمكان) تكعيبية. أما البناءات الهندسية التي تخص المعادلات التكعيبية فكانت تتحول كلها في نهاية المطاف إلى إدخال متوسطين هندسيين بين قطعتي مستقيم معطيتين.

وفي هذا الجزء الأول من الرسالة لم يختلف هدف الطوسي عن هدف الخيام: تشكيل نظرية للمعادلات بواسطة هذه الترجمة المزدوجة الجبرية - الهندسية التي سبق أن أشرنا إليها وحيث كانت وسيلتهما الرئيسية البناء الهندسي للجذور الموجبة. ومن هذا المنظار تتوضح بعض المعالم الخاصة لدراسة الطوسي: فهو لم يدرس، مثلاً، مجمل المنحنيات المعروفة، بل اكتفى بدراسة ما يلزمه منها لأجل بنائه الهندسي للجذور.

وعلى الرغم من تعلّق الجزء الأول من «الرسالة»، إلى حد كبير، بمساهمات الخيام يمكن إيجاد فوارق لا تظهر نتائجها إلا في الجزء الثاني. فلقد برهن الطوسي وجود نقطة التقاء للمنحنيين المتعلقين بكل من المعادلات التي درسها. أما الخيام فلم يقدّم بمثل هذه الدراسة إلا بالنسبة إلى المعادلة العشرين، كما أدخل الطوسي وسائل لجأ إليها بشكل مكثف في الجزء الثاني كالتحويلات الأفينية والمسافة من نقطة إلى مستقيم.

خصّص الجزء الثاني من الكتاب لدراسة المعادلات الخمس التي تحوي (بحسب تعبير الطوسي) «حالات مستحيلة»، أي حالات لا يوجد فيها أي جذر موجب، وهي المعادلات:

$$\begin{array}{ll} (21) \quad x^3 + c = ax^2 ; & (22) \quad x^3 + c = bx ; \\ (23) \quad x^3 + ax^2 + c = bx ; & (24) \quad x^3 + bx + c = ax^2 ; \\ (25) \quad x^3 + c = ax^2 + bx . \end{array}$$

وخلافاً للخيام لم يستطع الطوسي الاكتفاء بملاحظة وجود «حالات مستحيلة». فلقد دفعه انشغاله بمسألة برهان وجود نقاط لالتقاء المنحنيات، وبالتالي بمسألة وجود الجذور، إلى تمييز هذه الحالات ومعرفة أسبابها. إن اعتراض هذه المسألة التقنية وما ينجم عنها من تساؤل، هو بالتحديد ما قاد الطوسي إلى القفّض مع نهج الخيام وإلى تعديل مشروعه الأساسي. لكن، ولكي نستوعب هذا التحول العميق، يجب تحليل مسعى الطوسي. إن كلاً من المعادلات الخمس السابقة يمكن أن تكتب على الشكل $f(x) = c$ ، حيث f دالة متعددة الحدود. ولكي يميز الحالات المستحيلة ويحددها، كان على الطوسي دراسة التقاء المنحني الذي يمثل $y = f(x)$ مع المستقيم $y = c$. بالنسبة إلى الطوسي كان «المنحني» يعني القسم من هذا المنحني المتمثل بالجزء:

$$y = f(x) > 0 \quad \text{و} \quad x > 0$$

وهو جزء من المنحني يمكن عدم وجوده أصلاً. ويجدر أن نستجّل هنا أن المسألة بالنسبة إليه لا معنى لها إلا في حال كون $x > 0$ وكون $f(x) > 0$ وإنه في كل حالة من الحالات كان يضع الشروط التي تكون ضمنها $f(x)$ موجبة قطعاً. ففي المعادلة (21) وضع الشرط $0 < x < a$ ، وفي المعادلة (22) الشرط $0 < x < \sqrt{b}$ ، ويعطي هذا الشرط نفسه في المعادلة (23) مع العلم بأنه غير كافٍ. وعلى الرغم من أنه في المعادلات (24) و(25) لم يحدد في البداية مثل هذه الفسحة التي ينحصر ضمنها x ، إلا أنه يعود ويحدد مثل هذه الفسحات عندما يشرع في دراسة حصر (Encadrement) الجذور.

كان الطوسي إذاً مضطراً لتفحص العلاقة بين وجود الحلول ووضعية الثابت c بالنسبة إلى النهاية العظمى للدالة المتعددة الحدود. وفي هذه المناسبة أدخل مفاهيم جديدة، ووسائل جديدة ولغة جديدة؛ وقد ذهب إلى أبعد من ذلك بتحديد كائناً رياضياً جديداً. وقبل أن نستطرد يجب أن نتوقف قليلاً حتى ولو تعرضنا لبعض الترداد.

يبدأ الطوسي بإدخال مفهوم النهاية العظمى لعبارة جبرية معينة، وهو ما يشير إليه بـ «العدد الأعظم». وبافتراض أن $f(x_0) = c_0$ هي هذه النهاية العظمى، فإنها تعطي النقطة (x_0, c_0) . بعد ذلك يحدد الطوسي جذور $f(x) = 0$ ، أي تقاطع المنحني $f(x)$ مع المحور السيني؛ من ثم يخلص إلى استنتاج حصر جذور المعادلة $f(x) = c$.

يصل الطوسي في دراسته، إذن، إلى المرحلة التي تنحصر فيها كل المسألة في قضية وجود القيمة x_0 التي تعطي النهاية العظمى $f(x_0)$. من أجل هذا يعتمد معادلة لا تختلف إلا من حيث شكل الكتابة مع المعادلة $f(x) = 0$ ؛ لكن وقبل مواجهة هذه المسألة المركزية المتعلقة بالمشتق، يستحسن أن نسجل التغير في منحى عمله وإدخال التحليل الموضعي. ولنبدأ باستعراض النتائج التي توصل إليها.

بالنسبة إلى المعادلة (21) يوجد للمشتق جذران هما الصفر و $\frac{2a}{3}$ مما يعطي بالتالي نهاية صغرى هي $f(0)$ ونهاية عظمى هي $f\left(\frac{2a}{3}\right)$. من جهة أخرى يوجد للمعادلة $f(x) = 0$ جذر مزدوج هو $\lambda_1 = 0$ وجذر موجب $\lambda_2 = a$. يستنتج الطوسي، إذن، أن، في حال كون $c_0 < c$ ، يكون للمعادلة (21) جذران موجبان x_1 و x_2 يحققان العلاقة:

$$\lambda_1 = 0 < x_1 < x_2 < a = \lambda_2.$$

نلاحظ أن لهذه المعادلة جذراً ثالثاً سالباً x_3 لا يأخذه الطوسي بالاعتبار.

في ما يخص المعادلات (22)، (23) و(25) يعتمد الطوسي تحليلاً مشابهاً. وفي هذه الحالات الثلاث يكون للمشتق جذران أحدهما سالب والآخر موجب. الجذر الموجب x_0 يعطي النهاية العظمى $c_0 = f(x_0)$ ويكون للمعادلة $f(x) = 0$ ثلاثة جذور

بسيطة (مختلفة) أحدها سالب والآخران هما $\lambda_1 = 0$ و λ_2 ؛ وهذا ما يوصله إلى النتيجة التي توصل إليها في السابق.

أما فيما يخص المعادلة (24)، فتنشأ صعوبة لأن القيمة العظمى $f(x_0)$ يمكن أن تكون سالبة. وهنا يفرض الطوسي شرطاً إضافياً لكي لا يصادف إلا الحالة $f(x_0) > 0$ وينهج من ثم كما فعل بالنسبة إلى المعادلات السابقة؛ عند ذلك يكون للمعادلة $f(x) = 0$ جذران موجبان x_0 و x'_0 ($x'_0 < x_0$). يوجد إذن بالتالي نهاية صغرى سالبة ونهاية عظمى موجبة. ولا يأخذ الطوسي في الاعتبار سوى الجذر x_0 فيحصل على $c_0 = f(x_0)$. ومن جهة أخرى، يكون للمعادلة $f(x) = 0$ ، في هذه الحالة، ثلاثة جذور، الصفر و λ_1 و λ_2 ($0 < \lambda_1 < \lambda_2$)، من هنا يستنتج الطوسي أنه في حال كون $c < c_0$ ، يكون للمعادلة (24) جذران موجبان x_1 و x_2 بحيث

$$0 < \lambda_1 < x_1 < x_0 < x_2 < \lambda_2.$$

هذه المراجعة السريعة تُظهر أن وجود مفهوم «المشتق» لم يكن لا عرضياً ولا طارئاً، بل بالعكس كان هذا الوجود مقصوداً. وصحيح، من جهة أخرى، أنها ليست المرة الأولى التي نجد فيها العبارة الجبرية للمشتق في «الرسالة»؛ فلقد أدخلها الطوسي أيضاً لإنشاء طريقة حل عددي للمعادلات [راجع الفصل الأول]. لكنه في كلتا الحالتين اكتفى بإعطاء التعليمات حول تطبيق طريقته من دون استخلاص أفكار عامة. ففي كتاباته التي وصلت إلينا حتى الآن لا نجد سوى حسابات مبنية على أمثلة^(٧)، من دون أي عرض للمسيرة الفكرية التي قادته إلى اكتشافاته. هذا الإحجام عن الشرح لا بد من أن يذكرنا بشبيه له عند فيرما وبخصوص الموضوع نفسه في دراسته *Methodus ad Disquirendam maximam et minimam*. وفي وضع من هذا النوع يجب اعتماد المزيد من الحذر؛ والطرق الفضلى للدراسة تقتضي عدم الابتعاد عن النص، أي عدم تقديم أية فكرة ما لم يحوها النص بشكل أو بآخر.

إننا نجد في هذه الرسالة وللمرة الأولى في تاريخ الرياضيات، على حد علمنا، فكرة رئيسية: تحديد النهايات القصوى (extréma) للعبارات الجبرية من جهة، ومن جهة أخرى دراسة تغيرات الدالات المتعددة الحدود في جوار نهاية قصوى معينة لكي يصار إلى احتساب هذه النهاية القصوى. ولم يكن الموضوع هذه المرة احتساب حجم أقصى أو مساحة قصوى، بل احتساب القيمة القصوى للدالات كثيرة الحدود؛ وتجدر الإشارة إلى أن ترجمة هذه المساعي إلى لغة التحليل الرياضي الحديث قد يُعرّضنا إلى الخلط الخاطيء بينها وبين غيرها من المساهمات. وهنا نستطيع مثلاً التذكير بإحدى مسائل

(٧) ليس المقصود هنا «الأمثلة» بمعناها الضيق، إنما المقصود هو الحالات أو الدالات التي تعرّض الطوسي لدرسها، بخاصة منها المعادلات 21 - 25. (المترجم).

أرخميدس^(٨) التي قد توحى ترجمتها إلى اللغة العصرية بأنه استعمل طرقاً مشابهة^(٩). لكن أرخميدس لجأ، في الواقع، إلى بناء هندسي بواسطة التقاء قطعين مخروطيين، زائد ومكافئ، ومن ثم برهن أن حجماً معيناً هو حجم أقصى استناداً إلى خصائص قطعين مخروطيين متماسين في نقطة معينة. وعبثاً نبحت في النص المتعلق بهذا الموضوع، والذي وجدته أوطوقوس (Eutocius)، عن عبارات جبرية أو عن مشتقاتها. وفي هذا المجال يمكن ذكر العديد من الأمثلة الأخرى إن في الرياضيات اليونانية أو في الرياضيات العربية.

ولكي نستوعب أصالة مساعي الطوسي بشكل أفضل، نأخذ مثل المعادلة (23) التي يمكن إعادة كتابتها على الشكل التالي:

$$f(x) = x(b - ax - x^2) = c ;$$

والمسألة الأساسية هي إيجاد القيمة $x = x_0$ التي بها تصل $f(x)$ إلى نهايتها العظمى.

شرح الطوسي كيفية المرور من المعادلة (23) إلى معادلتين من النوع (15) والنوع (21) باستعمال تحويلات أفينية:

$$x \rightarrow X = x_0 - x \quad \text{و} \quad x \rightarrow X = x - x_0$$

وفي سياق شرحه هذا أعطى المتساويتين التاليتين:

$$f(x_0) - f(x_0 + X) = 2x_0(x_0 + a)X - (b - x_0^2)X + (a + 3x_0)X^2 + X^3;$$

و

$$f(x_0) - f(x_0 - X) = (b - x_0^2)X - 2x_0(x_0 + a)X + (a + 3x_0)X^2 - X^3.$$

ولا بد أن الطوسي قارن بين $f(x_0)$ و $f(x_0 + X)$ وبينها وبين $f(x_0 - X)$ ، ملاحظاً أنه في الفسحة $[0, \lambda_2]$ ، يكون التعبيران

$$X^2(3x_0 + a - X) \quad \text{و} \quad X^2(3x_0 + a + X)$$

Archimède, *Commentaires d'Eutocius, fragments*, éd. Ch. Mugler (Paris, Les Belles lettres, 1972), pp. 88 sqq. (٨)

I.G. Bachmakova, «Les Méthodes différentielles d'Archimède», *Archive for History of Exact Sciences*, vol. 2, no. 2, pp. 102 sqq. (٩) انظر:

موجبين . من ثم استطاع أن يستنتج من المتساويتين ما يلي :

$$- \text{ إذا كان } (b - x_0^2) \geq 2x_0(x_0 + a) \text{ يكون } f(x_0) > f(x_0 + X)$$

$$- \text{ إذا كان } (b - x_0^2) \leq 2x_0(x_0 + a) \text{ يكون } f(x_0) > f(x_0 - X)$$

وبالتالي :

$$b - x_0^2 = 2x_0(x_0 + a) \Rightarrow \begin{cases} f(x_0) > f(x_0 + X), \\ f(x_0) < f(x_0 - X); \end{cases}$$

وهذا يعني أنه في حال كون x_0 الجذر الموجب للمعادلة التالية :

$$f'(x) = b - 2ax - 3x^2 = 0 ,$$

يكون $f(x_0)$ هو القيمة العظمى لـ $f(x)$ في الفترة المدروسة .

تجدر الإشارة إلى أن المتساويتين المذكورتين أعلاه تتلاءمان مع توسيع (مفكوك) تايلور حيث :

$$f'(x_0) = b - 2ax_0 - 3x_0^2 ; \frac{1}{2!} f''(x_0) = -(3x_0 + a) ; \frac{1}{3!} f'''(x_0) = -1$$

يرمي الطوسي، إذاً، على ما يبدو، إلى ترتيب $f(x_0 + X)$ و $f(x_0 - X)$ حسب قوى X وإلى تبيان أنَّ الوصول إلى النهاية العظمى يتحقق عندما يكون معامل X في هذا المفكوك هو الصفر. تكون إذن قيمة X التي تعطي $f(x)$ نهايتها العظمى هي الجذر الموجب للمعادلة $f'(x) = 0$.

يبقى أن نقول إن الطوسي قد يكون درس، في المتساويتين المذكورتين أعلاه، الدالتين $f(x_0 - X)$ و $f(x_0 - X')$ حيث $X \neq X'$ ؛ لكن طالما أنه اعتمد أسلوب المقارنة، يبقى تحليلنا السابق قائماً. إن هذا التوسيع (المفكوك) الواضح الذي أعطاه في سياق تحويل المعادلة (23) إلى معادلتين من النوع (15) و (21)، المحلولتين سابقاً، هو أيضاً مهم جداً. هذا ما يجب التنبيه إليه في محاولة فهم الطرق التي اتبعها. وبصورة عامة، في إطار حل المعادلات، تبدو الطريقة متعلقة، جزئياً على الأقل، بالمسألة التالية، ذات الطبيعة الجبرية: تحويل المعادلة التي نبحت عن جذورها الموجبة إلى معادلات أخرى سبق وعُرفت طريقة استخراج جذورها الموجبة. إن المفكوك المذكور نفسه يبدو في إطار آخر كتحضير لطريقة الحل العددي للمعادلات. لكن هذه الطريقة ليست سوى الطريقة التي يشار إليها على أنها طريقة فيرما. ترتدي هذه الملاحظة أهمية كبرى كما سنبين فيما بعد. نكتفي آنياً بالذكر بأن الطوسي كان يعلم بأنه في حال كون r جذراً لمعادلة من الدرجة الثالثة $P(x) = 0$ ، يكون كثير الحدود $P(x)$ قابلاً للقسمة على $(x - r)$. وبواسطة تحويل أفيني كان يمكنه ردّ معادلة إلى معادلة أخرى سبق وحلّها. لكن، رغم تحسسه لوجود علاقات عقلانية بين معاملات المعادلة وبين

جذورها، فإنه لم يدرس هذه العلاقات لا بحد ذاتها ولا بالشكل العام، فلم يكن من الممكن لهذه العلاقات أن تظهر عنده إلا في حال كون جميع الجذور موجبة. وهذا بالضبط ما حصل في المعادلة (9) أي في:

$$x^2 + c = b.x$$

عند كون $b^2 \geq 4c$. في هذه الحالة يبرهن الطوسي بوضوح أن x_1 و x_2 هما الجذران الموجبان لهذه المعادلة، إذا، وفقط إذا، كان لدينا:

$$x_1 + x_2 = b \quad \text{و} \quad x_1 \cdot x_2 = c$$

أما بخصوص معادلات الدرجة الثالثة فالمعادلة (20) هي الوحيدة التي لها ثلاثة جذور موجبة. هنا لم يتطرق الطوسي إلى مسألة العلاقة بين الجذور والمعاملات، فهو لم يلاحظ أصلاً وجود الجذور الثلاثة (الموجبة).

شكل غياب الأعداد السالبة عائقاً أمام وضع مسائل العلاقات المنطقية بين المعاملات والجذور الصحيحة. أضف إلى ذلك، أن هذا الغياب أثقل الخطى وآخر التوصل إلى النتائج المرجوة لأنه استدعى إكثار من الحالات التي يفترض دراستها في بعض الاستدلالات. هذا ما يظهره بوضوح مثل دراسة النهاية العظمى للدالة $f(x)$ في الحالة الثانية من المعادلة (25). فلكي يقارن بين $f(x)$ و $f(x_0)$ في الفسحة $[0, x_0]$ ، يقسم هذه الفسحة إلى اثنتين: $[0, a]$ و $[a, x_0]$ ؛ ومن ثم يستدعي في حساباته الفوارق $(a - x_0)$ و $(a - x)$ من جهة و $(x_0 - a)$ و $(x - a)$ من جهة ثانية. ونستطيع إيجاد مزيد من الأمثلة المشابهة في أماكن أخرى من الرسالة.

ولقد تسبب غياب الأعداد السالبة أيضاً باضطراب الطوسي للاستعانة بمعادلتين مساعدتين في المسائل من (21) إلى (25). ولقد سبق وعالجنا حالة المعادلة (21). لكن لنضف أنها تؤول إلى معادلة من النوع (15) بواسطة التحويل $x \rightarrow -x$. أما بالنسبة إلى المسائل الأربع الأخرى، ففي حال كون $c < c_0$ يكون للمعادلة $f(x) = c$ ثلاثة جذور حقيقية، x_3, x_2, x_1 :

$$x_3 < 0 < x_1 < x_0 < x_2 ;$$

وبواسطة التحويل الأفيني $x \rightarrow x_0 + X$ تتحول المعادلة $f(x) = c$ إلى المعادلة $g(X) = c_0 - c$ التي هي من النوع (15) الذي يحوز، تحت الشروط نفسها، على ثلاثة جذور حقيقية، أحدها فقط موجب:

$$X_3 < -x_0 < X_1 < 0 < X_2$$

هنا لا يأخذ الطوسي بالاعتبار سوى X_2 الذي يعطيه $x_2 = x_0 + X_2$. من ثم يعمد إلى تطبيق التحويل الأفيني $x \rightarrow x_0 - X$ ، مفترضاً أن $X < x_0$ ؛ وهذا ما يعطيه المعادلة

$h(X) = c_0 - c$ أي المعادلة $g(-X) = c_0 - c$ وهي من النوع (21) ولها ثلاثة جذور حقيقية:

$$X_2 < 0 < X_1 < x_0 < X_3 ;$$

وبما أنه افترض $x = x_0 - X$ أي أن، $X < x_0$ ، لا بد له من اختيار X_1 واعتباره الجذر المناسب ($0 < X_1 < x_0$) مهملًا X_2 و X_3 ، فيحصل على الجذر $x_1 = x_0 - X_1$.

نرى، إذن، أن غياب الأعداد السالبة تسبب في تعدد الحالات التي يجب درسها، وفي إطالة العمليات الحسابية، كما تسبب في الاستفاضة في العرض. وقد شكل هذا النقص حاجزاً أمام النفاذ إلى نص الطوسي، وزاد من خطورة هذا الحاجز غياب أية رمزية للتعبير عن المفاهيم الجديدة وحساباتها.

نرى إذن أن الجزء الثاني من الرسالة هو بشكل واضح تحليلي: تجري العمليات الحسابية فيه بشكل جبري بحث ولا وظيفة للأشكال الهندسية سوى المساعدة على التخيل.

ثالثاً: طريقة إيجاد النهايات العظمى

استطاع تحقيقنا، استناداً إلى رسالة الطوسي وحدها، أن يثبت أن هذا العمل احتوى على طريقة عاد واكتشفها فيما وطورها من بعده بخمسة قرون. هذه النتيجة قد تشكل مفاجأة؛ فإذا ما ثبتت يمكننا أن نسمح لنا بمعرفة أفضل بتاريخ أحد أصول بعض المفاهيم التحليلية، كما يمكننا أن تلقى المزيد من الضوء على مساعي هذا الرياضي الهام الذي عرفه القرن السابع عشر.

وقل أن درست نصوص كما درست صفحات فيما التي عالجت طريقة إيجاد النهايات العظمى والصغرى. ولما استدعت كتابات مثل ما استدعته هذه الكتابات من تفسيرات وشروحات متناقضة. فمنذ الانتقادات التي وجهها مونتوكلا^(١٠) (Montucla)

(١٠) انظر: J. Itard, *Essais d'histoire des mathématiques*, réunis et introduits par R. Rashed (Paris: Blanchard, 1984), p. 236.

انظر أيضاً: Jean Etienne Montucla, *Histoire des mathématiques*, nouvel tirage augmenté d'un avant-propos par Ch. Naux (Paris: A. Blanchard, 1960), t. 11, p. 113.

حيث يكتب: «نلاحظ هنا وبشكل عابر أن السيد هويغنز قد أخطأ في عرضه لهذه القاعدة. تركز هذه القاعدة بحسب قوله على أنه عندما تصل الإحداثية الصادية إلى نهايتها الصغرى يوجد من جهتيها إحداثيتان تجاوزانها وتكونان متساويتين. وهذه بالفعل خاصية تتمتع بها النهاية الصغرى والنهاية العظمى، لكنها ليست الخاصية الرئيسية لقاعدة السيد دو فيرما».

ضد قراءة هويغنز (Huyghens) لطريقة فيرما، لم يكف المؤرخون عن التساؤل عن الطبيعة الحقيقية لهذه الطريقة وحتى عن وحدتها بالذات. إن مشروعنا أكثر تحديداً وأكثر تواضعاً، إنه يرمي إلى التذكير، بما أمكن من الاقتضاب، بالدرب التي سلكها فيرما، لكي نتوقف عند آخر شكل خرجت به طريقته، هذه الطريقة التي استطعنا أيضاً إظهارها عند الطوسي. ولنبدأ بعودة إلى ما عرّضه الطوسي لكي نقدم ملخصاً عاماً لاتجاه مسيرته.

لنأخذ إذن المعادلة

$$(1) \quad f(x) = c$$

والمساويتين

$$(2) \quad f(x_0 + X) - f(x_0) = X P_1(x_0) + \sum_{k=2}^n \frac{X^k}{k!} \cdot P_k(x_0)$$

$$(3) \quad f(x_0 - X) - f(x_0) = -X P_1(x_0) + \sum_{k=2}^n (-1)^k \cdot \frac{X^k}{k!} \cdot P_k(x_0)$$

$$f, P_k \in \mathcal{Q}[X], \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

ترتكز طريقة الطوسي كما رأينا على الفكرة التالية: تصل $f(x)$ إلى نهايتها القصوى (extrémum) $f(x_0) = c_0$ في النقطة x_0 ، إذا كان $P_1(x_0) = 0$ وإذا وجد جوار x_0 يكون فيه للعبارتين:

$$\sum_{k=2}^n (-1)^k \frac{X^k}{k!} \cdot P_k(x_0) \quad \text{و} \quad \sum_{k=2}^n \frac{X^k}{k!} \cdot P_k(x_0)$$

الاشارة نفسها.

بالنسبة إلى معادلات (21) حتى (25) لا يأخذ الطوسي بالاعتبار سوى الفترات التي تكون عليها $f(x) > 0$ ولا يدرس، في الواقع إلا النهاية العظمى لـ $f(x)$.

هذه هي الطريقة التي أدت إذن بالطوسي إلى المفهوم الذي سمي فيما بعد بـ «المشتق». فبعد أن وجد توسيعاً (مفكوكاً) لكثير الحدود، بالنسبة إلى المتغير المساعد، تمرّف إلى دور عبارة الدالة المشتقة. ولقد سارت دراسة الطوسي بمجمليها بشكل جبيري بحث؛ لكننا لا نملك هنا سوى تركيب لطريقته، فلم يُشر الكاتب إلى ما يدل على تحليلها. إن قراءات متكررة لرسائله جعلتنا نرجح أنه اعتمد في استدلالاته على الرسم البياني المحدد بـ $f(x) > 0$; $x > 0$. أما فيما يخص الحدود الأخرى لمفكوك تايلور فسوف نرى في الفصل الأول، أن الطوسي استعان بالحد الثاني، لكنه لم يتساءل بتاتاً عن الشروط التي يجب أن تليها هذه الحدود المختلفة.

يعرض فيرما، في دراسته *Methodus ad Disquirendam maximam et minimam* المؤرخة سنة ١٦٣٧م على أقرب تقدير^(١١)، طريقته بشكل عام نسبياً لكن من دون إعطاء أي تبريرات لهذه الطريقة. وفي سنة ١٦٣٨م يعود إلى هذه الطريقة نفسها في *Ad Eandem Methodum*^(١٢) حيث يحاول جاهداً أن يكون أكثر وضوحاً. لكنه، وفي المقابلين كما تظهر الأمثلة التي عالجه، يأخذ العلاقة (2) لكي يقارن بين $f(x_0)$ و $f(x_0 + X)$. وكان هدفه، المشابه للمشروع المستشف من أعمال الطوسي، هو محاولة فصل الحدود الأولى لتوسيع تايلور عن الحدود الأخرى، ذلك لأن المسألة التي اقتضت هذا التوسيع - مسألة النهاية القصوى - تتعلق فقط بهذه الحدود الأولى. ولكي يصف هذه العملية، يستعين فيرما بتعبير «adégalité» المستعار من ترجمة «علوم الحساب» لديوفنطس^(١٣)، حيث نقل كلمة $\pi\alpha\rho\iota\sigma\acute{o}\tau\eta\varsigma$. هذا التعبير مأخوذ من تعبير «égalité» أي المساواة لكنه «ليس المساواة بل الاقتراب بقدر ما...» على حد ما كتب أ. جيرار (A. Girard)^(١٤). بمعنى آخر، وعودة إلى كلام فيرما بالذات، هذه الكلمة تدل على اعتبار عبارتين أو حدين «وكأنهما متساويان على الرغم من أنهما ليستا كذلك»^(١٥). وكما تشهد الأمثلة التي أعطاها فيرما، تسمح هذه المقارنة، انطلاقاً من العلاقة (2)، بفصل $P_1(x)$ وباستنتاج الشرط التالي: قيم x التي تجعل قيمة $f(x)$ نهاية عظمى أو صغرى هي جذور المعادلة:

$$P_1(x_0) = 0.$$

ولكي نوضح الطابع الجبري لأعمال فيرما، نقرأ ما كتبه هو بالذات عام ١٦٣٦م: «لكن ما أفدّره أكثر من كل ما عداه هو طريقة لتحديد جميع أنواع المسائل المسطحة والمجسمة، وجدت بواسطتها اختراع *maximae et minimae in omnibus omnino problematibus* (يعني النهايات العظمى والصغرى... (المترجم)) وذلك باستخدام معادلة، بسيطة كبساطة معادلة التحليل العادي»^(١٦).

في مقاله الأخير هذا لا يضيف فيرما شيئاً على ما ورد في كتابته الأولى تبريراً لطريقته. لكن، يبدو أنه منذ العام ١٦٣٨م كان يحوز على مثل هذه التبريرات. ففي ردّه

(١١) Pierre de Fermat, *Oeuvres de Fermat*, publiées par les soins de mm. Paul Tannery et Charles Henry, sous les auspices du ministère de l'instruction publique (Paris: Gauthier - Villars et fils, 1891 - 1896), vol. 1, pp. 133 - 136.

(١٢) المصدر نفسه، ص ١٤٠ - ١٤٧.

(١٣) المصدر نفسه، ص ١٤٠.

(١٤) A. Girard, *l'Arithmétique de Simon Stevin de Bruges* (Leiden: [n. pb.], 1625), p. 626.

(١٥) Fermat, Ibid, p. 140.

(١٦) المصدر نفسه، المجلد الثاني (١٨٩٤)، ص ٥٦.

على انتقادات ديكارت التي تلخص بأنه اهتدى إلى طريقته مصادفة من دون معرفة مبادئها الحقيقية، كتب فيرما إلى ميرسين (Mersenne): «... مع أن البرهان الذي لم أقدمه بعد يركز أساساً على كون $(x_0 + X \iff) A + E$ و $(x_0 - X \iff) A - E$ فإن الغرض نفسه»، أي أنه يتوجب مقارنة $f(x_0)$ ، $f(x_0 + X)$ و $f(x_0 - X)$. إن هذه الفكرة هي بالضبط ما يتبين من رسالته الشهيرة لبرولار (Brûlart) بتاريخ ٣١ أيار/مايو سنة ١٦٤٣ م.

يبدأ فيرما هذه الرسالة بالتأكيد على أن البحث عن النهاية القصوى «يجب أن يؤدي إلى نقطة واحدة أو إلى حدّ (terme) واحد». من ثم يشرح أنه عندما تكون هذه النقطة x_0 ، فإنّ للعبارتين (2) و (3) الإشارة نفسها (إيجاباً أو سلباً). تكمن المسألة إذن، كما يقول فيرما «في إيجاد طريقة يعطي بواسطتها $A + E$ و $A - E$ الحد نفسه (terme) لتمثيل A ، بحيث تمثل A المذكورة، النقطة المنصفة ويكون كل ما على جانبيها إما زيادة وإما نقصاناً بحسب بحثنا عن الكبرى أو عن الصغرى. لكن، يبدو أن هناك طريقة تعطي المعادلة نفسها بواسطة $A + E$ أو بواسطة $A - E$ وهذا ما تظهره لكم العبارة، كما يظهره المنطق للوهلة الأولى. ذلك لأن $A - E$ تعطي دائماً الحدود نفسها التي تعطيها $A + E$ ، مع الفارق الوحيد الذي هو تغير الإشارات في مواضع القوى المفردة، بحيث لا تبدل المعادلة في شيء».

وفي هذه المناسبة يستعيد فيرما مثلاً رياضياً نستطيع ترجمته كما يلي:

$$f(x) = ax^2 - x^3 \quad 0 < x < a.$$

نفرض أن $x = x_0$ يعطي النهاية القصوى ومن ثم لنقابل بين:

$$f(x_0 + X) = ax_0^2 - x_0^3 + (2ax_0 - 3x_0^2)X + (a - 3x_0)X^2 + X^3$$

وبين

$$f(x_0 - X) = ax_0^2 - x_0^3 - (2ax_0 - 3x_0^2)X + (a - 3x_0)X^2 - X^3.$$

فإذا كان x_0 جذراً للمعادلة

$$2ax_0 - 3x_0^2$$

يكون $x_0 = \frac{2a}{3}$ ، وبالنسبة إلى X حيث $X < a$ ، يكون لدينا:

$$f\left(\frac{2a}{3} + X\right) - f\left(\frac{2a}{3}\right) < 0 \quad \text{و} \quad f\left(\frac{2a}{3} - X\right) - f\left(\frac{2a}{3}\right) < 0$$

فتكون $f\left(\frac{2}{3}a\right)$ قيمة عظمى.

في هذه الرسالة يعلن فيرما أن النهاية القصوى هي إما نهاية عظمى وإما نهاية صغرى تبعاً لإشارة الحد المرافق لـ X^2 . إن هذا النص، إذا ما أكمل برسالته في السابح من نيسان/أبريل ١٦٤٣م إلى مرسين يظهر أنَّ طريقة فيرما هذه ذات طبيعة جبرية واضحة، كما يظهر أنها وضعت فقط لكثيرات الحدود. لكن هذا التشابه مع الطوسي يذكر بتشابه آخر: إن فيرما يعتمد في كتاباته أسلوب التركيب تاركاً تحليلاته إلى نصوص أخرى كالنص الشهير «طريقة القيم العظمى والصغرى»^(١٧). الفكرة الأساسية في هذا التحليل يُمكن التعبير عنها كما يلي: من الجهتين المتقابلتين للقيمة القصوى تمر الدالة بقيمتين متساويتين، بشكل يجعل المعادلة (1) تحوّل على جذرين يحصران $x = x_0$ ، عندما تكون c قريبة بشكل كاف من هذه القيمة القصوى. وعند نقطة النهاية القصوى يتساوى الجذران بحيث يكون للمعادلة جذر مزدوج. وبتهيأ لنا أننا نفقد المغزى الأساسي لدراسة الطوسي إذا لم نفترض أنه امتلك هذه الفكرة ولو بالحس فقط، وأنه أدرك بأن أية نقطة تحقق النهاية العظمى هي نقطة مزدوجة من التقاء الرسم البياني لـ $(x > 0, f(x) > 0)$ مع المستقيم $y = c$.

ومهما كان الطريق الذي اتبعه تحليل الطوسي، فإن تركيبه يكفي للبرهان على أننا في الواقع أمام طريقة فيرما. والآن، وقد اضحى تاريخ طريقة النهايتين العظمى والصغرى يختلف عما كان عليه، تصبح المسألة التي تطرح نفسها حالياً على المؤرخين هي مسألة التحديد الدقيق للمسافة التي انفرد وتمايز فيها فيرما تطبيقاً لطريقته، على مسائل لم يتطرق إليها الطوسي.

* * *

انطلاقاً من أعمال الخيام، أراد الطوسي تكريس عمل كامل لنظرية المعادلات الجبرية التي يمكن القول بأنها أضحت فصلاً مستقلاً من فصول الرياضيات. وتأكيداً لهذه الوضعية، على ما يبدو، ضمن الطوسي بداية كتابه، دراسة المنحنيات التي سيستخدمها فيما بعد؛ كما أدخل وبرّر رياضياً الطريقة - المسماة طريقة روفيني-هورنر- من أجل حل عددي للمعادلات. وبتبني مشروع الخيام، رمى الطوسي إلى التحقيق الأكثر اكتمالاً والأكثر وحدة لهذا المشروع. إن الهدف الأساسي الذي يطبع رسالته هو، في رأينا، إعادة بناء الوحدة لفصل خصص للمعادلات الجبرية. وطالما لم ندرك بشكل كاف مرماء المتعمّد في إعداد عرض منظم ومترايط، نبقي بعيدين عن فهم ما كتب. لكن هذا المشروع بالذات هو الذي لم يستطع الصمود أمام بناء «الرسالة»: الوحدة التي

(١٧) المصدر نفسه، المجلد الأول، ص ١٤٧ - ١٥٣.

أرادها تحطمت مع بروز معضلة لم يكن من الممكن توقعها منذ البداية. هذه المشكلة قسمت الرسالة إلى قسمين؛ ولا شك أن هذين القسمين متعاضدان لكنهما ينتميان إلى نوعين مختلفين من الرياضيات. القسم الأول يندرج في التقليد الذي أرساه الخيام والذي يستند إلى البناء الهندسي لجذور المعادلات. لكن، وفي سياق دراسته هذه، يفرض الطوسي على نفسه مهمة إضافية: البرهان كنهج؛ هذا يعني وفي كل حالة من الحالات، برهان وجود النقطة التي تلتقي فيها المنحنيات والتي تشكل إحداثيتها السينية الجذر الموجب المطلوب. هذه المتطلبات المستجدة تقود الكاتب إلى مسائل حصر الجذور وفصلها بعضها عن بعض، ومعالجة شروط وجودها، وذلك بكل استقلالية عن بنائها الهندسي. إن حلّ هذه المسائل هو الذي دعا الطوسي إلى تعريف مفهوم النهاية العظمى لعبارة جبرية وإلى الاجتهاد لايجاد المفاهيم والطرق التي تساعده على تحديد النهايات العظمى. هذا المسعى قاد الرياضي إلى اختراع مفاهيم وطرق لم تتم تسميتها إلا في ما بعد؛ وبالإضافة إلى ذلك فرض عليه تغييراً في أسلوب المعالجة، توصلاً إلى التعامل مع هذه المفاهيم. فعلى حدّ علمنا اكتشف، للمرة الأولى، ضرورة المعالجة الموضوعية.

الجزء الثاني من «الرسالة»، المخصص بالضبط لهذه المسائل، يختلف عن الجزء الأول بالمواضيع الرياضية التي يتعامل معها ويتميّز عنه بالأسلوب الرياضي الذي يتبناه. لكن اكتشاف هذا العالم الجديد الذي استطاع الطوسي بالكاد بلوغ شاطئه، كان أكبر من أن يكتفي باللغة الطبيعية؛ كان يتطلب لغة تتناسب بصورة أفضل مع مفاهيمه ووسائله. هنا إذن تدخل الرمزية لتلعب دوراً سلبياً: باختصار، إذا كانت اللغة الطبيعية ما زالت تتناسب مع متطلبات الجبر الحسابي فإنها أصبحت تنتصب عائقاً حقيقياً أمام توسع البحث الذي بدأ مع الثنائية الجدلية للجبر والهندسة. ولربما نجد هنا، أي في الرمزية، المجال الذي ينبغي البحث فيه عن الأسباب الرئيسية لانتهاء أبحاث الرياضيات العربية في هذا الموضوع. وربما نجد هنا أيضاً تفسيراً لانطلاقة الرياضيات في أوروبا القرن السابع عشر.

لقد برهنا إذاً أن الاكتشاف من وجهة النظر الموضوعية والتحليلية هو ما ميّز مساهمة الطوسي؛ لذلك ينبغي أن نتخلى عن الأفكار المسلّم بها مسبقاً عن تاريخ تزاوج الجبر والهندسة قبل القرن السابع عشر، وبخاصة عن الرأي السائد عامة عن المستوى الذي وصلت إليه الرياضيات العربية في هذا المجال. أما الآن فيتوجب علينا تحديد موقع الطوسي من الناحية التاريخية.

رابعاً: الرسالة حول المعادلات: الكاتب، تاريخ الكتابة، وعنوان الرسالة

تشير الشهادات التاريخية التي وصلت إلينا إلى أن تلميذ الخيام، شرف الدين المسعودي، كتب مؤلفاً عالج فيه نظرية المعادلات كما عالج مسألة حل المعادلات التكعيبية. ويبدو أن هذا الكتاب، فيما لو وُجد فعلاً، قد فقد نهائياً^(١٨). أما شرف

(١٨) يقول المؤرخ الصفدي أن شرف الدين المسعودي كان أحد تلامذة الخيام: لقد درس تحت إشرافه، كتاب ابن سينا، الإشارات. انظر: صلاح الدين خليل بن أبيك، كتاب الوافي بالوفيات، النشرات الإسلامية؛ ج ٦، ق ١ (فيسبادن: فرانز شتاينر، ١٩٧٤)، مج ٢، ص ١٤٢. فاستناداً إلى الصفدي، كان المسعودي إذن تلميذاً للخيام في الفلسفة، إن اهتمامات المسعودي اللاحقة لا تكذب هذا القول: فمن المعروف أن له تفسيراً للخطبة التوحيدية، انظر: الخيام، رسائل الخيام الجبرية، ص ١٨ من المقدمة العربية. وهو معروف كفيلسوف من قبل معاصريه وخاصة من قبل فخر الدين الرازي. لكن هل بإمكاننا أن نستنتج أنه درس أيضاً الرياضيات على يد أستاذه؟ نجد أنفسنا غير قادرين على الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحاضر. لكن هناك فئتين من الشهادات تسندان إليه مؤلفاً يتناول المعادلات الخمس والعشرين، أي المعادلات من الدرجة الثالثة وما دون.

الفترة الأولى من الشهادات تضم الرياضيين: كمال الدين الفارسي، جمشيد الكاشي، يحيى الكاشي، واليزدي. فلقد كتب الفارسي: «فإن المعادلة قد ترتقي من التي بين جنسين مفردين إلى التي بين جنسين وجنسين أو ثلاثة أو أكثر إلى غير نهاية، ثم التي بين جنسين وجنسين أو ثلاثة أو أكثر، ثم التي بين ثلاثة وثلاثة أو أكثر إلى غير نهاية. ويُعجز عن استخراج المجهول في أكثرها بل في جميعها إلا ما يقل بما لا يعتد به بالقياس إلى البواقي، الأولون والآخرون وإن بلغوا الغاية في الأفكار والنهائية في الانتظار وبذلوا فيها دهور جهدهم وصرفوا فيها قرون وكدهم. ويصدق ما قلناه ويحقق ما ادعينا أنه لم ينقل من الأولين - شكر الله ساعدهم - مع وفور اهتمامهم بتوفير قواعد العلوم وتدوين أبواب النظريات في أنواع الحكم وأصناف الصناعات، إلا مسائل ست، ولا متأخرين إلا عن الإمام المتبحر شرف الدين المسعودي جزاءه الله خير الجزاء، فقد نقل أنه بين استخراج الشيء في تسع عشرة مسألة أخرى عن الست». انظر: كمال الدين أبو الحسن الفارسي، أساس القواعد في أصول القوائد (استنبول، مخطوطة شهيد علي باشا، ١٩٧٢)، أوراق غير مرقمة.

هنا نلاحظ، وفي الأمر غرابة، أن الفارسي لم يتطرق إلى مساهمة الخيام التي كانت معروفة، ليس في عصر الفارسي وحسب إنما أيضاً في ما بعد ذلك، فإن أقل ما يمكن استنتاجه هو أن الفارسي تبع مجرى أبحاثه في الجبر الحسابي من دون أن يهتم لهذا التيار الآخر. أضف إلى ذلك أن قول الفارسي المذكور، لا يحتوي على أي إسناد محدد يدل على إلمامه المباشر بمضمون رسالة المسعودي. لكن الأمر يختلف تماماً عندما يذكر الفارسي في كتابه عن البصريات رسالة المسعودي حول «الأثار العلوية»، حيث يستشهد بدقة بمحتوى الرسالة. أما الأقوال الأخرى من هذه الفئة فتستند كلها إلى المصدر نفسه، أي إلى الفارسي نفسه. فلقد كتب جمشيد الكاشي: «وقد أورد شارح البهائية (أي الفارسي) أن الإمام شرف الدين المسعودي استخرج تسع عشرة مسألة غير الست المشهورة وبين كيفية استخراج المجهول منها». انظر: غياث الدين جمشيد بن مسعود الكاشي، مفتاح الحساب، تحقيق أحمد سعيد الدمرداش ومحمد حمدي الحفني الشيخ؛ مراجعة عبد الحميد =

الدين الطوسي، فلم يظهر إلا في الجيل الذي تلاه^(١٩)، ولم يكتب عن سيرته إلا القليل من قبل المؤرخين المحدثين. فلقد كان الكلام عن سيرته ينتهي سريعاً، بمجرد تعداد رسائله التي حُفظت حتى الآن^(٢٠).

= لظني (القاهرة: [د.ن.]. ١٩٦٧). إن هذا الكلام هو تماماً ما نقرأه عن الفارسي، في كتاب: يحيى بن أحمد الكاشي، لإيضاح المقاصد في شرح أساس الفوائد (استنبول، جاز الله، ١٤٩٤)، الورقة ١٢٨، حيث يقول: «وقد حكى الفاضل الشارح أن الإمام شرف الدين المسعودي استخراج تسع عشرة مسألة غير الست المشهورة وبين كيفية استخراج المجهول منها».

وأخيراً كتب محمد بن باقر زين العابدين اليزدي: «قال صاحب المفتاح، قد أورد شارح البهائية، أن الإمام شرف الدين المسعودي استخراج تسع عشرة مسألة غير الست المشهورة، انظر محمد بن باقر اليزدي، عيون الحساب (استنبول، مخطوطة هازيناسي ١٩٩٣)، الورقة ٥٩».

نرى إذن أن جميع هذه الشهادات تنهل من المصدر نفسه: الفارسي، الذي لم تكن أقواله في هذا الخصوص غامضة وحسب، بل كانت أيضاً منقوضة بالوقائع التاريخية. هنا يمكن أن نتساءل إذا ما كان الفارسي ومن تبعه قد خلطوا بين رياضيين يفصلهما جيل واحد فقط ويحملان الاسم نفسه، شرف الدين. فمن المعروف أن الخيام توفي سنة ٥٨٢ للهجرة وأن تلميذه شرف الدين المسعودي كان لا يزال حياً في هذا التاريخ، استناداً إلى فخر الدين الرازي الذي أكد التقاء شرف الدين المسعودي سنة ٥٨٢ هـ (أي ١١٨٦م)، انظر: فخر الدين الرازي، مناظرات العالم الرازي (حيدرآباد، ١٣٦، سلاجانك)، ظهر الصفحة ١٢. وفي هذا التاريخ كان الطوسي قد أصبح راشداً. ومن الأكيد أن ظننا هذا ليس من دون أساس؛ فعلى حد علمنا، لم ينسب إلى المسعودي أي عمل رياضي. ومن مؤلفاته المعروفة، بالإضافة إلى «الأثار العلوية»، رسالة «الكفاية» في علم الفلك؛ أما في الرياضيات فلا يعرف له أي مؤلف. ولعل الحجة الوحيدة التي يمكنها اعتراض هذه الفرضية هي اللغة الثانية من الشهادات التي قدمها كاتب الطبقات أحمد بن مصطفى (المعروف بطاشكيري زاده): «ومن الرسائل الوافية بالمقصود، رسالة شرف الدين محمد بن مسعود بن محمد المسعودي». انظر: أبو الخير أحمد بن مصطفى طاشكيري زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور (القاهرة: [د.ن.]. ١٩٦٨)، مج ١، ص ٣٩٢. إن هذا التأكيد الذي يفتقد القرائن التي تمزعه، لا يمكنه رفع جميع الشكوك المتعلقة بوجود مؤلف المسعودي هذا. وتبقى المسألة معلقة بانتظار شهادات أخرى.

(١٩) المرة الأولى التي أئرنّا فيها الانتباه إلى أهمية مساهمات الطوسي كانت في تحقيقنا لكتاب: السموال بن يحيى بن عباس المغربي، الباهر في الجبر، تحقيق وتحليل صلاح أحمد ورشدي راشد، سلسلة الكتب العلمية؛ ١ (دمشق: جامعة دمشق، ١٩٧٢)، المقدمة الفرنسية ص ٩، من ثم عرضنا طريقته في عدة مقالات ابتداءً من عام ١٩٧٣، انظر الهامش رقم (٤) من مقدمة هذا الكتاب، ص ٤٢، وهناك دراسة من قبل عادل أنبويّا مستقلة عن دراستنا، صدرت سنة ١٩٧٦. انظر: Adel Anboubā, «Sharaf al-Dīn al-Tūsī» Dictionary of Scientific Biography (1976).

(٢٠) انظر مثلاً: Heinrich Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und Ihre Werke, Abhandlungen zur Geschichte der Mathematischen Wissenschaften Mit Einschluss Ihrer Anwendungen; 10. hft (Leipzig: B.G. Teubner, 1900), p. 134.

أو: Carl Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur (Leiden: E. J. Brill, 1937), vol. 1, p. 472.

تجدد إذن العودة إلى الأعمال التاريخية القديمة، أملاً بالتقاط النزر اليسير من المعلومات التي تقدمها حول شرف الدين الطوسي.

أصله من طوس (في شمالي إيران) كما تدل نسبته؛ ولم يظهر إلا عند بلوغه لكي يعود ويختفي بعد ذلك بسرعة في تلك الحقبة المضطربة التي شكّلها الربع الأخير للقرن الثاني عشر. وعلى الرغم من إجماع أصحاب كتب الطبقات القدامى على أهميته وعلو مقامه في الرياضيات، فإنهم لم يكرّسوا له أي مقال خاص كما فعلوا لأقرانه. فلقد اكتفوا بذكره في مقالاتهم المخصصة لتلاميذه الذين كان معظمهم أبعد من الوصول إلى مستواه. فيروي القفطي [١١٧٢ - ١٢٤٨م] بخصوص الحلبي أبي الفضل بن يامين أنه «قرأ على شرف الطوسي عند قدومه إلى حلب»^(٢١). وفي هذه المناسبة يشدد القفطي على تمكن الطوسي من الرياضيات ومن الفلسفة كذلك، ويذكر بأن تلميذه توفي سنة ٦٠٤هـ/١٢٠٧م. بعد القفطي بقليل، وفي القرن نفسه (الثالث عشر) يقدم صاحب كتب الطبقات، ابن أبي أصيبعة، بعض التوضيحات الإضافية: درس أبو الفضل الحارثي على يد الطوسي في دمشق وتوفي سنة ٥٩٩هـ/١٢٠٢م عن سبعين عاماً^(٢٢). وكذلك كان الطوسي أستاذاً في الموصل لفترة لا بأس بها كما توحى الحادثة التي سبقت كما يلي: «ولما كان شرف الدين الطوسي بمدينة الموصل، وكان أوحده زمانه في الحكمة والعلوم الرياضية وغيرها، سافر ابن الحاجب والحكيم موفق الدين بن عبد العزيز إليه ليجتمعا به، ويشغلا عليه، فوجدها قد توجه إلى مدينة طوس»^(٢٣). وبحسب الكاتب نفسه، توفي موفق الدين سنة ٦٠٤هـ/١٢٠٧م، عن ستين عاماً تقريباً.

ومن بين جميع تلامذة الطوسي، يعتبر كمال الدين بن يونس (٥٥١ - ٦٣٩هـ/١١٥٦ - ١١٤٨م) الأشهر من دون منازع. ولم يفت المؤرخ ابن خلكان الذي عرفه شخصياً أن يذكر أنه درس تحت إشراف الطوسي «أصول إقليدس والمجسطي»؛ بمعنى آخر، تلقى ابن يونس ثقافته الأولية على يد الطوسي^(٢٤). أقوال ابن خلكان هذه تؤيدها كتابة لابن يونس نفسه. ففي نص نستغرب لماذا لم يلحظه أحد، يقول مؤلف طبقات الفقهاء، تاج الدين السبكي: «ورأيت بخط الشيخ كمال الدين بن يونس على الجزء

(٢١) أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، تاريخ الحكماء، وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب اخبار العلماء بأخبار الحكماء، تحقيق يوليوس ليبيرت (ليبنتزج: [ديترينغ]، ١٩٠٣)، ص ٤٢٦.

(٢٢) أبو العباس أحمد بن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، شرح وتحقيق نزار رضا (بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٦٥)، ص ٦٧٠.

(٢٣) المصدر نفسه، ص ٦٥٩.

(٢٤) شمس الدين أبو العباس أحمد بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج ٨ (بيروت: [د.ن.]، ١٩٧٧)، ج ٥، ص ٣١٤ وج ٦، ص ٥٢ - ٥٣.

الأول من إقليدس إصلاح ثابت بن قرة ما نصه: «قرأت على الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع شرف الدين، فخر العلماء، تاج الحكماء، أبي المظفر أدام الله أيامه، بعد عودته من طوس، هذا الجزء؛ وكنت حللته عليه نفسي مع كتاب المجسطي وشيء من المخروطات؛ واستنتجته ما كان وعدنا به من كتاب الشكوك، فأحضره واستنسخته. وكتبه موسى بن يونس بن محمد بن منعه، في تاريخه. هذه صورة خطه، وتاريخ الكتاب المشار إليه تاسع عشر ربيع الأول سنة ست وسبعين وخمسائة هجرية»^(٢٥).

يبدو من الثابت إذاً أن الطوسي أقام في الموصل قبل ١٢ آب/أغسطس ١١٨٠م، وأن تلميذه كان حينها في الخامسة والعشرين من عمره على الأكثر وأن المنهاج الذي درسه ابن يونس على يد أستاذه كان عبارة عن العناصر الضرورية لإعداد رياضي وفلكي شاب في مستوى ذلك العصر. فضلاً عن ذلك، إذا ما صدقت أقوال ابن يونس فإن إقامة الطوسي في الموصل لم تكن الأولى، لكنه كان في عودته إليها من طوس، التي جلب منها ما كان وعد تلميذه به، وهو ما يُحتمل كثيراً أن يكون كتاب الشكوك لابن الهيثم حول بطليموس.

لذلك يكفي أن نقابل التواريخ المذكورة سابقاً لكي نصل من دون أية مجازفة إلى النتيجة التالية: حتى قبل العام ١١٨٠م كان الطوسي رياضياً ذائع الصيت يقصده الطلاب ويتنقلون إليه. في هذا التاريخ كان تلميذه الدمشقي، أبو الفضل الحارثي، في الخمسين من عمره. لكن الحارثي درس على يد أستاذه في دمشق، وهذا ما يدعو إلى الافتراض بأن الطوسي قد أقام فيها قبل هذا التاريخ. وبتابع تحليل مماثل، تدل تواريخ وفيات تلميذه، على أنه أقام في حلب في حدود الفترة نفسها.

في حوالى التاريخ نفسه تختفي آثار الطوسي. ومن كتب التاريخ وكتب الطبقات تظهر إشارة واحدة إلى وفاته. إلا أن هذه الإشارة أوقعت، للأسف، جميع المؤرخين المحدثين في خطأ^(٢٦)؛ القضية تتعلق برسالة أرسلها الطوسي إلى أحد رجال الدولة.

(٢٥) تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو (القاهرة: [د.ن.، د.ت.])، ج ٨، ص ٣٨٦.

(٢٦) يتفق المؤرخون المحدثون على أن الطوسي توفي بحدود العام ٦١٠ للهجرة، أي العام ١٢١٣م. ومن دون تقديم أية حجة يحدد بعضهم مكان وفاته (المدينة التي ولد فيها). لكن هذه الفرضية التي كثيراً ما تقدم على أنها واقع أكيد، لا ترتكز في الحقيقة سوى إلى خطأ بسيط ورد في نسخ تاريخ الرسالة التي بعث بها الطوسي إلى رجل دولة في همدان، المدينة التي كان يقيم فيها آنذاك.

وهناك في الواقع مخطوطتان من الرسالة نفسها، إحداهما في مدينة ليدن (شرقيات ١٤)، والأخرى في جامعة كولومبيا (شرقيات ٤٥). في مخطوطة ليدن، تاريخ الرسالة هو بالفيصل سنة ٦٠٦ للهجرة، وبعد أن يفترض المؤرخون ضمناً بأنها آخر ما كتب الطوسي، يحددون تاريخ وفاته بالسنة ٦١٠ للهجرة. لكن هذا التاريخ ليس إلا نتيجة بسيطة لخطأ ارتكبه ناسخ مخطوطة ليدن. فلقد سبق وأثبتنا أن مخطوطة =

ولقد أُنْخِ النَّاسِخُ الرَّسَالَةِ، ونَسِيَ كِتَابَةَ أَرْقَامِ الْأَحَادِ وَالْعَشْرَاتِ، فِي الْقَرْنِ السَّادِسِ لِلْهِجْرَةِ، الْأَمْرَ الَّذِي يَتْرَكُ الْمَعْلُومَاتِ فُضْفَاضَةً فِي هَذَا الْمَجَالِ. أُرْسِلَتْ هَذِهِ الرَّسَالَةُ مِنْ هَـمْدَانَ قَبْلَ بَدَايَةِ الْقَرْنِ السَّابِعِ لِلْهِجْرَةِ. لَكِنْ، لَيْسَ مَا يَشِيرُ إِلَى كَوْنِهَا آخِرَ مَا كَتَبَهُ الطُّوسِي وَلَا إِلَى كَوْنِهِ حَزَرَهَا بَعْدَ كِتَابَةِ رِسَالَتِهِ حَوْلَ الْمَعَادِلَاتِ.

وَيَبْقَى لَدَيْنَا حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ لَا مَجَالَ لِلنَّقَاشِ فِيهَا، وَهِيَ أَنَّ الطُّوسِيَّ عَاشَ فِي النِّصْفِ الثَّانِي لِلْقَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ لِلْمِيلَادِ. نَشَطَ وَكَتَبَ شَهْرَةً فِي نَحْوِ السَّبْعِينَيَّاتِ وَالْثَمَانِينَيَّاتِ مِنْهُ؛ وَوُلِدَ عَلَى مَا يَبْدُو فِي نَهَايَةِ الثَّلَاثِ الْأَوَّلِ مِنَ الْقَرْنِ وَتَنَقَّلَ بَيْنَ طُوسَ، هَـمْدَانَ، الْمَوْصِلَ، حَلَبَ وَدِمَشْقَ.

الْعَمَلُ الرَّئِيسُ لِلطُّوسِيِّ، بِشَأْنِ نَظَرِيَةِ الْمَعَادِلَاتِ، كَانَ إِذَا رِسَالَةً تَعُودُ إِلَى النِّصْفِ الثَّانِي مِنَ الْقَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ، حَيْثُ كَانَتْ مَعْرُوفَةً وَمُنْتَشَرَةً. وَهَنَّاكَ شَهَادَتَانِ هُمَا مَخْطُوطَتَانِ تَأْتِيَانِ بِيَعْبُضِ التَّوْضِيحَاتِ بِشَأْنِ هَذِهِ «الرَّسَالَةِ» وَتَعُودَانِ إِلَى اثْنَيْنِ مِنْ رِيَاضِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنَ الْقَرْنِ الثَّالِثِ عَشَرَ. يَكْتُبُ الْأَوَّلُ وَهُوَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخَلَّاطِي: «وَالْمَسَائِلُ الْجَبْرِيَّةُ تَنْتَهِي إِلَى خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ بِمَعَادِلَةِ الْكَعَابِ وَهُوَ مَا أَظْهَرَهُ أَسْتَاذُ أَسْتَاذِي شَرَفُ الدِّينِ الطُّوسِيُّ نَوَّرَ اللَّهِ ضَرْيَحَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنَ الْفُرُوعِ وَالْمَسَائِلِ الَّتِي تَقَعُ فِي تِلْكَ الْأَصُولِ شَيْئًا»^(٢٧٧). الْوَلَمُ الَّذِي يُوْجِهُهُ الْخَلَّاطِي بِشَكْلِ غَيْرِ مُبَاشِرٍ إِلَى «أَسْتَاذِ أَسْتَاذِهِ» هُوَ كَوْنُهُ حَدَّ «الرَّسَالَةِ» بِالْمَعَادِلَاتِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ دُونِ التَّنَطُّقِ لِفَصُولٍ أُخْرَى فِي الْجَبْرِ. لَكِنْ خَلَوَ رِسَالَةُ الطُّوسِيِّ مِنْ مَوَاضِيْعٍ جَبْرِيَّةٍ أُخْرَى لَا يَدْعُو إِلَى الْاسْتِغْرَابِ، فَجَذَبَهَا مَوْجُودَةٌ فِي التَّقْلِيدِ الَّذِي أَرَسَاهُ الْخَيْثَامُ، وَالَّذِي هِيَمَنَ بِشَكْلِ

= لِيَدُنْ هَذِهِ لَيْسَتْ سَوَى نَسْخَةٍ حَدِيثَةٍ (تَعُودُ إِلَى الْقَرْنِ السَّابِعِ عَشَرَ فِي أَسْتَرْدَامِ) لِلْمَخْطُوطَةِ الْوَحِيدَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي جَامِعَةِ كُولُومْبِيَا. انْظُرْ: الْخِيَامُ، رِسَالَتُ الْخِيَامِ الْجَبْرِيَّةِ، الْمَقْدَمَةُ الْعَرَبِيَّةُ، ص ٢٠ وَمَا يَلِيهَا. إِنَّا نَجِدُ تَارِيخَ الرَّسَالَةِ فِي الْمَخْطُوطَةِ الْآخِرَةِ هَذِهِ (ظَهَرَ الصَّفْحَةُ ٢٩) كَالتَّالِي: «سَنَةِ وَخَمْسَمِائَةٍ هِجْرِيَّةٍ». وَلِسَبِّ نَجْهَلُهُ لَمْ يَسْجَلِ النَّاسِخُ لَا أَحَادَ السَّنِينَ وَلَا عَشْرَاتِهَا. وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرٍ، فَالْثَّابِتُ أَنَّ رِسَالَةَ الطُّوسِيِّ هَذِهِ كَتَبَتْ فِي الْقَرْنِ السَّادِسِ، وَلَيْسَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ فِي بَدَايَةِ الْقَرْنِ التَّالِي. أَمَّا فِي مَخْطُوطَةِ لَيْدِنَ فَهَذَا التَّارِيخُ مُقَدَّمٌ عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي «سَنَةِ سِتَّةٍ وَخَمْسَمِائَةٍ هِجْرِيَّةٍ». وَكَلِمَةُ «سِتْمِائَةٍ» يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَكْتُوبَةً إِمَّا بِخَطِّ مُخْتَلَفٍ أَوْ عَلَى الْأَقْلَى بِرِيشَةٍ مُخْتَلَفَةٍ. وَيُمْكِنُ تَقْدِيمُ تَفْسِيرٍ يُمْكِنُ الدِّفَاعُ عَنْهُ (وَهَذَا أَقْصَى مَا يُقَالُ فِيهِ) لِلْخَطِّ الَّذِي ارْتَكَبَهُ نَاسِخُ مَخْطُوطَةِ لَيْدِنَ، فَالتَّارِيخُ بِالْعَرَبِيَّةِ يُمْكِنُ أَنْ يَكْتُبَ بِدَهْءٍ بِأَرْقَامِ الْأَحَادِ مَرُورًا بِالْعَشْرَاتِ فَالْمِائَاتِ؛ وَالنَّاسِخُ قَدْ يَكُونُ قَرَأَ «سَنَةِ» بِدَلِّ كَلِمَةٍ «سَنَةِ» وَأَضَافَ مِنْ عِنْدِهِ كَلِمَةً سَنَةٍ لِيَتَسَّقَ الْمَعْنَى؛ فَيَكُونُ قَدْ قَرَأَ «سَنَةِ سِتَّةٍ وَخَمْسَمِائَةٍ»؛ وَطَالَمَا أَنَّ هَذَا التَّارِيخَ بَعِيدٌ عَنِ الْوَاقِعِ، أَتَى مِنْ صَحِّحِهِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمَصْصَحُ هُوَ النَّاسِخُ نَفْسَهُ، فَكُنْتُ «سِتْمِائَةٍ» بِدَلِّ كَلِمَةٍ «خَمْسَمِائَةٍ».

(٢٧٧) الْخَلَّاطِي، نُورُ الدَّلَالَةِ فِي عِلْمِ الْجَبْرِ وَالْمَقَابِلَةِ (مَخْطُوطَةٌ دَنْشَكَاهُ، جَامِعَةُ طَهْرَانَ، رَقْمُ ٤٤٠٩)، ص ٢.

ظاهر في النصف الثاني من القرن الثاني عشر^(٢٨). غير أن دراسة جبر الخلاطي تظهر أنه كان جبرياً حسابياً يسير في نهج الكرجي؛ فهو لم يستوعب البُعد الفعلي لمساهمة الخيام، وكذلك بالنسبة إلى مساهمة الطوسي.

القول التاريخي الثاني حول رسالة الطوسي يعود إلى اسماعيل بن ابراهيم المارديني (الملقب بابن فلّوس) الذي يكتب: «وفي التحقيق إن مسائل الجبر لا تنتهي ولا تنحصر في هذه الست على ما ذكره الطوسي» [ص ١٣] «فهذه خمس وعشرون <معادلة> بعضها يمكن إخراجه بتلك الست المشهورة، التي لا يمكن إخراجها بها، لا بد فيها من طريقة عمر الخيام المستخرجة من مقالات ديوفنطس أو طريقة الجدول التي وضعها الإمام شرف الدين المظفر بن محمد الطوسي وتُخرجها عليه»^(٢٩). فاستناداً إلى ابن فلّوس إذاً، لم يكن الطوسي في «رسالته» أحد مطبقي «طريقة الجداول» فقط، وهي الطريقة المستعملة بالضبط في الحل العددي للمعادلات، إنما كان هو من وضع هذه الطريقة^(٣٠). إن الذين أتوا بعد الطوسي (بجيل واحد على الأكثر) أُنكدوا في حينه أن عمله الجبري يحوي دراسة خمس وعشرين معادلة كما يحوي طريقة تحل بها هذه المعادلات عديداً. وهذا، بالتحديد، محتوى «الرسالة» التي وصلت إلينا؛ لكن أمانتها للأصل تثير مسألة جدية: فمَنذ السطور الأولى للرسالة نستنتج أن النص الأساسي قد تبدّل من قبل أحدهم. وأننا نجهل كلّ شيء عن الشخص الذي بدّل بالنص، سوى أنه عاش قبل نهاية القرن الثالث عشر كما يدل تاريخ المخطوطة^(٣١). إن هذا المجهول يعلن من دون مواربة، في فقرة تمهيدية «للرسالة»: «... فإني قصدت في هذا الكتاب تلخيص صناعة الجبر والمقابلة وتهذيب ما وصل إليّ من كلام الفاضل الفيلسوف الأعظم شرف الدين المظفر بن محمد الطوسي وتحويل كلامه من إفراط التطويل إلى حد الاعتدال. وأسقطت الجداول التي رسمها في عمل الحساب واستنباط المسائل لبعده عن الطبع واستدعائه طول الزمان الموجب لللال وتثبيته كيفية استخراج المسائل

(٢٨) هذا هكذا إذن، في رسالة جبرية أنجزت في الثاني عشر من تموز/ يوليو ١١٨٥م، نجد من جديد تصنيف الخيام للمعادلات وتوصيته باستعمال المنحنيات المخروطية. انظر الرسالة التي نسبت خطأ إلى: أبي كامل شجاع بن أسلم، رسالة في الجبر والمقابلة (مخطوطة آستان، قدس، مشهد، ٥٣٢٥).
(٢٩) شمس الدين المارديني، نصاب الخبر في حساب الجبر (استنبول، مخطوطة فيض الله، ١٣٦٦)، ص ١٣ - ١٤.

(٣٠) هذا التأكيد يعيده رياضي آخر هو تاج الدين التبريزي. فابن الهائم ينقل ما قاله التبريزي في هذا الصدد عند حديثه عن معادلات الدرجة الثالثة: «فلا يمكن استخراجها إلا بالراهن الهندسية كما ذكره عمر الخيام، أو بالطريق المجدول كما ذكره شرف الدين المظفر بن محمد الطوسي»، انظر: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن الهائم، الممتع في شرح المقنع في علم الجبر والمقابلة (استنبول، مخطوطة شهيد علي باشا، رقم ٢٠٧٦)، أوراق غير مرقمة.
(٣١) انظر في ما بعد.

بالتخت، وجمعت بين العمل والبرهان وسَمَّيته المعادلات^(٣٢).

وهكذا تتحدد إذا مسألة أمانة النص الذي بين أيدينا لنص الطوسي الأصلي: فهل حقق هذا المجهول بالفعل برنامجه التلخيصي؟ قبل أن نبحت في حل هذه المسألة يجب أن نذكر، استناداً إلى تعابير المجهول نفسها، أن التغييرات التي نوى القيام بها لا تطل المحتوى الرياضي للرسالة ولا بنيتها أو تنظيمها. فعبر صفحات النص لا نجد ما يشير إلى أن هذا المجهول ينسب لنفسه أية مساهمة، مهما كانت متواضعة، في موضوع هذا العمل أو أي تحوير في بنيتها. إن ما رَمَى إليه هذا المجهول كان واضحاً ويتعلق بالقيمة التعليمية لـ «الرسالة»: إنه لا يهتم إلا بنوعية أسلوب العرض. لكن، ما الذي كان باستطاعته حذفه تحقيقاً لهده؟

تنظم «الرسالة»، في حالتها التي وصلت إلينا بها، على الشكل التالي: بعض المقدمات حول القطع المخروطية، متبوعة بتعريف وحدة القياس وتصنيف المعادلات الخمس والعشرين؛ تأتي من ثم دراسة هذه المعادلات بالترتيب ويتبع كل منها الأمثلة العددية التي تقتضيها مع تبرير لحلول هذه الأمثلة. وكل ما نرجوه من مثل هذه الرسالة موجود، وفي موضعه المناسب. وربما كان هناك استثناء واحد: فبداية النص مشوشة وأقل ما يقال فيها إنها جافة. فلا يقدم الطوسي أية شروحات توضح مشروعه ولا ينساق لأي اعتبارات تاريخية أو تحليلية تسمح بتحديد موقع العمل الذي يقدمه. ويزيد من غرابة هذا التصرف كونه يناقض تقليداً كان متبعاً في عصره عند تقديم الأعمال الكتابية غير القصيرة؛ أضف إلى ذلك أن الكاتب نفسه احترم هذا التقليد عند تقديم رسالته حول الأسطرلاب الخطي^(٣٣). فهل حذف المجهول مقدمة قد يكون حواها النص، بعد أن كتب فقرته التمهيدية؟ تبدو هذه الفرضية واقعية، إلا أنها بحاجة إلى الحجج التي تبررها والتي تركز إلى تاريخ النص نفسه.

ومهما كانت الأحوال، ويمعزل عن هذه المسألة، يبدو أن بنية العمل لم تصب بأي تحوير. لكن، هل يمكن الوصول إلى هذه النتيجة نفسها استناداً إلى نص «الرسالة» كما هو حالياً؟ إن استعراض «الرسالة» في المعادلات يكفي لأن نستنتج بأن القسم الأكبر منها مخصص للبحث عن الجذور الموجبة للمعادلات المدروسة والمسائل التي يؤدي إليها هذا البحث: تحويلات أفينية، فصل الجذور، حصر الجذور... إلخ. يضاف إلى ذلك، المقدمات التمهيدية المتعلقة بالمنحنيات المخروطية، التي تستعمل في ما بعد لتحديد الجذور. هذه الأقسام هي من دون شك بيد الطوسي من دون أي حذف أو إعادة صياغة من قبل «المجهول» الذي اكتفى بنسخ ما كتبه المؤلف. فلقد درس

(٣٢) انظر الرسالة، ص ٢.

(٣٣) مخطوطة لايدن (٥٩١).

الطوسي المعادلات بالترتيب بناء على منهج متسق ينتظم بحسب تقسيم المعادلات إلى فئات، كما سنرى في ما بعد. من هذه الزاوية يمكن إذن، ومن دون عناء، التحقق من أن لا شيء ينقص «الرسالة». ومن جهة أخرى هناك بعض الثغرات في النص. فبعض الجمل يوحي تركيبه بأنه تعرض لبعض الاختصار أو بأن بعض التعبيرات قد أسقط منه. لكن تفحص هذه الثغرات يظهر أنها حوادث بسيطة سببتها عملية النسخ.

إن الطوسي نفسه يقدّم آخر دليل مهم على ما نقول. فلقد كان له أيضاً «كتيب» حول «الخطين اللذين يقربان ولا يلتقيان» يعالج الخطين المقاربين للقطع الزائد المتساوي الأضلاع، وضعناه محققاً ومترجماً ضمن هذا الكتاب. وهذا الموضوع هو مما عالجه في الجزء الأول من «الرسالة». إن ترتيب هذا الموضوع يختلف بين الرسالة والكتيب، وهذا أمر طبيعي. ففي الرسالة يتعلّق الأمر ببعض المقدمات الضرورية للدراسة الجبرية اللاحقة. أما الكتيب فيدرس موضوع الخطين المقاربين بحد ذاته. لكن، وعلى الرغم من هذا الفرق، تظهر مقارنة النصين، تطابقاً في القضايا الرياضية، كما تظهر أن الكتابة هي نفسها في الرسالة وفي الكتيب^(٣٤).

إن دور الناقل المجهول هو إذن غير ذي تأثير بالنسبة إلى الصياغة، ومن هذه الناحية، فإن أمانة كتابة «الرسالة» لنصها الأصلي الذي كتبه الطوسي، مضمونة.

لكن الوضع يتغيّر عندما يتعلق الأمر بالجزء المخصص للحل العددي للمعادلات. فلقد اعترف الناقل المجهول بأنه أزال الجداول من الرسالة. ولكي نتعرّف إلى المواد التي يمكن أن تتألف منها هذه الجداول، يستحسن التذكير بال نوعين من الجداول المستعملين في ذلك العصر. هناك أولاً الجداول الموجودة كلياً على الورق والتي تُسجّل كل نتائج العمليات الحسابية وكل خطوات الخوارزمية^(٣٥). إن أيّاً من هذه الجداول يمكن أن يكون إما عبارة عن عدة جداول متتالية يتناسب كلّ منها مع مرحلة في الحساب اللازم، وإما جدولاً واحداً بمستويات منفصلة ومتدرّجة بوضوح^(٣٦). أما النوع الثاني من الجداول فيحمل اسم «لوح الرمل» - «التخت». وهذا النوع موروث من الحساب الهندي. و«التخت»، هو في الأصل جدول مرسوم على لوح مغبر بالتراب أو

(٣٤) مقارنة الكتيب بالنص المقابل في «الرسالة» يكشف التطابق بين القضية الأولى في «الكتيب» والقضية الثانية في «الرسالة». وكذلك، فالفقيتان ٣ و ٤ في «الرسالة» مطابقتان لقسم من القضية ٢، من «الكتيب»: قسم من هذه القضية غير موجود في «الرسالة»، وهو القسم الذي يشكل المقطع المتعلق ببرهان القضية ٣ منها: $[d(D, \Delta, d(C, \Delta))]$. فمن الممكن إذن أن يكون الطوسي قد آلف «الكتيب» لكي يعالج النقص في برهانها. وقد تكون هذه الفرضية هي الأكثر احتمالاً بين الفرضيات التي تحاول تفسير تقديم «الكتيب» بشكل مستقل عن «الرسالة»، بالرغم من أنه يستعيد نوصحاً منها.

(٣٥) مسار الطريقة الحسابية العملية، «Algorithm». (المترجم).

(٣٦) يكفي تصفح: السمّوال، الباهر في الجبر، للتعرف إلى مختلف أشكال هذه الجداول.

بالرمل، ممّا يسهل كتابة الأرقام عليه ومحوها ونقلها من مكان إلى آخر. وبينما تحتفظ الجداول من النوع الأول بالعمليات الحسابية الانتقالية بين مرحلتين، لا تحتفظ الجداول من هذا النوع إلا بنتيجة هذه العمليات، نتيجة المحو المنهجي. وقد لجأ الطوسي إلى هذين النوعين من الجداول: فقد استعمل النوع الثاني لكي يحسب بعض خطوط جداول من النوع الأول، وهي الجداول التي كانت ترمي إلى إيصال العمليات الحسابية إلى غايتها. إن الجداول من النوع الأول هي التي خطرت للناقل المجهول الفكرة التعيسة بحذفها. لقد ضاعف الحذف صعوبة النفاذ إلى النص، فكانت له بالتالي نتيجة هي عكس ما رمى إليه الناقل المجهول من وراء هذا الحذف.

ويضيف الناقل المجهول انه حذف، بالإضافة إلى الجداول، شروحات إضافية تتعلق بطرق حل المسائل بواسطة «الواح الغبار». نُذكر هنا بأن الطوسي، لأجل حلّ المعادلات التي لا تتوّل إلى معادلات أخرى معروفة، بواسطة تحويلات أفينية، كان يُعطي أمثلة عددية، تمثل حالات ثلاثاً في كل مرة. إن الشروحات المحذوفة توجد إذاً في إحدى هذه الحالات أو حتى فيها مجتمعة. إلا أننا نستطيع حصر الموضوع المحتمل لهذه الشروحات الإضافية المختلفة من دون اللجوء إلى فرضيات كيفية. فقد يظن البعض، عند الوصول إلى الحالة الثانية أو الثالثة وقراءة «ونطبق الطريقة السابقة» بأن النص مبتور. لكن ما من دليل يُثبت هذه الفرضية إن بالاستناد إلى تاريخ النص أو إلى النص نفسه؛ وليس ما يدل على أن الكتابة هذه لا تعود إلى الطوسي نفسه. ومن جهة أخرى، يبدو لنا أنه لا يتوجب المبالغة في أهمية هذه الملاحظة التي ساقها الناقل المجهول. فالقسم المخصص للحل العددي للمعادلات، وبالأخص لتبرير الطريقة المسماة بطريقة روفيني - هورنر، كما سنرى، يتميز بصعوبته، حيث تضاف بعض الصعوبات اللغوية إلى التعقيدات الرياضية. فلغة «الرسالة» رتيبة ومكثفة، هذا بالإضافة إلى ثقلها، الأمر الذي سبّب من دون شك ابتعاد المؤرخين وعزوفهم عن دراستها. وكان لا بد للناقل المجهول من الاصطدام بهذه الصعوبات بالذات، التي أفشلت محاولات الاختزال في النص - إن عن طريق البتر أو عن طريق التلخيص - طالما أن هذا النص مكتوب بلغة الطوسي. وإنّ العودة إلى النص ومحاولة القيام بتلخيص من هذا النوع تكفي للاقتناع بما نقول.

لم يكن باستطاعة هذا المجهول، إذاً، سوى حذف الجداول، وهذا ما لم يفقه القيام به؛ أما بالنسبة إلى باقي النص، فلقد نقل، بهذا القدر أو ذاك، من العناية، كتابة الطوسي. ولم يستطع، لحسن الحظ، تحقيق هدفه المعلن في الفقرة التمهيدية، فأوصل إلينا نصاً قريباً من النص الأصلي. أما في ما يتعلق بالجداول فلقد أعدنا تشكيلها انطلاقاً من مسار ما كتبه المؤلف.

إننا نجهل ما إذا كان الطوسي قد وضع عنواناً لـ «رسالته». وبحسب معلوماتنا،

فإن أياً من المصادر القديمة لم يُعطيها عنواناً صحيحاً. وبما أنه لم يكن من النادر أن يستعمل عمل من الأعمال باسم الموضوع الذي يعالجه وباسم صاحبه، فقد يكون هذا العنوان «رسالة شرف الدين الطوسي في الجبر والمقابلة» وهو ما يُوحى به الناقل المجهول. لكن اختياره لعنوان «في المعادلات» يعبر في الواقع عن إدراك عميق لموضوع «الرسالة» وللمجال الذي أعطى فيه الطوسي مساهمته الأكبر. فهل كان هو مخترع هذا العنوان أم أنه وجده في مقدمة محتملة للطوسي؟ مهما يكن من أمر، فهو العنوان الوحيد الذي بحوزتنا، الذي يجدر الاحتفاظ به كونه يعكس تماماً محتوى هذا العمل.

ولقد سبق أن ذكرنا أعمال الطوسي الرياضية الأخرى التي وصلت إلينا: دراستان رياضيتان محققتان ومترجمتان في عملنا هذا ودراسة أخرى تتعلق بالأسطرلاب الخطي.

خامساً: تحقيق النص

حتى عهد قريب لم يكن يعرف لرسالة الطوسي سوى مخطوطة واحدة محفوظة في مكتبة «المكتب الهندي» (India Office) في لندن. هذه المخطوطة ليست قديمة العهد، فقد تم نسخها في نهاية القرن الثامن عشر. إن تاريخ نسخ هذه المخطوطة غير البعيد من جهة، وأهمية المعلومات الرياضية التي وُجدت للمرة الأولى في هذه الرسالة من جهة أخرى، دفعانا إلى مضاعفة الحذر والتساؤل حول جدوى نشر النص حتى بعد إتمام تحقيقه وترجمته. فليس ما يكفل بشكل قاطع أن الناقل المجهول لم يكن معاصراً لرياضيات غير رياضيات الطوسي وبالتالي كان متأثراً بها. وصحيح أن هذه الفرضية بعيدة الاحتمال، نظراً لأسباب تاريخية، نظرية، ولأسباب تعود إلى فقه اللغة. لكن، قبل استبعاد هذه الفرضية ينبغي إيجاد دليل حاسم يستند في مثل هذه الحالة، إلى تاريخ النص نفسه وليس إلى التحاليل النظرية فقط. إننا نحوز حالياً على مثل هذا الدليل، بعد اكتشافنا، منذ سنوات، النموذج الذي نقلت عنه مخطوطة لندن، الذي يعود تاريخه إلى خمسة قرون قبل هذه المخطوطة. وقبل أن نستطرد، لنتوقف أولاً عند مخطوطات «الرسالة».

١ - مخطوطة «المكتب الهندي»

لندن رقم ٤٦١، مجموعة 10th (لوث) رقم ٧٦٧، تشير إليها هنا بالحرف «L» (ل).

المخطوطة الأولى التي تشير إليها هنا بالحرف «L» تحمل الرقم ٤٦١ في مكتبة «المكتب الهندي» وفهرسة «لوث» ٧٦٧. هذه المخطوطة هي واحدة من مجموعة تضم ستة أعمال علمية، تعود الأعمال الخمسة الأخرى فيها لتصير الدين الطوسي، ابن

الهشم، القوهي، ابراهيم بن سنان، وثابت بن قرة. وكان من الطبيعي أن تلفت أهمية هذه المجموعة، انتباه مؤرخي العلوم العربية الذين دأبوا على مراجعتها منذ بداية القرن الحالي، إذا لم نقل منذ ما قبل هذا التاريخ. لذلك فإن الصمت الذي أحيط به محتوى الرسالة لا يعود إلى جهل بوجود النص؛ إنه يعود إلى صعوبة حجب أهميته، وسنحللها في ما بعد.

تقع المخطوطة «ل» هذه في ٢٠٨ ورقات، ١٤٣ منها مكرسة لرسالة الطوسي - من الورقة ٣٥ ظهر، إلى الورقة ١٧٩ وجه - قياس الصفحات هو ٢٢,٩ سم × ١٣,٨ سم. يحيط بالنص مستطيلان يفصلهما هامش عريض. المستطيل الخارجي محدد بخط مزدوج، أما الداخلي فمحدد بخط مذهب محاط بخطين [انظر الصورة رقم ١]. في كل صفحة يحتل النص مجالاً من ١٦,٦ سم × ٨,٩ سم ويحتوي على ١٢ سطراً في كل منها ما بين ١٣ و ١٦ كلمة تقريباً. الورق مصقول ناعم، سميك وحتائي اللون. الورقات الـ ٢٠٨ كلها من الصناعة نفسها؛ ويظهر تفحصها أنه لم يجر تبديل في نوعية الورق خلال عملية النسخ. الورقات مرقمة بأرقام المطبعة من قبل مكتبة لندن ومجموعها في حالة ممتازة. الغلاف أيضاً يعود إلى القرن الثامن عشر وهو من جلد يميل لونه إلى البني، مزخرف برسوم هندسية مذهبة - مستطيلات متداخلة.

مخطوطة «الرسالة» مكتوبة بالحبر الأسود. وقد ترك الناسخ مكاناً لبعض العناوين ولبعض العلامات المتعارف عليها التي تشير إلى نهاية الفقرات في نية منه للعودة إليها لكتابتها بالأحمر بعد انتهاء النسخ، لكنه لم يقم بهذا العمل. الأشكال الهندسية جميعها مرسومة بالحبر الأحمر بينما الأحرف والأرقام عليها بالأسود. وباتباعه هذه القاعدة حذا الناسخ، حذو النموذج الذي نقل عنه. لكن، خلافاً للنموذج، الذي يقع فيه كل شكل في المكان الذي يعود له، نجد أن الناسخ قد جمع الأشكال الهندسية كلها في صفحتين أصفقهما في نهاية الرسالة. وأما الخط الذي كتبت به المخطوطة فهو نستعليق.

لا يوجد على المخطوطة قلفونة نستطيع أن نقرأ فيها اسم الناسخ أو التاريخ الذي نسخت فيه. غير أن الناسخ أشار إلى تاريخ انتهاء نسخ الرسالة الأولى من المجموعة (المنسوبة إلى نصير الدين الطوسي). فلقد كتب أنه أنهى مراجعة هذه النسخة مقارنة مع الأصل بتاريخ ١٤ شوال ١١٩٨ للهجرة، أي ٣١ آب/أغسطس ١٧٨٤ للميلاد.

نشير إلى أن الناسخ نفسه هو الذي خط مجموعات أخرى، توجد بدورها في مكتبة لندن: لو٣ ٧٤٣، ٧٤٤، ٧٤٥. فهذه المخطوطات كلها مكتوبة بالخط نفسه، على الورق نفسه، ومجموعة بالطريقة نفسها كما تدل المقارنة المنهجية. وهذا يدفع للاعتقاد بأن الأمر يتعلق بطلية واحدة كُلف بها الناسخ نفسه في نهاية القرن الثامن عشر. فلقد كتبت المجموعة لو٣ ٧٤٥ قبل المجموعة التي تهمن بأقل من شهر، ذلك أنها مؤرخة في ٢١ رمضان ١١٩٨ هـ أي في ٨ أيلول/سبتمبر ١٧٨٤ م.

الصفحة الأولى عبارة عن جدول المحتويات بخط الناسخ حيث أعطي العمل العنوان التالي «رسالة في المعادلات لشرف الدين مظفر بن محمد الطوسي، في خمس وعشرين مسألة في الجبر والمقابلة». وفي صلب «الرسالة» لا وجود لأية كتابة ملحقة على هوامش النسخة. إن الإضافات الوحيدة موجودة على الورقة ٥٥ وجه و ١٠٥ ظهر، والورقة ١٣٣ وجه (على كل منها كلمتان)، وعلى الورقتين ٥٨ وجه و ١١٦ ظهر (فقرة صغيرة). إن هذه التعابير الخمسة أضيفت بيد الناسخ الذي أظهر مكانها بواسطة العلامات المستعملة عادة في المخطوطات العربية. ويبدو أنه أضافها في مجرى عملية النسخ وليس بعد إتمامها، خلال مراجعة العمل. ذلك أنَّ مثل هذه المراجعة مستبعدة نظراً لتعدد الثغرات فيها. والمخطوطة منسوخة وليست مكتوبة عن طريق الإملاء كما يظهر التحليل النحوي. لكن، قبل الانتهاء مما يتعلق بهذه المخطوطة ينبغي إلقاء نظرة على النموذج الوحيد الذي نقلت عنه.

٢ - خدابخش (باتنا، الهند)

رقم ٢٩٢٨، مشار إليها بالحرف «B»، (ب).

هي مجموعة رسائل وكتيبات رياضية كتبها مؤلفون مثل الأهوازي، الخازن... إلخ. تنصدر هذه المجموعة ست وعشرون ورقة منسوبة إلى كاتب مجهول. هذه الأوراق من ١ وجه إلى ٢٦ وجه هي ما تبقى من رسالة الطوسي بعد فقدان ورقاتها الأولى، التي تحوي من دون شك العنوان واسم المؤلف. فالصفحات التي وصلت إلينا تمثل ثلثي «الرسالة». ولحسن الحظ أن القسم المفقود في «ب» بقي محفوظاً في «ل». وبما أننا سنظهر بدقة بأن «ب» كانت النموذج الوحيد لـ «ل»، يمكننا أن نستنتج أن فقدان الثلث الأول من «ب» لا يعود تاريخه إلى أبعد من نهاية القرن الثامن عشر. ومن جهة أخرى فإن ترقيم الأوراق الست والعشرين بالترتيب، ابتداءً من الورقة ١ لا يمكن أن يكون قد تم من قبل الناسخ، وهو يعود أيضاً إلى ما بعد نهاية القرن الثامن عشر. والآن وبعد هذه الملاحظة نعود إلى وصف المخطوطة «ب».

إن تفحص المخطوطة يكفي لشرح أسباب فقدان ثلثها الأول؛ فالصفحات الأولى منها قد أفسدت الرطوبة فانفصلت عن رفيقاتها خلال القرن الماضي، ولولا ترميم المجموعة لما كان بالامكان تفادي الخسارة الكلية التي لا تعوّض لنص الطوسي. ويُظهر تفحصها كذلك أنَّ القسم الأكبر من المجموعة كتبه الناسخ نفسه.

وفي ما يخص الرسالة بالذات، تتوالى الأوراق بالترتيب باستثناء الورقتين الأولى والثانية اللتين تبادلتا المكان. الصفحات من قياس واحد: ٢١,٩ سم × ١٣,٢ سم، وكل منها تحتوي على ٣٠ سطراً بمعدل ٢٥ كلمة للسطر الواحد. الورق من صناعة واحدة ولونه يميل إلى الحمرة. مجمل مخطوطة «الرسالة» مكتوب بالحبر الأسود؛

يستثنى من ذلك عناوين المسائل، وعناوين الحالات في كل من المسائل وبعض العلامات التقليدية التي تدل على نهاية الفقرات. وأخيراً، الأشكال الهندسية المرسومة، وكل هذه الاستثناءات مكتوبة بالحبر الأحمر. الأشكال الهندسية توجد في أمكنتها المناسبة وليست مجموعة في النهاية كما هي الحال في المخطوطة «ل».

الخط هنا أيضاً نستعليق، متراص. آثار الرطوبة وفساد بعض الأجزاء، يعيقان القراءة أحياناً؛ ولا توجد في المخطوطة أية إشارة، لا إلى هوية الناسخ ولا إلى مكان نسخها. نجد تاريخ كتابتها فقط في القلفونة، وهو السابع من رمضان عام ٦٩٦هـ الموافق للتاسع والعشرين من حزيران/يونيو ١٢٩٧م، أي قبل المخطوطة «ل» بنحو خمسة قرون. إن هذا التاريخ تؤكد أيضاً قلفونة رسالة أخرى ضمن المجموعة نفسها وبالخط نفسه، إذ نقراً: «شهر شوال ٦٩٦ للهجرة» أي - افتراضاً لوقوعه في منتصف شوال ٦ - آب/أغسطس ١٢٩٧م.

إننا لا نعرف شيئاً تقريباً عن تاريخ المخطوطة. المعلومة الوحيدة التي قدّمها الناسخ أكدتها نوعية النسخة وهي أنه نقلها عن نموذج واحد وأنه، عند انتهائه من النسخ، راجعها مقابلًا إليها بهذا النموذج. ولا زالت آثار هذه المراجعة حاضرة لتشهد على ذلك، كبعض الكلمات والتعابير المضافة إلى الهامش تعويضاً عن إهمالها خلال عملية النسخ. فلقد أضاف الناسخ سبع كلمات وتعابير على الهامش، مستعملاً العلامة المعروفة من قبل نساخ المخطوطات العربية، والتي تشير في كل مرة إلى موضع التعبير المضاف، داخل النص. بهذه الطريقة يضيف كلمة في كل من المواضع^(٣٧): ١، ٩٤؛ ١٠٤، ١٥؛ ١٢٧، ١٣؛ ١٤٨، ٢٠؛ وتعبيراً في ١٤٣، ٤ و ١٩٩، ١٤ و ١٥. وفي ١٨٠، ١٤ يضيف كلمة محامها الزمن قد تكون «منه» أو «به»، لا نرى ما يدعو إلى إضافتها. وأخيراً في ١٨٢، ٣، نجد العلامة التي تشير إلى الإضافة من دون أن نجد الكلمة أو التعبير المضاف. فقد يكون الناسخ نسي هذه الإضافة التي يحتمل أيضاً أنها قد محيت.

كل هذا يظهر الدقة التي اتبعها الناسخ خلال كتابته، والتي يعكسها أيضاً ما دونه فوق السطور، سواء خلال الاستنساخ أو لدى المراجعة. ففي موضعين أضاف حرفاً للوصول، [١٠٦، ٢٠ و ١٠٧، ٩]؛ وفي أربعة مواضع أضاف كلمة [١٢٧، ١٣؛ ١٤٣، ٢؛ ١٤٤، ٢؛ ١٧١، ١٠. وفي هذا الموضع الأخير أنت الإضافة تحت السطر]. إن عناية الناسخ ودقته تظهران أيضاً من خلال العدد الضئيل للكلمات أو التعابير التي تكررت كتابتها - وهذا يشمل تكرار التعبير نفسه أو إعادة كتابة تعبير قريب

(٣٧) العدد الأول يشير إلى رقم الصفحة، والعدد التالي بعد الفاصلة يشير إلى رقم السطر: ٩٤،

١ تشير إلى: الصفحة ٩٤، السطر ١. (المترجم).

منه. فلقد اقتصر الأمر على سبعة تردادات، خمسة منها شطبها الناسخ نفسه. فلقد ترددت كلمة في ١٤،١٤٠ وعبارة في ٧،٢٢٧. أما في ٩،٩٤؛ ٢،١٠٤؛ ٢،١٣٤؛ ١٩،١٦٢، فبعد أن ردّد كلمة قريبة من المعنى، عاد وشطبها هو نفسه.

أخيراً، فإنّ الكلمات والتعابير التي نقتح إزالتها من أجل تحقيق نص الطوسي، تشهد على تيقظ الناسخ لدى عملية النسخ. ففي فئة أولى منها - ٩،١١٩؛ ١٩،١٧٣؛ ١٩،٢١٦؛ ١١،٢١٨ - لا تقع على الناسخ أية مسؤولية كما يبدو. ففي المواضيع الثلاثة الأولى نجد كلمة «مربع»، أما في الموضوع الرابع فنجد كلمة «ضعف» وفي كل من هذه الحالات يقود النص إلى خطأ حسابي. وبحسب طبيعة هذه الحوادث، فإنها قد تعود إلى الطوسي نفسه وليس ما يدعو إلى إرجاع مسؤوليتها إلى الناسخ. إلى هنا يبقى لدينا ثلاثة أخطاء لغوية نقتح إزالتها، تعود، في رأينا، إلى الناسخ. فعندما نجد في ٣،١٢٨ «مسؤول عنه» بدل «مسؤول» كما يقتضي استعمال النص، نفهم بسهولة، أن الناسخ قد انساق هنا عفواً مع اللغة المتداولة خلال الاستنساخ. أما الحالتان الباقيتان فتندرجان ضمن حوادث النسخ البسيطة: في ٥،١٩١، عن طريق مزجه بين جملتين موجودتين، تشكّلت عنده جملة جديدة وضعها في النص. فعند كتابته للأولى «ونضرب عدد الأموال في» وقراءته للتي تليها «ونضرب المبلغ في عدد الأموال»، كتب «ونضرب المبلغ في مثله». وأخيراً، في ١٠،١٩٤ يبدو أن الناسخ، ولأسباب نجهلها، لم يكتب سوى المقطع اللفظي الأخير من «في مربع».

تشير أقوال الناسخ بالذات إلى أنه راجع نسخته، مقابلاً إياها بالنموذج، وهو حتماً نموذج الوحيد. إن تفحصنا للنص يُظهر آثار هذه المراجعة بكل وضوح، كما يظهر قلة عدد الأخطاء العائدة للنسخ، الأمر الذي يدلّ على دقة الناسخ في عمله. لكن هذا الأمر يبدو منقوضاً بالعدد الهائل للنواقص التي نستطيع أن نعدد منها ١٣٤، خمسون منها هي تعابير من كلمتين على الأقل. مئة من هذه النواقص أصابت صحة النص الرياضي بالذات؛ ففي عودة إلى النص الذي تم تحقيقه، نرى أن الناسخ قد سها عن كتابة مقاطع تتعدى أحياناً السطر، الأمر الذي يعطل برهان الطوسي. فإذا لم تكن هذه الثغرات من فعل الناسخ، فإنها ترجع إما إلى «الناقل المجهول»، وإما إلى نسخة متوسطة بين الناقل والمخطوطة «ب»، وإما إلى الاثنين معاً. ويبدو أن بعضاً، على الأقل، من هذه النواقص يعود إلى «الناقل المجهول»؛ هذا البعض يتعلّق بالمقاطع التي يعالج الطوسي فيها الحل العددي للمعادلات؛ فيحتمل أن سهو «الناقل المجهول» عن بعض التعابير، يعود إلى كونه قد نسخ هذه المقاطع بسرعة ومن دون عناية نظراً إلى عجزه عن فهم أهمية ما ورد فيها. ومن المفروض أن يتبدل الأمر عندما يعالج النص برهان وجود الجذور وتحديددها وجميع المسائل المتعلقة بهذا الأمر؛ ذلك لأن طموح هذا «المجهول» لتخفيف الثقل في نص المؤلف، يفترض به بعض المقدرة الرياضية ويجعلنا نتوقع منه تصرفاً آخر. لكننا إذا ما استرسلنا فقد ننزلق هنا إلى حقل الفرضيات الوعر؛

فلتُفْلَ إذن، وببساطة، إنه من المعقول جداً، عزو هذه النواقص إلى «الناقل المجهول» وإلى نسخة وسيطة، كانت هي نموذج المخطوطة «ب».

وعلى الرغم من عدم تمكننا من تحديد أصول الثغرات الأخرى في «ب»، ينبغي أن نقدم مسحاً سريعاً لها من أجل إعطاء الصفات المميزة لهذه النسخة. في الحواشي المرافقة للنص المحقق، تظهر أخطاء منها نحو ١١٦ خطأ نحوياً، ٩٠ رياضياً، ١٥ إملائياً و ٣٥ كلمة تحتل مكان آخر. إن عدد الأخطاء النحوية ليس مرتفعاً إذا ما كنا على معرفة بالأخطاء التي اعتادها رياضيو العصر. فعلى الرغم من أنه لم يكن من النادر وجود رياضيين متضلعين من لغتهم إلا أن كتابتهم الرياضية كانت تأتي مناقضة لهذه الكفاءة بسبب إهمالهم بعض القواعد. لذلك لا نستطيع التمييز بكل دقة بين أخطاء الطوسي نفسه وأخطاء النساخ من بعده. ومن الأخطاء الإملائية ما كان شائعاً في ذلك العصر؛ ومنها ما نتج عن حوادث نسخ بسيطة - مثل كتابة «بزواية» بدل «بزواية». والأخطاء الرياضية، بغالبيتها العظمى (أكثر من تسعة أعشارها) هي في كتابة الأحرف التي تدل على قطعات من مستقيم. باقي الأخطاء الرياضية هو بالضبط ثمانية، خمسة منها تتعلق بأرقام تدخل في الحل العددي للمعادلات؛ الثلاثة الأخرى الباقية هي «مطلوب» بدل «مطلوباً» في ١٥، ١٠٥ و «الجذر» بدل «الجذر» في ١٨، ١٠٥، وأخيراً «مربع» في ٧، ١٠٩ بدل «مكعب». في كل الأحوال تعتبر هذه الأخطاء حوادث في النسخ تعود إما إلى نسخ «ب»، إما إلى نسخ نموذج «ب». ويتوجب أخيراً ذكر الكلمات الموضوعية مكان غيرها. هنا أيضاً نجد أنفسنا، من دون أدنى شك، أمام حوادث في النسخ يعقل أنها ناتجة عن قراءة سيئة في النموذج. فهكذا نقرأ في ١٣، ١٠٥ و ١٢، ١٢٩ و ٦، ١٢٩ كلمة «الثاني» بدل كلمة «الباقي»؛ أما في ١٢، ١١١ و ٧، ١١٣ و ٢٠، ١١٤ فنقرأ كلمة «كعب» بدل كلمة «مكعب» (وحتى الطوسي كما سنرى لا يميز دائماً بين اللفظتين). وكذلك نقرأ «كل» بدل «كلا» - ٥، ١٥٦ و ١١، ٢٣٠ و ١٤، ٢٣٤. و«من» بدل «في» - ٥، ١٢٣ و ١٣، ٢٠٢؛ «إلى» بدل «في» - ١٤، ١١٠ و ٢٠، ١٩٧؛ «ثلث» بدل «ثلاثة» - ١، ١٥٢ و ٣، ١٥٢؛ «الأخر» بدل «الأخير» - ٤، ١٣٣؛ «أعني» بدل «في» - ١٠، ١٧١؛ «من» بدل «عن» - ٣، ١٨٧ و ١٨، ١٩٦؛ «فهي» أو «فهل» بدل «فهذا» - ٣، ١٩٥؛ «لكن» بدل «لكون» - ١٠، ٢٠٠؛ «بين» بدل «من» - ٦، ٢١٧ ..

وفي المقابل، نجد بعض التعابير التي لا يمكن تصنيفها مع الفئة السابقة، ومن المعقول جداً أنها تعود إلى كتابة الطوسي نفسه: «السطح» بدل «المربع» - ٤، ١٣٤؛ «حينئذٍ فنعمل» بدل «حينئذٍ نعمل» - ١٦، ١٦٤؛ «في مربع» بدل «مربعه في» - ٢٠، ١٨٥ ..

ولكي نهي هذه الفقرة، لنذكر الأخطاء الناجمة عن سهو المؤلف أو من أحد

النسخ: «المطلوب» بدل «المبلغ» - ٣، ٩٢؛ «مع» بدل «مثل» - ٧، ١٥٠؛ «بدل» بدل «ضرب» - ٥، ١٧١؛ «مربع» بدل «ضلع» - ١، ٢٠٨؛ «أموالاً» بدل «عدد الجذور» - ٢، ٢٤٢.

تبدو المخطوطة «ب» إذاً على الشكل التالي: نسخة منقّحة عن طريق مقابلتها بالنموذج الذي نسخت عنه، مكتوبة بدقة وعناية، خالية من الحواشي إلا أنها مشوبة بالعديد من الثغرات التي تتوزع فيها والتي يحتمل جداً أن تكون موروثّة من النموذج الأصل الذي هو بالضرورة نسخة متوسطة بين المخطوطة «ب» وبين تلك العائدة للناسخ المجهول.

والآن، إذا ما قمنا بمقابلة المخطوطتين «ب» و«ل» بشكلٍ دقيق وشامل نصل إلى النتائج التالية:

- * كل الجمل وكل الكلمات الناقصة في «ب» تنقص كذلك في «ل».
- * باقي الجمل والكلمات التي تنقص «ل» بصورة خاصة موجودة في «ب».
- * كل الأخطاء في «ب»، مهما كان نوعها، موجودة في «ل» أيضاً.
- * العكس ليس صحيحاً فالعديد من الأخطاء في «ل» لا يُوجد في «ب»؛ هذه الأخطاء تعود إذاً إلى ناسخ «ل».
- * إن ناسخ «ل» لم يكتب ما وجده في «ب»، بل نسخ عن «ب» من دون تمييز. فكان عندما يجد فراغاً في «ب» يترك الفراغ نفسه في «ل»؛ ولقد نقل كذلك الأخطاء الإملائية الناتجة عن عدم الانتباه. وعندما كان ناسخ «ب» يعيد الجملة نفسها سهواً، كان ناسخ «ل» ينقل التكرار نفسه - ٧، ٢٢٧.

* إن هذا الجمود لدى ناسخ «ل» يتسبب في لا معقولة عند الوصول إلى القسم المتعلق بالحساب العددي، وهذا ما يظهر أن «ل» تتعلق تماماً بـ «ب» وبها وحدها. ومثالاً على ذلك، نجد في «ب» وفي منتصف إحدى الصفحات، داخل النص، عناصر حسابية أولية بواسطة «لوح الغُبار» (انظر الصورة رقم ١)؛ ولقد ظن ناسخ «ل» أن العناصر المكونة للّوح هي جزء من السطر الذي يقابلها في النص، وهكذا دمج كل سطر من اللوح بالسطر المقابل له من النص تبعاً لمكان هذه السطور في «ب»، غير مكترث بسخافة ما ينتج عن ذلك.

* هذه الأمانة العمياء لم تمنعه من أن يضيف أخطاء من اختراعه، إلى حوادث القراءة والثغرات الأخرى. كلمتان فقط تشدّان عن مئات الحوادث هذه، أدخل فيها الناسخ تصحيحاً بإبدال أحد حروف العطف: «وإذا» بدل «فإذا» - ٨، ٢٠٩؛ «خاصة» بدل «فخاصة» - ١٨، ٢١٠.

* أخيراً، أعفى ناسخ «ل» نفسه من عناء وضع خط أفقي فوق الأحرف التي تشير إلى مقادير أو إلى أعداد، وهو ما نجده في «ب».

٣ - مخطوطة مكتبة مارشيانا

البندية - شريقات ١١٩٠٧ CCXXIX، ونشير إليها هنا بالحرف «ف».

هذه المخطوطة هي جزء من مجموعة^(٣٨) تحتوي على ترجمة فارسية لكتاب

(٣٨) أبلغتني عن وجود هذه المجموعة في العام ١٩٨٤، الأنسة جوزيبيينا فرانشيني التي تكرمت بإرسال ميكروفيلم عنها إليّ، مع وصف دقيق للمخطوطة نقلته في ما يلي كاملاً كما وردنا مع تعابير الشكر الجزيل للفتتها الطيبة:

«Un manoscritto parziale dell'opera di Šaraf Al-Dīn Al-Tūsī si trova a Venezia nella biblioteca Marciana, associato ad altri due manoscritti:

— una traduzione persiana del trattato sanscrito di algebra e geometria: «Lilavati» di Bhāskara.

— Un frammento iniziale della redazione araba dei «Sette libri delle coniche» di Apollonio Pergeo a cura del matematico Yahyā Ben-Abī Al-Shukr Al-Maghribi A-Andalusi.

I tre manoscritti portano il numero 11907 Orient., codice CCXXIX. Provengono dalla famosa «donazione Teza» (Il professore Emiliò Teza, insigne filologo, lasciò alla biblioteca Marciana tutta la sua copiosa biblioteca, che si può dividere in tre parti: la prima comprendente opere di cultura generale, la seconda opere di linguistica ed infine la terza comprendente la parte più caratteristica della libreria, cioè la serie dei testi orientali; vedere la pubblicazione «La libreria del prof. Emilio Teza donata alla Marciana», curata da Carlo Frati, Firenze 1913).

Notizie tecniche sull'opera no. 11907 Orient.

E rilegata in tela, di colore marron scuro, in più parti sbadito (necessita di restauro).

Il titolo: «Lilavati» in lettere maiuscole dorate, compare nella parte superiore del dorso, incorniciato da due motivi floreali di colore oro. Va rilevato che tale titolo è incompleto perchè si riferisce solamente al primo manoscritto persiano.

Nella parte interna della copertina destra si sono delle segnature in matita, mentre nella parte superiore del risguardo è scritto: The Lilavati transl. in Pers. by Fayd, Calcutta 1827. Appena sotto, fra parentesi, si scorge un cognome:

force Lavoux o Levoux.

Il presunto titolo dell'opera appare, nuovamente nel foglio successivo, associato al numero delle pagine e delle linee per pagina, sempre in inglese e in matita.

Le pagine cartacee di cm 29,5 × cm 46,5 sono 126 (alcune sono bianche) più un foglio staccato di cm 23,3 × cm 35,5 privo di numerazione. Questa incomincia da destra a sinistra come ricche de la scrittura persiana e araba. Ce n'è una non originale, in matita, riferita alle pagine ed una originale riferita ai fogli, in inchiostro rosso. Per quanto riguarda la numerazione originale la parte persiana e la parte araba sono indipendenti (la parte persiana ha la numerazione 1-52, la parte araba, che comprende due manoscritti, ha la numerazione 1 - 8). Le tre parti dell'opera sono scritte a tutta pagina con inchiostro nero frammezzato con inchiostro rosso e il numero delle righe è variabile: = oscilla fra 18 e 26 nella prima ed è mediamente 26 nelle altre due. Nelle prima e nell'ultima si

ليلافتاني (*Līlāvatī*) بهسكرا (Bhaskara) وعلى مقطعين باللغة العربية. المقطع الأول قصير جداً وهو تعليق لأبي الشكر المغربي على مخروطات أبولونيوس. أما المقطع الثاني فهو جزء من «رسالة» الطوسي. هذا الجزء - الذي يشكل خمس «الرسالة» كما سبق وذكرنا - يتوقف فجأة. فلقد توقف الناسخ قبل أن يُنهي إحدى الجمل، من دون عودة لمتابعة النسخ. الخط في هذه المخطوطة نستعليق ويبدو أنه يعود إلى القرن الماضي.

إن مقابلة هذه المخطوطة مباشرة مع المخطوطة «ب» غير واردة، ذلك لأن القسم الذي يقابلها في «ب» قد أصابه التلف. إلا أنه بمقارنتها مع «ل»، نستطيع، وبسرعة، استخلاص نتيجة أولية وهي أن «ل» لم تكن النموذج الذي نُسخَتْ عنه «ف». فهناك تعابير خمسة، من ضمنها فقرتان - ٢٢، ٨ - ٢٠؛ ٢٨، ٢ - ٤، - مفقودة من «ل» غير أنها موجودة في «ف». هذا بالإضافة إلى أربع كلمات وثلاثة أحرف ناقصة من «ل»، موجودة في «ف».

إلا أن ما يثير الدهشة هو العدد المرتفع للأخطاء المشتركة بين «ل» و «ف». وإذا لم نحفظ إلا بالأخطاء ذات الدلالة، أي بتلك التي لا يمكن أن تكون عرضية، نستطيع تعداد التالية: ٢، ٦؛ ٨، ٣؛ ١٤، ٧؛ ٦، ٨؛ ١١، ١؛ ١٥، ٣؛ ٢٣، ١٠؛ ٢٣، ٢٠؛ ٣٤، ٥؛ ٣٦، ١٤؛ ٣٧، ٢؛ ٤٠، ١٨. وهذا يعود إما إلى «ميكانيكية» في عملية النسخ أو إلى أخطاء لغوية أو إلى أخطاء رياضية مستغربة أعيدت كتابتها كما هي بالضبط. فهكذا نقرأ مثلاً في ٢، ٦ «الجدول التي رسمه» بدل «الجدول التي رسمها»؛ أو، في ٣، ١ «الأعمدة الخالطة» بدل «الأعمدة الخارجية». ومن جهة أخرى، نجد في ٢٦، ١٨، عبارة مرّدة، هي نفسها مرّدة في «ل». هذه الحوادث تدفع، بالتأكيد، للافتراض بأن «ف» و«ل» منسوختان عن النموذج نفسه أو عن نسختين تعودان إلى النموذج نفسه. ومن المعقول، من جهة أخرى، أنهما تنحدران من الأصل نفسه، «ب»، ذلك لأن «ف» وهي مخطوطة حديثة العهد قد كتبت من دون شك في الهند (وهذا ما يوحي به وجودها في المجموعة نفسها مع ترجمة ليلافتاني من السنسكريتية إلى الفارسية).

trovano parecchie figure geometricale. Ciascun manoscritto arabo è accompagnato da una breve = annotazione esplicativa in lingua inglese, scritta con inchiostro marrone, mentre quello persiano presenta una traduzione inglese, quasi completa, in interlinea a matita. Va notato che tutte le parti inglesi sembrano della stessa mano, invece i manoscritti veri e propri, probabilmente, non provengono da un unico amanuense, anche se, si deve ammettere, che la scrittura è costantemente di bella forma e sempre bene leggibile.

Per quanto riguarda l'ortografia si può rilevare che le lettere non sono vocalizzate, ma dotate di punti diacritici».

واستناداً إلى تقاليد تاريخ المخطوطات، فإن المعطيات التي تمكننا من إعادة تركيبها تحكم علينا الارتكاز على «ب» لتحقيق الجزء الأكبر من «الرسالة»؛ لذلك فهي تدفعنا إلى مجابهة جميع الصعوبات التي ترافق هذه المهمة التي وصفناها وتكلمنا عليها في مكان آخر^(٣٩). إن الدراسة التي تعتمد المقارنة تظهر بشكل نهائي أن «ل» تنحدر من «ب» فقط؛ كما تعطي احتمالاً كبيراً بأن تكون «ف» هي الأخرى منحدرة من «ب». لكن، توحياً للإقناع، مع المحافظة على عدم الإطالة وعدم إثقال الحواشي بما لا يلزم، يجب، في تحقيق القسم المفقود من «ب» أن نسجل بصورة منهجية حوادث النسخ في «ل» وفي «ف»؛ فتسجيل هذه الحوادث يساعد، بدرجات متفاوتة الأهمية، على تحقيق هذا المقطع. أما في ما يتعلق بالثلثين الباقيين من النص فكان مرجعنا الوحيد هو المخطوطة «ب»؛ لكننا، وللإقناع، تمسكنا بعرض عينة من نتائج المقابلة المنهجية بين المخطوطتين «ف» و«ل»، وذلك في الحواشي، ما بين الصفحة ٧٧ والصفحة ٩٧، حيث قدّمنا جميع الدلائل المخطوطة. وفي تحقيق بقية الصفحات، المشتركة بين «ل» و«ب» لم نسجل سوى العبر التي تقدمها «ب»، مكتفين بالعبر الأكثر أهمية المستخلصة من «ل» - وبخاصة بالثرغرات -؛ وبمعنى آخر، لم نقدم إلا ما هو أساسي للإثبات. إلى ذلك، يبقى لـ «ل» دورٌ تلعبه في تحقيق النص وبخاصة عندما يتعلق الأمر بإكمال بعض المقاطع التي أنلفتها الرطوبة في «ب».

وفي كل الأحوال، تبقى الطريقة التي اتبناها في تحقيق النص، هي نفسها التي درجنا على اتباعها سابقاً، في مناسبات أخرى: اختصار تدخلنا في النص إلى حدّه الأدنى، والاحتفاظ به فقط لحالات الأخطاء اللغوية أو العلمية التي قد تعيق الفهم الجيد للنص. ولم نسلم بأي تغيير في نص المخطوطة، إلا بعد استنفاد الإمكانيات اللغوية التي تسمح بعدم المساس بهذا النص.

في الحالة التي تحتل هنا المقام الأول في اهتماماتنا، وهي حالة المخطوطة «ب»، كما في معظم مخطوطات الرياضيات العربية، تكمن المصادر الأساسية للأخطاء في كتابة الأحرف التي تشير إلى المقادير الهندسية. ولقد قمنا، بالطبع، بإظهار هذه الأخطاء وتصحيحها في الحواشي. لكنّ العرف في هذا المجال يقضي بأن نضع خطأً أفقياً فوق هذه الأحرف؛ فنكتب مثلاً ب ح. هذه الخطوط الأفقية التي أهملها ناسخ «ل»، موجودة بصورة منهجية في «ب». لكن، وابتداءً من الصفحة ٢٠٥، وبدل كتابة ب ح س د، تمشياً مع العادة، عند التدليل على مجموع أو على فرق المقدارين ب ح س د، كان يكتب ب ح س د الأمر الذي يؤدي إلى خطأ. ولقد أصلحنا هذا النوع من الأخطاء الكتابية من دون الإشارة إليها في الحواشي.

(٣٩) Diophante, *Les Arithmétiques*, établi et traduit par R. Rashed (Paris: Les Belles lettres, 1984), Introduction, pp. LXXIV sqq.

إن كتابة الأعداد تطرح مسألة معادلة للمسألة السابقة. ولقد قمنا بالتصحيح عند اقتضائه. ولقد حافظ ناسخ «ب» على الخطوط التي تعلق الأرقام والتي اختفت في «ل». ولقد اهتمنا عن الإشارة إلى هذه الخطوط لكي لا ننقل الحواشي، لكننا طبعناها في مجال آخر. وبما أن الأشكال الهندسية هي من صنع النساخ، فلقد أعدنا رسمها، مستعينين بالنص، من دون إدراج الأصل ضمن الحواشي.

كتابة المخطوطة، هي بطبيعتها، من دون أحرف مَد؛ يضاف إلى ذلك أن نص «ب» مُعْجَمٌ إلا في ما خَصَّ بعض فقراته، وأن التشكيل، في الغالب، غائبٌ عن الحروف. وفي هذا المجال، لم نُشير إلى تصحيحاتنا في الحواشي إلا عند اضطرارنا لتعديل هذه الحركات أو عند التعابير التي تجوز فيها قراءة أخرى.

الكتابة صحيحة بصورة عامة، باستثناء بعض الأخطاء أو الحالات التي تدعو إلى النقاش. وهكذا نجد في المخطوطة: «المسول»، «مسئلة»، «كلي»، «إنكان»، «إنكانت»، «كذي»، «أحديهما»، «هكذي»، «ملي»، التي ينبغي إبدالها على التوالي بـ: «المسؤول»، «مسألة»، «كلا»، «إن كان»، «إن كانت»، «كذا»، «أحدهما»، «هكذا»، «مثلاً»، التي أعدنا تصويبها من دون ذكرها في الحواشي. وكذلك، بالنسبة إلى الأعداد التي كتبت احتراماً للقواعد الإملائية القديمة، اعتمدنا كتابتها بحسب الإملاء الحديث؛ فلقد كتبنا «ثلاثة»، «ثلاثون»، «ثلاثمائة» بدل «ثلاثة»، «ثلثون»، «ثلثمائة»، من دون أن نشير في الحواشي إلى هذه التصحيحات.

أخيراً، نذكر أن الطوسي، كالعديد من الرياضيين العرب، لا يفرق بين كلمتي «كعب» - القوة الثالثة - و«مكعب» - الجسم الهندسي - وليس من النادر وجود الكلمتين في الجملة نفسها للدلالة على المعنى الأول (أنظر مثلاً ٢١٤، ٤ - ٥). أضف إلى ذلك أن كلمة «كعب» تعني أيضاً المرتبة للجذر التكعيبي. ولقد اهتمنا، في ما يتعلق بهذا الأمر، عن أي تعديل يهدف إلى إعطاء الشكل الذي يسمح بالاستعمال الأمثل؛ ذلك لأن التبادل فيما بين هذه الكلمات كان أمراً شائعاً في ذلك العصر، بالإضافة إلى أن الإطار الذي توجد فيه لا يترك أي مجال للالتباس في المعاني.

في كل الأحوال، نشير في الحواشي إلى ما أصلحناه وإلى بدائل أخرى ممكنة تجوز في النص. وعندما نقوم بإضافة أو حذف، فإننا نستعمل الاصطلاحات المرحية الإجراء. وتبقى الحواشي مع ذلك مخصصة للتوضيحات الضرورية لتحقيق النص وتبينه وللملاحظات اللغوية المحتملة التي لا غنى عنها من أجل ذلك. ولقد قمنا بإضافة بعض الملاحظات بشأن محتوى النص. إن هذه المداخلات غير الاعتيادية مخصصة لتبني قراء النص العربي وحده، من خطأ محتمل أو لتقديم بعض الإيضاحات الضرورية لهم، للمساعدة على فهم النص. ولقد تعمّدنا ترك التبريرات والشروحات إلى التعليق المرافق للنص أو إلى الملاحظات الإضافية.

[illegible]

الصورة رقم (٣)

مخطوطة خدابخش رقم ٢٩٢٨، ورقة ١٧.

وسهله و مضاعف القاييم مثل اب لو يسكن هو قطع ا ر و مثل قطع ا ي ا ر ا ه
 نقطه وسهله قه و مجازيه ح و هو قطع ا ه و فضيل مثل اب لو يسكن ع و هو
 سه م و هو خطا القريب في الكافي و نقطه م على محيط المثلث و يخرج من
 م عمودا على ا ق و هو م ق فلان غير القاييم م في ا سه غني م ربع ا سه مثل م ربع م
 ف ا سه غني م مثل م غني ا و لان الخط القريب البسحي يسكن م نقطه قه فلام و ان
 تجاذب خطا القريب نقطه م ق قتي الى محيط المثلث الا ا يه نقطه م في و مثل المثلث
 و ايضا فضله ا ر ا فيه مثال اب زيد عليه زيا و قه م ق م ربع ا سه م ربع م ربع م
 في ا ب اعظم م ربع ا و يخرج خطا قريب في ا ح سبيط المثلث ا ح في و يخرج
 نقطه غرسو و ا على ا ق و هو ر قه فلان ا ب في ا ب مثل م ربع م ربع م
 ا ف الى ا ف و كنهه ر ف الى ا ف بسبيط م ربع ا ف غني م ربع ا ر قه الى م ربع م
 ا ف الى ا ف بسبيط م ربع ا ف اعظم م ربع ا فيه مثال م ربع م ربع م ر قه فلام و ا ح في
 ر ف غني م ربع ا ف و لان ا ب ا ف في ا ف اعظم م ربع ا و و هو سا و لم ربع

في ا ب اعظم م ربع ا
 في ا ح سبيط المثلث ا ح
 في ا ف بسبيط م ربع ا
 في ا ف اعظم م ربع ا

الصورة رقم (٤)

مخطوطة Loth (لوث) رقم ٧٦٧ المكتب الهندي، ورقة ٥٨.

سادساً: الترجمة الفرنسية

تتميز اللغة التي كتبت بها «الرسالة» بصعوبة غير عادية. ونادراً ما يوجد نص رياضي يضاهي صفحتها في هذا المجال. والقضية هنا ليست نتيجة شوائب في مقدرة المؤلف اللغوية؛ فهذا الجانب المستعصي يتعلّق بقضية من نوع آخر: إنّه يتعلّق، بالضبط، بالتقدّم الذي حصل في هذا الفرع من الرياضيات بفضل المؤلف نفسه. وسنحلّل، في مكان آخر، تطوّر هذا العلم وأسلوب الكتابة فيه. أما الآن فنكتفي بالتذكير بأنّه، في غياب الرمزية، كان من الصعب جداً التعبير عن الأبحاث الجديدة من خلال اللغة العادية وحدها. إن مثل هذا التباين بين مستوى تطور الرياضيات وإمكانات اللغة العادية لا يحدّ من تقدم المعرفة فقط، بل يعيق أيضاً انتشار هذه المعرفة. إن حالة الطوسي معيّنة تماماً في هذا المجال؛ وهي تقدّم مثلاً عن هذا القيد الذي فرضه استعمال اللغة الطبيعية في الرياضيات. ولنبدأ بتفحص بعض المسائل التي طرحتها اللغة التي استعملها الطوسي.

في أقسام «الرسالة» المخصصة للحل العددي للمعادلات يعتمد الطوسي منهجاً منظماً: فهو يبدأ بتطبيق خوارزميته على مختلف الحالات قبل أن يقدم مبرراتها الرياضية. واللغة التي يستعملها في عرضه هذا مشتقة من لغة الجبر الحسابي، أي من اللغة المستعملة لاستخراج الجذر النوني لعدد صحيح بواسطة الخوارزمية نفسها. لكن توسيع هذه الطريقة وتطويرها بحيث تنطبق على المعادلات الكثيرة الحدود، بالإضافة إلى محاولة إنشاء نظرية رياضية جديدة لشرح هذه الخوارزمية نفسها، تسبّباً في تقوية الاتجاه (الموجود أصلاً) إلى استعمال الكلمة نفسها للتعبير عن عدة أشياء أو عدة عمليات مختلفة؛ كما تسبّباً في صياغة تعابير يصعب استعمالها. فقد استعملت كلمة «جذر» للدلالة على الجذر التربيعي وعلى جذر المعادلة، وكذلك على المرتبة المعدّة للجذر التربيعي. كما كان لكلمة «كعب» ثلاثة معانٍ. وبحسب الحالة المدروسة كانت كلمة «المرتبة» تشير إلى المرتبة العشرية للعدد أو إلى المنزلة العشرية للرقم ضمن العدد، باعتبار أن 10^0 هي المنزلة رقم 1. ويُدخّل الطوسي أيضاً تعابير مثل «الجذر السعي للكعب الأخير». إن اللجوء إلى مثل هذه الصيغ للدلالة على مراتب المعاملات يزيد من صعوبة قراءة النص.

وتزداد اللغة تعقيداً عندما يتصدى الطوسي للتبرير الرياضي لخوارزميته. وهنا يشرع بشرح طرق تحديد مختلف الأرقام التي يتألف منها الجذر المطلوب والمنزلة العشرية لكل من هذه الأرقام، وكذلك تحديد العلاقة بين معاملات المعادلة تبعاً للمرتبة العشرية لكل معامل. وعلى الرغم من أن لغة الطوسي سوية وتحافظ على الشكل نفسه

إلا أنها تتحول سريعاً إلى ما يشبه الألفاظ نتيجة ثقل تعابيرها وتعدد الصيغ التفضيلية^(٤٠) فيها ونتيجة للإسهاب الذي قد يدعو إلى الحيرة.

في الأقسام الأخرى من الرسالة يستعمل الطوسي بشكل أساسي لغة الخيام؛ هذا ما فعله مثلاً عند معالجته تحديد جذور المعادلات بواسطة المنحنيات المخروطية. إنها في الواقع لغة مركبة من لغة الجبر الهندسي ولغة الهندسة، وبخاصة في الفصل المتعلق بالقطع المخروطية. غير أن الطوسي يعتمد توجيه أبحاثه في اتجاه يزيد طابعه التحليلي على اتجاه أبحاث الخيام. فهو يُدخل تعابير جديدة غائبة كلياً عن صفحات الخيام، مثل «عدد التفاوت»، «العَلَم»... إلخ، بهدف تشكيل المقادير ومقارنتها. وفي الاجمال استعمل الطوسي لغة الجبر الحسابي في الهندسة، أكثر بكثير ممّا فعل الخيام؛ لكنّه، أيضاً، استعمل لغة الهندسة في الجبر لكي يصوغ لغة تتلاءم مع تحليل المقادير، وبالتالي مع نظرية المعادلات الجبرية على الشكل الذي قدّمها به. غير أن تعدد المفاهيم والحسابات المعقدة التي تتطلبها هذه الرياضيات لم يكن من شأنه أن يجد في اللغة المتداولة وحدها ما يقتضيه الوضوح والإيجاز وما تقتضيه الفعالية المطلوبة.

في ظل هذه الحالة، كيف يمكن تحويل نص الطوسي إلى الفرنسية؟ هناك طريقتان يمكن اتباعهما في هذا المجال. الطريقة الأولى كانت متبعة في القرن التاسع عشر، ولا تزال تتبع أحياناً حتى الآن، وهي تركز على استعمال رمزية بدائية وتستعين بتعابير حديثة. هذه الطريقة تزيل بعض العوائق الخاصة بترجمة النصوص القديمة وتصل بالتالي إلى نص فرنسي مملّط، وبالتالي أكثر أناقة. والطريقة الثانية والأصعب، هي الترجمة الحرفية التي لا تعتمد احترام روح النص فقط، بل حرفيته أيضاً. وباعتماد هذه الطريقة لا تعود المسألة مسألة الالتفاف على الصعوبات، بل مجابتهها كلها تقريباً. ونحن نعمدنا سلوك السبيل الثاني هذا، على الرغم ممّا قد تعانیه أناقة النص؛ فهذه الطريقة لا تمنع الخلط بين عمليتي الترجمة والتفسير وحسب، بل تقي من أن تندس أيضاً، ثم تظهر خلال عملية الترجمة، بعض المفاهيم العائدة لرياضيات أخرى. وأخيراً نضيف بأن إدخال الرموز (الحديثة (المترجم)) في ترجمة «الرسالة»، قد يطمس العوائق التي أقامها غياب الرمزية في عمل الطوسي ويُعطي بالتالي فكرة مضلّة عن الأسلوب الرياضي للنص.

زيادة على ما تقدّم، يُعبّر أسلوب الطوسي موحداً في الشكل، بمعنى أنه يستعمل إجمالاً التعبير نفسه للإشارة إلى الموضوع نفسه أو إلى المفهوم نفسه. وفي الترجمة إلى الفرنسية أردنا احترام القواعد عينها التي اتبعها المؤلف. فلقد حاولنا، بقدر الإمكان، إعادة الكلمة الفرنسية ذاتها مقابل الكلمة العربية الواحدة. وبالإضافة إلى ذلك، بذلنا ما بوسعنا لإيجاد تعابير ذات طابع قديم لكي نقل بأمانة عبارات هذا الرياضي.

(٤٠) نسبة إلى أفضل التفضيل: (أعظم، أصغر...). (المترجم).

لكن، ومن أجل احترام المظهر الموحد للغة الطوسي، مع تأمين سهولة في قراءة النص، بدا لنا من الضروري إعطاء بعض التعريفات^(٤١)، التي وإن لم يكن المؤلف قد قدّمها صراحة، إلا أنها كامنة في العرض الذي يقدمه بشأن الحل العددي للمعادلات، وهذا ما ستتحقق منه لاحقاً.

سابعاً: أعمال الطوسي الرياضية الأخرى

زيادة على الرسالة في «المعادلات»، تحوي أعمال الطوسي الرياضية «كتيباً» عن الخط المقارب لأحد فروع القطع الزائد المتساوي الأضلاع، كما تحوي مقالاً في «عمل مسألة هندسية» يحلها جبرياً، وهذا كل ما وصل إلينا من أعماله الرياضية.

يستجيب «الكتيب» لهدفين في آن، فهو أولاً يندرج ضمن تقليد متبع منذ القرن العاشر؛ وهو من جهة ثانية مرتبط مباشرة «بالرسالة»، كما رأينا. فلقد شكلت دراسة أبولونيوس في الكتاب الثاني من المخروطات وبخاصة منها القضية ٢ - ١٤، حافزاً لكثير من أعمال الرياضيين العرب التي كان لها كلها العنوان نفسه: «في الخطين اللذين يقربان ولا يلتقيان»؛ ونعرف حالياً ثلاثة من هذه الكتيبات للسرّجى والثّمي وابن الهيثم. وسنحقق ونحلّل محتوى هذه الكتيبات في مكان آخر. لكن لنذكر فقط بأن الطوسي، حتى ولو حداً حذو بقية الرياضيين بتخصيص نص للقضية المهمة التي تتعلق بمفهوم الخط المقارب، إلا أنه لم يدرسها لذاتها؛ وإنه حتى ولو بحث، كما فعلوا، في وصف سميات فروع القطع الزائد، وفي سلوكه بقرب الخط المقارب، فإنما فعل ذلك تلبية لمقتضيات دراسة المعادلات الجبرية: فمعادلة المنحني بالنسبة إلى خطوطه المقاربة، تدخل في حلّها.

لكن «الكتيب» الذي كتب بعد «الرسالة» يهدف إلى إنجاز نص إحدى أوائل قضاياها، ويمكن أن يبدو، من هذه الزاوية، ككتابة ثانية للقضيتين الأولى والثانية من الرسالة.

ولا نعرف حتى الآن إلا نسخة واحدة من «الكتيب» هي عبارة عن النص الثاني والأخير من إحدى المجموعات. النص الأول يعود إلى نظام الدين النيسابوري، وهو شرح لرسالة نصير الدين الطوسي في علم الفلك. هذه النسخة هي مخطوطة آيا صوفيا - استنبول رقم ٢٦٤٦. ومما ورد في قلفونة النص الأول، نعلم أن هذه النسخة أنجزها المدعو محمد بن مصطفى بن موسى الإبانلوغي المعروف بالصوفي في بداية نيسان/ أبريل ١٤٢٦م، و«الكتيب» يحتل الورقة الأخيرة - الورقة ٧١ - وهي من صناعة بقية الأوراق نفسها. ما كتّب عليها هو بيد الناسخ نفسه. فنحن إذن متأكدون من هوية

(٤١) انظر المصطلحات ص LVI.

الناسخ ومن تاريخ النسخ. وعبر المخطوطة كلها، الخط نستعليق وقياس كل من صفحاتها ٢٧,٦ سم × ١٨,٥ سم يحتل فيها النص مجال ٢٤,٩ × ١٣,٢ سم^٢، وتحوي ٣١ سطراً، في كل سطر نحو ١٩ كلمة. النص مكتوب بالحبر الأسود، أما الأشكال الهندسية فبالأحمر. وبينما راجع الناسخ نص الشرح في علم الفلك مقارناً إياه بالنموذج الأصل، ليس من إثبات بأن «الكتيب» قد عُومِلَ بالمثل. فلا نرى على هامش النص أي تعليق لا من الناسخ ولا من غيره. نشير أخيراً إلى أن مصدر المخطوطة هو «مكتبة السلطان محمود خان».

أما «المقال» (وبهذه اللفظة نشير إلى رسالته «في عمل مسألة هندسية») فهو بطبيعته عمل ظرفي. إنه رسالة جوابية عن سؤال طرحه أحد رجال الدولة، وهو شخص مشار إليه باسمه من دون كنيته؛ لذلك يبقى هذا المراسل مجهولاً لنا. إننا نجهل أيضاً تاريخ كتابة صفحات هذا العمل. لذلك لا نستطيع تحديد موقعه في سياق أعمال الطوسي. ولقد وصلتنا نسختان من هذا «المقال»: النسخة الأولى تشكل جزءاً من مخطوطة سميت شرقيات ٤٥، ص ٢٩ - ٣٥، في جامعة كولومبيا. والثانية موجودة في مخطوطة ليدن شرقيات ١٤، من الورقات ٣٢٣ وجه إلى ٣٢٦ ظهر لكننا تمكنا من إثبات أن المخطوطة الأخيرة هي نسخة من الأولى، تعود إلى القرن السابع عشر. ولقد قمنا بمقارنة تفصيلية دقيقة للنسختين عند الطبعة الأولى لمقالنا هذا^(٤٢). لذلك لم نتردد في إهمال مخطوطة ليدن عند تحقيق النص، محتفظين، فقط، بمخطوطة سميت، شرقيات ٤٥.

ثامناً: المصطلحات

نذكر بأن «المرتبة العشرية» لعدد طبيعي N هو العدد الطبيعي m الذي يحقق الشرط: $10^m \leq N < 10^{m+1}$. نذكر أيضاً بأن أي عدد طبيعي N يمكن كتابته على الشكل التالي: $N = C_p 10^p + C_{p-1} 10^{p-1} + \dots + C_2 10^2 + C_1 10 + C_0$ حيث الأحرف $C_0, C_1, C_2, \dots, C_p$ تشير إلى الأرقام العشرية المؤلفة لهذا العدد (كل منها محصور بين الصفر والتسعة، و $C_p \neq 0$). ففي هذه الحالة نقول إن العدد n هو المنزلة العشرية للرقم C_i في العدد N . في العدد $N = ٢٥٦٤٦٩٧$ نجد الرقم ٧ في المنزلة صفر، ٩ في المنزلة ١ (أو المنزلة الأولى)، ٦ في المنزلة ٢ وفي المنزلة ٤... إلخ.

تعريف ١: المرتبة العشرية لعدد طبيعي N هي ما يسميه الطوسي «آخر مراتب العدد» N .

ملاحظة ١: كان الطوسي يعطي هذا الاسم أحياناً للعدد $10^m \cdot E[N/10^m]$ حيث

(٤٢) Roshdi Rashed, «Un problème arithmético - géométrique de Sharaf al-Dīn al-Ṭūsī»

Journal for the History of Arabic Science, vol. 3, no. 2 (Alep 1978), pp. 233 - 253.

m هي المرتبة العشرية لـ N وحيث $E(a)$ تشير إلى القسم الصحيح من العدد a .

في ما يلي، يشير الحرف N إلى عدد طبيعي، آخر مراتبه (مرتبه العشرية) هي m ؛ ويشير الحرف n إلى عدد طبيعي يحقق الشرط $n \leq m$.

القسمة الإقليدية لـ m على n تعطي

$$m = np + r \quad (0 \leq r < n)$$

لنأخذ الآن عدداً طبيعياً j بحيث يكون $(0 \leq j \leq p)$.

تعريف ٢: إنَّ المنزلة العشرية التي يشير إليها العدد jn تسمى «المرتبة الجيمية المُعدَّة للجذر النوني» للعدد $N^{(٤٣)}$.

ففي الحالة $n = 2$ ، المرتبة الجيمية المُعدَّة للجذر النوني هي: «المرتبة الجيمية المُعدَّة للجذر» (التربيعي)؛ وفي هذه الحالة، إذا كان $j = p$ ، نقول إنها «آخر المراتب المهيأة للجذر»، وهو ما يسميه الطوسي «الجذر الأخير». وإذا كان N هو معامل x^0 في معادلة تربيعية، $(n = 2, j = p)$ ، نقول إنها «آخر المراتب المهيأة للجذر، المقابل للعدد N »، وهو ما يسميه الطوسي «الجذر الأخير المقابل للعدد $N^{(٤٤)}$ ».

وقياساً على ذلك، في الحالة $n = 3$ ، المرتبة الجيمية المُعدَّة للجذر النوني، هي «المرتبة الجيمية المُعدَّة للجذر التكعيبي». وفي هذه الحالة، إذا كان $j = p$ ، نقول إنها «آخر المراتب المُعدَّة للجذر التكعيبي» وهو ما يسميه الطوسي بـ «الكعب الأخير». وإذا كان N هو معامل x^0 في معادلة تكعيبية، $(n = 3, j = p)$ ، نقول إنها «آخر المراتب المُعدَّة للجذر التكعيبي المقابل للعدد N »، وهو ما يسميه الطوسي «الكعب الأخير المقابل للعدد N ».

ملاحظة ٢: لتحديد المرتبة الجيمية المُعدَّة للجذر النوني حيث $n = 2$ أو $n = 3$ ، يعتمد الطوسي على غرار رياضي علم الحساب، إلى تقسيم الأرقام التي تؤلف العدد N إلى شرائح ابتداءً من الرقم ذي المنزلة صفر. وكان يضع علامة على طرف كل شريحة، هي عبارة عن صفر صغير يضعه فوق الرقم الذي يحدد هذا الطرف. فعلى هذا الأساس يشير الصفر الصغير ذو الرتبة j إلى المرتبة الجيمية المُعدَّة للجذر النوني المقابلة للعدد N .

ملاحظة ٣: الرقم ذو المنزلة العشرية صفر (في كتابة N)، منزلته بالنسبة إلى

(٤٣) التعبير الذي استعمله المؤلف بالفرنسية هو «Place affectée» (الموضع المهيأ) وليس «المرتبة». (المترجم).

(٤٤) أو أيضاً «مرتبة آخر الجذور المقابلة للعدد». (المترجم).

الطوسي هي 1. لذلك يجب أن نتذكر بأن الموضع الجيمي بحسب التحديد 2 هو الموضع الـ $(j+1)$ ، أي المنسوب لـ $(j+1)$ بحسب الطوسي. «الموضع الأخير» الذي هو الموضع الجيمي حيث $j=p$ ، هو بالنسبة إلى الطوسي الموضع الجيمي حيث $j=p+1$.

تعريف ٣: لנأخذ عددين طبيعيين N و N' ، مختلفين أو متساويين، ولنفرض أن m هي المرتبة العشرية لـ N وأن m' هي المرتبة العشرية لـ N' ، وأن ℓ و n عدداً طبيعيين مخالفان للصفر يحققان: $m < n$ و $m' < \ell$.

إن المرتبة الجيمية j^* المعدلة للجذر النوني n^* المقابل لـ N والمرتبة الجيمية المعدلة للجذر اللامي (ℓ^*) المقابل لـ N' نقول إنهما موضعان «سميتان» (يحملان الاسم نفسه). وكذلك يقال «سميتان» للمنزلة العشرية الجيمية داخل N وللمنزلة العشرية الجيمية داخل N' . نقول كذلك «سميتين» للمرتبة الجيمية المعدلة للجذر النوني المقابلة للعدد N وللمرتبة الجيمية المعدلة للجذر اللامي المقابل للعدد N' .

مثال: لنأخذ العددين: $N = 349873910781$ و $N' = 79041234$.

في هذه الحالة يكون $m = 11$ و $m' = 7$. ولنأخذ $n = 3$ و $\ell = 2$ ، وإذا حددنا المراتب المعدلة للجذر التكعيبي المقابلة لـ N والمراتب المعدلة للجذر (التريبي) المقابلة لـ N' ، وذلك بوضع صفر صغير فوق طرف كل شريحة، نحصل على:

$$N = \overset{0}{3} \overset{0}{4} \overset{0}{9} \overset{0}{8} \overset{0}{7} \overset{0}{3} \overset{0}{9} \overset{0}{1} \overset{0}{0} \overset{0}{7} \overset{0}{8} \overset{0}{1} ;$$

$$N' = \overset{0}{7} \overset{0}{9} \overset{0}{0} \overset{0}{4} \overset{0}{1} \overset{0}{2} \overset{0}{3} \overset{0}{4} .$$

إن هذه الكتابة البيانية تسمح بالرؤية الفورية للمراتب (المعدلة) للجذر التكعيبي وللمراتب الجذر التريبي، السمية. فالمرتبة الثالثة المعدلة للجذر التكعيبي المقابلة لـ N - وهي المنزلة العشرية السادسة، انظر الرقم «٣»، السابع من اليمين في كتابة N -، والمرتبة الثالثة المعدلة للجذر التريبي المقابلة للعدد N' - وهي المنزلة العشرية الرابعة؛ انظر الرقم «٤» الخامس من اليمين في كتابة N' -، هما مرتبتان سميتان.

فعندما يكون $N = N'$ ، $n = 2$ ، $j = p$ ، فإن المرتبة العشرية الجيمية تسمى «المرتبة السمية» لآخر المراتب المعدلة للجذر، وهي ما يسميه الطوسي «المرتبة السمية للجذر الأخير»؛ وإذا كان $n = 3$ فهي تسمى «المرتبة السمية لآخر المراتب المعدلة للجذر التكعيبي» وهي ما يسميه الطوسي «المرتبة السمية للكعب الأخير».

وقد نلتقي في ما سيتبع بعض التعريفات التي ليست سوى تطبيقات من التعريف ٣ السابق.

القسم الأول

الفصل الأول

الحل العددي للمعادلات وطريقة روفيني - هورنر

قسم مهم من «رسالة» الطوسي مخصص للحل العددي للمعادلات. إن هذا الموضوع الرياضي بدأ يتشكّل مع العمل على استخراج الجذر النوني لعدد صحيح وتطور من ثمّ، ليشمل حل المعادلات الكثيرة الحدود. لذلك ليس من المستغرب في شيء أن يشكّل أحد الأجزاء المكوّنة لرسالة تتناول بالضبط هذه المعادلات.

ولسنا هنا في صدد إعادة كتابة تاريخ هذا الموضوع، لكننا سنستعيد أفكار الطوسي وطرقه لشرحها والتعليق عليها؛ هذه الأفكار التي حال دون النفاذ إليها خطأ تسبب في العديد من الأخطاء. إن التوصل إلى هذه الاستعادة، استوجب تغييراً في اللغة وإدخالاً متعمّداً لمصطلحات تناسب أفكار الكاتب وتكون مؤهلة لإبراز المحطات المختلفة في تفكيره. فلا شك إذاً أننا لن نُقدّم هنا سوى قراءة في «الرسالة» للقسم الذي يعالج هذا الموضوع. وقد أردنا لهذه القراءة أن تكون، بقدر الإمكان، القراءة الأكثر أمانة للمسائل التي طرحها الطوسي وللوسائل التي اخترعها لحلها.

لنأخذ المعادلة:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c = 0 \quad (١ - ٠)$$

حيث المعاملات كلّها في \mathbb{Z} .

ولنكتب (١ - ٠) على الشكل الذي اتّبعه الطوسي

$$g(x) = h(x) \quad (٢ - ٠)$$

حيث $g(x)$ تشير إلى مجموع الحدود ذات المعاملات الموجبة و $h(x)$ تشير إلى مجموع الحدود ذات المعاملات السالبة في $f(x)$. وهنا يميز الطوسي بين حالات ثلاث:

الحالة (١): ($c = 0$)؛ في هذه الحالة يعود حلّ المعادلة (١ - ٠) إلى حل معادلة من الدرجة الثانية.

الحالة (٢): ($c < 0$)؛ في هذه الحالة $c > 0$ ، وسيكون $-c$ إذاً معاملاً في $h(x)$ وتحوز المعادلة (١ - ٠) على جذر موجب على الأقل.

الحالة (٣): ($c > 0$)؛ في هذه الحالة، يوجد c في $g(x)$ وقد لا يكون لـ (١ - ٠) أي جذر موجب؛ وقد يكون لها جذر موجب، مزدوج أو بسيط؛ وأخيراً يمكن أن يكون لها جذران موجبان مختلفان.

ولكي يحدّد الجذر الأكبر، يعتمد الطوسي إلى تبديل أفيني للمتغير، فتؤول المسألة إلى معادلة من الحالة (٢)، ذات جذر موجب واحد فقط. هذا الجذر الموجب الوحيد الذي يحصل عليه عندئذٍ، يقابل، نظراً لتبديل المتغيرات، الجذر الأكبر المطلوب للمعادلة الأساسية. أما الجذر الأصغر في المعادلة الأساسية، فيقابله جذر سالب في المعادلة المحوّلة. وهنا نذكر بأن الجذر السالب لا وجود له بالنسبة إلى الطوسي.

إنّ مخطط فصلنا هذا ينتظم إذاً بشكل طبيعي: فقرة أولى تطرح المسألة بشكل إجمالي. من ثمّ تعالج الفقرات ٢، ٣ و ٤، الحالة الثانية المذكورة سابقاً. والفقرة الخامسة تعالج الحالة الأخيرة ($c > 0$). أما الفقرة السادسة، النهائية، فهي مخصصة لإعادة تركيب لوحات الطوسي على الشكل الذي كانت عليه قبل حذفها في القرن الثالث عشر من قبل المجهول الذي سبق ذكره في المقدمة.

إنّ تفضّص المراحل المتتالية لعرض الطوسي سيسمح بتبيان ما يلي:

١ - لم يكتفِ الطوسي بإدخال خوارزمية للحل، بل حاول صياغة نظرية رياضية لتبرير هذه الخوارزمية وتطبيقها.

٢ - إن الأقسام المكوّنة لهذه النظرية، وتبعاً لذلك فإن المراحل المختلفة لعرض الطوسي، هي أقسام متفاوتة من حيث الدقة الرياضية ومن حيث العمومية.

٣ - الخوارزمية التي أدخلها الطوسي هي مثلى (Optimale) بالمعنى الحالي للكلمة؛ فهي تؤدّي إلى احتساب الجذر المطلوب بشكل فعلي و«اقتصادي» (أي، بمراحل حسابية قليلة لا تقتضي وقتاً طويلاً لإنجازها (المترجم)).

٤ - الخوارزمية ليست سوى المخطط العملي المنسوب إلى روفيني - هورنر^(١).

هذا ما سبق أن أكدناه وما سنبرهنه بدقة في الفصل الحالي. فهذه الخوارزمية إذن ليست خاصة بالمعادلات التكعيبية، ويمكن تعميمها فوراً على المعادلات الكثيرة الحدود.

Roshdi Rashed, «Résolution des équations numériques et algèbre Sharaf Al-dīn al-Tūsī (١)

Viète,» *Archive for History of Exact Sciences*, vol. 12, no. 3 (1974), pp. 244 - 290.

أولاً: مسألة المعادلات العددية

يعالج الطوسي في «الرسالة» المعادلات من الدرجة الأصغر أو المساوية لـ ٣. لكن صياغته يمكن تعميمها بشكل فوري إلى ما يعود لحل المعادلة:

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^{n-i} = 0, \quad (١ - ١)$$

حيث $a_n \neq 0$ ، $a_0 = 1$ ، $a_i \in \mathbb{Z}$.

إن دراسة هذه المعادلة تتطلب إدخال بعض الوسائط التي ستظهر الفائدة منها في الفقرات التالية:

بالنسبة إلى أي معامل a_i ($a_i \neq 0$ و $1 \leq i \leq n$)، نسمي m_i المرتبة العشرية^(٢) لـ a_i ونفرض أن القسمة الإقليدية لـ m_i على i تعطي:

$$m_i = i \cdot p_i + q_i; \quad (٢ - ١)$$

حيث $0 \leq q_i < i$.

وبما أن العدد الطبيعي a_n يلعب دوراً أساسياً في هذه الدراسة، فسوف نشير بـ N ، m ، p ، q ، بالتالي، إلى الأعداد $|a_n|$ ، m_n ، p_n و q_n . ولكي لا نبتعد عن روح «الرسالة» سنكتب f غالباً على شكل فرق بين كثيرتي حدود g و h ذات معاملات موجبة؛ لذلك نستطيع كتابة المعادلة (١ - ١) على الشكل التالي:

$$g(x) = h(x) \quad (١ - ١)$$

لكننا اعتبرنا أساساً أن $a_0 = 1$ ؛ لذا فإن درجة $g(x)$ هي n بينما درجة $h(x)$ هي، قطعاً، أصغر من n . وكما فعلنا سابقاً سوف نميز بين حالتين:

الأولى: $a_n < 0$ ؛ وهذا يعني أن $(N = |a_n|)$ هو حد من حدود $h(x)$ ؛ وفي هذه الحالة يوجد دائماً جذر موجب على الأقل.

الثانية: $a_n > 0$ ؛ وهذا يعني أن $N = a_n$ هو حد من حدود $g(x)$. وفي هذه الحالة تجوز الاحتمالات التي سبق ذكرها.

(٢) إذا كان c هو عدد الأرقام العشرية التي تولف عدداً موجباً a ، فإن المرتبة العشرية لـ a هي $c - 1$ أي أيضاً: $E[\log_{10} a]$.

لنفترض، من جهة أخرى أن المعادلة (١ - ١) تحوز على حلّ هو s توسيعه العشري هو التالي:

$$s = \sum_{i=0}^r s_i \quad (١ - ٣)$$

حيث $s_i = \sigma_i 10^{-i}$.

لكي نحسب s ، يكفي أن نحسب بالتتالي الأرقام s_i . إن طريقة الطوسي لهذا الاحتساب تحوي قسمين: القسم الأول يخصصه لاحتساب σ_0 . أما في القسم الثاني فيشكل معادلة يكون $(s - s_0)$ جذراً لها، وانطلاقاً من هذه المعادلة الجديدة يبحث عن s_1 ؛ ويشكّل من جديد معادلة يكون $s_1 - (s - s_0)$ جذراً لها. وهكذا يعيد العملية نفسها ما يُلزَم من المرات. هذا هو مسار طريقة الطوسي التي ستفحصها فيما سيتبع.

ثانياً: تحديد الرقم الأول من الجذر الموجب المطلوب

من السهل إيجاد σ_0 في حالة معادلة، سواء أكانت كثيرة الحدود أم لا، إذا ما اتبعنا طرقاً تحليلية تسمح بحصر الجذر المطلوب داخل فسحة مناسبة وتسمح بالتالي بحصر أول أرقامه (بدءاً من اليسار).

لكن الطريق التي اتبعها الطوسي كانت مختلفة تماماً. صحيح أنه توّسل خَصُر الجذر المطلوب ضمنَ فسحة مناسبة؛ ألا أنه عمل على مواجهة حالات عدة آخذاً بالاعتبار ترتيب معاملات المعادلة (١ - ١) بحسب قيمها المطلقة. ولنذكر منذ الآن بأن الصعوبة الكبرى التي وجدها الطوسي، والتي لم تتكشف له إلا عند نهاية بحثه، كانت كثرة الحالات المختلفة التي عليه مواجهتها. فسرعان ما يتزايد عدد هذه الحالات عندما يتجاوز n العدد ٣، وهذا ما يجعل المناقشة صعبة إن لم نُقلّ عقيمة. وزيادة على ذلك، وحتى لو توقفنا فقط عند المعادلات التكعيبية، سرعان ما نكتشف أن المعطيات التي تخص معاملات المعادلة (١ - ١) والتي بالنظر إليها تتحدّد الحالات التي يجب مواجهتها، هي معطيات لا تفي بالمطلوب. فهذه المعطيات نفسها بإمكانها أن تؤدّي إلى حالة معينة في مثل ما، كما إلى حالة من نوع آخر في مثل ثانٍ. إلا أن هذه الصعوبة التي اعترضته عند محاولته تبرير خوارزميته وشرح كيفية تحديد الرقم الأول من الجذر المطلوب، لم تمنعه من إبراز فكرة «كثير الحدود المهيمن»؛ وهو بهذا الإبراز، يدفع بنظرية المعادلات إلى الأمام، لكن باتجاهات مغايرة. ولا يسعنا إلا أن نذكر أن الطوسي يختم طريقته بالاعتراف بنوع من التردد بخصوص هذه الصعوبة. ولنتناول حالياً نصّ الطوسي.

لنفترض أولاً أن المعادلة (١ - ١) تحوز على جذر موجب وحيد هو s ، معطى على شكل المعادلة (١ - ٣). ولنفترض أيضاً أن s هو جذر بسيط (غير مزدوج أو أكثر

من مزدوج). إن هذا الشرط محقق حكماً في حالات عدة، منها الحالة ($a_n < 0$ و $a_i \geq 0$) لكل i حيث $1 \leq i < n$ ومنها الحالة $a > 0$, $b > 0$ و $x^3 + a x^2 = b x + N$.

وقد يكون محققاً، تبعاً للقيم الفعلية للمعاملات (الموجبة) a و b ، في المعادلة:

$$x^3 + b x = a x^2 + N.$$

إن شرط وجود جذر موجب واحد بسيط، بالاستناد إلى توأصل f ، يقضي بأن تُغيّر $f(x)$ إشارتها مرّة واحدة على \mathbb{R}_+ . وبشكل أكثر تحديداً، فإنّ لدينا ما يلي:

$$(1 - 2) \text{ إذا كان } \left. \begin{array}{l} 0 < x_1 < s \\ \text{و} \\ x_2 > s \end{array} \right\} \text{ أو } \left. \begin{array}{l} x_1 > s \\ \text{و} \\ x_2 > s \end{array} \right\} \text{ يكون } (f(x_1) \cdot f(x_2) > 0)$$

$$(2 - 2) \text{ إذا كان } \left. \begin{array}{l} x_1 < s \\ \text{و} \\ x_2 > s \end{array} \right\} \text{ يكون } (f(x_1) \cdot f(x_2) < 0).$$

لكن، بما أن لدينا:

$$0 < \sigma_0 \cdot 10^r \leq s < (\sigma_0 + 1) \cdot 10^r \quad (3 - 2)$$

تكون اللامتساوية

$$f(\sigma \cdot 10^r) \cdot f[(\sigma + 1) \cdot 10^r] \leq 0 \quad (4 - 2)$$

محققة بـ $\sigma = \sigma_0$ (المساواة في (2 - 4) تنحقق عند كون $s = \sigma_0 \cdot 10^r$ ، وهذا ما سنستبعده في ما سيتبع). وبشكل أدق، يمكننا أن نوّكد النتيجة التالية: «الرقم الوحيد الذي يحقق اللامتساوية (2 - 4) هو σ_0 ».

وللبرهان، نفترض أن σ رقم مخالف لـ σ_0 . من البديهي أن $\sigma < \sigma_0$ ، تعطي:

$$\sigma \cdot 10^r < (\sigma + 1) \cdot 10^r \leq \sigma_0 \cdot 10^r < s,$$

وأن $\sigma_0 > \sigma$ تعطي:

$$s < (\sigma_0 + 1) \cdot 10^r \leq \sigma \cdot 10^r < (\sigma + 1) \cdot 10^r$$

لهذا، وبناء على (2 - 1) يكون لدينا، في كلتا الحالتين، أي مهما كان σ :

$$f(\sigma \cdot 10^r) \cdot f[(\sigma + 1) \cdot 10^r] > 0.$$

ولنعد الآن إلى المعادلات (١ - ١) ($a_i \in \mathbb{Z}$, $a_n = N \neq 0$, $a_0 = 1$) ذات الجذر الموجب الواحد البسيط.

في هذه المعادلات، نرى بسهولة أن العلاقتين (١ - ٢) و (٢ - ٢) تأخذان الشكل التالي:

$$\left. \begin{aligned} 0 < x < s &\implies f(x) < 0 \\ x > s &\implies f(x) > 0 \end{aligned} \right\} \quad (٢ - ٢)$$

لذلك، فعندما يكون $\sigma = \sigma_0$ يكون لدينا، بناء لما سبق، وباعتبار $10^r \cdot \sigma_0 \neq s$:

$$f((\sigma_0 + 1) \cdot 10^r) > 0 \quad \text{و} \quad f(\sigma_0 + 10^r) < 0 \quad (٥ - ٢)$$

وهو، أخذاً في الاعتبار (١ - ١)، ما نستطيع كتابته:

$$g((\sigma_0 + 1) \cdot 10^r) > h((\sigma_0 + 1) \cdot 10^r) \quad \text{و} \quad g(\sigma_0 \cdot 10^r) < h(\sigma_0 \cdot 10^r) \quad (٦ - ٢)$$

ملاحظة ٢ - ١: لنفرض أن $a_i \geq 0$ لأجل كل i حيث $(1 \leq i \leq n-1)$ وأن $(a_n = -N < 0)$. عند ذلك يُكتب الشرط (٦ - ٢) كما يلي:

$$g(\sigma_0 \cdot 10^r) < N < g((\sigma_0 + 1) \cdot 10^r) \quad (٧ - ٢)$$

وفي هذه الحالة يمكن تحديد σ_0 بشكلٍ وحيد، كونه الرقم الأكبر بين الأرقام σ التي تحقق الشرط $g(\sigma \cdot 10^r) < N$.

لذلك، من الممكن، نظرياً على الأقل، تحديد σ_0 و r انطلاقاً من $f(x)$ ، وذلك بواسطة هذه، أو تلك، من العلاقات من (٢ - ٤) إلى (٢ - ٧).

لكن، في كل هذه العلاقات، استعملنا جميع حدود f ، بينما كانت الفكرة الرئيسة للطوسي تدعو إلى التوقف عن الاستعانة بكل الحدود، لكي نستخدم فقط عدداً محدوداً منها. وفي الواقع، يوجد عامة، كثير حدود f_1 ، مؤلفاً من بعض حدود f ، متعلقاً بـ s وبحيث تكون العلاقة:

$$f_1((\sigma_0 + 1) \cdot 10^r) > 0 \quad \text{و} \quad f_1(\sigma_0 \cdot 10^r) < 0 \quad (٨ - ٢)$$

مكافئة للعلاقة (٢ - ٥).

إذا ما كتبنا f_1 على شكل فرق $(g_1 - h_1)$ بين كثيري حدود g_1 و h_1 بمعاملات موجبة، تصبح (٨ - ٢) مكافئة للعلاقة:

$$g_1((\sigma_0 + 1) \cdot 10^r) > h_1((\sigma_0 + 1) \cdot 10^r) \quad \text{و} \quad g_1(\sigma_0 \cdot 10^r) < h_1(\sigma_0 \cdot 10^r) \quad (٩ - ٢)$$

هكذا نرى أنه بقدر ما يكون عدد حدود f التي يتألف منها f_1 قليلاً، بقدر ما يسهل تحديد σ_0 . إن فكرة الطوسي هذه تبرز إذن التعريف التالي:

تعريف: لنأخذ المعادلة (١ - ١) ولنفرض أن s هو أحد جذورها الموجبة.

نقول عن كثير حدود f_1 إنه «مهيمن» بالنسبة إلى s عند تحقق الشروط التالية:

(أ) حدود f_1 هي حدود من f ؛

(ب) (٢ - ٥) و (٢ - ٨) متعادلتان؛

(ج) لا يمكن اختصار f_1 ، بمعنى أننا إذا حذفنا أيّاً من حدود f_1 ، يصبح الشرط (ب) غير محقق.

عندما نكتب f_1 على شكل فرق $(g_1 - h_1)$ بين كثيري حدود بمعاملات موجبة g_1 و h_1 ، نقول عن g_1 و h_1 إنهما «مهيمنان» بالنسبة إلى s .

ملاحظة ٢ - ٢: لنفرض أن g_1 و h_1 كثيرا حدود مهيمنان بالنسبة إلى s وأن h_1 مُختَصَر إلى N ، $(h_1 = N)$. في هذه الحالة نكتب (٢ - ٩) على الشكل التالي:

$$g_1(\sigma_0 \cdot 10^r) < N < g_1((\sigma_0 + 1) \cdot 10^r) \quad (٢ - ١٠)$$

ولكي نبحث عن كثيري الحدود $(g_1 \text{ و } h_1)$ ينبغي أن نعود إلى المعادلة (١ - ١) وإلى الوسائط m_i ، p_i و q_i التي أدخلناها في الفقرة الأولى. فإن معرفة المراتب العشرية للأعداد $|a_i \cdot s^{n-i}|$ ، حيث $(a_i \neq 0)$ ، والمنازل العشرية لأرقامها، هي أساسية لتحديد كثيرات الحدود المهيمنة. لكن s مجهول، وكذلك المراتب العشرية للأعداد $|a_i \cdot s^{n-i}|$ والمنازل العشرية للأرقام التي تولّفها. ولكي يحلّ هذه المسألة، يعتمد الطوسي إلى مقارنة مراتب الوسائط. وقبل البدء بالمقارنة، وتسهيلاً لها، لنحقق التجانس ولنعتبر الـ $|a_i \cdot s^{n-i}|$ كمجسمات ^(٢) عدد أبعادها n ، يمكن كتابتها:

$$\left(|a_i|^i\right) \cdot s^{n-i} \quad (٢ - ١١)$$

حيث $(a_i \neq 0)$ و $(1 \leq i \leq n)$.

هذا يقودنا إلى مقارنة المراتب p_i للجذور الـ i إية (i ièmes) لـ $|a_i|$ أي لـ $(|a_i|^{\frac{1}{i}})$. فبمقارنة هذه المراتب الواحدة بالأخرى، بما فيها $p_n = P$ ، تنتج معلومات قيّمة، ستظهر الفائدة منها في حالات عديدة، عند البحث عن كثيرات الحدود المهيمنة.

وينبغي الإشارة إلى أن هذه المقارنة التي تنظم بموجبيها المراتب المذكورة بحسب

(٢) فوق - مكعبات (hypercubes). (المترجم).

درجات كبرها، لا تمكّن وحدها من فصل الحالات التي يتوجب مواجهتها. إن تعذر فصل الحالات هذا يرجع بشكل رئيس إلى أن مختلف أرقام $|a_i|$ و s وبخاصة الأرقام الأولى تساهم أيضاً - ولو بدرجات متفاوتة - وبشبه استقلالية بعضها عن بعض، وبحسب درجات كبرها، بتشكيل مراتب المجسمات (٢ - ١١) و s^n و مراتب حاصل جمع أي مجموعة من بينها. إن هذه المساهمة تتعلق إذن بالمثال المعالج حتى ولو فُرضت على p_i شروط ثابتة. مثال على ذلك: إذا كان r هو مرتبة s وكان $\sigma = 9$ ، تكون مرتبة s^n هي $nr + (n - 1)$ ، إذا لم يكن n كبيراً جداً. وبالمقابل إذا كان $\sigma_0 = 1$ ، تكون مرتبة s^n هي nr فقط. وهذا الأمر يبقى صحيحاً بالنسبة إلى بقية المجسمات الواردة في (٢ - ١١).

وبالرغم من عدم إمكان فصل الحالات هذه، يتوجب علينا، مع الطوسي، مواجهة حالات عدة مصنفة فقط بحسب درجات كبر ال p_i . عندئذٍ نستطيع أن نبرهن أن هذه الحالات ليست منفصلة، بعكس ما كان يعتقد الطوسي، على ما يبدو، على الأقل في بداية «رسالته».

الحالة الأولى:

$$p > p_i \quad (1 \leq i \leq n-1) \quad (٢ - ١٢)$$

هذه اللامتساويات تكافئ اللامتساويات التالية:

$$ip > ip_i + q_i = m_i \quad (1 \leq i \leq n-1) \quad (٢ - ١٣)$$

كان الطوسي يعتقد، على ما يبدو، أن المجسمات (٢ - ١١) حيث $(1 \leq i \leq n-1)$ المتعلقة بـ $g(s)$ هي ذات مراتب عشرية أصغر من مرتبة s^n وأن المجسمات (٢ - ١١) المتعلقة بـ $h(s)$ هي من مراتب عشرية أصغر من مرتبة N . يستنتج إذن أن s_0^n لا يتأتى إلا من أرقام الشريحة الأخيرة من N ، أي أن s^n و N هما مهيمنان (بالنسبة إلى s). ولو لم نأخذ في الاعتبار ما أتينا على ذكره قبل قليل، بخصوص مساهمة أرقام s و $|a_i|$ في تشكّل مراتب المجسمات (٢ - ١١)، لَمُنّا إلى استنتاج مماثل لاستنتاج الطوسي. لكن هذا الاستنتاج ليس صحيحاً دائماً. فالشروط (٢ - ١٢) التي يضعها الطوسي، غير كافية لإيجاد كثيرات الحدود المهيمنة، بشكل منهجي. فكثيرات الحدود هذه تتعلق بالمثال المعالج. فعندما يكون p أكبر «بما يكفي» من ال p_i ، يحصل من دون شك أن $(g_1(x) = x^n)$ و $(h_1(x) = N)$ هما مهيمنان. عندئذٍ نستطيع أن نبرهن أن $p = r$ وبأن σ_0 يتحدد بواسطة (٢ - ١٠) التي تعاد كتابتها في هذه الحالة على الشكل التالي:

$$(\sigma_0 \cdot 10^r)^n < N < ((\sigma_0 + 1) \cdot 10^r)^n \quad (٢ - ١٤)$$

يبقى أن نحدد بالضبط المقصود بتعبير «بما يكفي» السابق ذكره. وهذا التحديد ليس في إمكاننا؛ فهو يختلف من معادلة إلى أخرى. لذلك سنعالج بصورة منهجية أنواع المعادلات التي درسها الطوسي مُقَدِّمين لكل نوع منها، أولاً المثال الذي قدّمه المؤلف ومتبعينه من ثمّ بأمثلة معاكسة.

وكما سنرى، يقدّم الطوسي أنواعاً ثمانية من المعادلات تحوي جميع المعادلات التي يكون فيها $c < 0$ (باستثناء المعادلة $x^3 - N = 0$ التي تعود لاستخراج الجذر التكعيبي لعدد ما). الأنواع السبعة الأولى لها جذر موجب واحد حكماً. أما المعادلات من النوع الثامن فلها جذرٌ موجبٌ على الأقل (انظر الملاحظة (٢ - ٣) في ما بعد). والأنواع الباقية هي إما معادلات يمكن إعادتها إلى معادلات من الدرجة الثانية، وإما معادلات يكون فيها $c > 0$ ويمكن إعادتها بواسطة تحويل أفييني للمتغير، إلى معادلات تحويها الأنواع الثمانية السابقة (انظر الفقرة خامساً من هذا الفصل).

النوع ١: $x^3 + ax = N$ ؛ وهنا: $a_1 = 0$ ، $a_2 = a$ ، $a_3 = -N$.

(١) مثال الطوسي: $s = 321$ ، $N = 33087717$ ، $a = 36$.

في هذا المثال $p = 2$ ، $p_2 = 0$ (الصفري)، فيكون شرط الطوسي (٢ - ١٢) محققاً. نستطيع أن نبرهن أن x^3 و N مهيمنان، ونحصل، بمساعدة (٢ - ١٤) على $r = 2$ و $\sigma_0 = 3$.

(٢) $s = 790$ ، $N = 1150770090$ ، $a = 832571$.

هنا يكون: $p = 3$ و $p_2 = 2$ ، شرط الطوسي محقق. لو كان x^3 و N مهيمنين لحصل معنا $r = 3$ ، $\sigma_0 = 1$ وهذا خطأ. نلاحظ هنا أن كثير الحدود الوحيد المهيمن بالنسبة إلى الجذر $s = 790$ (إلى جانب N) هو: $g(x) = x^3 + ax$.

(٣) $s = 999$ ، $N = 1006992000$ ، $a = 9999$.

هنا يكون: $p = 3$ ؛ $p_2 = 1$ و شرط الطوسي محقق. لو كان x^3 و N مهيمنين لحصل $r = 3$ ، $\sigma_0 = 1$ وهذا خطأ.

النوع ٢: $x_3 = ax + N$

وهنا: (الصفري) $a_1 = 0$ ، $a_2 = -a$ ، $a_3 = -N$.

(١) مثال الطوسي: $s = 321$ ، $N = 32767038$ ، $a = 963$.

في هذا المثال $p = 2$ ، $p_2 = 1$ ، شرط الطوسي محقق. نستطيع أن نبرهن أن x^3 و N مهيمنين في هذه الحالة، وبناءً على (٢ - ١٤) نحصل على $r = 2$ ، $\sigma_0 = 3$.

(٢) $s = 211$ ، $N = 7284142$ ، $a = 9999$.

وهنا $p = 2$ ، $p_2 = 0$ فشرط الطوسي مؤمن. ونستطيع أن نبرهن أنه لو كان x^3 و N مهمين لحصل معنا $r = 2$ و $\sigma_0 = 1$ وهذا خطأ.

$$(٣) \quad s = 100, N = 990100, a = 99$$

وهنا $p = 1$ ، $p_2 = 0$ (صفر)، شرط الطوسي محقق. لو كان x^3 و N مهمين لحصل معنا $r = 1$ ، $\sigma_0 = 9$ وهذا خطأ.

$$\text{النوع ٣: } x^3 + ax^2 = N$$

$$\text{وهنا } a_2 = 0, a_1 = a$$

$$(١) \text{ مثال الطوسي: } s = 321, N = 36167391, a = 30$$

وهنا $p = 2$ ؛ $p_1 = 1$ وشرط الطوسي محقق. نستطيع أن نبرهن أن x^3 و N مهمين وهذا ما يعطي $r = 2$ و $\sigma_0 = 3$.

$$(٢) \quad s = 99, N = 1852389, a = 90$$

وهنا $p = 2$ ، $p_1 = 1$ وشرط الطوسي مؤمن. لو كان x^3 و N مهمين لحصل $r = 2$ و $\sigma_0 = 1$ وهذا خطأ.

$$\text{النوع ٤: } a_2 = 0, a_1 = a, x^3 = ax^2 + N$$

$$(١) \text{ مثال الطوسي } s = 321, N = 29984931, a = 30$$

هنا $p = 2$ ، $p_1 = 1$ وشرط الطوسي محقق. نستطيع أن نبرهن أن x^3 و N هما بالفعل مهمين وهذا يعطي $r = 2$ ، $\sigma_0 = 3$.

$$(٢) \quad s = 721, N = 323341102, a = 99$$

هنا $p = 2$ ، $p_1 = 1$ وشرط الطوسي محقق. لو كان x^3 و N مهمين لكان $r = 2$ و $\sigma_0 = 6$ وهذا خطأ.

$$(٣) \quad s = 100, N = 910000, a = 9$$

هنا $p = 1$ ، $p_1 = 0$ وشرط الطوسي محقق. بالإمكان برهنة أنه لو كان x^3 و N مهمين، لكان $r = 1$ و $\sigma_0 = 9$ وهذا خطأ.

$$\text{النوع ٥: } a_2 = b, a_1 = a, x^3 + ax^2 + bx = N$$

$$(١) \text{ مثال الطوسي: } s = 321, N = 34345395, b = 102, a = 12$$

هنا $p = 2$ ، $p_1 = 1$ ، $p_2 = 1$ شرط الطوسي إذن مؤمن. نستطيع برهنة أن x^3 و N مهمين وهذا يعطي $r = 2$ و $\sigma_0 = 3$.

$$.s = 98, N = 1903552, b = 1000, a = 90 \text{ (٢)}$$

هنا $p = 2, p_1 = 1, p_2 = 1$ ، وشرط الطوسي محقق. لو كان x^3 و N مهمين لكان $r = 2$ و $\sigma_0 = 1$ وهذا خطأ.

$$.s = 980, N = 1037427020, b = 9999, a = 90 \text{ (٣)}$$

هنا $p = 3, p_1 = p_2 = 1$ ، وشرط الطوسي محقق. لو كان x^3 و N مهمين لحصل معنا $r = 3, \sigma_0 = 1$ وهذا خطأ.

$$\text{النوع ٦: } a_2 = -b, a_1 = -a, x^3 = ax^2 + bx + N$$

$$.s = 321, N = 29792331, b = 600, a = 30 \text{ (١) مثال الطوسي:}$$

وهنا $p = 2, p_1 = p_2 = 1$ ، شرط الطوسي محقق، ونستطيع أن نبرهن أن x^3 و N مهمين، وهذا يعطي $r = 2, \sigma_0 = 3$.

$$.s = 321, N = 23481471, b = 1000, a = 90 \text{ (٢)}$$

هنا أيضاً $p = 2$ و $p_1 = p_2 = 1$ ، وشرط الطوسي محقق. لكن، لو كان x^3 و N مهمين لكان $r = 2$ و $\sigma_0 = 2$ وهذا خطأ.

$$.s = 1010, N = 928314230, b = 987, a = 99 \text{ (٣)}$$

هنا $p = 2, p_1 = p_2 = 1$ ، وشرط الطوسي محقق. لو كان x^3 و N مهمين لكان $r = 2$ و $\sigma_0 = 9$ وهذا خطأ.

$$\text{النوع ٧: } a_2 = -b, a_1 = a, x^3 + ax^2 = bx + N$$

$$.s = 321, N = 36148131, b = 60, a = 30 \text{ (١) مثال الطوسي:}$$

هنا $p = 2, p_1 = 1, p_2 = 0$ ، وشرط الطوسي مؤمن. نستطيع أن نبرهن أن x^3 و N مهمين وهذا يعطي $r = 2$ و $\sigma_0 = 3$.

$$.s = 308, N = 26233284, b = 9999, a = 1 \text{ (٢)}$$

وهنا $p = 2, p = 0, p_2 = 1$ ، وشرط الطوسي محقق. لو كان x^3 و N مهمين لحصلنا على $r = 2$ و $\sigma_0 = 2$ وهذا خطأ.

$$.s = 99, N = 1890405, b = 111, a = 95 \text{ (٣)}$$

هنا $p = 2, p_1 = p_2 = 1$ ، وشرط الطوسي محقق. ولو كان x^3 و N مهمين لحصلنا على $r = 2$ و $\sigma_0 = 1$ وهذا خطأ.

$$\text{النوع ٨: } a_2 = b, a_1 = 0, x^3 + bx = ax^2 + N$$

(١) مثال الطوسي: $a = 30$ ، $b = 300$ ، $N = 30081231$ ، $s = 321$.

هنا $p = 2$ ، $p_1 = p_2 = 1$ ، وشرط الطوسي محقق و x^3 و N مهيمنان وهذا يعطي $r = 2$ ، $\sigma_0 = 3$.

(٢) $a = 99$ ، $b = 100$ ، $N = 22907202$ ، $s = 321$.

وهنا $p = 2$ ، $p_1 = p_2 = 1$ ، وشرط الطوسي إذن محقق. لو كان x^3 و N مهيمنين لكان $r = 2$ و $\sigma_0 = 2$ وهذا خطأ.

(٣) $a = 99$ ، $b = 423$ ، $N = 929738330$ ، $s = 1010$.

هنا $p = 2$ ؛ $p_1 = p_2 = 1$ ، وشرط الطوسي محقق. ولو كان x^3 و N مهيمنين لحصلنا على $r = 2$ ، $\sigma_0 = 9$ وهذا خطأ.

الحالة الثانية:

(٢ - ١٥) يوجد جزء، A (غير فارغ) من المجموعة $\{1, 2, \dots, n\}$ يحقق الشرطين التاليين:

$$\begin{cases} [i \in A, j \in A] \Rightarrow p_i = p_j \\ [i \in A, j \notin A] \Rightarrow p_i > p_j \end{cases}$$

مع الملاحظة أن مكمل A في المجموعة المذكورة A^c يمكن أن يكون فارغاً.

هنا أيضاً، إذا لم نأخذ في الاعتبار ما ذكرناه في الحالة الأولى، قد ينتج لدينا ميل إلى الاعتقاد بأن كثير الحدود هو المؤلف من الحدود x^{n-i} . حيث $a_i \in A$ هو مهيمن. لكن، كما سبق أن ذكرنا، كان موقف الطوسي بشأن هذه النقطة، ينقصه الوضوح. فقد وصل إلى حد تأكيد غياب قاعدة عامة بهذا الخصوص. وسوف نبين، بالفعل، أن هذه الشروط لا تؤدي إلى أي قانون عام في مجال البحث عن كثيرات الحدود المهيمنة. سنتابع إذن تفحص الأنواع التي درسها الطوسي. الشروط (٢ - ١٥) التي وضعها لتحقيق الأمثلة التي عالجها. لكن، هنا أيضاً، تُظهر الأمثلة المعاكسة التي سنقدمها أن هذه الشروط غير كافية.

النوع ١: $x^3 + ax = N$ ، $a_1 = 0$ ، $a_2 = a$ ، $a_3 = -N$.

من البديهي أن N هو، حكماً، مهيمن في مثل هذه المعادلة، فما علينا سوى البحث عن كثير الحدود المهيمن الآخر.

(١) مثال الطوسي: $a = 1203321$ ، $N = 419342202$ ، $s = 321$.

هنا $p = 2$ ، $p_2 = 3$ ؛ $A = \{2\}$ يحقق شرط الطوسي (٢ - ١٥) و ax مهمين. يحدد الطوسي r على أنه المرتبة العشرية لـ $[N/a]$ ^(٤) ويحدد σ_0 بواسطة العلاقة:

$$a \cdot \sigma_0 \cdot 10^r \leq N < a \cdot (\sigma_0 + 1) \cdot 10^r \quad (٢ - ١٦)$$

ويجد $r = 2$ و $\sigma_0 = 3$.

$$s = 680, N = 994432000, a = 1000000 \quad (٢)$$

هنا $p = 2$ ، $p_2 = 3$. المجموعة $A = \{2\}$ تحقق شروط الطوسي، لكن ax ليس مهميناً. وبينما r يساوي المرتبة العشرية لـ $[N/a]$ وهي 2، نجد أن (٢ - ١٦) تعطي $\sigma_0 = 9$ وهذا خطأ.

$$s = 101, N = 11130301, a = 100000 \quad (٣)$$

هنا $p = p_2 = 2$ ؛ $A = \{2, 3\}$ تحقق شروط الطوسي و ax مهمين؛ a و N يحدّان r و σ_0 كما في المثل الأول.

$$s = 610, N = 348981000, a = 200000 \quad (٤)$$

هنا $p = p_2 = 2$ ؛ $A = \{2, 3\}$ تحقق شروط الطوسي إلا أن ax ليس مهميناً. ومن السهل رؤية أن a و N وحدهما لا يحدّان r كما لا يحدّان σ_0 . وكثير الحدود المهيمن في هذا المثل هو $g(x) = x^3 + ax$.

$$s = 311, N = 61180231, a = 100000 \quad (٥)$$

هنا $p = p_2 = 2$ ، والمجموعة $A = \{2, 3\}$ تحقق شروط الطوسي؛ ax ليس مهميناً؛ و x^3 وحده (من دون ax) مهمين. ونلاحظ أن a و N يحدّان r .

$$\text{النوع ٢: } x^3 = ax + N, a_1 = 0, a_2 = -a, a_3 = -N.$$

في هذا النوع، x^3 مهمين، حكماً، فما علينا سوى التفتيش عن كثير الحدود المهيمن الآخر.

$$(١) \text{ مثال الطوسي: } s = 321, N = 237420, a = 102021$$

هنا $p = 1$ ، $p_2 = 2$ ؛ $A = \{2\}$. تحقق شروط الطوسي و ax مهمين في هذه الحالة حيث يحدد الطوسي r و σ_0 بالعلاقين:

$$\sigma_0 \cdot 10^r < a \cdot \sigma_0 \cdot 10^{3r} \quad \text{و} \quad a((\sigma_0 + 1) \cdot 10^r) > (\sigma_0 + 1)^3 \cdot 10^{3r}$$

(٤) $E_{(n)} = [n]$ هو الجزء الصحيح من أي عدد n .

اللتين تختصران في هذه الحالة بالعلاقة:

$$\sigma_0^2 10^{2r} < a < (\sigma_0 + 1)^2 10^{2r} \quad (١٧ - ٢)$$

$$.s = 211, N = 954142, a = 39999 \quad (٢)$$

هنا $p = 1, p_2 = 2, A = \{2\}$ تحقق شروط الطوسي، بينما ax ليس مهيمناً، وإذا طبقنا (١٧ - ٢) كما فعل الطوسي في المثل السابق نحصل على $\sigma_0 = 1$ وهو خطأ. وكثير الحدود المهيم هنا هو $h(x) = ax + N$.

$$.s = 550, N = 160875000, a = 10000 \quad (٣)$$

هنا $p = p_2 = 2, A = \{2, 3\}$ تحقق شروط الطوسي. يمكن أن نرى أن N مهيم وأننا نحصل على r و σ_0 من (٢ - ١٤).

$$.s = 154, N = 2112110, a = 10001 \quad (٤)$$

هنا $p = p_2 = 2, A = \{2, 3\}$ تحقق شروط الطوسي لكن ax وحده (من دون N) مهيم. كما أن N وحده مهيم.

$$.a_3 = -N, a_2 = 0, a_1 = a; x^3 + ax^2 = N \quad \text{النوع ٣:}$$

بالنسبة إلى هذا النوع أيضاً، N مهيم، حكماً.

$$.s = 321, N = 342199161, a = 3000 \quad (١)$$

في هذا المثال $p = 2, p_1 = 3, A = \{1\}$ تحقق شروط الطوسي و ax^2 هو فعلاً مهيم و r و σ_0 يتحددان إذن بالعلاقة:

$$a \sigma_0 10^{2r} \leq N < a(\sigma_0 + 1)^2 10^{2r} \quad (١٨ - ٢)$$

التي تعطي $r = 2, \sigma_0 = 3$. لكننا نلاحظ بأن الطوسي، في هذا المثال، استعمل كثير الحدود $(g(x) = x^3 + ax^2)$ بكامله لاحتساب r و σ_0 .

$$.s = 99, N = 10771299, a = 1000 \quad (٢)$$

هنا $p = 2, p_1 = 3, A = \{1\}$ يحقق شروط الطوسي. لكن ax^2 ليس مهيمناً، فاستناداً إلى (١٨ - ٢) نجد هنا $r = 2$ و $\sigma_0 = 1$ وهذا خطأ. كثير الحدود المهيم هنا هو $(g(x) = x^3 + ax^2)$.

$$.s = 680, N = 360672000, a = 100 \quad (٣)$$

هنا $p = p_1 = 2, A = \{1, 3\}$ تحقق شروط الطوسي لكن ax^2 ليس مهيمناً، فاستناداً إلى (١٨ - ٢) نجد $r = 3$ و $\sigma_0 = 1$ ، وهذا خطأ.

$$s = 66, N = 331056, a = 10 \text{ (٤)}$$

هنا $p = p_1 = 1$. $A = \{1, 3\}$ يحقق شرط الطوسي، لكن ax^2 ليس مهميناً؛
المهمين هو x^3 .

$$\text{النوع ٤: } x^3 + ax^2 = N \text{ ؛ } a_1 = -a, a_2 = 0, a_3 = N$$

نلاحظ أولاً أن x^3 مهمين في هذا النوع من المعادلات.

$$(١) \text{ مثال الطوسي: } s = 321, N = 927369, a = 312$$

هنا $p = 1, p_1 = 2$. $A = \{1\}$ يحقق شروط الطوسي و ax^2 مهمين بالفعل.
ويحدد الطوسي r و σ_0 بالعلاقة:

$$\sigma_0^3 10^{3r} < a \sigma_0^2 10^{2r} \quad \text{و} \quad (\sigma_0 + 1)^3 10^{3r} > a(\sigma_0 + 1)^2 10^{2r}$$

التي تؤول في مثالنا إلى:

$$\sigma_0 10^r < a < (\sigma_0 + 1) 10^r \quad (١٩ - ٢)$$

وهذا يعني أن σ_0 هو الرقم الأول من a .

$$(٢) s = 301, N = 181202, a = 299$$

هنا $p = 1, p_1 = 2$. $A = \{1\}$ تحقق شروط الطوسي، لكن ax^2 ليس مهميناً.
فلو طبقنا (٢ - ١٩) في هذا المثال لحصل $\sigma_0 = 2$ ، وهذا خطأ.

$$(٣) s = 88, N = 604032, a = 10$$

هنا $p = 1, p_1 = 3$ ؛ $A = \{1, 3\}$ تحقق شروط الطوسي، لكن ax^2 (وحده) ليس
مهميناً، لكننا نستطيع أن نبرهن أن N مهمين.

$$\text{النوع ٥: } x^3 + ax^2 + bx = N \text{ ؛ } a_1 = a, a_2 = b, a_3 = -N$$

نلاحظ أن N مهمين في هذا النوع.

$$(١) \text{ مثال الطوسي: } s = 321, N = 996694407, b = 3000000, a = 6$$

هنا $p = 2, p_1 = 0, p_2 = 3$. $A = \{2\}$ تحقق شروط الطوسي و bx مهمين.
يحدد الطوسي r على أنه المرتبة العشرية لـ $[N/b]$. ومن دون أن يذكر ذلك صراحة،
يبدو أنه يحدد σ_0 بالعلاقة:

$$\sigma_0 b 10^r \leq N < (\sigma_0 + 1) b 10^r \quad (٢٠ - ٢)$$

$$(٢) s = 400, N = 823840000, b = 1500000, a = 999$$

هنا $p = 2$ ، $p_1 = 2$ ، $p_2 = 3$. $A = \{2\}$ تحقق شروط الطوسي ، لكن bx ليس مهيماً. فلو طبقنا (٢ - ٢٠) لحصلنا على $r = 2$ و $\sigma_0 = 5$ ، وهذا خطأ (جزئياً).

$$(٣) \quad s = 99 , N = 109761498 , b = 1000000 , a = 999$$

هنا $p = 2$ ، $p_1 = 2$ ، $p_2 = 3$. $A = \{2\}$ نحقق شروط الطوسي ، لكن bx ليس مهيماً، فمرتبة $[N/b]$ هي 2 وهي تختلف عن $r = 1$ ، و (٢ - ٢٠) لا يمكن تحقيقها.

$$(٤) \quad \text{مثال الطوسي: } s = 321 , N = 3124315791 , b = 30 , a = 30000$$

هنا $p = 3$ ، $p_1 = 4$ ، $p_2 = 0$. $A = \{1\}$ يحقق شروط الطوسي و ax^2 مهيمن بالفعل. يحدد الطوسي r على أنه المرتبة العشرية لـ $[N/a]$ ، وهذا يعطي $r = 2$. ومن دون أن يعبر بصراحة، يبدو أنه يحدد σ_0 بواسطة العلاقة:

$$(٢ - ٢١) \quad a \cdot \sigma_0^2 10^{2r} < N < a (\sigma_0 + 1)^2 10^{2r}$$

مما يعطي $\sigma_0 = 3$.

$$(٥) \quad s = 190 , N = 44858810 , b = 9999 , a = 1000$$

هنا $p = 2$ ، $p_1 = 3$ ، $p_2 = 1$. $A = \{1\}$ تحقق شروط الطوسي، لكن ax^2 ليس مهيماً. يتحدد $r = 2$ بواسطة N و a ؛ لكن تطبيق (٢ - ٢١) يعطي $\sigma_0 = 2$ ، وهذا خطأ.

$$(٦) \quad s = 43 , N = 694407 , b = 10000 , a = 100$$

هنا $p = 1$ ، $p_1 = p_2 = 2$. $A = \{1, 2\}$ تحقق شروط الطوسي و $(ax^2 + bx)$ هو بالفعل مهيمن.

$$(٧) \quad s = 810 , N = 605151000 , b = 10000 , a = 100$$

هنا $p = 2$ ، $p_1 = p_2 = 2$. $A = \{1, 2, 3\}$ تحقق شروط الطوسي، لكن $(ax^2 + bx)$ ليس مهيماً، بينما بإمكاننا برهان هيمنة x^3 .

$$(٨) \quad s = 110 , N = 3641000 , b = 10000 , a = 100$$

هنا $p = 2$ ، $p_1 = p_2 = 2$. $A = \{1, 2, 3\}$ تحقق شروط الطوسي و $(ax^2 + bx)$ مهيمن. وبالإمكان برهان أن x^3 هو أيضاً مهيمن ويعطي $r = 2$ و $\sigma_0 = 1$.

$$\text{النوع ٦: } a_3 = -N \quad ; \quad a_2 = -b \quad ; \quad a_1 = -a \quad ; \quad x^3 = ax^2 + bx + N$$

نضع

$$h(x) = ax^2 + bx + N,$$

ونلاحظ أن x^3 هو هنا مهمين، بالضرورة. نبدأ أولاً بشرح تفكير الطوسي بخصوص هذا النوع، هذا التفكير الذي يؤول إلى ما يلي:

لدينا

$$s^3 = as^2 + bs + N,$$

وهذا يعني أنَّ

$$as^2 = \lambda s^3 = (\lambda s) s^2,$$

$$bs = \mu s^3 = (\mu s) s^2,$$

$$N = \gamma s^3 = (\gamma s) s^2,$$

حيث

$$\lambda + \mu + \gamma = 1;$$

مما يعطي

$$s = \lambda s + \mu s + \gamma s.$$

ويبين الطوسي أنَّ:

$$E[\gamma s/10^r] = \sigma_0 \implies p > p_1, p > p_2; \quad (22 - 2)$$

$$E[\mu s/10^r] = \sigma_0 \implies p_2 > p, p_2 > p_1;$$

$$E[\lambda s/10^r] = \sigma_0 \implies p_1 > p, p_1 > p_2;$$

حيث $E[x]$ تشير إلى الجزء الصحيح من العدد x ؛ ويستنتج أن الحدود، bx ، N أو ax^2 تكون مهمة (بالتالي) عندما تكون العلاقات في المعادلة (22 - 2) صحيحة. لكن s مجهول وكذلك الأجزاء γs ، μs ، λs ، وبالتالي، لا نملك أية معلومة مسبقة عنها. لكن p ، p_1 و p_2 معروفة. هذا ما يجعل المعادلة (22 - 2) أكثر ملاءمة إذا كتبت على الشكل التالي:

$$(p \leq p_1 \text{ أو } p \leq p_2) \implies E[\gamma s/10^r] < \sigma_0; \quad (22 - 2)$$

$$(p_2 \leq p \text{ أو } p_2 \leq p_1) \implies E[\mu s/10^r] < \sigma_0;$$

$$(p_1 \leq p \text{ أو } p_1 \leq p) \implies E[\lambda s/10^r] < \sigma_0.$$

فإذا كان $p \geq p_1$ و $p \geq p_2$ ، نحصل، استناداً إلى (22 - 2)، على:

$$E[\lambda s/10^r] < \sigma_0 \text{ و } E[\mu s/10^r] < \sigma_0$$

من دون أن نحصل على $E[\gamma s/10^r] = \sigma_0$. ويمكننا إبداء ملاحظات مشابهة في الحالة

$(p_1 \geq p_2 \text{ و } p_1 \geq p_1)$ كما في الحالة $(p_2 > p \text{ و } p_2 > p_1)$. وهذا ما يبدو أن الطوسي لم يلاحظه. وفي ما يلي من الأمثلة تتضح هذه الوضعيات التي أشرنا إليها.

(١) مثال الطوسي: $a = 99$, $b = 70200$, $N = 340902$, $s = 321$.

هنا $p = 1$, $p_1 = 1$, $p_2 = 2$. $A = \{2\}$ تحقق شروط الطوسي. لكن الطوسي لا يعتبر bx مهيمناً سوى بشكل جزئي. فهو يعتبر أن b تحدد r على أساس أن r هو مرتبة b . وهذا ليس صحيحاً بشكل عام كما سنرى في المثال ٢. لكن b لا تحدد σ_0 . فتحديد σ_0 يعتمد أولاً على تحديد σ' :

$$\sigma'^2 \cdot 10^{2r} < b < (\sigma' + 1)^2 \cdot 10^{2r}$$

وإذا كان $(\sigma' + 1)$ يحقق:

$$\sigma^3 10^3 > h(\sigma 10^r)$$

يأخذ $\sigma_0 = (\sigma' + 1)$ وإلا، إذا كانت σ' تحقق اللامتساوية السابقة، يأخذ $\sigma' = \sigma_0$ ، وإلا فيجرب $\sigma' - 1$ ، وهكذا دواليك. ولنلاحظ هنا أن bx ليس مهيمناً، وهذا ما يؤكد الطوسي بحق.

(٢) $a = 9$, $b = 9285$, $N = 707$, $s = 101$.

هنا $p = 0$, $p_1 = 0$, $p_2 = 1$. $A = \{2\}$ تحقق شروط الطوسي، لكن مرتبة b تساوي 1 وهي بالتالي مختلفة عن $r = 2$ (راجع المثال السابق) وهو ما يظهر أن bx ليس مهيمناً.

(٣) $a = 9$, $b = 100000$, $N = 48792$, $s = 321$.

هنا $p = 1$, $p_1 = 0$, $p_2 = 2$. المجموعة $A = \{2\}$ تحقق شروط الطوسي. بالإمكان تبين أن bx مهيمن ويحدد r و σ_0 .

(٤) مثال الطوسي: $a \approx 300$, $b = 6000$, $N = 237861$, $s = 321$.

هنا $p = 1$, $p_1 = 2$, $p_2 = 1$. $A = \{1\}$ تحقق شروط الطوسي؛ ax^2 مهيمن ويحدد الطوسي r و σ_0 :-

$$a\sigma_0^2 \cdot 10^{2r} < \sigma_0^3 \cdot 10^{3r} \quad \text{و} \quad a(\sigma_0 + 1)^2 \cdot 10^{2r} > (\sigma_0 + 1)^3 \cdot 10^{3r}$$

وهذه العلاقة تؤول إلى العلاقة:

$$\sigma_0 \cdot 10^r \leq a < (\sigma_0 + 1) \cdot 10^r \quad (٢٣ - ٢)$$

التي ينتج منها أن r هو مرتبة a وأن σ_0 هو أول رقم من a ، أي الرقم 3.

$$s = 910, N = 414960, b = 9554, a = 899 \text{ (٥)}$$

هنا $p = 1, p_1 = 2, p_2 = 1$. المجموعة $A = \{1\}$ تحقق شروط الطوسي، لكن (٢ - ٢٣) لا تنطبق هنا و ax^2 ليس مهيمناً.

$$s = 560, N = 336000, b = 117000, a = 350 \text{ (٦)}$$

هنا $p = 1, p_1 = 2, p_2 = 2$. $A = \{1, 2\}$ تحقق شروط الطوسي، ونستطيع تبين أن $(ax^2 + bx)$ مهيمن.

$$s = 580, N = 493000, b = 10750, a = 560 \text{ (٧)}$$

هنا $p = 1, p_1 = p_2 = 2$. $A = \{1, 2\}$ تحقق شروط الطوسي، بينما ax^2 هو كثير حدود مهيمن.

$$\text{النوع ٧: } a_3 = -N, a_2 = -b, a_1 = a; x^3 + ax^2 = bx + N$$

$$(١) \text{ مثال الطوسي: } s = 321, N = 643284, b = 102000, a = 3$$

هنا $p = 1, p_1 = 0, p_2 = 2$. $A = \{2\}$ تحقق شروط الطوسي. نلاحظ فوراً مع الطوسي أن x^3 و bx مهيمنان. نستطيع إذن تحديد σ_0 و r بواسطة (٢ - ١٧) بإحلال b مكان a ، وهذا ما يعطي $\sigma_0 = 3$ و $r = 2$.

$$(٢) s = 790, N = 326514900, b = 1000000, a = 999$$

هنا $p = 2, p_1 = 2, p_2 = 3$. $A = \{2\}$ تحقق شروط الطوسي، لكن بالإمكان أن نبرهن أن x^3 و bx ليسا مهيمنين، كما أن ax^2 و bx غير مهيمنين. ولا نستطيع تطبيق العلاقة التي استخدمها الطوسي في المثال السابق.

$$(٣) \text{ مثال الطوسي: } s = 321, N = 342102861, b = 300, a = 3000$$

هنا $p = 2, p_1 = 3, p_2 = 1$. $A = \{1\}$ تحقق شروط الطوسي، ومن الواضح أن ax^2 و N مهيمنين.

في هذا المثال r هو بالنسبة إلى الطوسي المرتبة العشرية للعدد $E(N/a)$ ، لكنه لا يشرح بوضوح طريقته لتحديد σ_0 . ونلاحظ أيضاً أن x^3 و N مهيمنان، ويبدو أن هذين الحدين هما اللذان يسمحان للطوسي بتحديد σ_0 .

$$(٤) s = 70, N = 133070, b = 9999, a = 100$$

هنا $p = 1, p_1 = 2, p_2 = 1$. $A = \{1\}$ تحقق شروط الطوسي. نلاحظ أن ax^2 و N غير مهيمنين وأن x^3 و N كذلك غير مهيمنين.

$$\text{النوع ٨: } a_3 = -N, a_2 = b, a_1 = -a; x^3 + bx = ax^2 + N$$

(١) مثال الطوسي: $a = 30$ ، $b = 3.10^6$ ، $N = 992984931$ ، $s = 321$.

هنا $p = 2$ ، $p_1 = 1$ ، $p_2 = 3$. $A = \{2\}$ تحقق شروط الطوسي. نلاحظ أن bx و N مهيمنان. نستطيع، إذن، أن نحدد σ_0 و r بواسطة $E(N/b)$ حيث نجد $\sigma_0 = 3$ و $r = 2$.

(٢) مثال الطوسي: $a = 99$ ، $b = 10^4$ ، $N = 175602$ ، $s = 21$.

هنا $p = 1$ ، $p_1 = 1$ ، $p_2 = 2$. $A = \{2\}$ تحقق شروط الطوسي، لكن بالإمكان أن نبرهن أن bx و N غير مهيمنين، كما أن bx و ax^2 غير مهيمنين.

(٣) مثال الطوسي: $a = 321$ ، $b = 300$ ، $N = 96300$ ، $s = 321$.

هنا $p = 1$ ، $p_1 = 2$ ، $p_2 = 1$. $A = \{1\}$ تحقق شروط الطوسي. نلاحظ أن ax^2 و x^3 مهيمنان؛ ونستطيع تحديد σ_0 و r بواسطة a ، حيث نجد $\sigma_0 = 3$ و $r = 2$.

(٤) مثال الطوسي: $a = 199$ ، $b = 999$ ، $N = 239800$ ، $s = 200$.

هنا $p = 1$ ، $p_1 = 2$ ، $p_2 = 1$. $A = \{1\}$ تحقق شروط الطوسي. بالإمكان أن نبرهن أن ax^2 و x^3 غير مهيمنين.

ملاحظة ٢ - ٣:

١ - بعد أن أكد الطوسي أنه في حال $A = \{i\}$ يكون $a_i x^{n-i}$ مهيمناً، يبدو أنه تنبّه إلى أن المعطيات نفسها يمكن أن تؤدي إلى حالات مختلفة، وذلك بحسب المثل المطروح للمعالجة، حيث كتب: «وهذه الأشياء وإن كانت من خواص هذه التقديرات، لكن المطلوب الخارج من هذه المسألة: فلا يتعين أن يكون إما مطلوب الكعب للعدد وإما أحد مطلوبي القسمة في أحد المسطحين، بل في كل واحدة من الصور، يحتمل أن يكون أزيد من آخر الجذر ويحتمل أن يكون أنقص، فنحتاج في استخراجها إلى زيادة استقصاء» (ص ١٠٦ سطر ١٢ - ١٦ من نص رسالة الطوسي حول المعادلات (١ - ٢٠)).

٢ - المعادلة من النوع ٨ يمكن أن تحوز على جذر واحد أو على ثلاثة جذور موجبة. وجرياً على عادته لا يأخذ الطوسي بالاعتبار سوى حالة الجذر الواحد.

ثالثاً: تحديد الأرقام الأخرى للجذر وخطط احتسابها

لنُعُد الآن إلى المفهوم الذي أدخلناه في الفقرة الأولى. بعد أن يحدّد الطوسي σ_0 ، يرمي إلى تحديد استقرائي لمتوالية (E_k) ، من المعادلات الكثيرة الحدود، بواسطة الصيغ التالية:

$$(E_0) \quad f_0(x) = f(x) = 0,$$

$$(E_k) \quad f_k(x) = f_{k-1}(x + s_{k-1}) = 0, \quad (1 \leq k \leq r).$$

نستطيع أن نتحقق فوراً من أن جذور f_k حيث $(1 \leq k \leq r)$ هي نفسها جذور f_{k-1} بإنقاص s_{k-1} من كل جذر منها. إن جذور (E_k) هي إذن جذور (E_0) بإنقاص $(s_0 + s_1 + \dots + s_{k-1})$ من كل منها. ومن جهة أخرى، من البديهي أن s_r جذر للمعادلة (E_r) .

وقد رأينا أن بالإمكان، بشكل أو بآخر، إيجاد σ_0 و r وبالتالي s_0 انطلاقاً من (E_0) . لنفرض أنه، انطلاقاً من (E_i) ، بالإمكان تحديد σ_i ، $(1 \leq i \leq k-1)$. ولنبرهن أن بالإمكان حينئذٍ تحديد σ_k انطلاقاً من (E_k) ؛ (ونكون بهذا قد برهنا (استقرائياً) أن بالإمكان تحديد $\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_r$).

والبرهان يأتي من كَوْن:

$$s_k + \dots + s_r = s - (s_0 + s_1 + \dots + s_{k-1})$$

هو جذر للمعادلة E_k وأن أول أرقامه (العشرية) هو σ_k ؛ لذلك يمكن تحديد σ_k بتطبيق نتائج الفقرة السابقة على f_k .

إن توسيع تايلور لكثير الحدود $f_k(x) = f_{k-1}(x + s_{k-1})$ ، يعطي المعادلة (E_k) الشكل التالي:

$$x^n + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} f_{k-1}^{(n-1)}(s_{k-1}) + \dots + x f_{k-1}^{(0)}(s_{k-1}) + f_{k-1}(s_{k-1}) = 0.$$

وغالباً^(٥) ما يشكّل الحدان الأخيران، كثير حدود مهيمناً، الأمر الذي يسمح بتحديد s_k بالعلاقة:

$$s_k = [-f_{k-1}(s_{k-1})/f_{k-1}'(s_{k-1})] \quad (٣ - ١)$$

وهي صيغة كان الطوسي يطبقها منهجياً عندما يكون $k > 0$.

يمكن إذن تلخيص مسار الطوسي بما يلي: «المعادلة (E_0) تسمح، في مرحلة أولى، باحتساب s_0 ، أي σ_0 . بعد ذلك وبشكل استقرائي، نشكّل، في مرحلة ثانية، المعادلات (E_k) ، $1 \leq k \leq r$ الأمر الذي يسمح باحتساب الـ σ_k تتابعاً، وإجمالاً بواسطة (٣ - ١).

لكن، ولكي يكون هذا المسعى فعالاً، ينبغي إيجاد خوارزمية تساعد على التشكيل الاستقرائي للمعادلات (E_k) . إن خوارزمية من هذا النوع، يجب أن تسمح باحتساب معاملات (E_k) انطلاقاً من معاملات (E_{k-1}) . إنها، كما سنرى، الطريقة الشهيرة المعروفة بخوارزمية روفيني - هورنر.

(٥) ولكن بالإمكان وبسهولة، إيجاد أمثلة معاكسة، مثلاً:

$$x^3 + 30x^2 - 1200x - 9153 = 0; (s = 27).$$

نُذَكِّرُ بإيجاز، بأن هذه الطريقة هي خوارزمية تسمح باحتساب منهجي، بالشكل الأبسط والأسرع^(٦)، لمعاملات معادلة يكون جذورها جذور معادلة أخرى، بإنقاص عدد ثابت من كل منها. نستطيع تطبيق هذا المخطط على معادلتنا لننقص من أحد جذورها رقبه الأول؛ ونطبِّقه مرة ثانية لننقص من جذر المعادلة الجديدة، رقبه الأول، أي الرقم الثاني من جذر المعادلة الأساسية (التي سبق أن تعاملنا معها)، وهكذا دواليك.

لنأخذ، انتقلاً إلى الفعل، المعادلة كثيرة الحدود

$$F(x) = A_0 x^N + A_1 x^{N-1} + \dots + A_{N-1} x + A_N = 0 \quad (٢ - ٣)$$

ولنأخذ عدداً ثابتاً Δ . عن طريق اعتماد تبديل المتغيرات $x \rightarrow x + \Delta$ نُكتب المعادلة (٢ - ٣) على الشكل التالي:

$$\frac{x^N}{N!} F^{(N)}(\Delta) + \frac{x^{N-1}}{(N-1)!} F^{(N-1)}(\Delta) + \dots + \frac{x}{1!} F^{(1)}(\Delta) + F(\Delta) = 0 \quad (٣ - ٣)$$

وإذا ما سَمَّينا، لكل i ، حيث $(0 \leq i \leq n)$:

$$B_i = \frac{1}{(N-i)!} F^{(N-i)}(\Delta) \quad (٤ - ٣)$$

يكون

$$B_0 = \frac{1}{N!} F^{(N)}(\Delta) = A_0.$$

ومن البديهي أن جذور المعادلة (٣ - ٣) هي جذور المعادلة (٢ - ٣) بإنقاص Δ من كل منها (أي من كل من هذه الجذور).

إنَّ المخطط البياني التالي يسمح بالتشكيل المنهجي لكلِّ عناصره الأخرى انطلاقاً من عناصر الخط الأفقي الأول وهي معاملات (٢ - ٣). إن العناصر التي تحتاج إلى تحديد في هذا المخطط البياني هي الـ $B_{i, \Delta}$. كلٌّ من هذه العناصر $B_{i, \Delta}$ هو مجموع العنصرين اللذين يقعان فوقه مباشرة. وبالإمكان التحقق من أن معاملات المعادلة (٣ - ٣) ليست سوى عناصر القطر المائل الأيمن (Diagonale) لهذا المخطط:

$$B_0 = \frac{1}{N!} F^{(N)}(\Delta) = A_0,$$

$$B_i = B_{N-i, i} = \frac{1}{(N-i)!} F^{(N-i)}(\Delta),$$

$$1 \leq i \leq N;$$

إن N ، Δ والمعاملات A_0, \dots, A_n الخاصة بالمعادلة (٢ - ٣) تُسمى «مداخل» المخطط البياني وتسمى B_0, \dots, B_N «مخارج» هذا المخطط.

(٦) «الأكثر اقتصادية»، بالمعنى المعلوماتي الحديث. (المترجم).

A_0	A_1	A_2	$\dots A_{N-1}$	A_N
$\frac{\Delta A_0}{B_{0,1}}$	$\frac{\Delta B_{0,1}}{B_{0,2}}$	$\frac{\Delta B_{0,N-2}}{B_{0,N-1}}$	$\frac{\Delta B_{0,N-1}}{B_{0,N} = B_N}$	
$\frac{\Delta A_0}{B_{1,1}}$	$\frac{\Delta B_{1,1}}{B_{1,2}}$	$\frac{\Delta B_{1,N-2}}{B_{1,N-1} = B_{N-1}}$		
\dots	\dots	\dots		
$B_{N-2,1}$				
$\frac{\Delta A_0}{B_{N-1,1} = B_1}$				
$A_0 = B_0$				

نرمز إلى المخطط السابق بـ:

$$^{(v)}SCH(N; \Delta; A_0, \dots, A_N)$$

ويستحسن أن نرمز إليه بكل بساطة بـ SCH إذا كنا لا نخشى أي اختلاط في المعنى. كما نشير بـ

$$SCH(n; \delta; c_0, c_1, \dots, c_n)$$

إلى المخطط الذي ينتج عنه عندما يكون $N = n$ ، $\Delta = \delta$ ، و $A_i = c_i$ لأجل كل i حيث $(1 \leq i \leq n)$.

لنَعُد الآن إلى المعادلات (E_k) حيث $1 \leq k \leq r$ ولنسم $a_{i,k}$ ($1 \leq i \leq n$) معاملات المعادلة (E_k) . لكي نشكل هذه المعادلات نطبق المخطط البياني السابق، مع المعطيات التالية:

$$A_i = a_i, \Delta = s_0, N = n$$

حيث a_i هي معاملات $f_0(x)$ ، أي معاملات المعادلة (١ - ١). نحصل إذن على الكثرة (0)، الصفر^(٨). المخارج هنا هي معاملات $a_{i,1}$ للمعادلة (E_1) ، الأمر الذي يسمح بحساب s_1 . ومن البديهي أننا بحاجة إلى $(r-1)$ كثرة من هذا النوع، حيث تكون المداخل في الكثرة رقم k ، $(1 \leq k \leq r-1)$:

$$\Delta = s_k, \quad N = n$$

(٧) SCH هي الأحرف الأولى من «Schéma»، أي من عبارة «مخطط بياني».

(٨) وهي الكثرة الأولى.

بالإضافة إلى مخارج الكثرة رقم $(k-1)$ ، أي المعاملات $a_{i,k}$ التي تخص المعادلة (E_k) ، المخارج التي نحصل عليها هي معاملات المعادلة (E_{k+1}) : وهو ما يسمح باحتساب σ_{k+1} . هكذا يكون لدينا الخوارزمية التالية:

ALG-1^(٩):

الخطوة ١:

- تشكيل $SCH_0 = SCH(n; s_0; a_0, \dots, a_n)$

- تشكيل (E_1) واحتساب σ_1 .

الخطوة ٢:

- ابتداءً من $(k=1)$ وحتى $(k=r-1)$ ، تشكيل SCH_k :

$SCH_k = SCH(n; s_k; a_{0,k}, a_{1,k}, \dots, a_{n,k})$

- تشكيل (E_{k+1}) واحتساب σ_{k+1} .

ملاحظة ٣ - ١: استخراج الجذر النوني لعدد صحيح: الطريقة التي سنعرضها بإيجاز في هذه الفقرة، كان يطبقها الرياضيون في نهاية القرن العاشر لاستخراج الجذر التكعيبي ومن ثم لاستخراج الجذر النوني، أي لحل المعادلة:

$$x^n - N = 0$$

ويبدو أن طريقة الطوسي^(١٠) هي تعميم لهذه الطريقة.

لنفرض أن s هي الجزء الصحيح من $N^{\frac{1}{n}}$ وأن (s_i) ، $0 \leq i \leq r$ هي متتالية من أعداد صحيحة موجبة، غير محددة بـ $(1 - 3)$ لكنها تحقق:

$$\sum_{i=0}^r s_i \leq s.$$

في هذه الحالة تأخذ المعادلة (E_0) الشكل التالي:

$$(E_0) \quad f_0(x) = x^n - N = 0;$$

(٩) ALG رقم 1، اختصار لكلمة «Algorithmes» أي «خوارزمية».

(١٠) لحل المعادلات كثيرة الحدود. (المترجم).

وبطريقة استقرائية على (E_k) و $(s_i)^{(11)}$ ، يحصل ما يلي:

$$(E_k) \quad f_k(x) = f_{k-1}(x + s_{k-1}) = \sum_{p=0}^{n-1} \binom{n}{p} (s_0 + \dots + s_{k-1})^p \cdot x^{n-p} + [(s_0 + \dots + s_{k-1})^n - N] = 0.$$

إنّ مخارج $SCH_{k-1} = SCH(n; s_{k-1}; a_{0,k-1}, \dots, a_{n,k-1})$ هي إذن:

$$(r.1) \quad \begin{cases} a_{p,k} = \binom{n}{p} (s_0 + \dots + s_{k-1})^p, & (a \leq p \leq n-1) \\ a_{n,k} = (s_0 + s_1 + \dots + s_{k-1})^n - N \end{cases}$$

من الواضح أنّنا، في هذه الحالة، لا نحتاج إلى تشكيل المخططات البيانية، لأننا بحاجة إلى مخارجها فقط، وهي الـ $a_{p,k}$. ومن الواضح أيضاً أنّ أهمّ هذه المخارج لحلّ (E_0) هي المخارج $a_{n,k}$.

وإذا وضعنا

$$N_k = N - (s_0 + s_1 + \dots + s_{k-1})^n = -a_{n,k}$$

يتبيّن أنّ:

$$\begin{aligned} N_{k+1} &= N_k - [(s_0 + s_1 + \dots + s_k)^n - (s_0 + s_1 + \dots + s_{k-1})^n] = \\ &= N_k - \left[\binom{n}{1} (s_0 + s_1 + \dots + s_{k-1})^{n-1} \cdot s_k + \binom{n}{2} (s_0 + \dots + s_{k-1})^{n-2} s_k^2 + \dots + s_k^n \right]. \end{aligned}$$

في هذه الحالة⁽¹²⁾، إذن، يعود بناء المخطط البياني السابق، إلى الاحتساب المتتابع للأعداد N_k . فإذا توصلنا إلى $N_r = 0$ يكون الجذر النوني للعدد N هو $(s_0 + s_1 + \dots + s_r)$ ، وإلا، فإنّ هذا الجمع هو قيمة تقريبية للجذر.

لنأخذ الآن مثالي الجذر التربيعي والجذر التكعيبي للعدد N . في حال $n = 2$ يعود الاحتساب إلى:

$$\begin{cases} N_0 = N; \\ N_k = N_{k-1} - 2(s_0 + s_1 + \dots + s_{k-2})s_{k-1} - s_{k-1}^2, & 1 \leq k \leq r; \end{cases}$$

(١١) استناداً لصيغة ذي حدي نيوتن يمكن الوصول إلى نفس النتيجة. (المترجم).

(١٢) أي في حالة استتصال الجذر النوني. (المترجم).

في حال $n = 3$ ، يعود الاحتماب إلى :

$$\begin{cases} N_0 = N; \\ N_k = N_{k-1} - 3(s_0 + s_1 + \dots + s_{k-2})^2 s_{k-1} - 3(s_0 + \dots + s_{k-2}) \cdot s_{k-1}^2 - s_{k-1}^3. \end{cases}$$

وهذه النتائج كانت موجودة في القرن العاشر.

لنعد الآن إلى الحالة العامة، لكي نتفحص التعديلات التي أدخلها الطوسي على المخطط السابق. يمكننا القول بأن هذه التعديلات طبيعية، فقد شكلت إلى حد ما تبسيطاً لهذا المخطط، وفي تفحصنا هذا سوف نعمل على مرحلتين.

نبدأ بالتحقق من أن تأثير المدخل A_0 في $SCH(N; \Delta; A_0, A_1, \dots, A_n)$ على المخارج، باعتبارها كثيرات حدود تتعلق بـ Δ ، ينحصر فقط في تشكيل حدودها الأولى (أي ذات القوة الأعلى بالنسبة إلى Δ) وهي:

$$A_0, \binom{N}{1} \Delta A_0, \binom{N}{2} \Delta^2 A_0, \dots, \quad (5 - 3)$$

$$\binom{N}{N-1} \Delta^{N-1} A_0, \binom{N}{N} \Delta^N A_0 = \Delta^N A_0.$$

فإذا ما حفظنا هذه الحدود في الذاكرة، نستطيع اختصار المخطط المذكور من دون التأثير في فعاليته أو في كمية المعلومات التي يقدمها. وإذا ما حذفنا المدخل A_0 وجميع العناصر المشتقة منه، أي العناصر الواردة في (3 - 5) والتي نحفظها في الذاكرة، تصبح مخارج

$$\binom{13}{13} SCH(N-1; \Delta; A_1, A_2, \dots, A_n)$$

كالتالي :

$$B_1 - \binom{N}{1} \Delta A_0, B_2 - \binom{N}{2} \Delta^2 A_0, \dots, B_N - \Delta^N A_0 \quad (6 - 3)$$

ولإيجاد مخارج $SCH(N; \Delta; A_0, \dots, A_n)$ ، نأخذ A_0 (كمخرج أول) ونضيف إلى المخارج (3 - 6)، بالتالي، الحدود الأخرى (غير A_0) الواردة في (3 - 5).

لكن، لكي نتمكن من تتبع مسار الطوسي ومن تسهيل المقارنة بين طريقتي والطريقة العامة، سوف نحصر دراستنا في المجال الخاص ببحثه، أي في مجال معادلات الدرجة الثالثة ($N = 3$)، الأمر الذي يقودنا إلى المخطط :

$$\binom{13}{13} SCH(N-1; \Delta; A_1, \dots, A_n) \quad (13) \text{ يرمز إلى المخطط المختصر. (المترجم).}$$

ذي الجدول التالي :

A_1	A_2	A_3
	$\frac{\Delta A_1}{\Delta A_1 + A_2}$	$\frac{\Delta(\Delta A_1 + A_2)}{\Delta(\Delta A_1 + A_2) + A_3 = B_3 - \Delta^3 A_0}$
	$\frac{\Delta A_1}{2\Delta A_1 + A_2 = B_2 - 3\Delta^2 A_0}$	
$A_1 = B_1 - 3\Delta A_0$		

$$SCH(2; \Delta; A_1, A_2, A_3)$$

وعلماً بأن المخرج الأول للمخطط $SCH(3; \Delta; A_0, A_1, A_2, A_3)$ هو A_0 ، يمكن الحصول على المخارج الأخرى بإضافة $3\Delta A_0$ ، $3\Delta^2 A_0$ ، $\Delta^3 A_0$ ، بالتتابع، إلى مخارج $SCH(2; \Delta; A_1, A_2, A_3)$.

قبل تطبيق ما سبق، بهدف تشكيل المعادلات (E_k) في حالة المعادلة التكميلية، يُستحسن تخفيف الاصطلاحات بشكل ما، وتسمية (E_0) المعادلة:

$$(E_0) \quad f_0(x) = f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

حيث $a_0 = 1$ ؛ $a_1 = a$ ؛ $a_2 = b$ ؛ $a_3 = c$ ؛ $a_3^{(1)} = c$ ؛ كما تستحسن كتابة (E_k) على الشكل:

$$(E_k) \quad f_k^{(1)}(x) = x^3 + a_k x^2 + b_k x + c_k = 0.$$

لكي نشكل المعادلة (E_k) نبدأ بالمخطط $SCH(2; s_0; a, b, c)$ ونكون بذلك قد أنجزنا الكرة رقم (0) - صفر - المخارج هي إذاً:

$$a_1 - 3s_0, \quad b_1 - 3s_0^2, \quad c_1 - s_0^3,$$

وهو ما يسمح باحتساب معاملات (E_1) وبالتالي s_1 .

نعيد الكرة على المنوال نفسه $(r-1)$ مرة. والمداخل التي نعتمدها في الكرة رقم k ، بالإضافة إلى $N = 2$ و $s_k = \Delta$ ، هي مخارج الكرة رقم $(k-1)$ ، يضاف إليها، بالتالي: $3s_{k-1}$ ، $3s_{k-1}^2$ ، s_{k-1}^3 . المخارج التي نحصل عليها هي إذن:

$$a_{k+1} - 3s_k, \quad b_{k+1} - 3s_k^2, \quad c_{k+1} - s_k^3;$$

الأمر الذي يساعد على احتساب معاملات (E_{k+1}) أي a_{k+1} ، b_{k+1} ، c_{k+1} ومن ثم s_{k+1} .

(14) انسجماً مع كتابة المعادلة (1 - 1). (الترجم).

(15) بكتابة f على هذا الشكل، يكون لدينا $a = a_0$ ، $b = b_0$ ، $c = c_0$.

ومكناً يكون لدينا الخوارزمية التالية :

:ALG-2

الخطوة ١ :

- تشكيل $SCH'_0 = SCH(2; s_0; a, b, c)$: تشكيل $SCH'_0 = SCH(2; s_0; a, b, c)$.

- زيادة $s_0, 3s_0^2, 3s_0^3$ إلى مخارجه بالتالي^(١٦)؛ تشكيل (E_1) واحتساب s_1 .

الخطوة ٢ :

- بدءاً بـ $k = 1$ وانتهاءً بـ $k = (r - 1)$ ، تشكيل :

$$SCH'_k = SCH(2; s_k; a_k; b_k, c_k),$$

- إضافة $s_k^3, 3s_k^2, 3s_k$ ، بالتالي، إلى المخارج.

- تشكيل E_{k+1} واحتساب s_{k+1} .

يكتب SCH'_k على الشكل التالي :

a_k	b_k	c_k
$\frac{s_k a_k}{s_k a_k + b_k}$	$\frac{s_k(s_k a_k + b_k)}{s_k(s_k a_k + b_k) + c_k = f_k(s_k) - s_k^3 = c_{k+1} - s_k^3}$	
$\frac{s_k a_k}{2 s_k a_k + b_k} = b_{k+1} - 3 s_k^2$		
$a_k = a_{k+1} - 3 s_k.$		

SCH'_k

حيث نستنتج أننا ضربنا a_k مرتين متتاليتين بـ s_k و b_k ، مرة واحدة بـ s_k وضربنا c_k صفر مرة بـ s_k . لكن $s_k = \sigma_k 10^{r-k}$. نستطيع إذن ضرب a_k, b_k, c_k بالتالي بـ $(10^{r-k})^2, 10^{r-k}$ و 1 وإحلال σ_k مكان s_k في عمليات الضرب المقابلة في تشكيل SCH'_k . لكن ضرب عدد ما بقوة العشرة السالبة أو الموجبة يعود، تنالياً، إلى إزاحة أرقامه يميناً أو شمالاً، عدداً من المراتب العشرية يعادل قوة العشرة التي نضرب بها. إن هذه الإزاحة يميناً أو يساراً لا تستلزم عمليات إضافية، سواء على الرمل (التخت) أم على الورق أو على الآلة الحاسبة أو الحاسوب. أضف إلى ذلك، أن كل تغيير في

(١٦) على مخارجه. (المترجم).

مداخل مخطط ما، يؤثر، مبدئياً، في مخارجه. فإذا شكلنا المخطط التالي:

$$SCH_k'' = SCH(2; \sigma_k; a_k 10^{2(r-k)}, b_k 10^{r-k}, c_k)$$

نحصل على:

$a_k 10^{2(r-k)}$ $b_k 10^{r-k}$ $\frac{\sigma_k a_k 10^{2(r-k)}}{(s_k a_k + b_k) 10^{r-k}}$	c_k $\frac{\sigma_k (s_k a_k + b_k) 10^{r-k} = s_k (s_k a_k + b_k)}{s_k (s_k \cdot a_k + b_k) + c_k = c_{k+1} - s_k^3}$	$\frac{\sigma_k a_k 10^{2(r-k)}}{(2 s_k a_k + b_k) 10^{r-k} = (b_{k+1} - 3 s_k^2) 10^{r-k}}$
$a_k 10^{2(r-k)} = (a_{k+1} - 3 s_k) 10^{2(r-k)}$		

$$SCH_k''$$

إن مقارنة مخارج SCH_k'' ومخارج SCH_k' تظهر أن الأولى مطابقة للثانية مع إزاحة إلى اليسار تعادل $2(r-k)$ ، $(r-k)$ ، وصفر منزلة عشرية، بالتالي. نستطيع إذن، عن طريق إزاحات بسيطة مناسبة، أن نستهدي، انطلاقاً من المخارج الجديدة، إلى مخارج SCH_k' .

من جهة أخرى، مداخل SCH_{k+1}'' ، انطلاقاً من تحديدها، هي، بالإضافة إلى 2 و σ_{k+1} :

$$a_{k+1} 10^{2(r-(k+1))}, b_{k+1} 10^{r-(k+1)}, c_{k+1}, \quad (٧ - ٣)$$

التي هي مخارج SCH_k'' ، مضاف إليها بالتالي:

$$\left. \begin{aligned} 3s_k 10^{2(r-k)} &= 3\sigma_k 10^{3(r-k)}, \\ 3s_k^2 10^{r-k} &= 3\sigma_k^2 10^{3(r-k)}, \\ s_k^3 &= \sigma_k^3 10^{3(r-k)}, \end{aligned} \right\} \quad (٨ - ٣)$$

ومن ثم، مُزاحة يميناً، بالتالي: ٢، ١ وصفر منزلة عشرية. ونستطيع أيضاً الحصول على (٧ - ٣) عن طريق البدء بإزاحة مخارج SCH_k'' يميناً ٢، ١ وصفر منزلة عشرية بالتالي، ومن ثم إضافة الحدود الواردة في (٨ - ٣) متتالية، مزاحة بدورها يميناً: ٢، ١ وصفر منزلة عشرية، بالتالي.

ملاحظة ٣ - ٢: إذا أخذنا ما سبق في الاعتبار من دون أن نحذف العدد ١ (وهو قيمة A_0)، نحصل على المخطط SCH_k''' التالي:

- (k.1)
(k.2)
(k.3)
(k.4)
(k.5)
(k.6)

1	2	3	4
$10^{3(r-k)}$	$a_k 10^{2(r-k)}$	$b_k 10^{r-k}$	c_k
	$\frac{a_k 10^{3(r-k)}}{(a_k + s_k) 10^{2(r-k)}} = s_k 10^{2(r-k)}$	$\frac{\sigma_k(a_k + s_k) 10^{2(r-k)}}{\{s_k(a_k + s_k) + b_k\} 10^{r-k}}$	$\sigma_k\{s_k(a_k + s_k) + b_k\} 10^{r-k} = c_{k+1}$
	$\frac{\sigma_k 10^{3(r-k)}}{(a_k + 2s_k) 10^{2(r-k)}}$	$\frac{\sigma_k(a_k + 2s_k) 10^{2(r-k)}}{\{s_k(2a_k + 3s_k) + b_k\} 10^{r-k}} = b_{k+1} 10^{r-k}$	
	$\frac{\sigma_k 10^{3(r-k)}}{(a_k + 3s_k) 10^{2(r-k)}} = a_{k+1} 10^{2(r-k)}$		

$$SCH_k''' = SCH(3; \sigma_k; 10^{3(r-k)}, a_k 10^{2(r-k)}, b_k 10^{r-k}, c_k)$$

وكان الطوسي يستعمل أحياناً مثل هذا الجدول [راجع مثال ٣ في الفقرة التالية «خامساً»]، عندما لا يكون هناك حدودٌ للاحتفاظ بها في الذاكرة. ولكي نُعيد هذا الجدول كزّة أخرى، نأخذ كمدخل لـ SCH_{k+1}''' ، العدد $10^{3(r-(k+1))}$ ؛ من ثم نأخذ مخارج SCH_k''' بعد إزاحتها^(١٧) بالتالي: ٢، ١ وصفر منزلة عشرية.

وعند كون الـ a_k أعداداً سالبة، وعندما يكون الطرح $(-a_k - is_k)$ ممكناً، (3، 2، 1)، i ، يحتسب الطوسي الأعداد $(-a_k - is_k)$ أي نقيض $(a_k + is_k)$. إنّه يحتسب بشكلٍ خاص c_{k+1} بواسطة الصيغة:

$$c_{k+1} = c_k - s_k[s_k(-a_k - s_k)] + s_k b_k$$

ولنذكر أخيراً أن $10^{3(r-k)}$ لا تظهر في جدول الطوسي كما لا تظهر فيها العناصر $(k, 2, 2)$ ، $(k, 4, 2)$ ، $(k, 5, 2)$ بشكلٍ صريح، بل مجموعة مباشرة مع ما قبلها. ملاحظة ٣ - ٣: في المخطط SCH_k''' ، يظهر العنصر $10^{2(r-k)} a_k$ لكي يُضرب بـ s_k . لكن، يمكن أن نبرهن استقرائياً أنّ:

$$a_k = a + 3(s_0 + s_1 + \dots + s_{k-1})$$

وهو ما يُعطي:

$$\sigma_k a_k 10^{2(r-k)} = [a + 3(s_0 + s_1 + \dots + s_{k-1})] \cdot \sigma_k \cdot 10^{2(r-k)} \quad (9 - 3)$$

وإلى هذه الصيغة، كثيراً ما كان الطوسي يلجأ، عند احتساب لـ $10^{2(r-k)} a_k \cdot \sigma_k$ من دون أن يحتسب a_k بحد ذاتها. وسوف نعود إلى هذه المسألة في الفقرة القادمة.

إن الملاحظتين السابقتين تسمحان بتعديل، هو الأخير، للخوارزمية المذكورة لكي نحصل بالذات، على الخوارزمية التي استعملها الطوسي. نزيد هنا بأن الطوسي، عند تشكيله لجدوله، كثيراً ما كان يلجأ إلى فنون حسابية خاصة بعصره [راجع الفقرة القادمة]. ونكتفي الآن بتلخيص مسار عمله: لكي يحتسب σ_1 ، σ_2 ، ...، σ_r بشكل، بادئ ذي بدء

$$SCH_0'' = SCH(2; \sigma_0; a 10^{2r}, b 10^r, c)$$

حيث يحصل على المخارج

$$(a_1 - 3s_0) 10^{2r}, (b_1 - 3s_0^2) 10^r, c_1 - s_0^3$$

وهنا يصبح من الممكن احتساب $a_1 10^{2r}$ ، $b_1 10^r$ ، c_1 . عند ذلك يحتسب الطوسي σ_1 ، غالباً عن طريق (٣ - ١)، التي تصبح في هذه الحالة:

$$\sigma_1 = E[-c_1/b_1 10^r].$$

ثم يعيد الكزّة على المنوال نفسه (١ - r) مرة، متخذاً كمدخل لمخطط الكزّة رقم

(١٧) يميناً. (المترجم).

$k+1$ ، الأعداد 2، σ_{k+1} ومخارج المخطط k ، مضافاً إليها الحدود المحتفظ بها (٣) - ٨) ومزاحة من ثم، يميناً ٢، ١ وصفر منزلة عشرية بالتتالي. هذا ما يسمح بحساب معاملات (E_{k+2}) ومن ثم بحساب σ_{k+2} ، $1 \leq k \leq r-2$.

وعلى الرغم من أن أمثلة الرسالة تقتصر على حالة الجذور الصحيحة، إلا أن الطريقة تسمح بحساب جذور غير صحيحة؛ إن هذا التأكيد لا يركز فقط على الإمكانات النظرية لهذه الطريقة، بل على كونها أثبتت من قِبَل من أتوا بعد الطوسي لإيجاد مثل هذه الجذور. وفي كل الأحوال، من المستحسن إدخال تعديلات طفيفة عليها لتطبيقها في احتساب القيم التقريبية للجذر الموجب. لنفرض أن الجزء الصحيح s من هذا الجذر الموجب معطى بالعلاقة (١ - ٣) وهو ما نحسب أرقامه المتتالية بالطريقة المبينة أعلاه. نصل عند ذلك إلى المعادلة (E_r) التي تُحدد رقم الآحاد $s_r = \sigma_r$ للعدد s . وهنا، انطلاقاً من (E_r) ، وعن طريق تطبيق المخطط SCH ، نشكل المعادلة

$$(E_{r+1}) \quad f_{r+1}(x) = f_r(x + s_r) = 0.$$

القسم الكسري من جذر (١ - ١) هو جذر لهذه المعادلة. إن تبديل المتغير:

$$x \rightarrow \left(\frac{1}{10}\right)x, \quad (١٨)$$

يُحوّل (E_{r+1}) إلى معادلة هي (E_{r+1}^y) ذات جذور مساوية لجذور (E_{r+1}) بضرب كل منها بـ 10. القسم الكسري من جذر (١ - ١)، مضروب بعشرة، هو إذن جذر للمعادلة (E_{r+1}^y) . نستطيع، إذن، تطبيق ما تقدّم عليها، للحصول على الجزء الصحيح من هذا الجذر. نحصل على القيمة التقريبية الأولى للقسم الكسري المطلوب، عن طريق إزاحته إلى اليمين منزلة عشرية واحدة. وهكذا، نعيد الكرة تقليصاً وتمديدًا، العدد الذي نرغبه من المرات.

نستطيع الآن تلخيص المراحل المختلفة من طريقة الطوسي: فعن طريق تبديل المتغير: $x \rightarrow 10^{-k}x$ ، تأخذ المعادلة:

$$(E_k) \quad f_k(x) = x^3 + a_k x^2 + b_k x + c_k = 0,$$

الشكل التالي:

$$(E_k^y) \quad g_k(x) = f_k(10^{-k}x) \\ = 10^{3(r-k)}x^3 + 10^{2(r-k)}a_k x^2 + 10^{(r-k)}b_k x + c_k = 0;$$

وجذور (E_k^y) هي جذور (E_k) مقلّصة بنسبة هي $10^{-(r-k)}$. وجذر (E_k) التالي:

$$s_k + s_{k+1} + \dots + s_r = \sigma_k 10^{-k} + \dots + \sigma_{r-1} \cdot 10 + \sigma_r,$$

(١٨) إذا كانت f دالة حقيقية متواصلة بمتغير حقيقي x وكان a عدداً حقيقياً موجباً، فنقول عن الدالة φ_a حيث لكل x : $\varphi_a(x) = f(a^{-1} \cdot x)$ ، إنها تمدد للدالة f بنسبة تساوي a .

مثلاً، يقابله العدد

$$t_k = \sigma_k + 10^{-1}\sigma_{k+1} + \dots + 10^{-(r+k)}\sigma_r,$$

ذو القسم الصحيح σ_k . على هذا الأساس تلعب (E_k) و (E_k^y) الدور نفسه في تحديد σ_k الذي كان الطوسي يحدده إجمالاً عن طريق الحدين الأخيرين من (E_k^y) .

من جهة أخرى، لدينا:

$$\begin{aligned} g_{k+1}(10x) &= f_{k+1}(10^{r-(k+1)} \cdot 10x) = f_{k+1}(10^{r-k}x) = \\ f_k(10^{r-k}x + \sigma_k) &= f_k[(x + \sigma_k)10^{r-k}] = g_k(x + \sigma_k). \end{aligned}$$

وهذا يعني أن (E_{k+1}^y) لها جذور (E_k^y) نفسها، لكن بإنقاص σ_k من كل منها، ومن ثم بتمديدها بنسبة تساوي العشرة، أي بإزاحتها يساراً منزلة عشرية واحدة (ذلك لأن جذور E_{k+1}^y هي جذور $g_{k+1}(10x)$ ، بضرب كل منها بـ 10 (المترجم)).

لكن معاملات (E_k^y) هي $10^{3(r-k)}$ ومداخل المخطط SCH_k'' (باستثناء 2 و σ_k).
فالكثرة رقم k من خوارزمية الطوسي تعطي، إذاً، معاملات $g_k(x + \sigma_k) = g_{k+1}(10x)$.
يكفي، إذاً، اعتماد تقليصات بنسبة 10^{-3} ، 10^{-2} ، 10^{-1} و 1، أي إزاحة معاملات $g_{k+1}(x)$ يميناً عدداً من المنازل العشرية هو بالتالي: 3، 2، 1، 0 منزلة عشرية، وهذه المعاملات هي باستثناء $10^{3(r-(k+1))}$ ، مداخل SCH_{k+1}'' .

وهناك ملاحظة لا بد من تسجيلها، تظهر جلياً من خلال مجرى الدراسة الطويلة نوعاً ما، التي قدّمها الطوسي. وهذه الملاحظة هي أن المعارف الممتازة التي ملكها الطوسي لم تقتصر فقط على خصائص العمليات الجبرية على الأعداد والتعابير الجبرية أو على الأعداد العشرية لكنها احتوت أيضاً معرفة بصيغة ذي الحدين^(١٩) - التي كانت موجودة في نهاية القرن العاشر -؛ كما تضمنت كذلك معرفة بتوسيع (تايلور) لكثيرات الحدود. هذه المعارف سمحت للطوسي بتشكيل استقرائي للمعادلات (E_k) مستعملاً بشكل خاص التوسيع:

$$f_k(x) = f_{k-1}(x + s_{k-1}) = \sum_{\ell=0}^n \frac{1}{\ell!} f_{k-1}^{(\ell)}(s_{k-1}) \cdot x^\ell.$$

حيث تنتج معاملات هذا التوسيع من توسيع ذوات الحدين:

$$(x + s_{k-1})^3, \quad a_k(x + s_{k-1})^2, \quad b_k(x + s_{k-1}),$$

الموجودة في $f_{k-1}(x + s_{k-1})$ ، ومن اختزال الحدود المتشابهة، بعد ذلك.

إن معرفة الطوسي بالأعداد العشرية، سمحت له باستعمال طريقة الإزاحة يميناً أو يساراً التي تلائم هذا النوع من الحسابات، سواء على الورق أو على «لوح الرمل». فلقد

(١٩) «ذي حدي نيوتن».

رأينا أن الإزاحات تبعاً لخوارزميته، لم تكن تطبق فقط في مداخل ومخارج كلٍّ من المخططات SCH_k'' ، بل أيضاً في تشكيل هذه المخططات. وفي الواقع، خلال تنفيذ خوارزمية الطوسي، يجري احتساب عبارات من الشكل:

$$f_k(s_k) - f_k(0) = f_{k-1}(s_{k-1} + s_k) - f_{k-1}(s_{k-1}) \quad (10 - 3)$$

$$= s_k \sum_{\ell=1}^n \left(\frac{s_k^{\ell-1}}{\ell!} \right) f_{k-1}^{(\ell)}(s_{k-1})$$

وعبارات من الشكل:

$$s_{k+1} f_k^{(1)}(s_k) = s_{k+1} \sum_{\ell=1}^n \left(\frac{s_k^{\ell-1}}{(\ell-1)!} \right) f_{k-1}^{(\ell)}(s_{k-1}) \quad (11 - 3)$$

إن مقارنة (10 - 3) و (11 - 3) تظهر أن الأخيرة تنتج من ضرب حدود الأولى بالتالي بـ 1، 2، 3، ...، n ومن ثم بضرب مجموع الحدود الحاصلة بـ $\frac{s_{k+1}}{s_k}$ ؛ وهذا الضرب الأخير يعود إلى الضرب بـ $\frac{\sigma_{k+1}}{\sigma_k}$ ومن ثم بإزاحة العدد يمينا منزلة عشرية واحدة؛ ذلك لأن المرتبة العشرية لـ s_{k+1} هي أقل (بواحد) من مرتبة s_k . ويستعمل الطوسي أيضاً طريقة مشابهة لاحتساب التعابير ذات الشكل:

$$\frac{s_{k+1}^{\ell}}{\ell!} f_k^{(\ell)}(s_k).$$

نشير أخيراً إلى أن الطوسي، خلال تطبيق المخطط SCH ، يحتسب (10 - 3) بمساعدة العبارة:

$$s_k \left\{ f_{k-1}^{(1)}(s_{k-1}) + s_k \left[\frac{1}{2!} f_{k-1}^{(2)}(s_{k-1}) + s_k \left(\frac{1}{3!} f_{k-1}^{(3)}(s_{k-1}) + \dots + s_k \left(\frac{1}{n!} f_{k-1}^{(n)}(s_{k-1}) \right) \right) \right] \right\},$$

وهذا يقَدَّم ضرباً بـ s_k ، أقل عدد ممكن من المرات.

رابعاً: تشكيل الجدول

في الفقرة السابقة تبيّن أن جدول الطوسي يتألف من المخططات SCH_k'' ($0 \leq k \leq r$) مع بعض التعديلات الطفيفة. وعلى الرغم من أن هذه التعديلات لا تؤثر في جوهر الجدول، إلا أن علينا تبيينها بوضوح لكي يأخذ هذا الجدول موقعه بأكبر دقة ممكنة. لنستعرض، إذن، التعديلات التي أتى بها الطوسي إلى SCH_k'' .

لا يحتسب الطوسي المدخل $10^{2(r-k)} \alpha_k$ بحد ذاته. إن مدخل SCH_k'' هذا، هو مخرج

للمخطط SCH''_{k-1} (بإضافة حد محفوظ، ومن ثم بإزاحة إلى اليمين (المترجم)). هذا المدخل يساعد على تشكيل $\sigma_k 10^{2(r-k)}$. وهذا فعلاً هو العدد الذي يحتسبه الطوسي مباشرة خلال تشكيل SCH''_k من دون استخدام SCH''_{k-1} ، وذلك بواسطة العلاقة:

$$a_k \sigma_k 10^{2(r-k)} = \sigma_k [a 10^{2(r-k)} + 3(\sigma_0 10^{3r-2k} + \sigma_1 10^{3r-2k-1} + \dots + \sigma_{k-1} 10^{3r-2k-(k-1)})], \quad (Y^0)$$

التي تكتب على الشكل:

$$a_k \sigma_k 10^{2(r-k)} = \sigma_k \left[a \cdot 10^{2(r-k)} + 3 \sum_{i=0}^{k-1} \sigma_i 10^{3r-2k-i} \right] \quad (1 - \epsilon)$$

ملاحظة ٤ - ١: توجي العلاقة (١ - ٤) باستبدال المدخل $a_k 10^{2(r-k)}$ للمخطط SCH''_k بالمدخل $a 10^{2(r-k)}$ ويوضع σ_i في المنزلة العشرية $3r - 2k - i$ ، $(0 \leq i \leq k-1)$. وهذا يسمح، من أجل احتساب $a_k \sigma_k 10^{2(r-k)}$ بضرب كل من الحدود $a, \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{k-1}$ في المنزلة التي وُضع فيها، بـ σ_k . ويجب أن نلاحظ أن هذه العملية لا تحتاج في تنفيذها إلى أي وقت إضافي لأن $\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_{k-1}$ هي مسجلة في كل الأحوال.

ملاحظة ٤ - ٢: ما من شك بأن الطوسي يستنتج أن عليه أن يضرب دائماً s_k و s_k^2 بـ 3، لكي يحصل على الحدود المحتفظ بها. ولكي يختصر إلى مرة واحدة، عدد المرات التي يضرب بها بـ 3، يختزل في أمثله العددية، مداخل جدوله إلى ثلث كل منها، باستثناء c_k . هذا الاختزال الذي يصلح عندما تكون المداخل غير محددة وعندما يمثل الجدول مخططاً، لا يبقى صالحاً عند إسناد قيم محددة عددية، لهذه القيم غير المحددة، اللهم إلا في حال كون القيم المسندة تقسم بديهيّاً على 3 كما هي الحال في أغلب الأمثلة التي اختارها الطوسي.

ملاحظة ٤ - ٣: العلاقة (٣ - ٨) تظهر أنه، للحصول على الحدود المحتفظ بها، يكفي وضع σ_k نهائياً في المنزلة العشرية $3(r-k)$. فللحصول على $s_k 10^{2(r-k)}$ ، يكفي احتساب σ_k^2 و σ_k^3 ووضعها في المنزلة العشرية (الجديدة (المترجم)) لـ σ_k أو، عريضاً (عند الاقتضاء)، في منزلة أعلى.

لذلك، إذا ما أخذنا في الاعتبار الملاحظتين (٤ - ١) و (٤ - ٣) يتحول SCH''_k إلى الجدول TAB_k . وإذا أخذنا في الاعتبار الملاحظات (٤ - ١)، (٤ - ٢) و (٤ - ٣)، فعندها يتحول SCH''_k إلى الجدول TAB'_k .

(٢٠) نذكر بأن a_k يمكن تحديدها بالعلاقة:

$$a_k = a + 3(s_0 + s_1 + \dots + s_{k-1}); \quad s_i = \sigma_i 10^{r-i}; \quad 0 \leq i \leq r.$$

(k,0)	$\sigma_i 10^{3^r-2k-i} (0 \leq i \leq k)$	
(k,1)	$a_i 10^{2^i r-k}$	$b_k 10^{r-k}$
(k,2)	$\sigma_k \left\{ a_i 10^{2^i r-k} + 3 \sum_{i=0}^{k-1} \sigma_i 10^{3^r-2k-i} \right\} = a_k \sigma_k 10^{2^i r-k}$	$c_k (a_k s_k + b_k) 10^{r-k}$
(k,3)	$(a_k s_k + b_k) 10^{r-k}$	$c_{k+1} - s_k^2$
(k,4)	$a_k s_k 10^{r-k}$	
(k,5)	$(2a_k s_k + b_k) 10^{r-k} = (b_{k+1} - 3s_k^2) 10^{r-k}$	

1 2 3

TAB_k

(k,0)	$\sigma_i 10^{3^r-2k-i} (0 \leq i \leq k)$	
(k,1)	$a_i 10^{2^i r-k}$	$b_k 10^{r-k}$
(k,2)	$\sigma_k \left\{ a_i 10^{2^i r-k} + \sum_{i=0}^{k-1} \sigma_i 10^{3^r-2k-i} \right\} = a_k \sigma_k 10^{2^i r-k}$	$3\sigma_k (a_k s_k + b_k) 10^{r-k}$
(k,3)	$(a_k s_k + b_k) 10^{r-k}$	$c_{k+1} - s_k^2$
(k,4)	$a_k s_k 10^{r-k}$	
(k,5)	$(2a_k s_k + b_k) 10^{r-k} = (b_{k+1} - s_k^2) 10^{r-k}$	

1 2 3

TAB_k

ونلاحظ أننا، للحفاظ على c_{k+1} ، يجب أن نضرب $(a'_k s_k + b'_k)$ بـ $3\sigma_k$ ؛ وهذا ما يجب القيام به. فاختزال a و b إلى الثلث يؤثر خطياً (بشكل خطي) في الأعمدة التي يقع فيها كل منها وهذا ما لا يحصل بالنسبة إلى العمود الذي يقع فيه c_k . ويستعمل الطوسي، بحرية، هذا، أو ذلك، من الجدولين TAB_k و TAB'_k . لكن ذلك لا ينعنا من وصف جدولته الذي نسميه TAB ، مستعملين فقط TAB'_k ، ذلك لأنه الجدول الأكثر استعمالاً في «الرسالة».

معلوم أن مداخل TAB'_k هي:

$$2, \sigma_i, 10^{3r-2k-i} \quad (0 \leq i \leq k), \quad a' 10^{2(r-k)}, b'_k 10^{r-k}, c_k$$

وسوف نحصر تسمية «مداخل» بالمدخلين الأخيرين فقط، أما المداخل الأولى فلا نأتي على ذكرها صراحة.

لكي نشكل اللوحة TAB'_{k+1} ، نضيف إلى مخارج TAB'_k ، الحدين المحتفظ بهما: $s_k^3 10^{r-k}$ و s_k^3 (لأجل ترتيب وضعية 3 في الحد الأول، راجع الملاحظة ٤ - ٣)، نزيحهما، من ثم، 1 وصفر منزلة عشرية بالتالي. في الوقت نفسه، نزيح يميناً، منزلتين عشريتين كلاً من الحدود a' و σ_i ، $(0 \leq i \leq k)$ ونضع σ_{k+1} في المنزلة العشرية $3(r-k-1)$.

ملاحظة ٤ - ٤: لكي يضع عدداً في TAB ، يتخذ الطوسي مُنطلقاً هو المنزلة العشرية nr ؛ يمكن r أن يساوي p ؛ يمكنه أيضاً أن يكون أصغر من p أو أكبر من p . في الحالة الأخيرة، نضع أصفاراً (أي عدداً من الأرقام مساوية للصفر) بعدد كافٍ إلى يسار الحد الثابت. وعدد هذه الأصفار هو:

$$nr - (np + q) = n(r - p) - q.$$

الجدول TAB يشمل الجداول TAB'_k $(0 \leq k \leq r)$ مجتمعة.

والملاحظ أن مختلف الجداول التي أقامها الطوسي والمتعلقة بمختلف أنواع المعادلات، قد بنيت منهجياً ومع المحافظة على شكلها الموحد، مع فوارق تفصيلية طفيفة: فقد يختلف الترتيب الأفقي من لوحة إلى أخرى؛ كما أن إحدى الخطوات في جدول ما يمكن أن توجد مجزأة إلى خطوات تفصيلية في لوحة أخرى، والعكس صحيح.

تشكيل TAB لمعادلة معينة يؤول بشكل أساسي إلى تنفيذ الخطوات التالية:

١ - تشكيل TAB'_0 :

(١ - ١): وضع مداخل TAB'_0 أي عناصره ذات الإحداثيات $(0, 0)$ ، $(0, 1)$ ، $(0, 1, 2)$ ،

(0, 1, 3). هذه الخطوة يمكن تفصيلها كما يلي :

(١ - ١ - ١) : كتابة القيمة المطلقة للثابت، ($N = |c|$) وتحديد المنازل $3r$ حيث $0 \leq j \leq p$. هذا المدخل (بفارق إشارة، + أو -) يوجد في القسم الأعلى من الجدول. لكن، طالما يمكن تحديد r (راجع الفقرة (٢)، فإذا كان $r > p$ نضيف $q - (r - p) - 3$ صفراً إلى اليسار (ملاحظة ٤ - ٤) ونحدد المنازل $3(p+1)$ ، $3(p+2)$ ، \dots ، $3r$.

(١ - ١ - ٢) : وضع $b'10^r$.

نحتسب الفرق ($2r - m_2$). يمكن أن يكون هذا الفرق موجباً أو سالباً. عند ذلك، ابتداءً من المنزلّة العشرية $3r$ (ملاحظة ٤ - ٤)، نعدّ باتجاه اليسار أو باتجاه اليمين $|2r - m_2|$ منزلّة عشرة ونضع الرقم الأول من b' . لكن هذه المنزلّة تقابل المرتبة العشرية $r + m_2 = 3r - (2r - m_2)$ وهي مرتبة $b'10^r$. هذا المدخل يوضع في القسم الأوسط من الجدول.

(١ - ١ - ٣) : وضع $a'10^{2r}$.

نحتسب ($r - m_1$) ونعدّ من ثم، ابتداءً من المنزلّة $3r$ ، يساراً أو يميناً $|r - m_1|$ منزلّة عشرية، وحيث نتوقف، نضع الرقم الأول من a' . هذه المنزلّة العشرية تقابل المرتبة العشرية $2r + m_1 = 3r - (r - m_1)$ وهو مرتبة $a'10^{2r}$. هذا المدخل يوضع في القسم الأسفل من الجدول.

(١ - ١ - ٤) : وضع σ_0 .

عند احتساب σ_0 (بحسب الفقرة (٢)، نضعه في المنزلّة العشرية $3r$.

(١ - ٢) : احتساب الحد المحفوظ $s_0^3 = \sigma_0^3 10^{3r}$ (راجع الملاحظة ٤ - ١)؛ ذلك لكي نحتسب من ثم $(N - s_0^3) = -(c + s_0^3)$.

(١ - ٣) : احتساب المداخل الأخرى لـ TAB_0 وإضافة الحد $s_0^2 10^{2r} = \sigma_0^2 10^{2r}$ للمخرج $s_0^2 10^{2r}$ (تؤخذ بالاعتبار الملاحظتان ٤ - ١ و ٤ - ٢، خلال مجرى الحسابات جميعها).

٢ - تشكيل TAB'_k ، ($1 \leq k \leq r - 1$) :

(٢ - ١) : وضع مداخل TAB'_k .

(٢ - ١ - ١): إزاحة a' ، انطلاقاً من وضعيته الأساسية في TAB'_{k-1} ، منزلتين عشريتين.

(٢ - ١ - ٢): إزاحة b' منزلة عشرية واحدة انطلاقاً من وضعيته في TAB'_{k-1} .

(٢ - ١ - ٣): إزاحة كل من الحدود $\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_{k-1}$ ، منزلتين عشريتين انطلاقاً من وضعيتها في TAB'_{k-1} .

(٢ - ١ - ٤): وضع σ_k في المنزل $3(r-k)$.

(٢ - ٢): احتساب الحد المحتفظ به $s_k^3 = \sigma_k 10^{3(r-k)}$ (راجع الملاحظة ٤ - ١)، من ثم احتساب $-c_{k+1} - s_k^3$.

(٢ - ٣): احتساب $a'_k 10^{2(r-k)}$ حسب الصيغة (٤ - ١):

$$a'_k \sigma_k 10^{2(r-k)} = \left\{ a' 10^{2(r-k)} + \sum_{i=0}^{k-1} \sigma_i 10^{3r-2k-i} \right\} \sigma_k.$$

(٢ - ٤): احتساب بقية عناصر TAB'_k وإضافة الحد الإضافي $s_k^2 10^{r-k} = \sigma_0^2 10^{3(r-k)}$ إلى المخرج $10^{r-k} (b'_k - s_k^2)$.

يبقى علينا أن نبني جدول الطوسي TAB . وستتحقق من أن هذا الجدول ليس سوى تنالٍ من الجداول TAB'_k ($0 \leq k \leq r$). نبني أولاً TAB مع تفريق الخطوات في TAB'_k بعضها عن بعض، الأمر الذي يسمح بتمييز الواحد عن الآخر؛ من ثم نعود ونجمع ما بين هذه الخطوات لكي نحصل على TAB ، بحسب مفهوم الطوسي بالضبط.

تشبيهاً للأفكار، سننتقل إلى التطبيق في الحالة $r=2$ ، أي في حالة $s = s_0 + s_1 + s_2$. الأسطر العليا في TAB سيشار إليها بالزوج $(k, 0)$ التي تشير إلى السطر (الأفقي) 0 (صفر) من TAB'_k . السطور الأخرى التي تمثل عناصر من TAB'_k ، سيشار إلى عناصرها بالثلاثية (k, i, j) التي تشير إلى العنصر الموجود على السطر i والعمود j في TAB'_k . ونشير بـ $(k, i, j)_+$ إلى العنصر نفسه، مضافاً إليه الحد المحتفظ به الذي يتلاءم معه. من جهة أخرى، نشير بـ $(TAB'_k)_+$ إلى TAB'_k بعد إضافة الحدود المحتفظ بها إلى مخارجه (راجع الصفحة التالية، $TAB_0, (TAB_1)_+, ((TAB_2)_+$).

وسنلاحظ أن متابعة العمليات المذكورة أو إيقافها، أمر يتعلق بقيمة c_k . فإذا ما توصلت الحسابات خلال عملية تشكيل TAB ، إلى $c_k = 0$ ، نستنتج أن $k=r$ وأن سياق العمليات انتهى؛ بمعنى آخر، نتوقف عن متابعة تشكيل الـ TAB'_k التالية.

<p>(0.0) $\stackrel{2}{\leftarrow} \sigma_o$</p> <p>(0.1.3) $N = c$ $-\stackrel{2}{\leftarrow} \sigma_o^2 = -s_o^{2*}$</p> <p>(0.2.3) $-\stackrel{1}{\leftarrow} (a^i s_o + b^i) \sigma_o \times 3$</p> <p>(0.3.3) $+ N - (as_o + b)s_o - s_o^2 = \rightarrow$</p>	<p>(1.0) $\stackrel{2}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{2}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{2}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{2}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{2}{\leftarrow} \sigma_o$</p>	<p>(2.0) $\stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o$</p>
<p>(0.1.2) $\stackrel{1}{\leftarrow} b^i$</p> <p>(0.2.2) $(\stackrel{2}{\leftarrow} a^i) \sigma_o = \stackrel{1}{\leftarrow} a^i s_o$</p> <p>(0.3.2) $\stackrel{1}{\leftarrow} (a^i s_o + b^i)$ $\stackrel{2}{\leftarrow} \sigma_o^2 = \stackrel{1}{\leftarrow} s_o^{2*}$</p> <p>(0.4.2) $(\stackrel{2}{\leftarrow} a^i) \sigma_o = \stackrel{1}{\leftarrow} a^i s_o$</p> <p>(0.5.2) $+ \stackrel{1}{\leftarrow} \{(2a^i s_o + b^i) + s_o^2\} =$ $= \stackrel{1}{\leftarrow} b^i = \rightarrow$</p>	<p>(1.1.3) $-\stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o$</p> <p>(1.2.3) $-\stackrel{1}{\leftarrow} (a^i s_1 + b^i) \sigma_1 \times 3$</p> <p>(1.3.3) $+ -c_1 - (a_1 s_1 + b_1) s_1 - s_1^2 = \rightarrow$</p>	<p>(2.1.3) $-\stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o \stackrel{1}{\leftarrow} \sigma_o$</p> <p>(2.2.3) $-\stackrel{1}{\leftarrow} (a_2 s_2 + b_2) \sigma_2 \times 3.$</p> <p>(2.3.3) $+ -c_2 - (a_2 s_2 + b_2) s_2 - s_2^2 = 0$</p>

(0.1.1) $\frac{2}{3}a'$	(1.1.1) $\frac{2}{3}a'$	(2.1.1) a'
(1.3.2) $\frac{2}{3}(a's_1+b'_1)$ (1.4.2) $(\frac{2}{3}a')\sigma_1 + (\frac{2}{3}a')\sigma_1$ (1.5.2) $+\frac{2}{3}(2a's_1+b) = \frac{2}{3}b'_2 \rightarrow$	(2.1.2) b'_2 (2.2.2) $a\sigma_2 + (\frac{2}{3}a')\sigma_2 + (\frac{2}{3}a')\sigma_2$ (2.3.2) $a'_2s_2 + b'_2$ $\sigma'_2 = s'_2*$ (2.4.2) $a\sigma_2 + (\frac{2}{3}a')\sigma_2 + (\frac{2}{3}a')\sigma_2$ (2.5.2) $+(2a's_2 + b'_2) + s'_2$	(2.1.1) a'

TAB₀

(TAB₁)₊

(TAB₂)₊

جاءه من (٥)

إذا ما جمعنا هذه الجداول في جدول واحد، نحصل على جدول الطوسي. ولكي نواكب، عن كتب، مساره، سنوضحه مستخدمين أحد أمثله بالذات. فلقد حلّ الطوسي المعادلة:

$$x^3 + 12x^2 + 102x = 34\ 345\ 395$$

مستخدماً الجدول التالي، الذي أوضحنا خطواته المتتالية بالأرقام.

(2.0)	$\overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_o \overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_1 \sigma_2$	3 2 1
(1.0)	$\overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_o \overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_1$	3 2
(0.0)	$\overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_o$	3
(0.1.3)	$N = -c$	$\overset{\circ}{3} \overset{\circ}{4} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{4} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{9} \overset{\circ}{5}$
	$-\overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_o^3 = -s_o^3$	— 2 7
(0.2.3)	$-\overset{\cdot}{\leftarrow} (a's_o + b')\sigma_o \times 3$	— 1 1 1 0 6
(0.3.3)+	$N - (as_o + b) - s_o^3 =$	
(1.1.3)	$-\overset{\cdot}{\leftarrow} c_1$	6 2 3 4 7 9 5
	$-\overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_1^3 = -s_1^3$	— 8
(1.2.3)	$-\overset{\cdot}{\leftarrow} (a'_1s_1 + b'_1)\sigma_1 \times 3$	— 5 9 1 0 8 4
(1.3.3)+	$-c_1 - (a_1s_1 + b_1)s_1 - s_1^3 =$	
(2.1.3)	$-\overset{\cdot}{\leftarrow} c_2$	3 1 5 9 5 5
	$-\overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_2^3 = s_2^3$	1
(2.2.3)	$-(a'_2s_2 + b'_2)\sigma_2 \times 3$	3 1 5 9 5 4
(2.3.3)+	$-c_2 - (a_2s_2 + b_2)s_2 - s_2^3 = 0$	0 0 0 0 0 0
(0.1.2)	$\overset{\cdot}{\leftarrow} b'$	3 4
(0.2.2)	$(\overset{\cdot}{\leftarrow} a')\sigma_o = \overset{\cdot}{\leftarrow} a's_o$	1 2
(0.3.2)	$\overset{\cdot}{\leftarrow} (a's_o + b')$	1 2 3 4
	$\overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_o^2 = \overset{\cdot}{\leftarrow} s_o^2$	9
(0.4.2)	$(\overset{\cdot}{\leftarrow} a')\sigma_o = \overset{\cdot}{\leftarrow} a's_o$	1 2
(0.5.2)+	$\overset{\cdot}{\leftarrow} \{(2a's_o + b') + s_o^2\} = \overset{\cdot}{\leftarrow} b'_1$	9 2 4 3 4
(1.1.2)	$\overset{\cdot}{\leftarrow} b'_1$	9 2 4 3 4
(1.2.2)	$(\overset{\cdot}{\leftarrow} a')\sigma_1 + (\overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_o)\sigma_1$	6 8
(1.3.2)	$\overset{\cdot}{\leftarrow} (a'_1s_1 + b'_1)$	9 8 5 1 4
	$\overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_1^2 = \overset{\cdot}{\leftarrow} s_1^2$	4
(1.4.2)	$(\overset{\cdot}{\leftarrow} a')\sigma_1 + (\overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_o)\sigma_1$	6 8
(1.5.2)+	$\overset{\cdot}{\leftarrow} (2a'_1s_1 + b'_1) + s_1^2 = \overset{\cdot}{\leftarrow} b'_2$	1 0 4 9 9 4
(2.1.2)	b'_2	1 0 4 9 9 4
(2.2.2)	$a's_2 + (\overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_o)\sigma_2 + (\overset{\cdot}{\leftarrow} \sigma_1)\sigma_2$	3 2 4
(2.3.2)	$a'_2s_2 + b'_2$	1 0 5 3 1 8
(0.1.1)	$\overset{\cdot}{\leftarrow} a'$	4
(1.1.1)	$\overset{\cdot}{\leftarrow} a'$	4
(2.1.1)	a'	4

ملاحظة ٤ - ٥ : كل ما سبق وتحقق بالنسبة إلى معادلة الدرجة الثالثة يمكن تطبيقه كاملاً على معادلات الدرجة الثانية :

$$x^2 + ax + b = 0.$$

لنفرض أن :

$$s = s_0 + s_1 + s_2 + \dots + s_r$$

حيث $s = \sigma_k 10^{r-k}$ ، $(1 \leq k \leq r)$ هو جذر موجب لهذه المعادلة . هنا يستعمل الطوسي الجدول الكامل (راجع الملاحظة ٣ - ٢) المسمى جدول روفيني - هورنر ، مع الإزاحات التي أشرنا إليها في الملاحظة التي تتناول مداخل المخطط . عندئذٍ نحصل على الجدول التالي :

(k.٥)	$\sigma_i 10^{2r-k-i} \ (0 \leq i \leq k)$	
(k.1)	$a_k 10^{r-k}$	b_k
(k.2)	$\sigma_k 10^{2(r-k)}$	$(a_k + s_k) 10^{r-k} \times \sigma_k$
(k.3)	$(a_k + s_k) 10^{r-k}$	$b_k + (a_k + s_k) s_k = b_{k+1}$
(k.4)	$\sigma_k 10^{2(r-k)}$	
(k.5)	$(a_k + 2s_k) 10^{r-k} = a_{k+1} 10^{r-k}$	
	1	2

خامساً : الحالة $c > 0$

في الفقرات السابقة عالجت مسألة حل المعادلة :

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0 \quad (١ - ٥)$$

في الحالة $c < 0$ ؟ أما في هذه الفقرة فسوف نواجه الحالة $c > 0$.

يبرهن الطوسي أن المعادلة (١ - ٥) ، في هذه الحالة ، يمكنها أن تحوز على جذرين موجبين ، كما يجوز ألا يكون لها أي جذر موجب . لكن ، في هذه الحالة بالتحديد ، لا يمكن تطبيق الخوارزميات والطرق المستعملة في الفقرات السابقة بشكل تلقائي . فلنفترض أن (١ - ٥) تحوز على جذرين موجبين s و t وأن :

$$\left. \begin{aligned} E(s) &= \sigma_0 10^r + \sigma_1 10^{r-1} + \dots + \sigma_r; \\ E(t) &= \tau_0 10^p + \tau_1 10^{p-1} + \dots + \tau_p; \end{aligned} \right\} \quad (٢ - ٥)$$

عندما يكون $r = p$ و $\sigma_0 = \tau_0$ ويكون v أي عدد يحقق:

$$s < v < t$$

يكون لدينا


$$\sigma_0 10^r < s < v < t < (\sigma_0 + 1) 10^r$$

فيكون

$$f(\sigma_0 10^r) f(v) < 0 \quad \text{و} \quad f(v) f((\sigma_0 + 1) 10^r) < 0$$

وبالتالي:

$$f(\sigma_0 10^r) f((\sigma_0 + 1) 10^r) > 0.$$



بالطريقة نفسها نحصل على لامتناهية مماثلة تخص t ؛ وهذا يدل على أن اللامتناهية الأساسية (٢ - ٤) لا تتحقق لا بـ s ولا بـ t . لكن في حال إمكان حُضر أحد هذين الجذرين وحده، s مثلاً، ضمن الفترة $[\sigma_0 10^r, (\sigma_0 + 1) 10^r]$ ، عندها لا تغيّر $f(x)$ إشارتها سوى مرة واحدة في هذه الفترة، مارة بالصفر في النقطة s ؛ في هذه الحالة تكون اللامتناهية (٢ - ٤) محققة، ويمكن بالتالي اعتماد دراسة مماثلة لتلك الواردة في الفقرات السابقة من أجل تحديد s و t . فمن الآن وصاعداً نفترض أن هذه الشروط تتوفر دائماً.

وإذا ما عُدنا إلى «الرسالة»، نستنتج أن الطوسي كان يستعمل أحياناً، نتائج الفقرات السابقة لكي يحدد مباشرة الجذر الأصغر. إلا أنه كان يتحاشى اللجوء إلى هذه النتائج، عندما تعترضه أعداد سالبة، خلال تطبيقه للخوارزمية (عند عمليات الطرح مثلاً). ولهذا السبب بالتحديد، كما سنرى، يتفادى استعمال هذه النتائج عند تصديده لتحديد الجذر الأكبر. نشير، أخيراً، إلى أنه في كل الأحوال التي يوجد فيها جذران أحدهما غير منطقي (Irrationnel)، كان الطوسي لا يهتم إلا إلى الجذر المنطقي.

ولكي يلتف حول الصعوبة التي كان يستشعرها خلال الاحتساب من دون أن يصرح بها، كان الطوسي، بشكل شبه دائم، يحول نوع المعادلة المدروسة إلى أحد الأنواع التي سبق أن عالجهما في فقرات سابقة، وذلك بتحويل في المتغير: $x \rightarrow ax + b$. المعادلة التي يحصل عليها حينئذٍ، لا تحوز سوى على جذر موجب واحد t' يقابل الجذر الأكبر t للمعادلة الأساسية. بالإمكان حينئذٍ تحديد t' بتطبيق نتائج الفقرات السابقة ونحصل على $t = at' + b$. أما s فيقابلها جذر سالب من المعادلة المحولة.

ولكي نوضح ما ذكرنا به في هذه المقدمة سنعالج أحد أنواع المعادلات التي درسها الطوسي وهو الذي نُمثله المعادلة:

$$(E) \quad x^3 + c = ax^2,$$

حيث $a \in \mathbb{N}^*$ و $c \in \mathbb{N}^*$ ، وهي المعادلة (٥ - ١)، حيث $b = 0$ ، $c > 0$.

هنا لا يستخدم الطوسي نتائج الفقرات السابقة في البحث عن الجذر الأكبر t . وذلك من دون أن يشرح الأسباب. والسبب في ذلك يعود، على ما يبدو، إلى أن الطوسي يأخذ المعادلة (E) على الشكل:

$$(F) \quad f(x) = c - x^2(a - x) = 0.$$

وفي ظل معطيات هذه الفقرة، من السهل أن نرى أن f موجبة في الفترة $[0, s]$ وسالبة في الفترة $[t, s]$. لكن، إذا كان:

$$\sigma_0 10^r < s < t_0 10^p < t,$$

فحينئذٍ يكون:

$$f(\tau_0 10^p) < 0 \quad \text{و} \quad f(\sigma_0 10^r) > 0$$

وهنا، على الأرجح، يكمن السبب في استعمال الطوسي، أحياناً، نتائج الفقرات السابقة لتحديد s مباشرة وعدوله عن استعمالها لتحديد t .

نعود الآن إلى المعادلة E ونضع:

$$A = \left(\frac{2a}{3}\right)^2 \cdot \frac{a}{3} = \frac{4a^3}{27}; \quad D = A - c \quad (٣ - ٥)$$

يبرهن الطوسي أن ($D \geq 0$) هو شرط ضروري وكاف لوجود جذرين موجبين. وهو، في الواقع، يفرق بين حالات ثلاث:

١ - ($D < 0$): لا تحوز (E) على جذر موجب.

٢ - ($D = 0$): تحوز (E) على جذر موجب واحد (مزدوج) وهو $\frac{2a}{3}$.

٣ - ($D > 0$): تحوز (E) على جذرين موجبين مختلفين، أصغرهما s والأكبر t .

يرهن الطوسي أن s و t يحققان اللامتناهية

$$(1 - 5) \quad 0 < s < \frac{2a}{3} < t$$

لتحديد t ، يحول الطوسي (E) عن طريق تبديل أفيني للمتغير $x \rightarrow x + \frac{2a}{3}$ ، فتأخذ (E) الشكل التالي:

$$x^3 + ax^2 = D,$$

فيصبح بالإمكان تطبيق نتائج الفقرات السابقة؛ فللمعادلة الأخيرة جذر موجب واحد t' :

$$t' = t - \frac{2a}{3},$$

الأمر الذي يسمح باستخلاص t .

مثال ١: $a = 465$ ، $c = 14\ 837\ 904$.

يجد الطوسي $D = 57\ 596$ ، فهو إذا أمام الحالة الثالثة. المعادلة المحولة تكتب كما يلي:

$$x^3 + 465x^2 = 57\ 596.$$

الجذر الوحيد (الموجب) لهذه المعادلة هو 11 وبالتالي:

$$t = 310 + 11 = 321.$$

وفي هذا المثال نجد أن s عدد غير منطقي، $298 < s < 299$. كما نشير إلى أن الطوسي، بعد أن ينهي عرض طريقته في البحث عن الجذر الأصغر للمعادلة (E)، سيتفادى هذا المثال.

في البحث عن s ، يقسم الطوسي الحالة الثالثة إلى حالات ثلاث:

١ - $c = \frac{1}{2}A$ ؛ في هذه الحالة نتحقق من أن $s = \frac{a}{3}$. عندئذ نجد $t = \frac{a}{3} + \frac{a}{\sqrt{3}}$ وهو عدد غير منطقي لا يهم الطوسي.

٢ - $c < \frac{1}{2}A$ ؛ هنا يبرهن الطوسي أن $s < \frac{a}{3}$.

٣ - $c > \frac{1}{2}A$ ؛ ويبرهن أن $s > \frac{a}{3}$.

في الحالتين ١ و ٢ يستعمل الطوسي طريقة الفقرات السابقة في البحث عن s ، من دون أن يلتقي بأي عدد سالب خلال عملياته الحسابية. لكن، أخذاً بالاعتبار شكل (E) و (F)، ولكي يطبق المخطط SCH بحسب الفقرة «الثالث»، عليه احتساب:

$$\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} [x^2 (a - x)],$$

في النقطة $x = s_0$ ، وهو ما يساوي $(a - 3s_0)$. وهذا الفرق $(a - 3s_0)$ موجب في الحالتين ١ و ٢ إلا أنه قد يكون سالباً في الحالة ٣. في هذه الحالة يحول الطوسي

المعادلة (E) بواسطة التبديل الأفيني:
 $x \rightarrow \frac{2a}{3} - x.$

مثال ٢: $a = 963$ ، $c = 66\ 152\ 322$.

وهي المعادلة (١-٥) حيث $a = -963$ ، $b = 0$ ، $c = 66\ 152\ 322$. نجد أن
 $D = 132\ 304\ 644 = 2c$. الجذر الأصغر هو، إذن، $\frac{a}{3} = 321$. لكن الطوسي يعود فيجد
هذا الجذر عن طريق إقامة جدول لا يحتوي على حدود محتفظ بها. ذلك أنه يكرر المخطط
 SCH_1''' (راجع الملاحظة ٣-٢) وهذا هو جدول الطوسي المقابل لهذا المخطط.

(2.0)	3 2 1
(1.0)	3 2
(0.0)	3
(0.1.4)	6 6 1 5 2 3 2 2
(0.2.4)	— 5 9 6 7
(1.1.4)	6 4 8 2 3 2 2
(1.2.4)	— 6 1 7 3 2
(2.1.4)	3 0 9 1 2 2
(2.2.4)	— 3 0 9 1 2 2
(3.1.4)	0 0 0 0 0 0
(0.2.3) = (0.3.3)	1 9 8 9
(0.4.3)	1 0 8 9
(0.5.3)	3 0 7 8
(1.1.3)	3 0 7 8
(1.2.3)	8 6
(1.3.3)	3 0 8 6 6
(1.4.3)	4 6
(1.5.3)	3 0 9 1 2
(2.1.3)	3 0 9 1 2
(2.2.3)	2
(2.3.3)	3 0 9 1 2 2
(0.1.2)	9 6 3
(0.3.2)	6 6 3
(0.5.2)	3 6 3
(0.7.2)	6 3
(1.1.2)	6 3
(1.3.2)	4 3
(1.5.2)	2 3
(1.7.2)	3
(2.1.2)	3
(2.3.2)	2

سادساً: إعادة تركيب الجداول

أصبح بالإمكان أن نقوم بإعادة تركيب جداول «رسالة» الطوسي التي حذفها الناقل المجهول، ونكون بذلك قد «رسمنا» هذه الرسالة كاملة. سنستعيد إذاً، وبالترتيب، كل الحلول العددية التي عرضها الطوسي، باستثناء تلك التي عرضناها على صورة أمثلة في الفقرات السابقة. وسنضيف على الهامش، الخطوات المقابلة في الخوارزمية التي سبق إعدادها.

$$\begin{array}{rcl}
 x^2 + ax = N & (2.0) & 3 \ 2 \ 1 \\
 a = 31 & (1.0) & 3 \ 2 \\
 N = 112 \ 992 & (0.0) & 3 \\
 & (0.1.2) & 1 \ 1 \ 2 \ 9 \ 9 \ 2 \\
 & (0.2.2) & \left\{ \begin{array}{r} - \ 9 \\ - \ 9 \ 3 \end{array} \right. \\
 (1.1.2) = (0.3.2) & & \underline{1 \ 3 \ 6 \ 9 \ 2} \\
 & (1.2.2) & \left\{ \begin{array}{r} - \ 4 \\ - \ 1 \ 2 \ 6 \ 2 \end{array} \right. \\
 (2.1.2) = (1.3.2) & & \underline{6 \ 7 \ 2} \\
 & (2.2.2) & \left\{ \begin{array}{r} - \ 1 \\ - \ 6 \ 7 \ 1 \end{array} \right. \\
 & (2.3.2) & \underline{0 \ 0 \ 0} \\
 & (0.1.1) & 3 \ 1 \\
 * \left\{ \begin{array}{l} (0.2.1) \\ (0.3.1) \\ (0.4.1) \end{array} \right. & & \left\{ \begin{array}{r} 3 \\ 3 \ 3 \ 1 \\ 3 \end{array} \right. \\
 & (0.5.1) & \underline{6 \ 3 \ 1} \\
 & (1.1.1) & 6 \ 3 \ 1 \\
 * \left\{ \begin{array}{l} (1.2.1) \\ (1.3.1) \\ (1.4.1) \end{array} \right. & & \left\{ \begin{array}{r} 2 \\ 6 \ 5 \ 1 \\ 2 \end{array} \right. \\
 & (1.5.1) & \underline{6 \ 7 \ 1} \\
 & (2.1.1) & 6 \ 7 \ 1
 \end{array}$$

الجدول رقم (١ - ١)

(*) منفذة دفعة واحدة.

$$x^2 + ax = N$$

$$a = 2012$$

$$N = 748\ 893$$

(2.0)	1
(1.0)	2
(0.0)	3
(0.1.2)	7 4 8 8 9 3
(0.2.2)	{ -9
(1.1.2) = (0.3.2)	{ -6 0 3 6
(1.2.2)	{ -4
(2.1.2) = (1.3.2)	{ -5 2 2 4
(2.2.2)	{ -1
(2.3.2)	{ -2 6 5 2
(0.1.1)	2 0 1 2
(0.2.1)	3
* (0.3.1)	2 3 1 2
(0.4.1)	3
(0.5.1)	2 6 1 2
(1.1.1)	2 6 1 2
(1.2.1)	2
* (1.3.1)	2 6 3 2
(1.4.1)	2
(1.5.1)	2 6 5 2
(2.1.1)	2 6 5 2

الجدول رقم (١ - ٢)

نذكر أن الطوسي، في حالة معادلة من الدرجة الثانية، لم يكن بحاجة إلى إزاحة خطوط القسم الأعلى من الجدول لأنه يستعمل الجدول كاملاً.

(*) منفذة دفعة واحدة.

$$x^2 + b = ax$$

$$a = 2123$$

$$b = 578\,442$$

(2.0)		1
(1.0)		2
(0.0)		3
(0.1.2)	—	5 7 8 4 4 2
(0.2.2)	—	— 5 4 6 9
(1.1.2) = (0.3.2)		— 3 1 5 4 2
(1.2.2)	—	— 3 0 0 6
(2.1.2) = (1.3.2)		— 1 4 8 2
(2.2.2)	—	— 1 4 8 2
(2.3.2)		0 0 0 0
(0.1.1)		— 2 1 2 3
(0.2.1)		3
* { (0.3.1)		— 1 8 2 3
(0.4.1)		3
(0.5.1)		— 1 5 2 3
(1.1.1)		— 1 5 2 3
(1.2.1)		2
* { (1.3.1)		— 1 5 0 3
(1.4.1)		2
(1.5.1)		— 1 4 8 3
(2.1.1)		— 1 4 8 3

الجدول رقم (١ - ٣)

(*) مثقلة دفعة واحدة.

$x^3 + bx = N$	(2.0)	3 2 1
$a = 0$	(1.0)	3 2
$b = 36$	(0.0)	3
$N = 33\ 087\ 717$	(0.1.3)	3 3 0 8 7 7 1 7
		- 2 7
	(0.2.3)	- 1 0 8
$(1.1.3) = (0.3.3)_+$		6 0 7 6 9 1 7
		- 8
	(1.2.3)	- 5 7 6 7 2
$(2.1.3) = (1.3.3)_+$		3 0 8 1 9 7
		- 1
	(2.2.3)	- 3 0 8 1 9 6
$(2.3.3)_+$		0 0 0 0 0 0
	(0.1.2)	1 2
$(0.5.2)_+$	9	1 2
(1.1.2)	9	1 2
(1.2.2)	6	
(1.3.2)	9 6	1 2
		4
(1.4.2)	6	
$(1.5.2)_+$	1 0 2 4	1 2
(2.1.2)	1 0 2 4	1 2
(2.2.2)	3 2	
(2.3.2)	1 0 2 7 3 2	

الجدول رقم (١ - ٤)

(*) الخطوات التي نتائجها الصفر، غير مدونة.

$$x^3 + bx = N$$

$$b = 1\ 203\ 321$$

$$N = 419\ 342\ 202$$

(2.0)	3 2 1
(1.0)	3 2
(0.0)	3
(0.1.3)	4 1 9 3 4 2 2 0 2
	- 2 7
(0.2.3)	- 3 6 0 9 9 6 3
(1.1.3) = (0.3.3) +	3 1 3 4 5 9 0 2
	- 8
(1.2.3)	- 2 9 8 2 6 4 2
(2.1.3) = (1.3.3) +	1 5 1 1 4 8 2
	- 1
(2.2.3)	- 1 5 1 1 4 8 1
(2.3.3) +	0 0 0 0 0 0 0
(0.1.2)	4 0 1 1 0 7
	9
(0.5.2) +	4 9 1 1 0 7
(1.1.2)	4 9 1 1 0 7
(1.2.2)	6
(1.3.2)	4 9 7 1 0 7
	4
(1.4.2)	6
(1.5.2) +	5 0 3 5 0 7
(2.1.2)	5 0 3 5 0 7
(2.2.2)	3 2
(2.3.2)	5 0 3 8 2 7

الجدول رقم (١ - ٥)

(*) الخطوات التي نتائجها الصفر، غير مدونة.

$$x^3 = bx + N$$

$$b = 963$$

$$N = 32\ 767\ 038$$

(2.0)	3 2 1
(1.0)	3 2
(0.0)	3
(0.1.3)	3 2 7 6 7 0 3 8
	— 2 7
(0.2.3)	2 8 8 9
(1.1.3) = (0.3.3) +	6 0 5 5 9 3 8
	— 8
(1.2.3)	5 7 4 0 7 4
(2.1.3) = (1.3.3) +	3 0 7 1 9 8
	— 1
(2.2.3)	3 0 7 1 9 7
(2.3.3) +	0 0 0 0 0 0
(0.1.2)	— 3 2 1
	9
(0.5.2) +	8 9 6 7 9
(1.1.2)	8 9 6 7 9
(1.2.2)	6
(1.3.2)	9 5 6 7 9
	4
(1.4.2)	6
(1.5.2) +	1 0 2 0 7 9
(2.1.2)	1 0 2 0 7 9
(2.2.2)	3 2
(2.3.2)	1 0 2 3 9 9

الجدول رقم (١ - ٦)

$$x^3 = bx + N$$

$$b = 102\ 021$$

$$N = 327\ 420$$

(2.0)	3 2 1
(1.0)	3 2
(0.0)	3
(0.1.3)	3 2 7 4 2 0
(0.2.3)	— 2 7
(1.1.3) = (0.3.3) ₊	3 0 6 0 6 3
(1.2.3)	— 8
(2.1.3) = (1.3.3) ₊	3 7 1 9 5 8
(2.2.3)	— 1
(2.3.3) ₊	2 0 6 1 4 0
b	— 1 0 2 0 2 1
(0.1.2)	— 3 4 0 0 7
(0.5.2) ₊	9
(1.1.2)	5 5 9 9 3
(1.2.2)	— 6
(1.3.2)	6 1 9 9 3
(1.4.2)	4
(1.5.2) ₊	6
(2.1.2)	6 8 3 9 3
(2.2.2)	— 3 2
(2.3.2)	6 8 7 1 3

الجدول رقم (١ - ٧)

$$x^3 + ax^2 = N$$

$$a = 30$$

$$N = 36\ 167\ 391$$

(2.0)	3 2 1
(1.0)	3 2
(0.0)	3
(0.1.3)	3 6 1 6 7 3 9 1
(0.2.3)	— 2 7
(1.1.3) = (0.3.3) +	— 2 7
(1.2.3)	— 6 4 6 7 3 9 1
(2.1.3) = (1.3.3) +	— 8
(2.2.3)	— 6 1 3 2
(2.3.3) +	— 3 2 7 3 9 1
(0.2.2)	— 1
(0.4.2)	— 3 2 7 3 9
(0.5.2) +	— 0 0 0 0 0 0
(1.1.2)	3
(1.2.2)	9
(1.3.2)	3
(1.4.2)	9 6
(1.5.2) +	9 6
(2.1.2)	6 2
(2.2.2)	1 0 2 2
(2.3.2)	4
(0.1.1)	6 2
(1.1.1)	1 0 8 8
(2.1.1)	1 0 8 8
(2.2.1)	3 2
(2.3.1)	1
(2.4.1)	1 0 9 1 3
(2.5.1)	1 0
(2.6.1)	1 0
(2.7.1)	1 0

الجدول رقم (١ - ٨)

$$x^3 + ax^2 = N$$

$$a = 3\,000$$

$$N = 342\,199\,161$$

(2.0)	3 2 1
(1.0)	3 2
(0.0)	3
(0.1.3)	3 4 2 1 9 9 1 6 1
(0.2.3)	— 2 7
(1.1.3) = (0.3.3) ₊	— 2 7
(1.2.3)	4 5 1 9 9 1 6 1
(2.1.3) = (1.3.3) ₊	— 8
(2.2.3)	— 4 2 9 6
(2.3.3) ₊	— 2 2 3 1 1 6 1
(0.2.2)	— 1
(0.4.2)	— 2 2 3 1 1 6
(0.5.2) ₊	— 0 0 0 0 0 0 0
(1.1.2)	3
(1.2.2)	9
(1.3.2)	3
(1.4.2)	6 9
(1.5.2) ₊	6 9
(2.1.2)	2 6
(2.2.2)	7 1 6
(2.3.2)	4
(0.1.1)	2 6
(1.1.1)	7 4 2 4
(2.1.1)	7 4 2 4
	1 3 2
	7 4 3 7 2
	1
	1
	1

الجدول رقم (١ - ٩)

$$x^3 = ax^2 + N$$

$$a = 30$$

$$N = 29\ 984\ 931$$

(2.0)+(2.1.1)	3 1 1
(2.0.3)	1
	3 1
(1.0)+(1.1.1)	3 1
(1.0.2)	2
(1.0.1)+(1.1.1)	2 9
(0.0)+(0.1.1)	2 9
(0.0)	3
(0.1.3)	2 9 9 8 4 9 3 1
(0.2.3)	— 2 7
	— 2 7
(1.1.3) = (0.3.3)+	5 6 8 4 9 3 1
	8
(1.2.3)	— 5 3 8 8
(2.1.3) = (1.3.3)+	2 8 8 9 3 1
	— 1
(2.2.3)	— 2 8 8 9 3 0
(2.3.3)+	0 0 0 0 0 0
(0.2.2)'	— 9
	9
(0.2.2)	— 3
(0.3.2)+	8 7
(0.4.2)	— 3
(0.5.2)+	8 4
(1.1.2)	8 4
(1.2.2)	5 8
(1.3.2)	8 9 8
(1.4.2)	5 8
	4
(1.5.2)+	9 6 0
(2.1.2)	9 6 0
(2.2.2)	3 1
(2.3.2)	9 6 3 1
$\leftarrow [a]$	— 3
(0.1.1)	— 1
(1.1.1)	— 1
(2.1.1)	— 1

الجدول رقم (١ - ١٠)

(*) الخطوات التي نتائجها الصفر، غير مشار إليها في الجدول.

$$x^3 = ax^2 + N$$

$$a = 312$$

$$N = 927\ 369$$

(2.0)+(2.1.1)	2 1 7
(2.0.3)	1
	2 1 6
(1.0)+(1.1.1)	2 1 6
(1.0.2)	2
(1.0.1)+(1.1.1)	1 9 6
(0.0)+(0.1.1)	1 9 6
(0.0)	3
(0.1.3)	0 0 9 2 7 3 6 9
(0.2.3)	— 2 8 0 8
	— 2 7
(1.1.3) = (0.3.3)+	2 0 0 7 3 6 9
	— 8
(1.2.3)	— 1 8 9 1 2
(2.1.3) = (1.3.3)+	1 0 8 1 6 9
	— 1
(2.2.3)	— 1 0 8 1 6 8
(2.3.3)+	0 0 0 0 0 0
(0.2.2)'	— 9 3 6
	9
(0.2.2)	— 3 1 2
(0.3.2)+	5 8 8
(0.4.2)	— 3 1 2
(0.5.2)+	2 7 6
(1.1.2)	2 7 6
(1.2.2)	3 9 2
(1.3.2)	3 1 5 2
	4
(1.4.2)	3 9 2
(1.5.2)+	3 5 8 4
(2.1.2)	3 5 8 4
(2.3.2)	2 1 6
(2.4.2)	3 6 0 5 6
$\Delta[a]$	— 3 1 2
(0.1.1)	— 1 0 4
(1.1.1)	— 1 0 4
(2.1.1)	— 1 0 4

الجدول رقم (١ - ١١)

$$x^3 + ax^2 + bx = N$$

$$a = 12$$

$$b = 102$$

$$N = 34\ 345\ 395$$

(2.0)	3 2 1
(1.0)	3 2
(0.0)	3
(0.1.3)	3 4 3 4 5 3 9 5
	— 2 7
(0.2.3)	— 1 1 1 0 6
(1.1.3) = (0.3.3) +	6 2 3 4 7 9 5
	— 8
(1.2.3)	— 5 9 1 0 8 4
(2.1.3) = (1.3.3) +	3 1 5 9 5 5
	— 1
(2.2.3)	3 1 5 9 5 4
(2.3.3) +	<u>0 0 0 0 0 0</u>
(0.1.2)	3 4
(0.2.2)	<u>1 2</u>
(0.3.2)	1 2 3 4
	9
(0.4.2)	<u>1 2</u>
(0.5.2) +	9 2 4 3 4
(1.1.2)	9 2 4 3 4
(1.2.2)	<u>6 8</u>
(1.3.2)	9 8 5 1 4
	4
(1.4.2)	<u>6 8</u>
(1.5.2) +	1 0 4 9 9 4
(2.1.2)	1 0 4 9 9 4
(2.2.2)	<u>3 2 4</u>
(2.3.2)	1 0 5 3 1 8
(0.1.1)	4
(1.1.1)	4
(2.1.1)	4

الجدول رقم (١ - ١٢)

$$x^3 + ax^2 + bx = N$$

$$a = 6$$

$$b = 3\,000\,000$$

$$N = 996\,694\,407$$

$$(2.0)$$

$$(1.0)$$

$$(0.0)$$

$$(0.1.3)$$

$$(0.2.3)$$

$$(1.1.3) = (0.3.3)_+$$

$$(1.2.3)$$

$$(2.1.3) = (1.3.3)_+$$

$$(2.2.3)$$

$$(2.3.3)_+$$

$$^2[a]$$

$$(0.1.2)$$

$$(0.2.2)$$

$$(0.3.2)$$

$$(0.4.2)$$

$$(0.5.2)_+$$

$$(1.1.2)$$

$$(1.2.2)$$

$$(1.3.2)$$

$$(1.4.2)$$

$$(1.5.2)_+$$

$$(2.1.2)$$

$$(2.2.2)$$

$$(2.3.2)$$

$$^4[a]$$

$$(0.1.1)$$

$$(1.1.1)$$

$$(2.1.1)$$

$$3\,2\,1$$

$$3\,2$$

$$3$$

$$9\,9\,6\,6\,9\,4\,4\,0\,7$$

$$- 2\,7$$

$$- 9\,0\,0\,5\,4$$

$$6\,9\,1\,5\,4\,4\,0\,7$$

$$- 8$$

$$- 6\,5\,8\,3\,4\,4$$

$$3\,3\,1\,2\,0\,0\,7$$

$$- 1$$

$$- 3\,3\,1\,2\,0\,0\,6$$

$$0\,0\,0\,0\,0\,0\,0$$

$$3$$

$$1$$

$$6$$

$$1\,6$$

$$9$$

$$6$$

$$1\,9\,1\,2$$

$$1\,9\,1\,2$$

$$6$$

$$4$$

$$1\,9\,7\,2\,4$$

$$4$$

$$6\,4$$

$$1\,1\,0\,3\,6\,8$$

$$1\,1\,0\,3\,6\,8$$

$$3\,2\,2$$

$$1\,1\,0\,4\,0\,0\,2$$

$$6$$

$$2$$

$$2$$

$$2$$

الجدول رقم (١ - ١٣)

(*) يشير الرمز $[a] \leftarrow n$ إلى إزاحة العدد a ، n منزلة عشرية.

$$x^3 + ax^2 + bx = N$$

$$a = 30\,000$$

$$b = 30$$

$$N = 3\,124\,315\,791$$

(2.0)	3 2 1
(1.0)	3 2
(0.0)	3
(0.1.3)	3 1 2 4 3 1 5 7 9 1
(0.2.3)	— 2 7
(1.1.3) = (0.3.3) +	— 2 7 9
(1.2.3)	— 3 9 7 3 0 6 7 9 1
(2.1.3) = (1.3.3) +	— 8
(2.2.3)	— 3 7 7 7 6 6
(2.3.3) +	— 1 9 5 3 8 1 9 1
$\frac{1}{2}[b]$	— 1
(0.1.2)	— 1 9 5 3 8 1 9
(0.2.2)	— 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.3.2)	3
(0.4.2)	1
(0.5.2) +	3
(1.1.2)	3 1
(1.2.2)	9
(1.3.2)	3
(1.4.2)	6 9 1
(1.5.2) +	6 9 1
(2.1.2)	2 6
(2.2.2)	6 2 9 6 1
(2.3.2)	4
$\frac{1}{2}[a]$	2 6
(0.1.1)	6 5 0 2 4 1
(1.1.1)	6 5 0 2 4 1
(2.1.1)	1 3 2
	6 5 1 2 7 3
	3
	1
	1
	1

الجدول رقم (١ - ١٤)

$$x^3 = ax^2 + bx + N$$

$$a = 30 \quad b = 600$$

$$N = 29 \ 792 \ 331$$

(2.0)+(2.1.1)	3 1 1
(2.0.3)	1
	3 1
(1.0)+(1.1.1)	3 1
(1.0.2)	2
(1.0.1)+(1.1.1)	2 9
(0.0)+(0.1.1)	2 9
(0.0)	3
(0.1.3)	2 9 7 9 2 3 3 1
(0.2.3)	— 2 8 8 0 0
	— 2 7
(1.1.3) = (0.3.3)+	0 5 6 7 2 3 3 1
	— 8
(1.2.3)	— 5 3 7 6 0 0
(2.1.3) = (1.3.3)+	2 8 8 3 3 1
	— 1
(2.2.3)	— 2 8 8 3 3 0
(2.3.3)+	0 0 0 0 0 0
2 [b]	— - 6 0 0
(0.1.2)	- 2 0 0
(0.2.2)	- 3
(0.3.2)	- 3 2 0 0
	9
(0.1.2)+	8 9 8 0 0
(0.2.2)	- 3
(0.3.2)+	8 6 8 0 0
(0.4.2)	- 3
(0.5.2)+	8 3 8 0 0
(1.1.2)	8 3 8 0 0
(1.2.2)	5 8
(1.3.2)	8 9 6 0 0
	4
(1.4.2)	5 8
(1.5.2)+	9 5 8 0 0
(2.1.2)	9 5 8 0 0
(2.2.2)	3 1 0
(2.3.2)	9 6 1 1 0
4 [a]	- 3 0
(1.0.1)	- 1 0
(1.1.1)	- 1
(2.1.1)	- 1

الجدول رقم (١ - ١٥)

$x^3 = ax^2 + bx + N$	(2.0)+(2.1.1)	2 8 8
$a = 99$	(2.0.3)	1
$b = 70\ 200$		2 8 7
$N = 340\ 902$	(1.0)+(1.1.1)	2 8 7
	(1.0.2)	2
	(1.0.1)+(1.1.1)	2 6 7
	(0.0)+(0.1.1)	2 6 7
	(0.0)	3
	(0.1.3)	0 0 3 4 0 9 0 2
	(0.2.3)	— 2 9 9 7 0 0
		— 2 7
(1.1.3) = (0.3.3)+		3 3 1 0 9 0 2
		— 8
(1.2.3)		3 1 2 8 4
(2.1.3) = (1.3.3)+		1 7 4 5 0 2
		— 1
(2.2.3)		1 7 4 5 0 1
(3.2.3)+		0 0 0 0 0 0
(0.1.2)'		— 7 0 2 0 0
(0.2.2)'		— 2 9 7
(0.3.2)'		— 9 9 9 0 0
(0.1.2)		— 2 3 4 0 0
		9
(0.1.2)+		6 6 6 0 0
(0.2.2)		— 9 9
(0.3.2)+		5 6 7 0 0
(0.4.2)		— 9 9
(0.5.2)+		4 6 8 0 0
(1.1.2)		4 6 8 0 0
(1.2.2)		5 3 4
(1.3.2)		5 2 1 4 0
		4
(1.4.2)		5 3 4
(1.5.2)+		5 7 8 8 0
(2.1.2)		5 7 8 8 0
(2.2.2)		2 8 7
(2.3.2)		5 8 1 6 7
$\Delta[a]$		— 9 9
(0.1.1)		— 3 3
(1.1.1)		— 3 3
(2.1.1)		3 3

الجدول رقم (١ - ١٦)

$(0, i, j)'$ تعني استعمال a, b بدل a', b' .

$(0, i, j)+$ تعني أن حداً قد أضيف.

$$x^3 = ax^2 + bx + N$$

$$a = 300$$

$$b = 6\,000$$

$$N = 237\,861$$

$$\begin{array}{rcl}
 (2.0) + (2.1.1) & & 2\,2\,1 \\
 (2.0.3) & & 1 \\
 & & 2\,2 \\
 (1.0) + (1.1.1) & & 2\,2 \\
 (1.0.2) & & 2 \\
 (1.0.1) + (1.1.1) & & 2 \\
 (0.0) + (0.1.1) & & 2 \\
 (0.0) & & 3 \\
 (0.1.3) & & 0\,2\,3\,7\,8\,6\,1 \\
 (0.2.3) & \left\{ \begin{array}{l} -2\,7 \\ -1\,8 \\ -2\,7 \end{array} \right. & * \\
 (1.1.3) = (0.3.3)_+ & & \begin{array}{r} 2\,0\,3\,7\,8\,6\,1 \\ 8 \\ 1\,9\,2 \\ 1\,0\,9\,8\,6\,1 \\ 1 \\ 1\,0\,9\,8\,6 \\ 0\,0\,0\,0\,0 \end{array} \\
 (1.2.3) & & \\
 (2.1.3) = (1.3.3)_+ & & \\
 (2.2.3) & & \\
 (2.3.3)_+ & & \\
 (0.1.2)' & & -6 \\
 (0.2.2)'_+ & & -9 \\
 (0.3.2)'_+ & & -9\,6 \\
 & & 9 \\
 (0.1.2) & & -2 \\
 (0.1.2)_+ & & 8\,8 \\
 (0.2.2) & & -3 \\
 (0.3.2)_+ & & 5\,8 \\
 (0.4.2) & & -3 \\
 (0.5.2)_+ & & 2\,8 \\
 (1.1.2) & & 2\,8 \\
 (1.2.2) & & 4 \\
 (1.3.2) & & 3\,2 \\
 & & 4 \\
 (1.4.2) & & 4 \\
 (1.5.2)_+ & & 3\,6\,4 \\
 (2.1.2) & & 3\,6\,4 \\
 (2.2.2) & & 2\,2 \\
 (2.3.2) & & 3\,6\,2 \\
 4-[a] & & -3 \\
 (0.1.1) & & -1 \\
 (1.1.1) & & -1 \\
 (2.1.1) & & -1
 \end{array}$$

الجدول رقم (١ - ١٧)

(*) خطوط أعمالها الطوسي.

$$x^3 + ax^2 = bx + N$$

$$a = 30$$

$$b = 60$$

$$N = 36\ 148\ 131$$

(2.0)	3 2 1
(1.0)	3 2
(0.0)	3
(0.1.3)	3 6 1 4 8 1 3 1
$\sigma_o^3 + (0.2.3)$	— 2 9 6 8 2
(1.1.3) = (0.3.3) +	6 4 6 6 1 3 1
	— 8
(1.2.3)	— 6 1 3 0 8
(2.1.3) = (1.3.3) +	3 2 7 3 3 1
	— 1
(2.2.3)	— 3 2 7 3 3
(2.3.3) +	0 0 0 0 0 0
$2[-b]$	— 6 0
(0.1.2)	— 2 0
$\cancel{E}(\sigma_o^2/3)$	3
	2 9 9 8 0
(0.2.2)	3
(0.3.2) + [$\cancel{E}\sigma_o^2/3$]	3 2 9 8 0
$\cancel{E}(2/3)\sigma_o^2$	6
(0.4.2)	3
(0.5.2) +	9 5 9 8 0
(1.1.2)	9 5 9 8 0
(1.2.2)	6 2
(1.3.2)	1 0 2 1 8 0
	4
(1.4.2)	6 2
(1.5.2) +	1 0 8 7 8 0
(2.1.2)	1 0 8 7 8 0
	3 2
(2.2.2)	1
(2.3.2)	1 0 9 1 1 0
$\cancel{E}[a]$	3
(0.1.1)	1
(1.1.1)	1
(2.1.1)	1

الجدول رقم (١ - ١٨)

$$x^3 + ax^2 = bx + N$$

$$a = 3$$

$$b = 102\ 000$$

$$N = 643\ 284$$

(2.0)	3 2 1
(1.0)	3 2
(0.0)	3
(0.1.3)	0 0 6 4 3 2 8 4
(0.2.3)	{ 3 0 6
σ_0^3	{ — 2 7
(1.1.3) = (0.3.3) ₊	— 2 7
	3 9 7 3 2 8 4
(1.2.3)	— 8
(2.1.3) = (1.3.3) ₊	— 3 7 5 7 2
	2 0 8 0 8 4
(2.2.3)	— 1
(2.3.3) ₊	— 2 0 8 0 8 3
	0 0 0 0 0 0
b	1 0 2
(0.1.2)	— 3 4
(0.2.2)	3
	9
(0.4.2)	3
(0.5.2) ₊	5 6 6
(1.1.2)	5 6 6
(1.2.2)	6 2
(1.3.2)	6 2 6 2
	4
(1.4.2)	6 2
(1.5.2) ₊	6 9 0 4
(2.1.2)	6 9 0 4
(2.2.2)	3 2 1
(2.3.2)	6 9 3 6 1
a	3
(0.1.1)	1
(1.1.1)	1
(2.1.1)	1

الجدول رقم (١ - ١٩)

$$x^3 + ax^2 = bx + N$$

$$a = 3\ 000$$

$$b = 300$$

$$N = 342\ 102\ 861$$

$$(0.2)$$

$$(0.1)$$

$$(0.0)$$

$$(0.1.3)$$

$$(0.2.3)$$

$$(1.1.3) = (0.3.3)_+$$

$$(1.2.3)$$

$$(2.1.3) = (1.3.3)_+$$

$$(2.2.3)$$

$$(2.3.3)_+$$

$$\leftarrow b$$

$$(0.1.2)$$

$$(0.2.2)$$

$$(0.4.2)$$

$$(0.5.2)_+$$

$$(1.1.2)$$

$$(1.2.2)$$

$$(1.3.2)$$

$$(1.4.2)$$

$$(1.5.2)_+$$

$$(2.1.2)$$

$$(2.2.2)$$

$$(2.3.2)$$

$$\leftarrow a$$

$$(0.1.1)$$

$$(1.1.1)$$

$$(2.1.1)$$

$$3\ 2\ 1$$

$$3\ 2$$

$$3$$

$$3\ 4\ 2\ 1\ 0\ 2\ 8\ 6\ 1$$

$$9$$

$$\left\{ \begin{array}{l} - 2\ 7 \\ - 2\ 7 \end{array} \right.$$

$$2\ 7$$

$$4\ 5\ 1\ 9\ 2\ 8\ 6\ 1$$

$$8$$

$$4\ 2\ 9\ 5\ 4$$

$$2\ 2\ 3\ 0\ 8\ 6\ 1$$

$$1$$

$$2\ 2\ 3\ 0\ 8\ 6$$

$$0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0$$

$$3$$

$$1$$

$$3$$

$$9$$

$$3$$

$$6\ 8\ 9\ 9$$

$$6\ 8\ 9\ 9$$

$$2\ 6$$

$$7\ 1\ 5\ 9$$

$$4$$

$$2\ 6$$

$$7\ 4\ 2\ 3$$

$$7\ 4\ 2\ 3$$

$$1\ 3\ 2$$

$$7\ 4\ 3\ 6\ 2$$

$$3$$

$$1$$

$$1$$

$$1$$

الجدول رقم (١ - ٢٠)

$$x^3 + bx = ax^2 + N$$

$$a = 30$$

$$b = 300$$

$$N = 30\ 081\ 231$$

$$(2.0) + (2.1.1)$$

$$(2.0.3)$$

$$(1.0) + (1.1.1)$$

$$(1.0.2)$$

$$(1.0.1) + (1.1.1)$$

$$(0.0) + (0.1.1)$$

$$(0.0)$$

$$(0.1.3)$$

$$(0.2.3)_+$$

$$(1.1.3) = (0.3.3)_+$$

$$(1.2.3)$$

$$(2.1.3) = (1.3.3)_+$$

$$(2.2.3)$$

$$(2.3.3)_+$$

$$(0.1.2)'_+$$

$$(0.2.2)'$$

$$(0.3.2)'_+$$

$$(0.1.2)$$

$$(0.2.2)$$

$$(0.3.2)_+$$

$$(0.4.2)$$

$$(0.5.2)_+$$

$$(1.1.2)$$

$$(1.2.2)$$

$$(1.3.2)$$

$$(1.4.2)$$

$$(1.5.2)_+$$

$$(2.1.2)$$

$$(2.2.2)$$

$$(2.3.2)$$

$$\leftarrow [a]$$

$$(0.1.1)$$

$$(1.1.1)$$

$$(2.1.1)$$

$$3\ 1\ 1$$

$$1$$

$$3\ 1$$

$$3\ 1$$

$$2$$

$$2\ 9$$

$$2\ 9$$

$$3$$

$$3\ 0\ 0\ 8\ 1\ 2\ 3\ 1$$

$$- 2\ 4\ 3\ 9$$

$$5\ 6\ 9\ 1\ 2\ 3\ 1$$

$$- 8$$

$$- 5\ 3\ 9\ 4$$

$$2\ 8\ 9\ 2\ 3\ 1$$

$$- 1$$

$$- 2\ 8\ 9\ 2\ 3$$

$$0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0$$

$$9\ 3$$

$$-9$$

$$8\ 1\ 3$$

$$1$$

$$9$$

$$-3$$

$$8\ 7\ 1$$

$$-3$$

$$8\ 4\ 1$$

$$8\ 4\ 1$$

$$5\ 8$$

$$8\ 9\ 9$$

$$4$$

$$5\ 8$$

$$9\ 6\ 1$$

$$9\ 6\ 1$$

$$3\ 1$$

$$9\ 6\ 4\ 1$$

$$-3$$

$$-1$$

$$-1$$

$$-1$$

الجدول رقم (١ - ٢١)

$$x^3 + bx = ax^2 + N$$

$$a = 30$$

$$b = 3 \times 10^6$$

$$N = 992\ 984\ 931$$

$$(2.0) + (2.1.1)$$

$$(2.0.3)$$

$$(1.0) + (1.1.1)$$

$$(1.0.2)$$

$$(1.0.1) + (1.1.1)$$

$$(0.0) + (0.1.1)$$

$$(0.0)$$

$$(0.1.3)$$

$$(0.2.3)$$

$$(1.1.3) = (0.3.3)_+$$

$$(1.2.3)$$

$$(2.1.3) = (1.3.3)_+$$

$$(2.2.3)$$

$$(2.3.3)_+$$

$$(0.1.2)$$

$$(0.2.2)$$

$$(0.3.2)$$

$$(0.4.2)$$

$$(0.5.2)_+$$

$$(1.1.2)$$

$$(1.2.2)$$

$$(1.3.2)$$

$$(1.4.2)$$

$$(1.5.2)_+$$

$$(2.1.2)$$

$$(2.2.2)$$

$$(2.3.2)$$

$$(0.1.1)$$

$$(1.1.1)$$

$$(2.1.1)$$

$$3\ 1\ 1$$

$$1$$

$$3\ 1$$

$$3\ 1$$

$$2$$

$$2\ 9$$

$$2\ 9$$

$$3$$

$$9\ 9\ 2\ 9\ 8\ 4\ 9\ 3\ 1$$

$$- 8\ 9\ 7\ 3$$

$$- 2\ 7$$

$$6\ 8\ 6\ 8\ 4\ 9\ 3\ 1$$

$$- 8$$

$$- 6\ 5\ 3\ 8\ 8$$

$$3\ 2\ 8\ 8\ 9\ 3\ 1$$

$$- 1$$

$$- 3\ 2\ 8\ 8\ 9\ 3$$

$$0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0$$

$$3$$

$$1$$

$$- 3$$

$$9\ 9\ 7$$

$$9$$

$$- 3$$

$$1\ 0\ 8\ 4$$

$$1\ 0\ 8\ 4$$

$$5\ 8$$

$$1\ 0\ 8\ 9\ 8$$

$$4$$

$$5\ 8$$

$$1\ 0\ 9\ 6\ 0$$

$$1\ 0\ 9\ 6\ 0$$

$$3\ 1$$

$$1\ 0\ 9\ 6\ 3\ 1$$

$$- 3$$

$$- 1$$

$$- 1$$

$$- 1$$

الجدول رقم (١ - ٢٢)

$$x^3 + bx = ax^2 + N$$

$$a = 321$$

$$b = 300$$

$$N = 96\ 300$$

$$(2.0) + (2.1.1)$$

$$(2.0.3)$$

$$(1.0) + (1.1.1)$$

$$(1.0.2)$$

$$(1.0.1) + (1.1.1)$$

$$(0.0) + (0.1.1)$$

$$(0.0)$$

$$(0.1.3)$$

$$(0.2.3)$$

$$(1.1.3) = (0.3.3)_+$$

$$(1.2.3)$$

$$(2.1.3) = (1.3.3)_+$$

$$(2.2.3)$$

$$(2.3.3)_+$$

$$(0.1.2)'$$

$$(0.2.2)'$$

$$(0.1.2)$$

$$(0.2.2)$$

$$(0.3.2)_+$$

$$(0.4.2)$$

$$(0.5.2)_+$$

$$(1.1.2)$$

$$(1.2.2)$$

$$(1.3.2)$$

$$(1.4.2)$$

$$(1.5.2)_+$$

$$(2.1.2)$$

$$(2.2.2)$$

$$(2.3.2)$$

$$\Delta[a]$$

$$(0.1.1)$$

$$(1.1.1)$$

$$(2.1.1)$$

$$2\ 1\ 4$$

$$1$$

$$2\ 1\ 3$$

$$2\ 1\ 3$$

$$2$$

$$1\ 9\ 3$$

$$1\ 9\ 3$$

$$3$$

$$0\ 0\ 9\ 6\ 3\ 0\ 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -2\ 8\ 8\ 9 \\ -9 \end{array} \right.$$

$$2\ 7$$

$$1\ 8\ 9\ 6\ 3\ 0\ 0$$

$$8$$

$$1\ 7\ 8\ 5\ 6$$

$$1\ 0\ 2\ 7\ 0\ 0$$

$$1$$

$$1\ 0\ 2\ 6\ 9\ 9$$

$$0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0$$

$$3$$

$$-9\ 6\ 3$$

$$1$$

$$9$$

$$-3\ 2\ 1$$

$$5\ 8\ 0$$

$$-3\ 2\ 1$$

$$2\ 5\ 9$$

$$2\ 5\ 9$$

$$3\ 8\ 6$$

$$2\ 9\ 7\ 6$$

$$4$$

$$3\ 8\ 6$$

$$3\ 4\ 0\ 2$$

$$3\ 4\ 0\ 2$$

$$2\ 1\ 3$$

$$3\ 4\ 2\ 3\ 3$$

$$-3\ 2\ 1$$

$$-1\ 0\ 7$$

$$-1\ 0\ 7$$

$$-1\ 0\ 7$$

الجدول رقم (١ - ٢٣)

(الفصل الثاني)

نقل وتعليق رياضي

(المعادلات ١ - ٢٠)

في مقدمة الرسالة، يعرف الطوسي القطوع المخروطية الثلاثة ويدرس خصائص نقاطها كما يعالج بعض المسائل المتعلقة بينها. وسوف نلاحظ أنه في البناء الخامس برهن أن خاصية المنحني المدروس هي خاصية مميزة، الأمر الذي يعود إلى إعطاء معادلة لهذا المنحني.

تعريفات

نشير بالحرف \mathcal{C} إلى مخروط محوره AD وبـ \mathcal{P} إلى سطح يمر بـ AD وبـ Q إلى سطح عمودي على \mathcal{P} .

تقاطع Q و \mathcal{C} يقال له قِطْعٌ مخروطي؛ وتقاطع Q و \mathcal{P} يقال له قطر القِطْع، والأعمدة الخارجة من محيط القطع إلى القطر يقال لها خطوط الترتيب للقِطْع.

نفرض أن تقاطع \mathcal{P} و \mathcal{C} يُعطي المثلث ABC ، حيث $AB = AC$ ، وأن Q يقطع AB في النقطة E بين A و B :

- * وإذا كان $Q//AC$ ، (Q موازياً لـ AC) يسمى القطع مكافئاً.
- * وإذا قُطِعَ Q الخط AC من جهة الرأس A ، يسمى القِطْع زائداً.
- * وإذا قطع Q الخط AC بين A و C يسمى القِطْع ناقصاً.
- * وإذا كان E هو رأس القطع المكافئ A هو رأس المخروط فإن $2EA$ يقال له الضلع القائم للقطع المكافئ ويُقال لـ EA وسيط (paramètre) القِطْع.
- * إذا كان E و F رأسي القطع الزائد فإن EF يسمى القطر المجانب للقطع الزائد.


تعليق

التحديدات السابقة استخدمها الطوسي بالنسبة إلى مخروط دائري حيث $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{2}$ (زاوية قائمة) وهذه التحديدات صالحة بالنسبة إلى أي مخروط دائري، باستثناء تعريف الضلع القائم للقطع المكافئ^(*).

القضية ١

لنعتبر أن \mathcal{P} قطع مكافئ ضلعه القائم a ورأسه E ، ولنعتبر أن F نقطة من قطره، يقابلها خط الترتيب FG . في هذه الحالة يكون لدينا:

$$a.EF = FG^2$$



الشكل رقم (٢ - ١)^(١)

البرهان: $GF \perp EF$ فيكون $GF \perp (ABC)$ وبالتالي $GF \perp BC$ و $GF = (EFG) \cap (BGC)$. وللبرهان على ذلك نفرض أن GF' خط موجود في السطح (BGC) وأن $GF' \perp BC$ ؛ عند ذلك يكون GF و GF' عمودين على BC خارجين من النقطة نفسها، وهذا محال.

(*) انظر: أبولونيوس، المخروطات (استنبول، مخطوطة آيا صوفيا، ٢٧٦٢)، الكتاب الأول، القضية XI.

(١) ترقم الأشكال إضافة من قبلنا؛ والأحرف الأبجدية اللاتينية على الأشكال، تقابل أحرفاً عربية في النص الأصلي (A = أ؛ B = ب؛ ج = C؛ ...).

بناء على ما تقدم يكون لدينا:

$$CF \cdot BF = GF^2 \quad (\text{قدرة النقطة } F \text{ بالنسبة إلى الدائرة } BGC).$$

ولنتبر أن I نقطة على AC بحيث يكون $EI // BC$ ؛ فيكون لدينا $EI = FC$ وبالتالي:

$$EI \cdot BF = GF^2.$$

$$\text{ولكن } BE = EF \text{ مما يعطي } \widehat{BFE} = \frac{\pi}{4} \text{ و } \widehat{B} = \frac{\pi}{4} \text{ وبالتالي } \widehat{BEF} = \widehat{EAI} = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{و } BF^2 = 2EF^2 \text{ . ولكن } \widehat{B} = \widehat{AEI} \text{ و } \widehat{C} = \widehat{AIE} \text{ ، فيكون } AE = AI \text{ و } EI^2 = 2AE^2$$

كما أن $EH^2 = 4AE^2$ وبالتالي يكون $EH^2 = 2EI^2$ ؛ من هنا تنتج العلاقة:

$$\frac{EH}{EI} = \frac{BF}{EF} \quad \text{و} \quad \frac{EH^2}{EI^2} = \frac{BF^2}{EF^2}$$

التي تعطي

$$EH \cdot EF = EI \cdot BF = GF^2 ,$$

ومنها

$$a \cdot EF = FG^2.$$

وهي خاصية تتمتع بها أية نقطة F من قطر القطع المكافئ \mathcal{P} .

تعليق

في حالة مخروط دائري حيث $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{2}$ ، يبرهن الطوسي أنه إذا كان \mathcal{Q} هو القطع المكافئ، وإذا كان (x, y) إحداثيي أية نقطة M من \mathcal{Q} بالنسبة إلى محورين مميزين: $x = GF$ و $y = EF$ ، عند ذلك يحقق x و y (وهما إحداثيا M) العلاقة $ay = x^2$ حيث a عدد مُعطى ($a = 2AE$). لكن الطوسي لا يدرس القضية العكسية، أي القضية التي تنص على أن أية نقطة $M = (x, y)$ من السطح تحقق إحداثياتها العلاقة $x^2 = ay$ هي بالضرورة نقطة من القطع المكافئ \mathcal{Q} ؛ لذلك فهو لم يعط معادلة لـ \mathcal{Q} بالشكل الكامل.

ومن جهة أخرى، في حالة مخروط دائري، بشكل عام $(\frac{\pi}{2} \neq \widehat{BAC})$ ، إذا وضعنا $\alpha = \widehat{BAC} = \widehat{BEF}$ يكون لدينا:

$$BF = 2EF \sin \frac{\alpha}{2} ,$$

$$EI = 2AE \sin \frac{\alpha}{2} = FC ;$$

وإذا وضعنا $EF = y$ ، $GF = x$ ، استناداً إلى العلاقة :

$$GF^2 = BF \cdot FC$$

يمكن أن نكتب :


$$x^2 = y \times 4AE \sin^2 \frac{\alpha}{2}.$$

وهذه العلاقة لها الشكل $x^2 = ay$ حيث $a = 4AE \sin^2 \frac{\alpha}{2}$ وفي حال $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ، $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}$ ، نحصل على ما توصل إليه الطوسي ($a = 2AE$) .

البناء الأول

بناء قطع مكافئ ضلعه القائم a :

نأخذ $AB = a$ ، ونسمي E منتصف AB . ومن ثم نخرج من E الخط ED ، $ED \perp AB$ ونأخذ على AB النقطة C بحيث يكون $EC = ED$ ؛ نجعل CD وننصفها على النقطة G (الشكل رقم (٢ - ٢)) ، فيكون $EG \perp DC$. ومن النقطة B نخرج BI ، $BI \parallel ED$ ، I على CD . دوران المثلث EGD ^(٢) حول EG (حتى انطباقه على المثلث EGC (المترجم)) يُحدث نصف مخروط \mathcal{C} . إذا كان Q سطحاً يمر بـ BI ، $Q \perp (EDC)$ ، يكون $Q \cap \mathcal{C}$ هو القطع المكافئ المطلوب .



الشكل رقم (٢ - ٢)

تعليق

لا يستخدم المؤلف سوى تعريف القطع المكافئ كقطع مسطح لمخروط دائري زاويته الرأسية قائمة .

(٢) الدوران الوهمي (نتوهم حركة مثلث ... بحسب تعبير الطوسي). (المترجم).


القضية ٢

لنأخذ قطعاً زائداً \mathcal{H} ، قطره المجانب EG ، ونقطة K من هذا القطر يقابلها خط الترتيب KI . عندها يكون لدينا:

$$(EG + EK) \cdot EK = IK^2 \quad (\text{الشكل رقم (٢ - ٣)})$$

البرهان: نسمي B رأس المخروط \mathcal{H} ونأخذ $BA = BC$ و $BD \perp AC$ ؛ فالزاوية ABC قائمة، ودوران المثلث BDC حول BD (حتى انطباقه على المثلث BDA (المترجم)) يُحدث نصف مخروط، و DC يحدث نصف دائرة في سطح قائم على (BAC) .

لنأخذ E على BC ولنأخذ $KE // BD$. معنا $\widehat{BEG} = \widehat{EBD}$ و $\widehat{EBD} < \frac{\pi}{2}$ ، لذلك $\widehat{BEG} < \frac{\pi}{2}$. وبما أن $\widehat{EBA} = \frac{\pi}{2}$ ، يكون $\widehat{BEG} + \widehat{EBG} < \pi$. لذلك يلتقي امتداد EK امتداد AB في نقطة نسميها G .



الشكل رقم (٢ - ٣)

نفرض أن Q سطح يحتوي KG بحيث يكون $Q \perp (ABC)$ ، عند ذلك يكون لدينا القِطْع الزائد $Q \cap \mathcal{H} = \mathcal{H}$ ويكون EG قطره المجانب. ونفرض أن LKM خط موازٍ لـ AC وأن (LIM) هو السطح المحتوي على LKM ، بحيث يكون

(٣) انظر الهامش رقم (٢) السابق. (المترجم).

$LKM \perp BD$ لكن $(LIM) \cap \mathcal{C}$ فيكون التقاطع $(LIM) \perp (ABC)$ ؛
و $IK = Q \cap (LIM)$ لسبب مماثل لما ورد في القضية ١. كما أن $\widehat{EKM} = \frac{\pi}{2}$
و $\widehat{EMK} = \frac{\pi}{4}$ ؛ لذلك $\widehat{MEK} = \frac{\pi}{4}$ و $EK = KM$ وبطريقة مماثلة نحصل على
 $\widehat{GKL} = \frac{\pi}{2}$ ، $\widehat{GLK} = \frac{\pi}{4}$ ؛ لذلك $\widehat{LGK} = \frac{\pi}{4}$ و $GK = KL$ لكن
 $KM \cdot KL = KI^2$ ، (قدرة K)،

وبالتالي:

$$KE \cdot KG = KI^2.$$

وهذه العلاقة قائمة بالنسبة إلى أية نقطة K من القطر.

تعليق

في حالة كون المخروط دورانياً، $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{2}$ و Q موازياً لمحور المخروط،
يكون \mathcal{C} قطعاً زائداً متساوي الأضلاع. وبرهن الطوسي أنه إذا كان (x, y) إحداثيي
نقطة M ، من \mathcal{C} بالنسبة إلى محورين متعامدين $OK = x$ ، $KI = y$ ، حيث O هي
النقطة المنصّفة لـ EG ، فعندها يكون:

$$x^2 - y^2 = a^2$$

حيث a هو نصف القطر المجانب، $a = OE$. ولتبيان ذلك نلاحظ أن العلاقة
 $KI^2 = KE \cdot KG$ تُكتب:

$$KI^2 = (KO + OE) \cdot (KO - OE) = KO^2 - OE^2$$

وتعطي بالتالي $y^2 = x^2 - a^2$.

وعلى غرار ما ورد في القضية ١ لا يتطرق الطوسي إلى القضية العكسية.

وفي حالة مخروط دوراني عادي $\widehat{ABC} = \alpha$ وحيث $Q // BD$ يكون لدينا:

$$LK = KG \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \quad \text{و} \quad KM = KE \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$$

فإذا ما وضعنا


$$x = OK, y = IK, b = \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}, a = OE$$

تكون العلاقة $KI^2 = KE \cdot KG$ مكافئة للعلاقة:

$$x^2 - \frac{y^2}{b^2} = a^2.$$

القضية ٣

نفرض أن \mathcal{M} قطع زائد محيطه BC ، قطره AM وقطره المجانب AB وأن E هي منتصف AB وأن $BH \perp AB$ بحيث يكون $BH = BE$. في هذه الحال يكون EH خطأً مقارباً للمحيط BC . (الشكل رقم (٢ - ٤)).



الشكل رقم (٢ - ٤)

البرهان: نأخذ C على \mathcal{M} و $CG \perp AB$. فيكون $\widehat{EBH} = \frac{\pi}{2}$ و $\widehat{BEH} = \widehat{BHE} = \frac{\pi}{4}$. لكن $\widehat{EGC} = \frac{\pi}{2}$ ، لذلك فإن GC يقطع حتماً EH ، في نقطة نسميها I . نأخذ K على EH ، بحيث يكون $CK \perp EH$ ، وكذلك L على EH بحيث يكون $BL \perp EH$. فبما أن $\widehat{GEI} = \frac{\pi}{4}$ و $\widehat{EGI} = \frac{\pi}{2}$ ، يكون $\widehat{GIE} = \frac{\pi}{4}$ ، لذلك $GE = GI$ ، ومن هنا نحصل على:

$$(EG + GC) \cdot CI + GC^2 = GI^2 = GE^2,$$

ومن جهة أخرى لدينا:

$$AG \cdot BG + EB^2 = EG^2,$$

فيكون لدينا :

$$AG \cdot BG + EB^2 = (EG + GC) \cdot CI + GC^2$$

لكن

$$AG \cdot BG = GC^2 ,$$

فيكون لدينا

$$EB^2 = (EG + GC) \cdot CI ,$$

وبالتالي

$$\frac{EG + GC}{EB} = \frac{EB}{CI} .$$

وبما أن $EG + GC > EB$ ، يكون $EB > CI$ ، وبما أن $\widehat{ELB} = \frac{\pi}{2}$ و $\widehat{BEL} = \frac{\pi}{4}$ ، يكون $\widehat{EBL} = \frac{\pi}{4}$ و $EL = BL$ ، وبالتالي :

$$EB^2 = EL^2 + LB^2 = 2BL^2 .$$

وبما أن $\widehat{CIK} = \frac{\pi}{4}$ و $\widehat{CKI} = \frac{\pi}{2}$ يكون $CK = KI$ و $\widehat{ICK} = \frac{\pi}{4}$ ، وبالتالي :

$$CI^2 = CK^2 + KI^2 = 2CK^2 .$$

من هنا نستنتج أن $BL^2 > CK^2$ وبالتالي $BL > CK$.

وعلى غرار ما تقدم، نفرض أن D نقطة من \mathcal{M} وأن $DM \perp AB$ وأن DM تقطع EH في النقطة N ؛ كما نفرض أن $SD \perp EH$ بحيث تكون النقطة S على EH . عندئذٍ، إذا كان $EM > EG$ نبين بطريقة مماثلة أن $CK > DS$. هكذا يظهر إذن أن EH تقترب من \mathcal{M} بلا نهاية^(٤). أضف إلى ذلك أن EH و \mathcal{M} لا يلتقيان إطلاقاً.

فإذا فرضنا أن \mathcal{M} و EH يلتقيان، نأخذ من إحدى نقاط التقائهما U ، عموداً هو UO على AB فيكون $UO = OE$ وبالتالي :

$$AO \cdot OB = OU^2 = OE^2 ,$$

لكن لدينا

$$OE^2 = AO \cdot OB + EB^2 ,$$

وبالتالي

$$AO \cdot OB = AO \cdot OB + EB^2 ,$$

وهذا خُلف. لا يمكن إذن التقاء EH و \mathcal{M} .

(٤) لانهايتاً (Indéfiniment)، «أبدأ» بحسب تعبير الطوسي.

تعليق

لنفرض أن E هي النقطة المنصّفة للقطر المجانب لـ \mathcal{H} وأن $EB = a$. عندئذٍ يكون الخط المستقيم Δ الذي يمرّ بـ E والذي يُحدِّث مع المستقيم EB زاوية تساوي $\frac{\pi}{4}$ ، هو خط مقارب للقطع الزائد \mathcal{H} .

ملاحظة: قبل أن نعود إلى برهان الطوسي نسجّل معنى مفهوم الابتعاد: القول بأن النقطة C أكثر ابتعاداً من النقطة B على المنحني \mathcal{H} يعادل القول بأن المسافة من النقطة E إلى المسقط العمودي لـ C على القطر المجانب AB أكبر من المسافة من E إلى مسقط B على AB (وهو B نفسه)، أي أن $EG > EB$. وكذلك، القول بأن D أكثر ابتعاداً من C على \mathcal{H} يعادل القول إن $EM > EG$.

لنفرض أن Δ هو المستقيم EL وأن $d(X, \Delta)$ هي المسافة بين نقطة X من \mathcal{H} إلى Δ . يبرهن الطوسي أن $d(B, \Delta) < d(C, \Delta)$ ، ويقول إن العلاقة $d(D, \Delta) < d(C, \Delta)$ تبرهن بالطريقة نفسها، إلا أن برهانه غير مكتمل.

وفي الواقع نستطيع أن نكمل هذا البرهان انسجماً مع طريقته، كما يلي:

نعلم أن $EM = MN$ فيكون $DN = EM - MD$ وبالتالي يكون:

$$(EM + MD) \cdot DN + MD^2 = EM^2.$$

كما أن $EA = EB$ وبالتالي $AM = EM + EB$ فيكون:

$$AM \cdot BM + EB^2 = EM^2.$$

وبما أن $D \in \mathcal{H}$ ، فإن $MD^2 = MA \cdot MB$ ومنها:

$$(EM + MD) \cdot DN = EB^2.$$

وكذلك، بما أن $C \in \mathcal{H}$ يكون:

$$(EG + GC) \cdot CI = EB^2.$$

مما يعطي:

$$\frac{EM + MD}{EG + GC} = \frac{CI}{DN}$$

لكن $\frac{CI}{DN} = \frac{CK}{DS}$ (انظر المثلثين CIK و DNS) فيكون:

$$\frac{EM + MD}{EG + GC} = \frac{CK}{DS}.$$

لكننا نفترض أن D أكثر ابتعاداً من C على \mathcal{H} ، إذن $EM > EG$ ، $AM > AG$ ،

و $BM > BG$. من هنا نستنتج أن :

$$MA . MB > GA . GB \text{ وبالتالي } MD^2 > GC^2 \text{ أي } MD > GC .$$

يكون لدينا إذن $EM + MD > EG + GC$ ومن هنا نستنتج أن $CK > DS$. فبالنسبة إلى أي زوج (C, D) من نقاط \mathcal{M} حيث يكون D أكثر ابتعاداً من C على \mathcal{M} ، يكون لدينا إذن $d(D, \Delta) < d(C, \Delta)$. نسجل هنا بأن هذا البرهان كامل في «الكتيب» (انظر المقدمة).

بعد ذلك يبرهن الطوسي أن Δ و \mathcal{M} لا يلتقيان . لكنه لا يبرهن أن ابتعاد D بغير نهاية على \mathcal{M} يجعل المسافة $d(D, \Delta)$ تـجـنـ^(٥) إلى الصفر . وهذا ما يمكن القيام به استناداً لأسلوب الطوسي كما يلي :

لدينا

$$d(D, \Delta) = DS = \frac{DN}{\sqrt{2}} = \frac{EB^2}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{EM + MD}$$

فليكن ε عدداً موجباً صغيراً بالقدر الذي نريده . لكي نحصل على $DS < \varepsilon$ ، يكفي أن نجعل $\frac{1}{EM + MD} < \varepsilon_1$ حيث $\frac{\varepsilon\sqrt{2}}{EB^2} = \varepsilon_1$.

ومهما كان وضع النقطة D على \mathcal{M} ، يكون $EM > MD$ وبالتالي :

$$EM + MD > 2MD ,$$

فيكون

$$\frac{1}{EM + MD} < \frac{1}{2MD} ,$$

يكفي إذن جعل $\frac{1}{2MD}$ أصغر من ε_1 ، أي $MD > \frac{1}{2\varepsilon_1}$ ؛ وعند ذلك يكون لدينا :

$$ME^2 > \frac{1}{4\varepsilon_1^2} + EB^2$$

ذلك لأن

$$ME^2 = MD^2 + EB^2 .$$

وهكذا، فلكل $\varepsilon > 0$ توجد نقطة M على محور القطع الزائد \mathcal{M} ، تحقق النقطة D التي تقابلها على \mathcal{M} العلاقة $d(D, \Delta) < \varepsilon$. الخط Δ هو إذن خط مقارب لـ \mathcal{M} .

(٥) تميل إلى الصفر (تقارب الصفر) . (المترجم) .

القضية ٤

ليكن \mathcal{M} قطعاً زائداً قمته B وخطه المقارب ES وقطره المجانب $2EB$ وليكن BL عموداً على ES ولتكن D نقطة من \mathcal{M} و $SD \perp LS$. عندئذٍ يكون لدينا $ES \cdot SD = EL^2$.

البرهان: لدينا $EM = MN$ فيكون $(EM + MN)^2 = 4EM^2$ ولدينا أيضاً:

$$EN^2 = EM^2 + MN^2 = 2EM^2$$

فيكون

$$(DS + SN)^2 = 2DN^2 \quad \text{و} \quad (EM + MN)^2 = 2EN^2$$

وبالتالي

$$\frac{(EM + MN)^2}{EN^2} = \frac{(DS + SN)^2}{DN^2},$$

أي

$$\frac{EM + MN}{EN} = \frac{DS + SN}{DN},$$

وبالتالي

$$(EM + MN) \cdot DN = (DS + SN) \cdot EN.$$

لكن

$$(EM + MN) \cdot DN = (EM + MD) \cdot DN + DN^2,$$

كما أن

$$(DS + SN) \cdot EN = (DS + SN) \cdot ES + (DS + SN) \cdot SN.$$

وأن

$$(DS + SN) \cdot SN = DN^2,$$

فيكون

$$(DS + SN) \cdot ES = (EM + MD) \cdot DN = EB^2,$$


وذلك بسبب ما تقدم في القضية ٣. من هنا نحصل على:

$$DS \cdot ES = \frac{EB^2}{2} = EL^2.$$

وكذلك، بما أن:

$$EK \cdot KC = EL^2,$$

مفروض (الشكل رقم (٢ - ٧)).




الشكل رقم (٢ - ٧)

نأخذ E على BD بحيث $BE = BD$. بواسطة البناء ٣، نبني قطعاً زائداً قطره المجانب DE ومقاربه AB . هذا القطع الزائد لا يلتقي BC .

تعليق

من المعطيات أن D هو رأس القطع الزائد و B مركزه؛ كما أن BD هو قطره المجانب وهو إذن معطى. وهذا ما يرد العمل إلى البناء رقم ٣.

البناء الخامس



الشكل رقم (٢ - ٨)

بناء قطع زائد مقاربه AB و AC و A هي النقطة المنصرفة للقطر المجانب)، $AC \perp AB$ ، ويمر بنقطة D أقرب إلى AB من AC (الشكل رقم (٢ - ٨)).

نأخذ E على AB ونأخذ G على AC بحيث $AG^2 = AE \cdot ED$ ، على AB بحيث $AI = AG$ ، وأخيراً M ، النقطة الرابعة في المربع $AIMG$. نبني القطع الزائد ذا الرأس M والقطر المجانب $2AM$ وذا

المقاربين AB و AC وذلك بواسطة البناء ٤. القطع المذكور يمر بالضرورة بـ D وإلا يحصل:

$$AG^2 = AE \cdot X,$$

حيث $X > ED$ أو $X < ED$ وهذا خلف.

النقطة D توجد إذن على القطع الزائد الذي يقترب بغير نهاية من AB - وبالتالي من AC ، ذلك لأنه إذا كان $HM \perp AM$ و $H \in AB$ ، يكون $HM = AM$ (بناء الخط المقارب بواسطة القضية ٣).

تعليق

يستدل الطوسي في برهانه بالطريقة التالية: إذا لم يمر \mathcal{H} بـ D فإنه يمر بنقطة أخرى $D' \neq D$ ، لها المسقط E نفسه على AB . فيكون معنا $AG^2 = AE \cdot ED'$ ، $ED' \neq ED$ ، فيكون $AG^2 \neq AE \cdot ED$ وهذا خُلف لأن G قد بني بحيث يكون:

$$AG^2 = AE \cdot ED.$$

يبرهن المؤلف إذن، بشكل صريح، أن $x \cdot y = \frac{a^2}{2}$ (حيث a هو نصف القطر المجانب) هي معادلة القطع الزائد. فلقد سبق وبرهن في القضية ٤ أن أي نقطة $M(x, y)$ من القطع الزائد \mathcal{H} تحقق $x \cdot y = \frac{a^2}{2}$ ، وهنا يبين أن أي نقطة $D(x, y)$ تحقق $x \cdot y = \frac{a^2}{2}$ ($\frac{a^2}{2} = AG^2$) موجودة على \mathcal{H} . هذه الخاصية تميز إذن نقاط القطع الزائد. في المقدمة يُعرّف الطوسي القطع المكافئ والقطع الزائد والقطع الناقص، على أساس أنها تقاطع مسطح لمخروط دائري ذي زاوية رأسية قائمة.

في القضية ١، يبرهن أن أي نقطة (x, y) من القطع المكافئ تحقق $x^2 = a \cdot y$ ، ولا يبرهن القضية العكسية؛ لكنه عبر رسالته يعتبر أن القطع المكافئ \mathcal{P} متميز بـ:

$$\mathcal{P} = \{(x, y), x^2 = a \cdot y\}.$$

من ثم يعتمد إلى بناء قطع مكافئ حيث a معطى مسبقاً. ونسجل الملاحظة نفسها بالنسبة إلى القضية ٢ حيث يعتبر أن القطع الزائد \mathcal{H} متميز بـ:

$$\mathcal{H} = \{(x, y), x^2 - y^2 = a^2\}.$$

في القضية ٣، يعطي الخاصية المميزة للخطين المقاربين للقطع الزائد متساوي الأضلاع.

في القضية ٤ المكتملة في ما بعد بالبناء الخامس، يثبت معادلة القطع الزائد بالنسبة إلى خطيه المقاربين:

$$\mathcal{H} = \left\{ (x, y); xy = \frac{a^2}{2} \right\}.$$

بعد ذلك، يقوم بأربعة إنشاءات. الإنشاء الأول هو إنشاء لقطع زائد ذي قطر مجانب مفروض a . الثاني هو بناء لقطع زائد حيث a معطى وكذلك خطه المقارب ومركزه. الإنشاء الثالث هو بناء لقطع زائد خطاه المقاربين مفروضان وكذلك رأسه.

والإنشاء الأخير هو بناء لقطع زائد خطاه المقاربان مفروضان ويمر بنقطة مفروضة. هذه الإنشاءات مرتبة حيث إن كلا منها يستعمل ما سبقه.

هذه التعريفات والقضايا والإنشاءات تسمح للطوسي بأن يوفر على قارئه عدم الرجوع إلى كتاب آخر غير كتابه. أما اكتفاؤه بمخروط دائري ذي رأس بزاوية قائمة فيعود إلى مستلزمات دراسته اللاحقة.

تصنيف المعادلات والمعادلات ذات الحدين

في مقدمة هذا الفصل يبدأ الطوسي، على خطى الخيام، بتحديد الوحدات القياسية: الوحدة الخطية، الوحدة السطحية، والوحدة المجسمة. فهكذا يمكن لمعادلة ما أن تعبر عن مسألة عددية أو عن مسألة مساحات أو عن مسألة أحجام. ومن ثم يعطي التصنيف التالي للمعادلات:

١ - المعادلات ذات الحدين

$$\begin{array}{llll} (١) & x = c & (٢) & x^2 = c \\ (٣) & x^2 = bx & (٤) & x^3 = ax^2 \\ (٥) & x^3 = bx & (٦) & x^3 = c \end{array}$$

٢ - المعادلات كثيرة الحدود

٢ - ١: المعادلات التي لا تحوي x^3 و c في آن واحد:

$$\begin{array}{llll} (٧) & x^2 + bx = c & (٨) & bx + c = x^2 \\ (٩) & x^2 + c = bx & (١٠) & x^3 + ax^2 = bx \\ (١١) & x^3 + ax^2 = bx & (١٢) & x^3 + bx = ax^2 \end{array}$$

٢ - ٢: المعادلات التي تحوي x^3 و c معاً.

٢ - ١: المعادلات التي تحوز دائماً على حل:

$$\begin{array}{llll} (١٣) & x^3 + bx = c & (١٤) & c + bx = x^3 \\ (١٥) & x^3 + ax^2 = c & (١٦) & c + ax^2 = x^3 \\ (١٧) & x^3 + ax^2 + bx = c & (١٨) & c + bx + ax^2 = x^3 \\ (١٩) & x^3 + ax^2 = bx + c & (٢٠) & x^3 + bx = ax^2 + c \end{array}$$

٢ - ٢: المعادلات التي ليس لها دائماً حل:

$$\begin{array}{llll} (٢١) & x^3 + c = ax^2 & (٢٢) & x^3 + c = bx \\ (٢٣) & x^3 + ax^2 + c = bx & (٢٤) & x^3 + bx + c = ax^2 \\ (٢٥) & x^3 + c = ax^2 + bx \end{array}$$

وخلافاً للخيتام الذي كان تصنيفه جبرياً^(٦) بحثاً، إذ ارتكز على درجة المعادلة وعلى تشكيل طرفيها، يعطي الطوسي تصنيفاً بعدياً - بمعنى أنه قد حصل بعد دراسة كل من هذه المعادلات (المترجم) - يعتمد، بخاصة في قسمه الأخير، على وجود الحلول. فالمعادلات (١) هي المعادلات التي تعود إلى استخراج الجذر؛ والمعادلات (٢ - ١) هي معادلات الدرجة الثانية، أو تلك التي تؤول إليها؛ المعادلات (٢ - ٢ - ١) هي جميعها معادلات من الدرجة الثالثة يمكن حلها^(٧)؛ والمعادلات (٢ - ٢ - ٢) هي معادلات من الدرجة الثالثة لا تحوز دائماً على حل.

في الموجز الذي يلي، سنعمد الاصطلاحات التالية:

- ℓ ، p ، s ، هي وحدات القياس الخطية، السطحية والمجسمة، تنالياً؛

- x_ℓ ، x_p ، x_s تشير إلى الحلول الخطية، السطحية والمجسمة تنالياً:

$$x_\ell = x \cdot \ell \quad , \quad x_p = x \cdot p = x_\ell \cdot \ell \quad , \\ x_s = x \cdot s = x_p \cdot \ell = x_\ell \cdot p$$

(٦) يعطي الخيتام التصنيف التالي:

I. المعادلات البسيطة: ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦.

II. المعادلات المركبة:

II. ١. المعادلات ثلاثية الحدود: ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ٢١، ٢٢.

II. ٢. المعادلات رباعية الحدود:

II. ١. ٢. المعادلات التي لا يحوي طرفها الثاني سوى عنصر واحد: ١٧، ١٨، ٢٣، ٢٤.

II. ٢. ٢. المعادلات التي يحوي طرفها الثاني عنصرين: ١٩، ٢٠، ٢٥. لكن الخيتام يتبنى من

الناحية العملية تصنيفاً آخر:

I. المعادلات المحلولة من دون المقاطع المخروطية: ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢.

II. المعادلات المحلولة بالمقاطع المخروطية:

II. ١. معادلة بسيطة: ٦.

II. ٢. ست معادلات ثلاثية الحدود: ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ٢١، ٢٢.

II. ٣. سبع معادلات رباعية الحدود: ١٧، ١٨، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٠، ٢٥. على هذا الأساس

فإن تصنيف الخيتام، النظري أو العملي، يبدو تصنيفاً استثنائياً (سابقاً للتجربة أو الاستدلال).


(٧) الحل بالنسبة إلى رياضي ذلك العصر، هو الحل الحقيقي الموجب.

المعادلات ذات الحدين

$$x = c$$

المعادلة ١ :

لنفرض أن ℓ ، p ، s تشير إلى الوحدات القياسية، الخطية والسطحية والجسمية تتالياً. يعالج الطوسي هذه المعادلة بثلاثة أشكال مختلفة، تبعاً للمجال الذي يعتبر أنها ضمنه. فهو يبدأ بحلها في فضاء ذي بعد واحد، ومن ثم في فضاء ذي بعدين، وأخيراً في فضاء ذي ثلاثة أبعاد (الشكل رقم (٢ - ٩)).



الشكل رقم (٢ - ٩)

الحل الخطي: نمثل الوحدة الخطية ℓ بالخط AB ونأخذ $b = c \ell$ ممثلاً بالخط AC . نبني من ثم $AC = DH$ ؛ فيكون DH هو الحل الخطي.

الحل السطحي: نأخذ $EA \perp AC$ و $GC \perp AC$ بحيث يكون $EA = CG = AB = \ell$ فإذا سمينا P المساحة $AEBC$ يكون لدينا: $P = cp$.

لنفرض الآن $ID = KH = \ell$ ، $KH \perp DH$ ، $ID \perp DH$. عند ذلك تكون مساحة المستطيل $DIKH$ هي الجذر السطحي المطلوب.

الحل المجسم: نفرض أن S هو حجم متوازي السطوح ذي القاعدة $AEBC$ والارتفاع ℓ ، وأن S' هو حجم متوازي السطوح ذي القاعدة $DIKH$ وذو الارتفاع ℓ نفسه. عند ذلك يكون لدينا:

$$S = cs ;$$

ويكون S' هو الحل المجسم.

تعليق


يبدو مسار الطوسي هنا بديهياً. لكننا سنحلله من أجل ما سيتبع من مسائل.
بحسب كون c تمثل طولاً أو مساحة أو حجماً، يكون للمعادلة حل خطي، سطحي أو مجسم. ونحصل على جميع الحلول بواسطة البناء الهندسي. إن مسار الطوسي هو نفسه، سواء في هذه المسألة أم في المسائل التي تليها ويتألف هذا المسار من مرحلتين:

١ - وجود الحل ، ٢ - احتساب الحل.

هاتان المرحلتان تختلطان أحياناً بحيث لا يمكن التفريق بينهما، لأن إمكانية احتساب الحل تعني بشكل طبيعي أنه موجود. هكذا، إذاً، من أجل مسألة وجود الحل، يبني الطوسي $c.p$ ، $c.s$ و $c.s$ ومن ثم يبني الأشكال الهندسية التي تساويها بالتالي والتي تمثل مختلف الحلول. أما بالنسبة إلى الاحتساب، فطالما أن c معطى، تُقاس x على أنها c في كل من هذه الأبعاد.

المعادلة ٢: $x^2 = c$

نأخذ مستطيلاً (AB) مساحته $c.p$ ، $c.p = (AB)$ ؛ ونبني مربعاً (CE) مساوياً في المساحة للمستطيل (AB) - بناء ضلع المربع يتم بحسب إقليدس ١٤ (المقصود القضية ١٤ من الكتاب الثاني من الأصول)^(٨). نأخذ متوازيي السطوح S و S' على القاعدتين (AB) و (CE) تتالياً، وبارتفاع هو ℓ . بما أن $(AB) = (CE)$ وأن الارتفاع هو نفسه، ℓ ، يكون لدينا $S = S'$. لكن $S = c.s$ بالإضافة إلى أن (CE) هو مربع سطحي و (S') هو مربع جسمي. هكذا نكون قد وجدنا مربعاً سطحياً، (CE) ، مساوياً لـ $c.p$ ، ومربعاً مجسماً، S' ، مساوياً لـ $c.s$. من ثم نستخرج الجذر c فيكون لدينا الحل المطلوب (الشكل رقم (٢ - ١٠)).



الشكل رقم (٢ - ١٠)

(٨) انظر: عمر الخيام، رسائل الخيام الجبرية، حققها وترجمها وقدم لها رشدي راشد وأحمد جبار، مصادر ودراسات في تاريخ الرياضيات العربية؛ ٣ (حلب: معهد التراث العلمي العربي، ١٩٨١)، ص ٢٠.

تعليق

عندما يشير الطوسي إلى بناء هندسي للضلع CI ، فإنه يبرهن وجود حلّ يكون قياس مربعه إما مساحة أو حجماً؛ والمساحة هي مساحة مربع مسطح، والحجم هو حجم مربع مجسم. فإذا فرضنا أن $CI = x\ell$ ، يكون لدينا:


$$(CE) = (AB) \Rightarrow x^2 p = cp$$

$$S = S' \Rightarrow x^2 s = cs;$$

وفي الحالتين نحصل على $x^2 = c$ ومنها يأتي الحل $x = \sqrt{c}$.

$$x^2 = bx \quad \text{المعادلة ٣:}$$

هذه المعادلة يمكن إرجاعها إلى المعادلة ١. (الشكل رقم (٢ - ١١)).



الشكل رقم (٢ - ١١)

نأخذ $AB = b\ell$ و $AC = CD = DB = \ell$ ، بحيث يكون $CH \perp AB$ ونأخذ المربع (AG) ذا الضلع AB ومن ثم $CH \perp AB$ ، فيكون $DI \perp AB$ ، ونأخذ $AK = \ell$ ، $CH = DI = AB$ ، عند ذلك يكون كل من (AH) ، (HD) ، (DG) جذراً سطحياً، وعدد هذه الجذور هو b . وإذا فرضنا أن x_p جذر سطحي، يكون:

$$(AG) = b \cdot x_p$$

من جهة أخرى، $(AM) = b.p$ و $(AM) = x_p$ ، فيكون بالتالي:

$$x_p = b.p .$$

لنفرض أن S هو المجسم ذو القاعدة (AG) والارتفاع ℓ وأن x جذر جسمي. عند ذلك يكون:

$$S = b \cdot x_s = x^2.s$$

لكن S' ، وهو المجسم ذو القاعدة (AM) والارتفاع ℓ ، يحقق العلاقة التالية $S' = b.s$. ومن جهة أخرى، لدينا:

$$\frac{x^2}{x} = \frac{x}{1} \quad \text{لأن}$$

$$\frac{(AG)}{(AM)} = \frac{AB}{AK} = \frac{(AH)}{(AL)} ,$$

فيكون

$$\frac{x^2 \cdot p}{x \cdot p} = \frac{x \cdot p}{p}$$

و

$$\frac{S}{S'} = \frac{(AG)}{(AM)} = \frac{AB}{AK} = \frac{(AH)}{(AL)} = \frac{S'}{S''} ,$$

حيث S'' هو المجسم ذو القاعدة (AL) والارتفاع ℓ ؛ ومن هنا ينتج:

$$\frac{x^2 \cdot s}{x \cdot s} = \frac{x \cdot s}{s} .$$

تعليق

نبني المربع ذا الضلع $\ell \cdot b$ ، عند ذلك يكون الحل السطحي هو المستطيل ذو الطول $b \cdot \ell$ والعرض ℓ . بما أن المربع يحوي b مستطيلاً من هذا النوع وبما أن ضلعه هو $b \cdot \ell$ ، يكون لدينا:

$$x^2 = bx.$$

في ما يتعلق بالحل الجسمي x ، فهو متوازي السطوح المبني على المستطيل الذي وجدناه، بارتفاع ℓ .


وبالطريقة الحسابية، فإن العلاقة $x^2 = bx$ تعادل $x = b$ (إذا ما استثنينا الحل الصفر) لأن $\frac{x^2}{x} = \frac{b}{1}$. وبما أن $\frac{x^2}{x} = \frac{b}{1}$ ، يكون لدينا $x = b$ (في البعدين).

ملاحظة: يعتمد الطوسي طريقة مساواة النسب، وفي كل من هذه النسب يكون حدًا النسبة من البعد ذاته، وهكذا تبقى النسبة نفسها مهما كان البعد. وهذا يعني أن

الحل، كما في المعادلة الأولى، مستقل عن الفراغ الذي يجري العمل ضمنه.

$$x^3 = a \cdot x^2 \quad \text{المعادلة ٤ :}$$

هذه المعادلة تعود أيضاً إلى المعادلة ١. (الشكل رقم (٢ - ١٢)).



الشكل رقم (٢ - ١٢)

لنأخذ $AB = a\ell$ و $AC = CD = DB = \ell$ ^(٩)، الوحدات ^(١٠) التي يحويها AB ؛ ونأخذ $CH \perp AB$ ، $DI \perp AB$ ، $CH = DI = a\ell$ ، $AK = \ell$ و $AK \perp DB$ ، لنفرض أن x_s جذر جسمي وأن x_s^2 مربع جسمي وليكن S_1 المجسم ذا القاعدة (AM) والارتفاع ℓ و S_2 المجسم ذا القاعدة (AG) والارتفاع نفسه. عند ذلك يكون $S_1 = x_s = (x \cdot s)$ و $S_2 = x_s^2$. ليكن S المكعب ذا الضلع AB ولتكن S_3 ، S_4 ، S_5 ذات القواعد (AH) ، (HD) ، (DG) ، تتالياً، وذات الارتفاع AB نفسه، وهذه المجسمات عددها a . عند ذلك يكون لدينا:

$$S = S_3 + S_4 + S_5 = aS_3.$$

(٩) نلاحظ (مثلما ورد في المعادلة ٣) أن AB تقسم إلى a وحدة وليس إلى ثلاث وحدات، لكنها طريقة في التعبير، واضحة في مجرى أسلوب الطوسي. (المترجم).

(١٠) الوحدات أو الأحاد الخطية. (المترجم).

المكعب ذو القاعدة (AL) والارتفاع (AC) هو الوحدة الجسمية s ، لذلك يكون لدينا $S_1 = a.s$ وبالتالي $x_s = a.s$ ، كما لدينا:

$$\frac{x^3}{x^2} = \frac{x^2}{x} \quad (١)$$

لأن

$$\frac{S}{S_1} = \frac{(AG)}{(AM)} = \frac{(AG) \cdot AC}{(AM) \cdot AC}$$

ويكون بالتالي لدينا:

$$\frac{x^3 \cdot s}{x^2 \cdot s} = \frac{x^2 \cdot p}{x \cdot p}$$

وإذا كان S_6 المجسم ذا القاعدة (AL) والارتفاع AB ، يكون:

$$\frac{S}{S_6} = \frac{(AG)}{(AL)},$$

وبالتالي

$$\frac{x^3 \cdot s}{x \cdot s} = \frac{x^2 \cdot p}{p}$$

و

$$\frac{x^3}{x} = \frac{x^2}{1}.$$

«وذلك ما أردنا بيانه».

تعليق

في هذه المسألة لا يتصدى الطوسي سوى للحل الجسمي - ذي البعد ٣ (المترجم) - للحصول على العلاقة (١) التي تقوده إلى المسألة (المعادلة) ٣ وبالتالي إلى المسألة ١. ونلاحظ أن المقطع الأخير من برهانه (السابق)، مخصص بشكل واضح للمعادلة ٥.

$$x^3 = bx \quad \text{المعادلة ٥ :}$$

هذه المعادلة تعود إلى المعادلة ٢ لأن:

$$\frac{x^3}{x^2} = \frac{x^2}{x} = \frac{x}{1}$$

و

$$\frac{x^3}{x} = \frac{x^2}{1},$$

لذلك $\frac{x^3}{bx} = \frac{x^2}{b}$. لكن، لدينا :

$$x^3 = bx \quad (١)$$

فيكون

$$x^2 = b \quad (٢)$$

لذلك فإن حل (٢) هو حل لـ (١) .

تعليق

عندما استعمل المجسمات في استدلاله في المقطع الأخير من المعادلة ٤ ، بين الطوسي العلاقة $\frac{x^3}{x} = \frac{x^2}{1}$ التي يستعملها في المعادلة ٥ . وهو ، من جهة أخرى يتقل من هذه العلاقة إلى :

$$\frac{x^3}{x^2} = \frac{x}{1}$$


بواسطة تبديل في المتوسطين ، وهي طريقة حسابية جبرية بحتة .

ونلاحظ أن الطوسي لا يهتم في هذه المسألة بقضية التجانس ، أي بقضية الأبعاد . وهذا ما سيعتمده في المعادلات الأخرى كما سنرى .

$$x^3 = c \quad \text{المعادلة ٦ :}$$

مقدمة : إذا كان α و β مقدارين مفروضين ، كيف يتم إيجاد مقدارين آخرين γ و δ بحيث يكون :

$$\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\delta}{\beta} \quad (\text{الشكل رقم (٢ - ١٣)})$$



M ——— L



الشكل رقم (٢ - ١٣)

ليكن $AB = \alpha$ ، $ML = \beta$ ولنفرض $AB > ML$. ولنأخذ $BC \perp AB$ و $BC = ML$ ولنأخذ القطع المكافئ \mathcal{P}_1 ذا الرأس B والمحور BC وذا الضلع القائم AB ، والقطع المكافئ \mathcal{P}_2 ذا الرأس B والضلع القائم BC والمحور AB .

ولنأخذ نقطة D على BC بحيث يكون $BD = AB$.

ولتكن K النقطة الرابعة من المربع $(ABDK)$ و $K' \in \mathcal{P}_1$ بحيث يكون $K'D \perp BD$ ؛ عند ذلك يكون:

$$AB \cdot BD = K'D^2;$$

لكن

$$AB \cdot BD = KD^2,$$

ذلك لأن $(ABKD)$ مربع؛ فيكون $K'D = KD$ وتكون K' و K النقطة نفسها.

ليكن $S \in \mathcal{P}_2$ و $AS \perp AB$ ؛ عند ذلك يكون:

$$BC \cdot AB = AS^2,$$

لكن

$$BC \cdot AB < AB^2,$$

فيكون

$$AS < AK;$$

وتكون النقطة K خارج \mathcal{P}_2 .

لتكن E نقطة على AB بحيث يكون $BE = ML$ ولتكن G النقطة الرابعة من المربع $(BEGC)$. لتكن G' النقطة من \mathcal{P}_2 بحيث يكون $EG' \perp BE$. عند ذلك يكون لدينا:

$$BC \cdot BE = EG'^2,$$

لكن

$$BC \cdot BE = EG^2,$$

ومنها $EG' = EG$ وبالتالي فإن G و G' هما النقطة نفسها.

لتكن I النقطة من \mathcal{P}_1 بحيث يكون $CI \perp BC$ ؛ لدينا:

$$AB \cdot BC = CI^2;$$

لكن

$$AB \cdot BC > CG^2 ,$$

فيكون

$$CI > CG ;$$

وتكون النقطة I داخل \mathcal{P}_2 . وبما أن القطع \mathcal{P}_1 يمر بـ I وبـ K فإنه يقطع \mathcal{P}_2 حتماً .
ليكن :

$$\{O\} = \mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 .$$

ليكن $OU \perp AB$ و $OP \perp BD$. بما أن $O \in \mathcal{P}_1$ يكون لدينا :

$$AB \cdot BP = OP^2 ,$$

وبالتالي، بما أن $BU = OP$:

$$\frac{AB}{BU} = \frac{BU}{BP} .$$

من جهة أخرى، بما أن $O \in \mathcal{P}_2$ ، لدينا :

$$BC \cdot BU = OU^2$$

وبالتالي، بما أن $OU = BP$:

$$\frac{BC}{BP} = \frac{BP}{BU}$$

فيكون

$$\frac{AB}{BU} = \frac{BU}{BP} = \frac{BP}{BC} .$$

بعد أن تم برهان هذه المقدمة، لنضع $\alpha = \ell$ ، الوحدة الخطية، و $\beta = c\ell$ ،
و $\gamma = x\ell$. استناداً إلى المقدمة نستطيع إيجاد γ و δ بحيث يكون :

$$\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\delta}{\beta} ,$$

فيكون لدينا :

$$\frac{\alpha^2}{\gamma^2} = \frac{\gamma}{\delta} \cdot \frac{\delta}{\beta} = \frac{\gamma}{\beta} ,$$

ويكون

$$\beta \cdot \alpha^2 = \gamma^3$$

لكن

$$\beta \alpha^2 = c \ell^3$$

فيكون

$$\gamma^3 = x^3 \ell^3$$

وبالتالي يكون γ هو الحل المطلوب ($\gamma = xl$).

أما احتساب x فيجري باستخراج الجذر التكعيبي للعدد c بالطريقة المشروحة في الفصل الأول.

تعليق

من أجل برهان وجود ضلع مكعب مساوٍ لـ c - أي حجمه مساوٍ لـ c (المترجم) - بيني الطوسي انطلاقاً من طولين α و β ، $\alpha > \beta$ ، طولين آخرين γ و δ بحيث تتوالى الأطوال الأربعة متناسبة.

من أجل تحديد γ و δ ، يستعمل التقاء القطعين المكافئين \mathcal{P}_1 ذي المحور AB و \mathcal{P}_2 ذي المحور BC :

$$\mathcal{P}_1 = \{(x, y) ; x \geq 0, y = \frac{1}{\alpha}x^2\}$$

$$\mathcal{P}_2 = \{(x, y) ; x \geq 0, y = \sqrt{\beta} \cdot \sqrt{x}\}.$$

ويبرهن أن \mathcal{P}_1 و \mathcal{P}_2 يتقاطعان في نقطة O ، يكون إحداثياتها الطولين المطلوبين γ و δ .
ليكن

$$f_1(x) = \frac{x^2}{\alpha}, \quad f_2(x) = \sqrt{\beta} \cdot \sqrt{x}$$

وليكن

$$f(x) = f_1(x) - f_2(x) = \frac{x^2}{\alpha} - \sqrt{\beta} \cdot \sqrt{x}$$

إن $f(x)$ معدومة (تساوي الصفر) عند $x = 0$ وكذلك عند $x = x_0 > 0$. فلدينا:

$$f(\alpha) = \alpha - \sqrt{\alpha} \cdot \beta = \sqrt{\alpha} (\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}) > 0,$$

$$f(\beta) = \frac{\beta^2}{\alpha} - \beta = \frac{\beta}{\alpha}(\beta - \alpha) < 0;$$

وبما أن الدالة f متواصلة، يوجد x_0 بين α و β ، $\beta < x_0 < \alpha$ ، بحيث يكون $f(x_0) = 0$.
ليكن $\gamma = x_0$ ؛ عند ذلك يكون لدينا:

$$\delta = f_1(x_0) = \frac{\gamma^2}{\alpha} \Rightarrow \alpha \cdot \delta = \gamma^2 \Rightarrow \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\gamma}{\delta}$$

$$\delta = f_2(x_0) = \sqrt{\beta} \cdot \sqrt{\gamma} \Rightarrow \delta^2 = \beta \cdot \gamma \Rightarrow \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\delta}{\beta}$$

وبالتالي

$$\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\delta}{\beta}$$

ملاحظة ١ : من المتساوية :

$$\frac{AB}{BU} = \frac{BU}{BP} = \frac{BP}{BC}$$

نستخلص

$$AB^2 \cdot BC = BU^3 \quad (١)$$

$$AB \cdot BC^2 = BP^3 \quad (٢)$$

مع العلم أننا فرضنا $AB > BC$.

- إذا كان $c < 1$ ، نضع $AB = \ell$ ، $BC = c\ell$ ، $BU = x\ell$ ، فيكون لدينا :

$$c\ell^3 = x^3\ell^3 \Rightarrow c = x^3 \quad (١)$$

ويكون الحل معطى بـ BU .

- إذا كان $c > 1$ ، نضع $AB = c\ell$ ، $BC = \ell$ ، $BP = x\ell$ ، فيكون لدينا :

$$c\ell^3 = x^3\ell^3 \Rightarrow c = x^3 \quad (٢)$$

ويكون الحل معطى بـ BP .

ملاحظة ٢ : يبرهن الطوسي أن نقطة \mathcal{P}_1 ، ذات الإحداثية السينية AB هي الرأس K للمربع مستخدماً في ذلك، وبشكل صريح، معادلة القطع المكافئ. ويستعمل كذلك، معادلة \mathcal{P}_2 لكي يبرهن أن K تقع خارج \mathcal{P}_2 .

بالطريقة نفسها يبرهن أن النقطة I من \mathcal{P}_1 ذات الإحداثية السينية BC تقع داخل \mathcal{P}_2 .


ملاحظة ٣ : يستعمل الطوسي المفهوم الهندسي لـ «الداخل» و«الخارج» لكي يثبت التقاء المنحنيين.

معادلات الدرجة الثانية ثلاثية الحدود

$$x^2 + bx = c \quad \text{المعادلة ٧ :}$$

فليكن $AB = b$ ولتكن C النقطة المنصّفة لـ AB (الشكل رقم (٢ - ١٤))؛ ليكن (KL) مربعاً مساحته $\frac{b^2}{4}$ وليكن :

$$(IK) = c \quad , \quad (IM) = (IK) \cup (KL) = \frac{b^2}{4} + c$$



الشكل رقم (٢ - ١٤)

نبني مربعاً ضلعه X بحيث يكون $X^2 = (IM)$ ، فيكون $X > CB$ لأن $X > \frac{b}{2}$.
نأخذ $CD = X$.

$$CD = CB + BD = \frac{b}{2} + BD$$

فيكون

$$CB^2 + c = (IM) = X^2 = (CD)^2 = CB^2 + BD^2 + 2BD \cdot CD = CB^2 + BD^2 + AB \cdot BD ;$$

وبالتالي

$$c = BD^2 + AB \cdot BD$$

ويكون BD هو الحل المطلوب، ($x = BD$).

ليكن $ED \perp BD$ و $ED = BD$ ، نُكَمِّلَ المستطيل $ADEH$ فيكون:

$$(ADEH) = AD \cdot DE = BD^2 + AB \cdot BD = C.$$

تعليق

نأخذ التحويل الأفيني:

$$x \longrightarrow x + \frac{b}{2} = X$$

فيكتب x على الشكل :

$$x = X - \frac{b}{2} ;$$

فإذا كان x حلاً للمعادلة $x^2 + bx = c$ ، يكون X حلاً للمعادلة :

$$\left(X - \frac{b}{2}\right)^2 + b\left(X - \frac{b}{2}\right) = c$$

التي تكتب كالتالي :

$$X^2 = c + \frac{b^2}{4} \quad (١)$$

فيكون $x > \frac{b}{2}$.

لكن أي X يحقق العلاقة :

$$X^2 = \left[\left(X - \frac{b}{2}\right) + \frac{b}{2}\right]^2 = \frac{b^2}{4} + \left(X - \frac{b}{2}\right)^2 + b\left(X - \frac{b}{2}\right) \quad (٢)$$

ومن العلاقتين (١) و (٢) نستنتج :

$$c = \left(X - \frac{b}{2}\right)^2 + b\left(X - \frac{b}{2}\right),$$

أي

$$c = x^2 + b.x .$$

$$\text{وبما أن } X = \left(c + \frac{b^2}{4}\right)^{\frac{1}{2}}, \text{ يكون الحل المطلوب } x = \left(c + \frac{b^2}{4}\right)^{\frac{1}{2}} - \frac{b}{2} .$$

ملاحظة : يبرهن الطوسي، عن طريق بناءات هندسية، وجود الجذر الموجب المقابل لكل مزدوج (b, c) من الأعداد الموجبة ويشير إلى طريقة احتساب هذا الجذر.

نشير إلى أن $c + \frac{b^2}{4}$ هو مميز المعادلة $x^2 + bx - c = 0$ وأن الطوسي يحتسب الجذر الموجب :

$$x = \sqrt{c + \frac{b^2}{4}} - \frac{b}{2} .$$

ولأجل حل عددي لهذا النوع من المعادلات، يعالج الطوسي أمثلة ثلاثة منها بحسب كون المرتبة السمية للموضع الأخير للجذر («المرتبة السمية للجذر الأخير») في c ، أكبر أو أصغر أو مساوية «لآخر مراتب» العدد b . [راجع المقدمة، الفقرة سادساً :


الترجمة الفرنسية] (من أجل التذكير بمعاني هذه المصطلحات، راجع المقدمة، الفقرة ثامناً: المصطلحات)^(١١).

$$x^2 = bx + c \quad \text{المعادلة ٨:}$$

ليكن $AB = b$ ، ولتكن C منتصف AB ، وليكن $(KL) = \left(\frac{b}{2}\right)^2$ و $(IK) = c$ ولتأخذ مربعاً ضلعه CD بحيث يكون:

$$CD^2 = (IK) + (KL)$$

فيكون $CD > CB$ وتكون D على امتداد CB (الشكل رقم (٢ - ١٥)).



الشكل رقم (٢ - ١٥)

ويكون لدينا:

$$c + CB^2 = BD^2 + CB^2 + 2CB.BD = BD^2 + CB^2 + AB.BD$$

(١١) في المثال الأول:

$$x^2 + 31x = 11 \overset{.}{2}9 \overset{.}{9}2 \overset{.}{3}1$$

المرتبة السمية للجذر الأخير = 2 (المئات)

المرتبة السمية لأرفع مراتب عدد الجذور = 1 (العشرات)

وفي المثال الثاني:

$$x^2 + 2012x = 7488 \overset{.}{9}3$$

المرتبة السمية للجذر الأخير = 2 (المئات)

المرتبة السمية لآخر مراتب عدد الجذور = 3، (الألوف). (المترجم).

وبالتالي

$$c = BD^2 + AB.BD = AD.DB,$$

لكن

$$AD.DB + AD.AB = AD^2,$$

فيكون

$$AB.AD + c = AD^2,$$

ويكون AD هو الحل المطلوب.

ليكن $(AE) = AD^2$ و $BG \parallel DE$ ولنفرض $BD = X$ و $AB = b$ ؛ عند ذلك يكون $AD = b + X$ ويكون:

$$(BE) = (b + X) \cdot X = bX + X^2 = c$$

وهي المعادلة السابقة^(١٢) التي نحتسب حلها بالطريقة المذكورة في المسألة السابقة. ويكون حل المعادلة المطروحة:

$$x = X + b.$$

تعليق

يبرهن الطوسي هندسياً وجود الجذر الموجب. بعد ذلك وبواسطة التحويل الأفيثي:

$$x \rightarrow x - b = X,$$

(وهو تحويل ممكن لأن $x > b$) يحول المسألة إلى معادلة من نوع المعادلة ٧ السابقة. فالمعادلة ٨ تعطي:

$$(b + X)^2 = b(b + X) + c$$

وهو ما يعادل

$$X^2 + bX = c$$

أي المعادلة ٧. وبصورة عكسية، إذا كان X حلاً للمعادلة ٧ يكون:

$$X \cdot (b + X) = c$$

وبالتالي:

$$b(b + X) + X(b + X) = c + b(b + X)$$

(١٢) المعادلة ٧.

أي

$$(b + X)^2 = c + b \cdot (b + X)$$

وهذا يعني أن $x = (b + X)$ هو حل للمعادلة ٨.

نشير إلى أن $CD^2 = \frac{b^2}{4} + c$ التي وردت في حساب الطوسي هي مميّز المعادلة ٨، لكن من الواضح تماماً أن ما رمى إليه الطوسي هنا هو تحويل المعادلة ٨ إلى معادلة من النوع السابق. يعطي الطوسي مثلاً واحداً:

$$21x + 96300 = x^2$$

ويستخدم التحويل الأفيني:

$$x \rightarrow x - 21 = X$$

فيحصل على المعادلة:

$$X^2 + 21x = 96300;$$

حيث يجد الحل $X = 300$ وبالتالي $x = 321$.

$$x^2 + c = bx \quad \text{المعادلة ٩:}$$

ليكن $AB = b$. بما أن $xx = x^2 + c$ و $b.x = x^2 + c$ ، فيكون $AB > x$. فإذا فرضنا $BD = x$ ، تكون النقطة D إذن بين A و B ويكون $AB.BD = b.x$ (الشكل رقم (٢ - ١٦)). ليكن $c = x^2 + (BG)$ ، $DE \perp AB$ و (BE) المربع ذا الضلع BD .





بما أن $(BE) = x^2$ يكون $c = (DG)$ وبالتالي $c = AD.BD$. لكن، لكي يكون هذا الأمر ممكناً، يتوجب أن توجد نقطة D على AB (أي بين A و B) بحيث يكون:

$$AD.DB = c.$$

إذا كان $c > \left(\frac{b}{2}\right)^2$ يكون $c > AD.BD$ لأن: $\left(\frac{AB}{2}\right)^2 > AD.BD$ ، فلا يمكن وجود D في هذه الحالة. فلكي تكون المسألة معقولة يتوجب أن يكون $c \leq \left(\frac{b}{2}\right)^2$.

- إذا كان $c > \left(\frac{b}{2}\right)^2$ ، المسألة مستحيلة.

- إذا كان $c = \left(\frac{b}{2}\right)^2$ ، يوجد حل $x = \frac{b}{2}$.



الشكل رقم (٢ - ١٦)

- إذا كان $c < \left(\frac{b}{2}\right)^2$ ، يوجد حلان x_1 و x_2 يحققان:

$$x_1 < \frac{b}{2}, \quad x_2 > \frac{b}{2}, \quad x_1 + x_2 = b.$$

فلنفرض أن $c \leq \left(\frac{b}{2}\right)^2$ ولناخذ D على AB بحيث $DA = DB$.

- في حال $c = \left(\frac{b}{2}\right)^2$ ، إذا فرضنا $x_1 = BD$ ، $x_2 = AD$ ، يكون لدينا $x_1 \cdot x_2 = c$.

- في حال $c < \left(\frac{b}{2}\right)^2$ ، نفرض $c = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - I$. توجد نقطة K على AD بحيث يكون $DK^2 = I$ ، فيكون:

$$DB^2 = c + DK^2$$

لكن

$$AK.KB + DK^2 = DB^2$$

فيكون

$$AK.KB = c.$$

ونكون قد وجدنا مقدارين AK و KB يحققان

$$AK + KB = b \quad \text{و} \quad AK.KB = c.$$

ليكن $AG = AK^2$ و (AE) المستطيل بكامله؛ عند ذلك يكون لدينا:

$$(AE) = AB.BE = AB.GK = AB.AK,$$

فيكون

$$(GB) + (AG) = AB.AK \quad \text{و} \quad (GB) = BK.KG = c$$

فإذا سمينا $AK = x_1$ يحصل لدينا:

$$x_1^2 + c = x_1 \cdot AB = bx_1.$$

وكذلك، ليكن (BG') المربع ذا الضلع BK و (AE') المستطيل الذي يقابله، فيكون:

$$(KE') + (AG') = BK \cdot AB.$$

فإذا وضعنا $BK = x_2$ ، يكون:

$$x_2^2 + c = bx_2.$$

تعليق

يمكن كتابة المعادلة ٩ على الشكل التالي:

$$c = x(b - x) \quad (١)$$

فيكون $x < b$ (بديهياً). وطالما أن:

$$\left(x - \frac{b}{2}\right)^2 = x^2 - bx + \frac{b^2}{4} \geq 0$$

يكون $x.(b-x) \leq \frac{b^2}{4}$.

- إذا كان $c > \frac{b^2}{4}$ تكون العلاقة (١) مستحيلة.

- إذا كان $c = \frac{b^2}{4}$ يكون $x = \frac{b}{2}$ حلاً مزدوجاً، فإذا أشرنا بـ x_1 و x_2 إلى حلّي المعادلة يكون لدينا $x_1 = x_2 = \frac{b}{2}$ وبالتالي $x_1 + x_2 = b$. وكذلك يكون:

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{b^2}{4} = c.$$

- إذا كان $c < \frac{b^2}{4}$ يكون للمعادلة حلان موجبان x_1 و x_2 يحققان:

$$x_1 < \frac{b}{2}, \quad x_2 > \frac{b}{2}, \quad x_2 = b - x_1,$$

ويكون بالتالي $x_1 + x_2 = b$ و $x_1 \cdot x_2 = c$.

في الحالة الأخيرة هذه يأخذ الطوسي:

$$x_1 = \frac{b}{2} - \sqrt{\Delta'}$$

حيث $\Delta' = \frac{b^2}{4} - c$ ويبرهن أن x_1 هي بالفعل حل؛ فلدينا:

$$c + \Delta' = \frac{b^2}{4}$$

لكن

$$\left(\frac{b}{2} - \sqrt{\Delta'}\right) \cdot \left(\frac{b}{2} + \sqrt{\Delta'}\right) + \Delta' = \frac{b^2}{4}$$

فيكون

$$\left(\frac{b}{2} - \sqrt{\Delta'}\right) \cdot \left(\frac{b}{2} + \sqrt{\Delta'}\right) = c$$

وبالتالي

$$x_1 (b - x_1) = c$$

وهذا يعطي أيضاً

$$(b - x_2) \cdot x_2 = c.$$

ملاحظة ١: في سياق برهانه يبرز الطوسي المميز $c - \frac{b^2}{4}$ والشكل الطبيعي (القانوني) للمعادلة وكذلك $DK^2 = \frac{b^2}{4} - c$ ، كما يبرز الدالات المتناظرة^(١٣) للجذور في

(١٣) في هذه الحالة مجموع الجذرين، وحاصل ضربهما. (المترجم).

حالة وجود جذرين موجبين. يدرس من ثم، حلاً عددياً لمعادلة من هذا النوع:

$$x^2 + 578442 = 2123x,$$

- راجع الفصل الأول، الفقرة سادساً: «إعادة تركيب الجداول»، الجدول رقم (٣)؛
يحسب x_1 ثم يستنتج $x_2 = b - x_1$.

ملاحظة ٢: في المعادلتين السابقتين (٧) و (٨) (المترجم))، أبرز الطوسي المميز كما أبرز الشكل الطبيعي لكل منهما. إلا أنه لم يبرز الدالات المتناظرة للجذرين لأنه لم يأخذ بالاعتبار في كلتا هاتين الحالتين سوى الجذر الموجب.

ملاحظة ٣: في المعادلات الثلاث السابقة، حل الطوسي المعادلة:

$$x^2 + bx + c = 0, \quad (١)$$

- في المعادلة ٧، $b > 0$ ، $c < 0$.

- في المعادلة ٨، $b < 0$ ، $c < 0$.

- في المعادلة ٩، $b < 0$ ، $c > 0$.

لكن الحالة $b > 0$ ، $c > 0$ ، لم تُعالج. فالطوسي لم يكتب هذه المعادلة على الشكل (١). ولم يكتبها على هذا الشكل معاصروه أو من أتوا بعده^(١٤).

$$x^3 + ax^2 = bx \quad \text{المعادلة ١٠:}$$

تعود هذه المعادلة إلى المعادلة ٧:

$$x^2 + ax = b.$$

ليكن A المكعب ذا الضلع ℓ ، $A = x^3$. وليكن:

$$G = bp, \quad E = axp, \quad D = x^2p, \quad C = bxs, \quad B = ax^2s,$$

$$K = xp, \quad L = p, \quad I = xs, \quad H = x^2s$$

لدينا:

$$\frac{A}{I} = \frac{D}{L}, \quad \frac{I}{C} = \frac{L}{G}$$

وبالتالي

$$\frac{A}{C} = \frac{D}{G} \quad (١)$$

(١٤) كان يفترض أن يكون طرفا المعادلة موجبين. (المترجم).

ولدينا أيضاً:

$$\frac{B}{H} = \frac{E}{K}, \quad \frac{H}{I} = \frac{K}{L}, \quad \frac{I}{C} = \frac{L}{G}$$

وبالتالي

$$\frac{B}{C} = \frac{E}{G} \quad (٢)$$

من (١) و (٢) نستنتج:

$$\frac{A+B}{C} = \frac{D+E}{G}$$

لكن، استناداً إلى المعادلة ١٠، لدينا:

$$A+B=C$$

فيكون لدينا

$$D+E=G$$

وبالتالي

$$x^2 + ax = b.$$

لحل المعادلة ١٠، نحلُ إذن المعادلة ٧ (الشكل رقم (٢ - ١٧)).

A	
I	
B	
H	
C	
D	
L	
E	
K	
G	

تعليق

يبرهن الطوسي أن عدداً موجباً x_0 هو حل للمعادلة ١٠ إذا، فقط إذا، كان x_0 حلاً للمعادلة:

$$x^2 + ax = b.$$

ذلك لأن

$$\frac{x^3 + ax^2}{bx} = \frac{x^2 + ax}{b}.$$

نشير إلى أن البرهان يحترم بثبات التجانس: نسب الأحجام، نسب المساحات، التي تُستبدل بقياساتها في ما بعد.

الشكل رقم (٢ - ١٧)

$$ax^2 + bx = x^3 \quad \text{المعادلة ١١:}$$

ترجع هذه المعادلة إلى المعادلة ٨.

ليكن $G = bx^2$ ، $A = bx^2$ ، $B = ax^2$ ، $C = x^3$ ، $D = bp$ ، $E = axp$ ، $G = x^2p$. نبين

كما فعلنا سابقاً أن:

$$\frac{A+B}{C} = \frac{D+E}{G}$$

لكن

$$A+B=C$$

فيكون، بالتالي:

$$D+E=G$$

فيكون

$$(المعادلة ٨) \quad ax+b=x^2.$$

فالعدد x_0 هو حل للمعادلة ١١، إذا، فقط إذا، كان حلاً للمعادلة ٨. يكفي إذن حل المعادلة ٨ (الشكل رقم (٢ - ١٨)).

A
B
C
D
E
G

الشكل رقم (٢ - ١٨)

$$x^3 + bx = ax^2, \quad \text{المعادلة ١٢:}$$

ترجع إلى المعادلة ٩.

ليكن $A = x^3s$ ، $B = bxs$ ، $C = ax^2s$ ، $D = x^2p$ ، $E = bp$ ، $G = axp$.
فتبرهن كما في السابق أن:

$$\frac{A+B}{C} = \frac{D+E}{G}.$$


لكن، بما أن $A+B=C$ (المعادلة ١٢)، يكون:

$$D+E=G;$$

وبالتالي

$$x^2 + b = ax \quad (\text{المعادلة ٩})$$

فالعدد x_0 هو حل للمعادلة ١٢، إذا، فقط إذا، كان حلاً للمعادلة ٩. يكفي إذن حل هذه المعادلة الأخيرة (الشكل رقم (٢ - ١٩)).



الشكل رقم (٢ - ١٩)

نشير إلى أن الطوسي لا يعتمد أي حل عددي بالنسبة إلى المعادلات الثلاث الأخيرة. فالفرضية في نظره هي قضية اختزال جبري.

I معادلات الدرجة الثالثة

يدرس الطوسي في هذا الفصل المعادلات التكعيبة التي لها دائماً حل موجب.

$$x^3 + bx = c \quad \text{المعادلة ١٣:}$$

ليكن $AB = \sqrt{b} \ell$ ، $E = p$ ، $MN = c \ell$ ، فيكون:

$$MN \cdot p = c \cdot s$$

ولتكن O قطعة مستقيمة تحقق العلاقة:

$$\frac{\ell}{AB} = \frac{AB}{O}$$

عند ذلك يكون:

$$\frac{p}{AB^2} = \frac{\ell}{O}.$$

ليكن $AC \perp AB$ بحيث يكون $\frac{MN}{AC} = \frac{O}{\ell}$ ؛ فيما أن $\frac{O}{\ell} = \frac{AB^2}{p}$ ، يكون $\frac{AB^2}{p} = \frac{MN}{AC}$

فيكون

$$AB.LP > AL^2$$

لكن

$$AB.AS = SG^2 \quad (\text{معادلة } \emptyset)$$

فيكون

$$SG > SP$$

وتكون بالتالي G داخل الدائرة (راجع الملاحظة ١) لنلا تكون LP مساوية لشعاع الدائرة وهذا محال .

لذلك، إذا أطلنا \emptyset إلى ما لا نهاية، فسوف يقطع الدائرة في نقطة، I . وإذا أخذنا $IK \perp AB$ و $IJ \perp AC$ ، يكون لدينا:

$$AB.AK = AJ^2 \quad (\text{معادلة } \emptyset)$$

ومن هنا

$$\frac{AB}{AJ} = \frac{AJ}{AK} ,$$

لكن

$$AJ.JC = IJ^2 \quad (\text{قدرة } J)$$

فيكون

$$\frac{AJ}{IJ} = \frac{IJ}{JC}$$

ومن هنا

$$\frac{AB}{AJ} = \frac{AJ}{IJ} = \frac{IJ}{JC} ,$$

ونحصل على

$$AB^2 . JC = AJ^3 ,$$

وبالتالي على

$$AB^2 . AJ + AB^2 . JC = b . AJ + AJ^3 .$$

ولقد رأينا أن

$$AB^2 . AJ + AB^2 . JC = AB^2 . AC = c \quad (= c.s)$$

فنكون قد وجدنا قطعة مستقيمة AJ تحقق

$$AJ^3 + bAJ = c$$

ويكون AJ هو الحل المطلوب.

تعليق

لنأخذ المعادلة ١٣ :

$$x^3 + bx = c \quad (١)$$

حيث $b > 0$ و $c > 0$. لهذه المعادلة جذر حقيقي واحد، وهو موجب، يحدده الطوسي.

لكي نفهم اختيار الطوسي للمنحنيات التي استخدمها، نضرب طرفي المعادلة بـ x ، فنحصل على:

$$x^4 + bx^2 = cx \quad (٢)$$

ذات الحل المبطل $x = 0$ والتي نكتب:

$$\frac{x^4}{b} = \frac{c}{b}x - x^2 \quad (٣)$$

إذا وضعنا

$$y^2 = x\left(\frac{c}{b} - x\right) \quad (\text{معادلة } \mathcal{C})$$

نحصل على $y^2 = \frac{x^4}{b}$ وبالتالي على:

$$y = \frac{1}{\sqrt{b}}x^2 \quad (\text{معادلة } \mathcal{P})$$

وذلك بإهمال القطع المكافئ \mathcal{P} ، ذي المعادلة $y = -\frac{1}{\sqrt{b}}x^2$ لأن \mathcal{P} و \mathcal{P} متناظران بالنسبة إلى قطر \mathcal{C} ، وبالتالي فإن النقط $\mathcal{C} \cap \mathcal{P}$ و $\mathcal{C} \cap \mathcal{P}$ لها الإحداثيات السنية نفسها.

يبرهن الطوسي أن \mathcal{C} و \mathcal{P} إذا التقيا في نقطة $X = (x_0, y_0)$ غير النقطة $A = (0, 0)$ فعند ذلك يكون x_0 جذراً لـ (١):

$$\frac{\sqrt{b}}{x_0} = \frac{x_0}{y_0} = \frac{y_0}{\frac{c}{b} - x_0},$$

وبالتالي

$$\frac{b}{x_0^2} = \frac{x_0}{y_0} \cdot \frac{y_0}{\frac{c}{b} - x_0} = \frac{x_0}{\frac{c}{b} - x_0}$$

ومنها

$$x_0^3 = b\left(\frac{c}{b} - x_0\right)$$

و

$$x_0^3 + bx_0 = c .$$

ويبرهن أن \mathcal{C} و \mathcal{P} يلتقيان معتمداً طريقة تعود إلى التالية :

نفرض أن $P(x, y) \in \mathcal{C}$ وأن :

$$x < \frac{c}{b} - x \quad \text{و} \quad x < \sqrt{b}$$

بما أن

$$y^2 = x \left(\frac{c}{b} - x \right) ,$$

يكون لدينا

$$\frac{x^2}{y^2} = \frac{x}{\left(\frac{c}{b} - x \right)} ,$$

وبالتالي

$$x^2 < y^2$$

ومنها

$$\frac{x}{y} < 1 < \frac{\sqrt{b}}{x} \quad \text{و} \quad x < y$$

فيكون

$$\sqrt{b} y > x^2 .$$

ليكن $G = G(X, Y) \in \mathcal{P}$. معنا العلاقة :

$$\sqrt{b} y = X^2$$

فيكون

$$X > x .$$

ويكون P داخل \mathcal{P} و $C = C\left(\frac{c}{b}, 0\right) \in \mathcal{C}$ خارج \mathcal{P} . وبما أن \mathcal{P} منحنٍ متواصل له فرع في اللانهاية، فإن \mathcal{P} يقطع \mathcal{C} حتماً .

ملاحظة ١ : في التعليق الذي تقدم حوَرنا قليلاً في تعليقات الطوسي . فمن أجل أن يبرهن التقاء المنحنيين، يؤكد أن G داخل الدائرة؛ لكن النقطة G يمكن أن تكون خارج \mathcal{C} كما يظهر المثال المعاكس التالي :

نأخذ $b = 144$ ، $c = 1008$ ، فيكون $\sqrt{b} = 12$ ، $\frac{c}{b} = 7$ ؛ ومعادلة \mathcal{C} تكتب كما

يلي :

$$y^2 = x(7 - x) ;$$

أما معادلة \mathcal{P} فتكتب

$$x^2 = 12y.$$

نأخذ $3 = y_0 = LP$ ؛ $SG = 6 = x_0$. على الدائرة \mathcal{C} ، معنا:

$$9 = x(7 - x)$$

فيكون الجذران x_1 و x_2 :

$$SP = x_1 = \frac{7 - \sqrt{13}}{2} < 6$$

و

$$x_2 = \frac{7 + \sqrt{13}}{2} = SP' < 6$$

ويكون G بالتالي ما بعد P' ، خارج الدائرة.

ملاحظة ٢: اختيار نصف الدائرة والقطع المكافئ هو الاختيار نفسه الذي اعتمده الخيام، الذي لم يبرهن تقاطعهما. ومن البديهي أنه ليس الاختيار الوحيد، إذ كان بإمكانه اختيار القطع المكافئ ذي المعادلة:

$$y = x^2 + b$$

والقطع الزائد ذي المعادلة $y = \frac{c}{x}$ ، لأن الصفر ليس حلاً للمعادلة ١٣.

ينهي الطوسي دراسته بحل ثلاث معادلات عددية مطبقاً طريقة الفصل الأول، الفقرة سادساً: «إعادة تركيب الجداول» (راجع الجدولين رقمي (١ - ٤) و (١ - ٥)).

$$c + bx = x^3 \quad \text{المعادلة ١٤:}$$

نأخذ AB بحيث يكون $AB^2 = bp$ و $K = p$ ونأخذ قطعة مستقيمة AO ، طولها c ، فيكون $K.O = c.s$. ونأخذ J بحيث يكون:

$$\frac{\ell}{AB} = \frac{AB}{J}$$

فيكون

$$\frac{p}{AB^2} = \frac{\ell}{J}.$$

ونأخذ النقطة C بحيث يكون $\frac{O}{AC} = \frac{J}{\ell}$ و $AC \perp AB$. فيما أن:

$$\frac{J}{\ell} = \frac{AB^2}{p} = \frac{O}{AC}$$

والخط MN يقطع \mathcal{M} في M' ويكون لدينا:

$$M'N^2 = CN.AN$$

فيكون

$$M'N^2 > NM^2$$

ويكون M بالتالي داخل \mathcal{M} .

ولنأخذ P على AE بحيث يكون:

$$AP > 4AB \quad (١)$$

و

$$AP.AB > AC^2 \quad (٢)$$

وليكن $PG \perp AE$ ، $G \in \mathcal{P}$ ، و $QG \perp AC$ ، $Q \in AC$.

عندئذ يكون:

$$AB.AP = GP^2 \quad (\text{معادلة } \mathcal{P})$$

وبالتالي

$$\frac{AP}{GP} = \frac{GP}{AB},$$

فيكون

$$\frac{AP^2}{GP^2} = \frac{GQ^2}{GP^2} = \frac{AP}{AB} > 4;$$

ونحصل على

$$GQ^2 > 4GP^2$$

أي على

$$GQ > 2GP$$

فنحصل أخيراً على

$$GQ > 2AQ.$$

لكن، استناداً إلى (٢)، لدينا:

$$GP^2 = AP.AB > AC^2$$

فيكون $AQ > AC$ ويكون $2AQ > QC$ وبالتالي:

$$GQ > 2AQ > QC$$

و

$$GQ_2 > QC^2 > AQ.QC$$

لتكن G' نقطة تقاطع GQ و \mathcal{M} . لدينا:

$$AQ.QC = G'Q^2 \quad (\text{معادلة } \mathcal{M})$$

وبالتالي

$$GQ > G'Q \quad \text{و} \quad GQ^2 > G'Q^2$$

وتكون النقطة G خارج \mathcal{M} . وبالتالي فإن \mathcal{P} و \mathcal{M} يلتقيان حتماً في نقطة، D . وليكن E و U إسقاطي D عمودياً على AE و AQ تنالياً. فبما أن $D \in \mathcal{P} \cap \mathcal{M}$ ، يكون لدينا:

$$\frac{AB}{DE} = \frac{DE}{AE} = \frac{AE}{CU}$$

وبالتالي

$$\frac{AB}{AU} = \frac{AU}{DU} = \frac{DU}{CU}$$

فيكون

$$AB^2 \cdot CU = AU^3.$$

لكن

$$AB^2 \cdot CU = AB^2 \cdot AC + AB^2 \cdot AU = c + b \cdot AU$$

ويحقق AU بالتالي العلاقة:

$$AU^3 = bAU + c$$

تعليق

الدراسة الكاملة لهذه المعادلة حيث $b > 0$ و $c > 0$ ، تظهر أن لها جذراً موجباً في مطلق الأحوال. في بعض الحالات يمكن أن يكون لها جذران سالبان أو جذر سالب مزدوج. ولا يعتبر الطوسي سوى الجذر الموجب الذي من أجل تحديده (وكما فعل الخيام) يأخذ نصف قطع مكافئ وفرعاً من قطع زائد متساوي الأضلاع له رأس القطع المكافئ نفسه ويبرهن التقاؤهما في نقطة ثانية تقابل الجذر الموجب. وإذا أخذنا القطع المكافئ والقطع الزائد بأكملهما، وجدنا، تبعاً لبعض قيم b و c نقاط الالتقاء التي تقابل الجذور السالبة.

في ما يخص المنحنيين، الطريقة هي نفسها التي اتبعت في المعادلة السابقة. فإذا

أدخلنا الحل المبذل $x = 0$ ، نكتب المعادلة ١٤ كالآتي :

$$\frac{x^4}{b} = x^2 + \frac{c}{b}x ;$$

نضع عندئذٍ

$$y^2 = x^2 + \frac{c}{b}x \quad (\text{معادلة القطع الزائد } \mathcal{H}),$$

و

$$y^2 = \frac{x^4}{b} \quad \text{أو} \quad y = \frac{1}{\sqrt{b}}x^2 \quad (\text{معادلة القطع المكافئ } \mathcal{P})$$

ونحمل القطع المكافئ \mathcal{P} ذا المعادلة $y = -\sqrt{b}x^2$ ، ذلك لأن \mathcal{P} و \mathcal{H} متناظران بالنسبة إلى محور \mathcal{H} ، فنقاط $\mathcal{P} \cap \mathcal{H}$ و $\mathcal{P} \cap \mathcal{H}$ لها الإحداثيات السينية نفسها.

بالنسبة إلى التقاطع $\mathcal{P} \cap \mathcal{H}$ ، لدينا:

$$\frac{\sqrt{b}}{x} = \frac{x}{y} = \frac{y}{x + \frac{c}{b}}$$

فيكون

$$\frac{b}{x^2} = \frac{x}{x + \frac{c}{b}}$$

وأخيراً يكون:

$$x^3 = bx + c .$$

ولكي يبرهن وجود نقطة مشتركة غير النقطة $A(0, 0)$ ، يعتمد الطوسي الطريقة

التالية:

يأخذ النقطة $M(\sqrt{b}, \sqrt{b})$ ، فيكون $M \in \mathcal{P}$. ويأخذ $M'(\sqrt{b}, y) \in \mathcal{H}$ ، فيكون:

$$y^2 = \sqrt{b} \left(\sqrt{b} + \frac{c}{b} \right) > b$$

وتكون النقطة M داخل \mathcal{H} .

لتكن نقطة $G = G(x_0, y_0)$ من \mathcal{P} ، $G \neq A$ ، بحيث يكون

$$y_0 > 4\sqrt{b} \quad (1)$$

و

$$\sqrt{b}y_0 > \frac{c^2}{b^2} \quad (2)$$

لدينا

$$\sqrt{b}y_0 = x_0^2 \quad (3)$$

إذن

$$\frac{y_0}{x_0} = \frac{x_0}{\sqrt{b}}$$

فيكون

$$\frac{y_0^2}{x_0^2} = \frac{y_0}{\sqrt{b}}$$

وبالتالي، استناداً لـ (١):

$$y_0 > 2x_0 \quad \text{أي} \quad y_0^2 > 4x_0^0$$

ومن جهة أخرى، استناداً إلى (٢) و (٣)

$$x_0 > \frac{c}{b} \quad \text{أي} \quad x_0^2 > \frac{c^2}{b^2}$$

فيكون

$$y_0 > \frac{c}{b} + x_0$$

وبالتالي

$$y_0^2 > \left(\frac{c}{b} + x_0\right)^2$$

وأخيراً

$$y_0 > x_0 \left(\frac{c}{b} + x_0\right).$$

ولتكن النقطة $G'(x_0, Y_0) \in \mathcal{H}$ ، فيكون:

$$x_0 \cdot \left(\frac{c}{b} + x_0\right) = Y_0^2.$$

ويكون بالتالي

$$y_0 > Y_0.$$

فالنقطة $G = (x_0, y_0)$ هي إذن خارج \mathcal{H} . وبما أن القطع المكافئ منحني متواصل، فالقوس MG يقطع حتماً \mathcal{H} .

ينتهي الطوسي دراسته بحل عددي لمعادلتين من هذا النوع (انظر الفصل الأول، الفقرة سادساً: «إعادة تركيب الجداول»، الجدولين رقمي (١ - ٦) و (١ - ٧)).

ملاحظة: في هذه المسألة، كما في غالبية المسائل التي ستليها، لا يُميز الطوسي بين أبعاد قياساته. ويدورنا، لن نقوم بتمييز من هذا النوع.

$$x^3 + ax^2 = c \quad \text{المعادلة ١٥:}$$

ليكن K ضلع مكعب مساوياً لـ c ، $K^3 = c$ ، وليكن $AB = a$. نأخذ نقطة C على امتداد AB بحيث يكون $BC = K$ ونأخذ المربع $BCED$ ذا الضلع BC . نأخذ القطع

أي

$$\frac{GH}{BC} = \frac{BC}{BG}$$

ومنها

$$\frac{AG}{HG} = \frac{HG}{BC} = \frac{BC}{BG} ,$$

وبالتالي

$$BG^2 \cdot AG = BC^3$$

ومنها

$$BC^3 = BG^2 \cdot BG + BG^2 \cdot AB$$

فيكون

$$c = BG^3 + aBG^2 ,$$

ويكون BG هو الحل المطلوب.

تعليق

إن دراسة كاملة للمعادلة ١٥، حيث a و c موجبان، تظهر أن لها دائماً جذراً موجباً. وتبعاً لقيم a و c يمكن أن يكون لهذه المعادلة جذران سالبان أو جذر مزدوج سالب. والطوسي لا يأخذ في الاعتبار سوى الجذر الموجب. ولكي يحدد هذا الجذر يستخدم، كما فعل الخيام، نصف قطع مكافئ مع فرع من قطع زائد متساوي الأضلاع ويبرهن أن لهذين المنحنيين نقطة مشتركة تقابل الجذر الموجب. ومثلما لاحظنا بالنسبة إلى المعادلة السابقة، فإذا أخذنا كامل القطعين، نجد، تبعاً لبعض قيم a و c ، نقاط التقاء أخرى، تقابل الجذور السالبة للمعادلة.

فيما يخص اختيار المنحنيين، إذا لاحظنا أن c موجب قطعاً، فإن الصفر لا يمكن أن يكون جذراً للمعادلة:

$$x^3 + ax^2 = c$$

لذلك يمكن أن نكتب هذه المعادلة على الشكل:

$$x + a = \frac{c}{x^2} ;$$

فإذا وضعنا $k^3 = c$ ، يكون لدينا

$$k(x + a) = \frac{k^4}{x^2} .$$

عندئذ نأخذ :

$$y^2 = k(x+a) \text{ أي } y^2 = \sqrt[3]{c}(x+a) \text{ (القطع } \mathcal{P} \text{) ؛}$$

$$y^2 = \frac{k^2}{x^2} \text{ أي } y = \frac{k^2}{x} \text{ (القطع } \mathcal{K} \text{).}$$

نلاحظ هنا أن لا مجال لأن يؤخذ في الاعتبار القطع الزائد $y = -\frac{k^2}{x}$ الذي من شأنه أن يؤدي إلى الجذور نفسها بسبب التناظر .

ولأجل أن يثبت وجود نقطة التقاء، يستعين الطوسي بالنقطة $M(\sqrt[3]{c}, Y) \in \mathcal{P}$ التي تحقق :

$$\sqrt[3]{c}(\sqrt[3]{c} + a) = Y^2$$

فيكون

$$Y^2 > \sqrt[3]{c}$$

ويكون M بالتالي داخل \mathcal{K} . لذلك يلتقي القطعان \mathcal{P} و \mathcal{K} بالضرورة . ذلك لأن رأس \mathcal{P} أي النقطة A هي خارج \mathcal{K} ؛ وبما أن \mathcal{P} منحنٍ متواصل يمر بنقطتين A و M ، إحدهما خارج \mathcal{K} والأخرى داخلها ، لذلك فإنه سيلتقي بالضرورة \mathcal{K} في إحدى نقاطه $H(x_0, y_0) = H$ وهي نقطة تُحقق ما يلي :

$$\frac{x_0 + a}{y_0} = \frac{y_0}{\sqrt[3]{c}} \quad (H \in \mathcal{P})$$

و

$$x_0 \cdot y_0 = c^{\frac{1}{3}} \quad (H \in \mathcal{K})$$

فيكون

$$\frac{\sqrt[3]{c}}{x_0} = \frac{y_0}{\sqrt[3]{c}} = \frac{x_0 + a}{y_0}$$

وبالتالي :

$$c = x_0^2(x_0 + a) = x_0^3 + ax_0^2$$

ويكون x_0 حلاً للمعادلة (١٥) .

ملاحظة ١ : يمكن حل هذه المعادلة أيضاً بواسطة تقاطع القطع المكافئ ذي المعادلة

$$y = x^2 + ax,$$

والقطع الزائد

$$y = \frac{c}{x} .$$

ملاحظة ٢ : يبرهن الخيام أن x_0 لا يمكن أن يكون أكبر من $\sqrt[3]{c}$ كما لا يمكن أن

يساوي $\sqrt[3]{c}$. إلا أن الطوسي يبين أن النقطة G هي بين A و C ، وبالتالي فإن $x_0 < \sqrt[3]{c}$.

هنا أيضاً ينهي الطوسي دراسته بحل عددي لمعادلتين من هذا النوع (انظر الفصل الأول، الفقرة سادساً، الجدولين رقمي (١ - ٨) و (١ - ٩)).

$$c + ax^2 = x^3 \quad \text{المعادلة ١٦ :}$$

نأخذ $AB = a$ ، $(SO) = p$ (الوحدة السطحية) ، $OP \perp (SO)$ ، $OP = c \cdot \ell$ ، فيكون $\frac{AB}{K} = \frac{K}{OP}$ يحقق K مستقيماً K . ونأخذ جزءاً مقطوعاً مستقيماً K يحقق $(SP) = (SO) \cdot OP = p \cdot (c \cdot \ell)$.

نأخذ $BC \perp AB$ ، بحيث يكون :

$$\frac{\ell}{BC} = \frac{AB}{K}$$

فيكون

$$\frac{p}{BC^2} = \frac{AB^2}{K^2} = \frac{AB}{OP} ,$$

وبالتالي

$$BC^2 \cdot AB = c \quad (١)$$

نأخذ القطع المكافئ \mathcal{P} ذا الرأس B والضلع القائم AB والمحور AB . ونأخذ جزءاً مستقيماً مقطوعاً L يحقق :

$$\frac{AB}{L} = \frac{L}{BC} .$$

الحالة الأولى : (الشكل رقم (٢ - ١٢٣)) : $AB > BC$. في هذه الحالة يكون $AB > L > BC$.


لتكن D نقطة على AB بحيث يكون $AD = L$ وليكن (AE) المربع ذا الضلع AD . ولتكن I نقطة على امتداد CB بحيث يكون $BI = BC$ ، فيكون $BI < AD$.

ليكن \mathcal{M} القطع الزائد الذي يمر بـ I والذي يكون AB و AN خطيه المقاربتين . رأس \mathcal{M} هو إذن $E^{(١٥)}$. فتوجد بالضرورة نقطة $M \in \mathcal{P}$ يكون خط ترتيبها MK مساوياً لـ BC . والمستقيم MK يقطع \mathcal{M} في النقطة M' فيكون :

$$KM' < BC^{(١٦)}$$

(١٥) $IB \cdot AB = BC \cdot AB = K\ell = L^2 = ED \cdot EN$ (المترجم) .

(١٦) لأن : $AB \cdot BC = KA \cdot KM'$ (معادلة \mathcal{M}) و $AB < KA$ (المترجم) .



الشكل رقم (٢ - ١٢٣)

فتكون النقطة M داخل \mathcal{H} وتكون B خارج \mathcal{H} لأنها توجد على خط مقارب؛ لذلك فإن \mathcal{H} و \mathcal{P} يلتقيان، في نقطة نسميها G . ونأخذ $AB \perp HG$ ، فيكون:

$$AH \cdot HG = AD^2 \quad (\text{معادلة } \mathcal{H})$$

لكن لدينا

$$AB \cdot BC = AD^2$$

فيكون

$$AH \cdot HG = AB \cdot BC,$$

وبالتالي

$$\frac{AH}{BC} = \frac{AB}{HG},$$

فيكون

$$\frac{AH^2}{BC^2} = \frac{AB^2}{HG^2}.$$

لكن، بما أن $G \in \mathcal{P}$ فيكون

$$AB \cdot BH = HG^2,$$

يحصل

$$\frac{AB}{HG} = \frac{HG}{BH},$$

فيكون

$$\frac{AB^2}{HG^2} = \frac{AB}{BH},$$

وهذا يعطي

$$\frac{AH^2}{BC^2} = \frac{AB}{BH}$$

وبالتالي

$$AH^2 \cdot BH = BC^2 \cdot AB = c;$$

لكن


$$AH^2 \cdot AB + AH^2 \cdot BH = AH^3 ;$$

لذلك يكون

$$AH^3 = c + a \cdot AH^2$$

ويكون AH هو الحل المطلوب.

الحالة الثانية: (الشكل رقم (٢ - ٢٣ب)): $AB = BC$ ؛ عندئذ يكون $L = AB$.




الشكل رقم (٢ - ٢٣ب)

نبني المربع ذا الضلع AB ؛ نأخذ القطع المكافئ \mathcal{P} نفسه ونأخذ $G \in \mathcal{P}$ ؛ وليكن \mathcal{M} القطع الزائد ذا الرأس C والخطين المقارين AB و AN . نفرض أن \mathcal{M} يمر بالنقطة G ^(١٧)، وأن H هو إسقاط G عمودياً على AB . نبرهن، كما تقدم أن AH هو الحل المطلوب.

(١٧) إن هذا الأمر لا يتحقق بالنسبة إلى أي نقطة G من \mathcal{Q} ، لكن يوجد نقطة مشتركة، G ، بين القطعين، والبرهان على ذلك يتم كما في الحالة الأولى. ويبدو أن الطوسي يضمّر هنا ما يلي: «نفرض أن \mathcal{M} يمر في النقطة G ».

الحالة الثالثة: (الشكل رقم (٢ - ٢٣ ج)): $AB < BC$ ، فيكون $AB < L$.



الشكل رقم (٢ - ٢٣ ج)

نأخذ $AX = L$ ونبني المربع ذا الضلع AX ونهي البرهان كما في السابق.

تعليق

لأجل كل زوج (a, c) من الأعداد الموجبة قطعاً، يكون للمعادلة:

$$x^3 = ax^2 + c$$

جذر حقيقي واحد، وهذا الجذر هو موجب قطعاً. ولكي يحدد هذا الجذر، يستخدم الطوسي، كما فعل الخيام، قطعاً مكافئاً وقطعاً زائداً ويبرهن أن لهما نقطة مشتركة تقابل هذا الجذر.

في ما يتعلق باختيار المنحنين، نستطيع أن نكتب على التوالي:

$$a(x-a) = \frac{ac}{x^2} \quad \text{و} \quad x-a = \frac{c}{x^2}$$

وعند ذلك نأخذ:

$$y^2 = a(x-a) \quad ; \quad (\text{القطع المكافئ } \mathcal{P})$$

$$y = \frac{\sqrt{ac}}{x} \quad \text{أي} \quad y^2 = \frac{ac}{x^2} \quad (\text{القطع الزائد } \mathcal{H})$$

وكما رأينا في السابق، لا مجال لأخذ القطع الزائد ذي المعادلة $y = \frac{-\sqrt{ac}}{x}$.

ولكي يبين وجود نقطة تقاطع، يأخذ الطوسي النقطة $M\left(x_0, \left(\frac{c}{a}\right)^{\frac{1}{2}}\right) \in \mathcal{P}$ والنقطة

$M'(x_0, y) \in \mathcal{M}$. فبما أن النقطة $M' \in \mathcal{M}$ ، $I\left(a, \left(\frac{c}{a}\right)^{\frac{1}{2}}\right)$ يكون لدينا:

$$x_0 \cdot y = a \left(\frac{c}{a}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

لكن، بما أن $M \in \mathcal{P}$ ، فإن $x_0 > a$ وبالتالي:

$$y < \left(\frac{c}{a}\right)^{\frac{1}{2}},$$

وتكون النقطة M بالتالي داخل \mathcal{M} . لكن B ، وهو رأس القطع المكافئ يوجد خارج \mathcal{M} لأنه على خط مقارب لـ \mathcal{M} . وبما أن \mathcal{P} منحن متواصل، فالقوس BM من \mathcal{P} يقطع \mathcal{M} بالضرورة في نقطة $G = G(X, Y)$. ويكون X حلاً للمعادلة ١٦؛ فلدينا ما يلي:

$$X \cdot Y = (ac)^{\frac{1}{2}} \quad (\text{معادلة } \mathcal{M})$$

فيكون

$$\frac{X^2}{\left(\frac{c}{a}\right)} = \frac{a^2}{Y^2} \quad \text{ومنها} \quad \frac{X}{\left(\frac{c}{a}\right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{a}{Y}$$

ولدينا كذلك:

$$a(X - a) = Y^2 \quad (\text{معادلة } \mathcal{P}),$$

وبالتالي:

$$\frac{a^2}{Y^2} = \frac{a}{X - a} \quad \text{وبالتالي} \quad \frac{a}{Y} = \frac{Y}{X - a}$$

فيكون

$$X^2(X - a) = c,$$

أي

$$X^3 = aX^2 + c.$$

ملاحظة: يأخذ الطوسي حالات ثلاثاً: $(ac)^{\frac{1}{2}} < a^2$ ، $(ac)^{\frac{1}{2}} = a^2$ و $(ac)^{\frac{1}{2}} > a^2$ ، وهي الحالات التي تقابل الوضعيات الممكنة لرأس \mathcal{M} بالنسبة إلى معاس \mathcal{P} في رأسه. في الحالات الثلاث يمكن البرهان بالطريقة نفسها، ولهذا السبب لا يقدم الطوسي البرهان في الحالتين الأخيرتين. ويبدو أنه لا يعطي أهمية بالغة للتفريق بين هذه الحالات لأن البرهان مستقل عن الحالة المطروحة.

وكما في السابق يعالج الطوسي حل مسألتين عدديتين من هذا النوع (انظر الفصل

الأول، الفقرة سادساً، الجدولين رقمي (١ - ١٠) و (١ - ١١)).


$$x^3 + ax^2 + bx = c \quad \text{المعادلة ١٧} :$$

نأخذ $AB = \sqrt{b}$ ؛ $AC \perp AB$ ؛ $AC = a$ ؛ ونأخذ AD بحيث يكون :

$$AB^2 \cdot AD = c,$$

و $CD \perp AB$. ونأخذ نصف الدائرة \odot ذات القطر CD . وليكن $BE \perp AB$ و $DE \perp AC$. بحيث يكون $ABED$ مستطيلاً.

الحالة الأولى: $ABED$ ليس مربعاً. فتكون النقطة D أقرب إلى أحد الخطين AB و BE ، فنرسم قطعاً زائداً \mathcal{H} ، يمر بـ D ويكون خطاه المقاربين AB و BE (الشكل رقم (٢ - ٢٤)).



الشكل رقم (٢ - ٢٤)

الحالة الثانية: $ABED$ مربع، فنرسم قطعاً زائداً رأسه D ومقاربا AB و BE .

في كلتا الحالتين نُطيل ED حتى EDJ التي هي مماسٌ \mathcal{C} في النقطة D . ليكن DO وترًا من الدائرة موجوداً بين \mathcal{C} و DJ . بما أن القوس DO موجود بين الوتر DO والخط DJ ، فإن O تقع داخل \mathcal{C} بينما تقع C خارج \mathcal{C} ؛ لذلك فإذا أطلنا \mathcal{C} إلى ما لانهاية فإنه سيقطع \mathcal{C} في نقطة نسميها K .

إذا كان L و M إسقاطاً K عمودياً على BE و AB على التوالي، يكون:

$$(معادلة ٨) \quad KM.MB = AB.AD$$

فيكون

$$KM \cdot KQ = QL \cdot QD,$$

وبالتالي

$$\frac{KQ^2}{QD^2} = \frac{AB^2}{AQ^2} \text{ و } \frac{KQ}{QD} = \frac{QL}{AQ} = \frac{AB}{AQ} \quad (١)$$

لكن $QK \perp CD$ و $K \in \mathcal{C}$ وبالتالي يكون:

$$KQ^2 = CQ \cdot QD \quad (\text{قدرة } Q)$$

ومنها

$$\frac{KQ^2}{QD^2} = \frac{CQ}{QD},$$

ومنها ومن (١) نستنتج

$$\frac{AB^2}{AQ^2} = \frac{CQ}{QD},$$

وبالتالي

$$AB^2 \cdot QD = AQ^2 \cdot CQ = AQ^2 \cdot CA + AQ^3 = a \cdot AQ^2 + AQ^3,$$

فيكون

$$AB^2 \cdot QD + AB^2 \cdot AQ = AQ^3 + a \cdot AQ^2 + b \cdot AQ,$$

أي

$$c = AB^2 \cdot AD = AQ^3 + a \cdot AQ^2 + b \cdot AQ;$$

فيكون AQ حلاً للمعادلة ١٧.

تعليق

كل ثلاثية (a, b, c) مؤلفة من أعداد حقيقية موجبة (فعلاً)^(١٨)، يقابلها معادلة

$$x^3 + ax^2 + bx = c$$

لها جذر موجب يدرسه الطوسي. يمكن في بعض الحالات أن يكون لهذه المعادلة جذران سالبان أو جذر سالب مزدوج. لكي يحدد الطوسي الجذر يستخدم، كما فعل الخيام، نصف دائرة وفرعاً من قطع زائد متساوي الأضلاع، ثم يبرهن أن لهما نقطة مشتركة تقابل الجذر المطلوب. عند استخدام كامل الدائرة مع فرعي القطع الزائد، يمكن حصول تقاطع أو تقاطعين بإحداثيات سينية سالبة تعطي الجذور الأخرى.

ولكي نفهم اختيار هذين المنحنيين، نلاحظ أن الصفر ليس جذراً للمعادلة ١٧،

(١٨) غير معدومة. (المترجم).

لذا يمكن أن نكتبها على الشكل التالي :

$$x + a = \frac{b}{x^2} \left(\frac{c}{b} - x \right).$$

نضرب من ثم بـ $\left(\frac{c}{b} - x \right)$ الذي يدخل حلاً إضافياً هو $x = \frac{c}{b}$ ، فيظهر مربع في الطرف الأيمن للمعادلة :

$$\left(\frac{c}{b} - x \right) (x + a) = \frac{b}{x^2} \left(\frac{c}{b} - x \right)^2$$

أي

$$\left(\frac{c}{b} - x \right) (x + a) = \left(\frac{c \cdot b^{-\frac{1}{2}}}{x} - b^{\frac{1}{2}} \right)^2.$$

وهنا نأخذ :

$$(y - b^{\frac{1}{2}})^2 = \left(\frac{c}{b} - x \right) (x + a) \quad (\text{معادلة } \mathcal{C})$$

وهي معادلة الدائرة ذات القطر CD ، حيث :

$$D\left(\frac{c}{b}, \sqrt{b}\right), \quad C(-a, \sqrt{b})$$

ونأخذ كذلك المعادلة :

$$(y - b^{\frac{1}{2}})^2 = \left(\frac{c \cdot b^{-\frac{1}{2}}}{x} - b^{\frac{1}{2}} \right)^2$$

التي تعطي قطعين زائدين \mathcal{H} و \mathcal{H}' :

$$y = \frac{c \cdot b^{-\frac{1}{2}}}{x} \quad (\text{معادلة } \mathcal{H})$$

$$y = 2b^{\frac{1}{2}} - \frac{c \cdot b^{-\frac{1}{2}}}{x} \quad (\text{معادلة } \mathcal{H}')$$

و \mathcal{H}' هو القطع الزائد المتناظر مع \mathcal{H} بالنسبة إلى CD ، لذلك، فإن التقاطعين $\mathcal{H} \cap \mathcal{C}$ و $\mathcal{H} \cap \mathcal{H}'$ متناظران بالنسبة إلى CD ولهما بالتالي الإحداثيات السينية نفسها.

ولكي يبرهن الطوسي وجود نقطة غير D مشتركة بين \mathcal{C} و \mathcal{H} يشير إلى أن مماس \mathcal{C} في D يختلف عن مماس \mathcal{H} في النقطة نفسها. وأخذاً في الاعتبار تحدّب المنحنيين \mathcal{C} و \mathcal{H} يبين وجود نقطة O ، $O \in \mathcal{C}$ ، $O \neq D$ ، تقع داخل \mathcal{H} ؛ فلو لم يكن الحال كذلك لَوُقع \mathcal{H} من جهة و \mathcal{C} من الجهة الأخرى لـ DJ وهي مماس \mathcal{C} في D ؛ وفي هذه الحالة يكون DJ مماساً مشتركاً وهذا محال. ومن ناحية أخرى، لدينا $C \in \mathcal{C}$ و C تقع خارج \mathcal{H} ؛ لذلك، وبما أن \mathcal{C} منحنٍ متواصل، فإن القوس CO يقطع بالضرورة \mathcal{H} في نقطة نسميها $K = K(x_0, y_0)$. ويبرهن الطوسي أن x_0 هي حل للمعادلة ١٧.

بما أن $K \in \mathcal{H}$ ، يكون

$$x_0 y_0 = c \cdot b^{-\frac{1}{2}}$$

وبالتالي

$$x_0(y_0 - b^{\frac{1}{b}}) = b^{\frac{1}{b}}\left(\frac{c}{b} - x_0\right),$$

فيكون

$$\frac{y_0 - b^{\frac{1}{b}}}{\frac{c}{b} - x_0} = \frac{b^{\frac{1}{b}}}{x_0} \quad (1)$$

وبما أن $K \in \mathbb{C}$ ، يكون:

$$(y_0 - b^{\frac{1}{b}})^2 = (x_0 + a) \left(\frac{c}{b} - x_0\right),$$

وبالتالي يكون:

$$\frac{(y_0 - b^{\frac{1}{b}})^2}{\left(\frac{c}{b} - x_0\right)^2} = \frac{x_0 + a}{\frac{c}{b} - x_0},$$

وبالتالي، استناداً إلى (1)، يكون:

$$\frac{b}{x_0^2} = \frac{x_0 + a}{\frac{c}{b} - x_0},$$

أي

$$b\left(\frac{c}{b} - x_0\right) = x_0^2(x_0 + a),$$

وبالتالي

$$c = x_0^3 + ax_0^2 + bx_0;$$

ويكون x_0 حلاً للمعادلة ١٧.

ملاحظة: يبدو أن اختيار نصف الدائرة والقطع الزائد اختيار متعمد. فبالإمكان الحصول على حل بتقاطع القطع المكافئ والقطع الزائد التاليين:


$$x.y = c \quad \text{و} \quad y = x^2 + ax + b$$

الذين يساعدان على الحل بشكل أسرع.

وينتهي الطوسي دراسته بحل عددي لثلاث معادلات من هذا النوع (انظر الفصل الأول، الفقرة سادساً، الجداول أرقام (١ - ١٢) و (١ - ١٣) و (١ - ١٤)).

$$c + bx + ax^2 = x^3 \quad \text{المعادلة ١٨}$$

ليكن $BD \perp AB$ ، $BD = a$ ، $AB = \sqrt{b}$ ليكون $BC \cdot AB^2 = c$ ، فيكون $BC = \frac{c}{b}$. نبني المستطيل $ABCG$ والمربع $AKEU$ بالمساحة نفسها. نأخذ القطع الزائد \mathcal{H}_1 الذي يمر بـ E ويكون خطاه المقاربان AK و AU والقطع الزائد \mathcal{H}_2 ذا الرأس D والقطر المجانب CD (الشكل رقم (٢ - ٢٥)).



الشكل رقم (٢ - ٢٥)

نأخذ O على DC بحيث $DO = BK$ و $OP \perp OB$ و $(P \in \mathcal{H}_2)$ فيكون $OP > BK$ ، ذلك لأن:

$$OP^2 = OC \cdot OD > OD^2 \quad (\mathcal{H}_2 \text{ معادلة}).$$

لتكن Q نقطة التقاء OP مع AN وهو امتداد AU ؛ فيكون $QP > AK$ لأن $OQ = BA$ لكن AN خط مقارب لـ \mathcal{H}_1 فهو بالتالي يقترب منه بغير نهاية، فالمسافة بين Q و \mathcal{H}_1 أصغر من AK الذي هو أصغر من QP . لذلك فإن \mathcal{H}_1 تدخل إلى داخل \mathcal{H}_2 . لكن لـ \mathcal{H}_1 نقط خارج \mathcal{H}_2 مثل E ومثل أية نقطة خارج زاوية الخطين المقاربين لـ \mathcal{H}_2 . لذلك فإن \mathcal{H}_1 و \mathcal{H}_2 يلتقيان في نقطة نسميها I . فنأخذ $IJ \perp DO$ ، فيكون $IJ \perp AN$ و JI يقطع AN في نقطة M ويكون:

$$AM \cdot MI = AK^2 = AB \cdot BC \quad (\mathcal{H}_1 \text{ معادلة})$$

وبالتالي يكون

$$AM \cdot MI + BJ \cdot JM = AB \cdot BC + BJ \cdot JM$$

ومنها

$$IJ \cdot BJ = AB \cdot CJ$$

فيكون

$$\frac{IJ^2}{CJ^2} = \frac{AB^2}{BJ^2} \quad \text{و} \quad \frac{IJ}{CJ} = \frac{AB}{BJ}$$

لكن

$$CJ.JD = IJ^2 \quad (\text{معادلة } \mathcal{H}_2)$$

فيكون

$$\frac{CJ}{IJ} = \frac{IJ}{JD}$$

ويكون

$$\frac{IJ^2}{CJ^2} = \frac{JD}{JC}$$

وبالتالي

$$\frac{AB^2}{BJ^2} = \frac{JD}{JC}$$

فيحصل

$$AB^2.JC = BJ^2.JD \quad (١)$$

لكن

$$AB^2.JC = AB^2.BJ + AB^2.BC \quad (٢)$$

و

$$BJ^3 = BJ^2.(JD + BD) = BJ^2.JD + aBJ^2 \quad (٣)$$

فإذا وضعنا $x = BJ$ ، يحصل، استناداً إلى (١)، (٢) و (٣):

$$x^3 = ax^2 + bx + c \quad (\text{المعادلة } ١٨)$$

تعليق

لكل ثلاثية (a, b, c) مؤلفة من أعداد حقيقية موجبة يكون للمعادلة ١٨

$$x^3 = ax^2 + bx + c$$

حل موجب (فعلاً). ويمكن أن يكون لها جذر سالب مزدوج أو جذران سالبان. لأجل تحديد الجذر الموجب، يستعمل الطوسي، كما فعل الخيام، قطعين زائدين متساويي الأضلاع (وبشكل أدق، فرعاً من كل منهما) ويبرهن أن لهما نقطة مشتركة تقابل الجذر المطلوب. نشير إلى أن أخذ الفرعين الآخرين، يُمكن، في ظل شروط على a ، b و c ، من إيجاد نقطة أو نقطتين أخريين تقابل الجذور السالبة.

لكي نفهم اختيار المنحنيات الذي اعتمده الطوسي، نلاحظ أن الصفر ليس حلاً

للمعادلة ١٨ التي يمكنها بالتالي أن تكتب:

$$x - a = \frac{b}{x^2} \left(x + \frac{c}{b} \right).$$

إذا ما ضُرب طرفا المعادلة بـ $\left(x + \frac{c}{b} \right)$ ، وهو ما يُدخِل جذراً إضافياً هو $\frac{c}{b}$ ، نقابله النقطة C ، نحصل على:

$$\begin{aligned} (x - a) \left(x + \frac{c}{b} \right) &= \frac{b}{x^2} \left(x + \frac{c}{b} \right)^2 \\ &= \left(b^{\frac{1}{2}} + \frac{c \cdot b^{-\frac{1}{2}}}{x} \right)^2. \end{aligned}$$

فإذا وضعنا أولاً:

$$(y + b^{\frac{1}{2}})^2 = (x - a) \left(x + \frac{c}{b} \right),$$

نحصل على معادلة \mathcal{M}_2 . وإذا وضعنا، من ثم:

$$(y + b^{\frac{1}{2}})^2 = \left(b^{\frac{1}{2}} + \frac{c \cdot b^{-\frac{1}{2}}}{x} \right)^2,$$

نحصل على قطعين زائدين \mathcal{M}_1 و \mathcal{M}'_1 :

$$(\mathcal{M}_1) \quad y = \frac{c \cdot b^{-\frac{1}{2}}}{x}$$

و

$$(\mathcal{M}_2) \quad y = -2b^{\frac{1}{2}} - \frac{c \cdot b^{-\frac{1}{2}}}{x}$$

متناظرين بالنسبة إلى CD ؛ لذلك فإن $\mathcal{M}_1 \cap \mathcal{M}_2$ و $\mathcal{M}'_1 \cap \mathcal{M}_2$ يعطيان الإحداثيات السينية نفسها وبالتالي الجذور نفسها للمعادلة ١٨.

لكي يبرهن وجود نقطة مشتركة بين \mathcal{M}_1 و \mathcal{M}_2 يأخذ الطوسي النقطة P وهي $P(a + m, y)$ على \mathcal{M}_2 حيث:

$$m = b^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{2}} \cdot b^{-\frac{1}{2}}$$

فيكون

$$(y + b^{\frac{1}{2}})^2 = m \cdot \left(m + \frac{c}{b} + a \right)$$

وبالتالي

$$(y + b^{\frac{1}{2}})^2 > m^2$$

و

$$y > c \cdot b^{-1}.$$

لتكن G النقطة $G(a+m, Y) \in \mathcal{M}_1$. بما أن AN خط مقارب لـ \mathcal{M}_1 يكون بالضرورة:

$$Y < c \cdot b^{-1}$$

وبالتالي فإن

$$Y < y$$

ويكون P داخل \mathcal{M}_1 . لكن D الموجودة على \mathcal{M}_2 هي خارج \mathcal{M}_1 ؛ لذلك، وبما أن \mathcal{M}_2 منحنٍ متواصل، فإن القوس DP يقطع \mathcal{M}_1 بالضرورة في نقطة نسميها $I(x_0, y_0)$ ، وتكون x_0 حلاً للمعادلة ١٨.

فبما أن I موجود على \mathcal{M}_1 ، يكون لدينا:

$$x_0 \cdot y_0 = c \cdot b^{-1}$$

وبالتالي يكون

$$x_0(y_0 + b^{\frac{1}{b}}) = b^{\frac{1}{b}} \cdot \left(\frac{c}{b} + x_0\right)$$

و

$$\frac{y_0 + b^{\frac{1}{b}}}{\frac{c}{b} + x_0} = \frac{b^{\frac{1}{b}}}{x_0} \quad (١)$$

وبما أن I موجود على \mathcal{M}_2 يكون:

$$\left(x_0 + \frac{c}{b}\right)(x_0 - a) = (y_0 + b^{\frac{1}{b}})^2,$$

وبالتالي

$$\frac{x_0 + \frac{c}{b}}{y_0 + b^{\frac{1}{b}}} = \frac{y_0 + b^{\frac{1}{b}}}{x_0 - a}$$

فيكون

$$\frac{(y_0 + b^{\frac{1}{b}})^2}{\left(x_0 + \frac{c}{b}\right)^2} = \frac{x_0 - a}{x_0 + \frac{c}{b}}$$

ويكون، استناداً إلى (١)

$$\frac{b}{x_0^2} = \frac{x_0 - a}{x_0 + \frac{c}{b}}$$

أي

$$ax_0^2 + bx_0 + c = x_0^3.$$

ملاحظة: كما مر في المعادلة السابقة، نلاحظ أن اختيار القطع المكافئ والقطع

نأخذ $NM \perp DM$ ، $N \in \mathcal{H}_2$ ، فيكون $MN > DM$ لأن:

$$MN^2 = CM \cdot DM$$

ولأننا في الحالة $AD < AC$ وبالتالي $CM > DM$. لذلك فإن $MN > AP$. ولتكن O نقطة التقاء NM مع إطالة BU . بما أن $OM = AB$ ، يكون $ON > BP$ ، فيكون $ON > BP = UJ$.

لتكن Q نقطة تقاطع ON و \mathcal{H}_1 فيكون $OQ < UJ$ لأن BI خط مقارب لـ \mathcal{H}_1 ، وتكون النقطة Q داخل \mathcal{H}_2 وبالتالي فإن \mathcal{H}_1 و \mathcal{H}_2 يلتقيان بالضرورة لأن النقطة J خارج \mathcal{H}_2 . نسمي G نقطة التقاء \mathcal{H}_1 بـ \mathcal{H}_2 ونسقط G عمودياً على AE في النقطة H وعلى AM في النقطة K . لدينا:

$$(BG) = (BJ) = (BD)$$

وبالتالي

$$(AG) = (DI) ,$$

أي

$$AH \cdot HG = HI \cdot HD$$

وبالتالي

$$\frac{AB^2}{AH^2} = \frac{HG^2}{HD^2} \quad \text{و} \quad \frac{AB}{AH} = \frac{HI}{AH} = \frac{HG}{HD}$$

لكن

$$(معادلة \mathcal{H}_2) \quad DH \cdot CH = HG^2$$

فيكون

$$\frac{HG^2}{DH^2} = \frac{CH}{DH}$$

وبالتالي

$$AB^2 \cdot DH = AH^2 \cdot CH .$$

فإذا سمينا $AH = x$ يكون لدينا:

$$AH^2 \cdot CH = AH^3 + AH^2 \cdot AC = x^3 + ax^2;$$

لكن


$$AB^2 \cdot DH = AB^2 \cdot AH + AB^2 \cdot AD = bx + c ;$$

فيكون

$$x^3 + ax^2 = bx + c ,$$

ويكون AH حلاً للمعادلة ١٩.

الحالة الثانية: (الشكل رقم (٢ - ٢٥ب)): $AD = AC = a$ ؛ $\frac{c}{b} = a$.



الشكل رقم (٢ - ٢٥ب)

إذا سمينا $AB = x$ يكون

$$x^3 = AB^2 \cdot x = bx ,$$

لكن

$$AD \cdot AB^2 = ax^2 = c ,$$

فيكون

$$x^3 + ax^2 = bx + c ,$$

ويكون AB حلاً للمعادلة ١٩.

الحالة الثالثة: (الشكل رقم (٢ - ٢٥ب)): $AD > AC$ ؛ $\frac{c}{b} > a$.

نفرض أن \mathcal{M}_2 هو القطع الزائد ذو الرأس C (والقطر المجانب CD). نبرهن، كما فعلنا سابقاً أن:

$$\frac{AB^2}{AH^2} = \frac{HG^2}{DH^2},$$

لكن

$$(M_2 \text{ معادلة}) \quad HG^2 = DH \cdot CH$$

فإذا أخذنا $AH = x$ ، يكون:

$$AH^2 \cdot CH = AH^3 + AH^2 \cdot AC = x^3 + ax^2,$$

ويكون

$$AB^2 \cdot DH = AB^2 \cdot AH + AB^2 \cdot AD = bx + c,$$

وبالتالي

$$x^3 + ax^2 = bx + c,$$

فيكون AH حلاً للمعادلة ١٩.

تعليق

كل ثلاثية منتظمة (a, b, c) مؤلفة من أعداد حقيقية موجبة (فعالاً)، يقابلها المعادلة ١٩

$$x^3 + ax^2 = bx + c,$$

التي تحوز على جذر موجب بالفعل؛ ويمكنها أن تحوز على جذرين سالبين أو على جذر سالب مزدوج.

لكي يحدد الجذر الموجب، يستخدم الطوسي، كما فعل الخيام، قطعين زائدين متساوي الأضلاع. نلاحظ في الواقع أنه يستعمل فرعي كل من هذين القطعين. فالقطع \mathcal{M}_2 محدد بواسطة قطره المجانب CD وبالتالي فإن C و D هما رأساه. وفي الحالة الأولى يستخدم الفرع ذا الرأس D ، وفي الحالة الثالثة يستعمل الفرع ذا الرأس C . والقطع \mathcal{M}_1 محدد بخطيه المقاربين اللذين يلتقيان في B ، ورأسه J حيث:

$$(BJ) = (BD) = AB \cdot AD$$

ويأخذ الطوسي الفرع ذا الرأس J ؛ والفرع الثاني من القطع نفسه يمر بـ D .

وفي كلتا الحالتين يلتقي القطعان \mathcal{M}_1 و \mathcal{M}_2 في D . ويبرهن الطوسي أن لهما نقطة التقاء أخرى G ، توجد في كلتا الحالتين على الفرع من \mathcal{M}_1 الذي لا يمر بـ D .

لكن، على \mathcal{M}_2 توجد النقطة G ، إما على الفرع الذي يمر بـ D وإما على الفرع الذي يمر بالنقطة C .

وعند استجابة a و b و c لبعض الشروط، يلتقي القطعان \mathcal{M}_1 و \mathcal{M}_2 في نقطة أو في نقطتين غير D و G ، ويقابل أياً من نقاط الالتقاء هذه جذر سالب هو إحداثيتها السينية.

في ما يخص اختيار المنحنيين، نلاحظ أن الصفر ليس جذراً للمعادلة ١٩ فهي بالتالي تكتب:

$$x + a = \frac{b}{x^2} \left(x + \frac{c}{b} \right)$$

وإذا ضربنا طرفيها بـ $\left(x + \frac{c}{b} \right)$ (وهو ما يدخل جذراً إضافياً هو $x = -\frac{c}{b}$ الذي يقابل النقطة D)، نحصل على

$$\left(x + \frac{c}{b} \right) (x + a) = \left(\sqrt{b} + \frac{c}{x \cdot \sqrt{b}} \right)^2.$$

فنضع

$$(y + \sqrt{b})^2 = \left(x + \frac{c}{b} \right) (x + a),$$

وهذه المعادلة هي معادلة \mathcal{M}_2 ، ذي القطر المجانب CD حيث $C(-a, -\frac{c}{b})$ و $D(-a, -\frac{c}{b})$. ومن ثم نضع

$$(y + \sqrt{b})^2 = \left(\sqrt{b} + \frac{c}{x\sqrt{b}} \right)^2$$

فنحصل على المعادلتين:

$$(y + \sqrt{b})^2 = \frac{c}{\sqrt{b} \cdot x} \quad (\text{معادلة } \mathcal{M}_1)$$

و

$$y = -2\sqrt{b} - \frac{c}{\sqrt{b} \cdot x}$$

والأخيرة هي معادلة منحنٍ \mathcal{M}'_1 متناظر مع \mathcal{M}_1 بالنسبة إلى المحور CD . لذلك فإن نقاط التقاء \mathcal{M}_1 و \mathcal{M}_2 من جهة، ونقاط التقاء \mathcal{M}'_1 و \mathcal{M}_2 المقابلة لها، من جهة أخرى، لها الإحداثيات السينية نفسها.

ومن أجل أن يبرهن الطوسي وجود نقطة $G(x_0, y_0)$ مشتركة بين \mathcal{M}_1 و \mathcal{M}_2 ، يعطى أولاً، في حالة كون $a < \frac{c}{b}$ ، نقطة $N(X, Y)$ تساوي على \mathcal{M}_2 حيث:

$$X + \frac{c}{b} < a \cdot b^{-\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}$$

وبما أن

$$(Y + b^{\frac{1}{2}})^2 = \left(X + \frac{c}{b}\right) (X + a) > \left(X + \frac{c}{b}\right)^2,$$

يحصل على

$$Y + b^{\frac{1}{2}} > c^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}$$

وبالتالي على

$$Y > c^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

ياخذ من ثم نقطة Q على \mathcal{M}_1 ، $Q = Q(X, y)$ ، فيحصل على:

$$y < c^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}, \quad (2)$$

ذلك لأن BO خط مقارب لـ \mathcal{M}_1 . ومن (1) و (2) نحصل على:

$$y < Y,$$

وبالتالي فإن Q داخل \mathcal{M}_2 .

وبما أن \mathcal{M}_1 منحن متواصل وبما أن لديه نقاطاً خارج \mathcal{M}_2 فهو حتماً يقطع \mathcal{M}_2 في نقطة G تساوي $G(x_0, y_0)$. إن x_0 هو حل للمعادلة ١٩.

فيما أن $G \in \mathcal{M}_1$ ، يكون لدينا:

$$x_0 y_0 = cb^{-\frac{1}{2}},$$

وبالتالي:

$$x_0(y_0 + b^{\frac{1}{2}}) = cb^{-\frac{1}{2}} + x_0 b^{\frac{1}{2}} = b^{\frac{1}{2}} \left(x_0 + \frac{c}{b}\right),$$

فيكون

$$\frac{b}{x_0^2} = \frac{(y_0 + b^{\frac{1}{2}})^2}{\left(x_0 + \frac{c}{b}\right)^2} \quad (3)$$

وبما أن $G \in \mathcal{M}_2$ ، يكون لدينا:

$$(y_0 + b^{\frac{1}{2}})^2 = \left(x_0 + \frac{c}{b}\right) (x_0 + a),$$

وبالتالي

$$\frac{(y_0 + b^{\frac{1}{2}})^2}{\left(x_0 + \frac{c}{b}\right)^2} = \frac{x_0 + a}{x_0 + \frac{c}{b}} \quad (4)$$

إن العلاقات (3) و (4) تعطينان العلاقة:

$$b \left(x_0 + \frac{c}{b}\right) = x_0^2 (x_0 + a),$$

أي

$$x_0^3 + ax_0^2 = bx_0 + c;$$

وهذا يعني أن x_0 حل للمعادلة ١٩.

في الحالة $\frac{c}{b} > a$ ، يبرهن بطريقة مماثلة وجود نقطة مشتركة $G(x_0, y_0)$ بين \mathcal{M}_1 و \mathcal{M}_2 وأن x_0 حل للمعادلة ١٩.

في الحالة $\frac{c}{b} = a$ ، يكون $x_0 = b^{\frac{1}{3}}$ حلاً للمعادلة ١٩ لأن:

$$b.b^{\frac{1}{3}} + c = (b^{\frac{1}{3}})^3 + a.(b^{\frac{1}{3}})^2.$$

نلاحظ، في هذه الحالة أن C و D هما النقطة نفسها وتكتب معادلة \mathcal{M}_2 كما يلي:

$$(y + b^{\frac{1}{3}}) = \pm(x + a),$$

لذلك، فإن \mathcal{M}_2 هي عبارة عن مستقيمين، أحدهما:

$$y = x + a - b^{\frac{1}{3}},$$

يقطع \mathcal{M}_1 في النقطة $G(x_0, y_0)$ حيث $x_0 = b^{\frac{1}{3}}$ والآخر

$$y = -(x + a + b^{\frac{1}{3}}),$$

يقطع، في بعض الحالات، الفرع الثاني من \mathcal{M}_1 في نقاط إحداثياتها السالبة.

ملاحظة: هنا أيضاً، كما في المسائل التي سبقت، كان بالإمكان اختيار قطعين يبدو أن أكثر ملاءمة: القطع المكافئ:

$$y = x^2 + ax$$

والقطع الزائد

$$y = \frac{c}{x} + b.$$


ينتهي الطوسي دراسة هذا النوع من المعادلات بتقديم حل عددي لثلاث معادلات منه (راجع الفصل الأول، الفقرة سادساً، الجداول أرقام (١ - ١٨) و (١ - ١٩) و (١ - ٢٠).

$$x^3 + bx = ax^2 + c \quad \text{المعادلة ٢٠:}$$

ليكن $AB = \sqrt{b}$ ؛ $AC = a$ ؛ $AC \perp AB$. ولتكن D نقطة على AC بحيث يكون $AD = \frac{c}{b}$ ، أي $AD \cdot AB^2 = c$.

ثلاث حالات تعترضنا:

الحالة الأولى: (الشكل رقم (٢ - ١٢٦))، أي $AD < AC$ ، أي $c < ab$.



الشكل رقم (٢ - ١٢٦)

نبنى المستطيل $ABED$ ونأخذ نصف الدائرة \odot ، ذات القطر CD ، نطيل BE إلى BL و BA إلى BU .

ونأخذ القطع الزائد \mathcal{H} ، ذا الخططين المقاربتين BL و BU والذي يمر بـ D ، فتكون النقطة B في منتصف قطره المجانب. لذلك فإن \mathcal{H} تدخل إلى داخل \mathcal{C} وتقطع \mathcal{C} في نقطة غير D . ومن أجل بيان ذلك، نأخذ PQ بحيث يكون:

$$\frac{AD}{DE} = \frac{DE}{PQ} \quad (1)$$

وهذا يعني

$$PQ = \frac{DE^2}{AD} = \frac{AB^2}{AD} = \frac{b^2}{c}.$$

لتكن O نقطة على AC تحقق العلاقة:

$$\frac{AD + PQ}{PQ} = \frac{DC}{CO} \quad (2)$$

فیکون

$$\frac{AD}{PQ} = \frac{DO}{OC}.$$

ولتكن $S \in \mathcal{C}$ بحيث يكون $OS \perp AC$ ، فيكون:

$$(O \text{ قدرة}) \quad OD \cdot OC = OS^2$$

ویکون

$$\frac{OD}{OS} = \frac{OS}{OC} ,$$

وبالتالي

$$\frac{OD^2}{OS^2} = \frac{OD}{OC} = \frac{AD}{PQ} = \frac{AD^2}{DE^2} .$$

فيكون

$$\frac{OD}{OS} = \frac{AD}{DE} ,$$

ومنها

$$\frac{OD}{AD} = \frac{OS}{DE} .$$

ونسمي J نقطة التقاء OS و BL ، فيكون $OJ = DE$ وبالتالي :

$$\frac{OD}{AD} = \frac{OS}{OJ} ;$$

لكن

$$\frac{OS}{OJ} < \frac{OS}{SJ}$$

فيكون

$$\frac{OD}{AD} < \frac{OS}{SJ} ,$$

وبالتالي

$$\frac{OA}{AD} < \frac{OJ}{SJ} .$$

وليكن N إسقاط S على AB فيكون :

$$\frac{SN}{AD} < \frac{DE}{SJ} ,$$

وبالتالي

$$SN.SJ < AD.DE$$

(٣)

إن المستقيم DE يقسم \mathcal{C} إلى قسمين، أحدهما في جهة AU والآخر في جهة نصف الدائرة \mathcal{C} . لذلك فإن \mathcal{C} يدخل حتماً إلى داخل \mathcal{C} وإلا فإنه يكون موجوداً بين DE ونصف الدائرة، وهذا الأمر محال. ولتبيان استحالة نأخذ النقطة P لالتقاء BS و \mathcal{C} ونسقطها عمودياً على BE و BA بالتتالي في نقطتين Y و U . فيكون $PYBU$ موجوداً كلياً داخل $SJBN$ ويكون :

$$SN.SJ > PY.YB$$

(٤)

لكن، بما أن P موجود على \mathcal{C} يكون :

$$PY.YB = DE.AD ;$$

فيكون، استناداً إلى (٣)

$$SN.SJ < PY.YB .$$

وهذا يعني أن الاستنتاج (٤) خاطئ، وبالتالي فإن افتراض عدم دخول \mathcal{H} في الدائرة \mathcal{G} ، خاطئ. لذلك، فإن \mathcal{H} تنفذ إلى داخل \mathcal{G} مقتربة بشكل مستمر من BL . لذلك فإن \mathcal{H} تقطع \mathcal{G} في النقطة C وفي نقطة أخرى هي G .

لتكن النقاط I ، K و M' إسقاطات G العمودية على AC ، BL و AB بالتالي. لدينا:

$$GK.KB = AD.AB \quad (\text{معادلة } \mathcal{H})$$

لتكن M تقاطع GM' و DE ؛ فيكون:

$$GK.GM = AD.DM$$

وبالتالي

$$IK.GM = AI.DM$$

فيكون

$$\frac{AB}{AI} = \frac{IK}{AI} = \frac{DM}{GM} = \frac{IG}{DI}$$

وبالتالي

$$\frac{AB^2}{AI^2} = \frac{IG^2}{DI^2} ;$$

لكن

$$(I \text{ قدرة}) \quad CI.DI = GI^2$$

فيكون

$$\frac{AB^2}{AI^2} = \frac{CI}{DI}$$

وبالتالي

$$AB^2.DI = AI^2.CI$$

ومنهما

$$AB^2.DI + AI^3 = AI^2.AC$$

وأيضاً

$$AB^2.DI + AI^3 + AB^2.AD = AI^2.AC + AB^2.AD$$

فيكون

$$AB^2.AI + AI^3 = AI^2.AC + AB^2.AD ;$$

فإذا وضعنا $AI = x$ ، يكون :

$$bx + x^3 = ax^2 + c$$

ويكون AI حلاً للمعادلة ٢٠.

الحالة الثانية: (الشكل رقم ٢) -

$$c = ab \text{ ؛ } AD = AC \text{ : (ب ٢٦)}$$

في هذه الحالة يكون AC حلاً
للمعادلة ٢٠ ، ذلك لأن :

$$AB^2.AC = bx = c$$


و

$$AC.AC^2 = ax^2 = x^3$$


فيكون

$$bx + x^3 = ax^2 + c .$$

الحالة الثالثة: (الشكل رقم (٢ - ٢٦ ج)) : $c > ab \text{ ؛ } AD > AC$.



الشكل رقم (٢ - ٢٦ ب)



الشكل رقم (٢ - ٢٦ ج)

نرسم DE و BE والدائرة \mathcal{C} والقطع الزائد \mathcal{H} . ونبرهن كما في السابق أن \mathcal{H}
تخترق \mathcal{C} وتقطعها في نقطة G . نرسم $GIK \perp AD$ ، I على AD ، K على BL ،
فيكون لدينا :

$$DI.IK = AI.IG ,$$

وبالتالي

$$\frac{AI}{IK} = \frac{AI}{AB} = \frac{ID}{IG} ,$$

فيكون

$$\frac{AI^2}{AB^2} = \frac{ID^2}{IG^2} = \frac{DI}{CI} ,$$

و

$$AI^2.CI = AB^2.DI ,$$

فيكون

$$(AI^3 - AI^2.CI) + AB^2.AD = AB^2.AD - AB^2.DI + AI^3 ,$$

وبالتالي

$$AI^2.AC + AB^2.AD = AB^2.AI + AI^3 ,$$

أي

$$ax^2 + c = bx + x^3 .$$

فيكون AI حلاً للمعادلة ٢٠.

تعليق

المعادلة $x^3 + bx = ax^2 + c$ حيث a, b, c أعداد حقيقية موجبة، لها جذر موجب على الأقل. وتبعاً لبعض قيم a, b و c يمكن أن يكون لها، بالإضافة إلى هذا الجذر، جذر موجب مزدوج أو جذران موجبان. نشير إلى عدم إمكانية وجود جذور سالبة لهذه المعادلة.

الحالات التي ميّزها الطوسي لا تتلاءم مع الحالات التي تنتج عن دراسة ومناقشة المعادلة. لكن هذه الحالات تسمح له بتحديد وضعيات نصف الدائرة وفرع القطع الزائد المستخدَمَيْن. وعلى غرار الخيتام، لم يبحث سوى عن جذر موجب واحد، بمساعدة نصف الدائرة وفرع القطع الزائد. ولم يشر الطوسي (وكذلك الخيتام) إلى إمكانية أن يكون لهذه المعادلة ثلاثة جذور موجبة.

في ما يتعلق باختيار المنحنيين، نلاحظ أن الصفر ليس جذراً للمعادلة ٢٠ التي يمكن كتابتها:

$$(x - a) = \frac{b}{x^2} \left(\frac{c}{b} - x \right) ;$$

إن ضرب طرفي هذه العلاقة بـ $(\frac{c}{b} - x)$ ، مدخلين جذراً إضافياً هو $x = \frac{c}{b}$ ، يُعطي :

$$(x - a) \left(x - \frac{c}{b} \right) = \left(\frac{cb^{-1}}{x} - b^{\frac{1}{2}} \right)^2 ;$$

فنضع

$$(y - b^{\frac{1}{2}})^2 = (x - a) \cdot \left(x - \frac{c}{b} \right)$$

وهي معادلة الدائرة \mathcal{C} ذات القطر CD ، $C(a, b^{\frac{1}{2}})$ ، $D(\frac{c}{b}, b^{\frac{1}{2}})$ ، فيكون معنا :

$$(y - b^{\frac{1}{2}})^2 = \left(\frac{cb^{-1}}{x} - b^{\frac{1}{2}} \right)^2 ,$$

التي تتفكك إلى :

$$(معادلة \mathcal{H}) \quad y = \frac{cb^{-1}}{x}$$

وإلى

$$y = 2b^{\frac{1}{2}} - \frac{cb^{-1}}{x}$$

والأخيرة هي معادلة القطع \mathcal{H}' المتناظر مع \mathcal{H} بالنسبة إلى CD . لذلك ، فإن $\mathcal{H} \cap \mathcal{C}$ و $\mathcal{C} \cap \mathcal{H}'$ متناظران بالنسبة إلى CD ، وبالتالي فإن الإحداثيات السينية لنقاط الالتقاء المتناظرة متساوية .

من أجل برهان وجود نقطة التقاء بين \mathcal{C} و \mathcal{H} ، يأخذ الطوسي في الحالة $\frac{c}{b} < a$ ، النقطة $S(x', y')$ من \mathcal{C} حيث :

$$(a - x') = \frac{\left(a - \frac{c}{b} \right)}{\left(1 + \frac{c^2}{b^3} \right)} \quad (1)$$

فيكون

$$(b^{\frac{1}{2}} - y')^2 = \left(x' - \frac{c}{b} \right) (a - x') ,$$

وبالتالي يكون

$$\frac{b^{\frac{1}{2}} - y'}{a - x'} = \frac{x' - \frac{c}{b}}{b^{\frac{1}{2}} - y'} ;$$

واستناداً إلى (1)

$$\frac{\left(x' - \frac{c}{b} \right)^2}{(b^{\frac{1}{2}} - y')^2} = \frac{x' - \frac{c}{b}}{a - x'} = \frac{c^2}{b^3} ,$$

وبالتالي

$$\frac{x' - \frac{c}{b}}{b^{\frac{1}{2}} - y'} = \frac{c}{b^{\frac{1}{2}}} ,$$

فيكون

$$\frac{x' - \frac{c}{b}}{\frac{c}{b}} = \frac{b^{\frac{1}{2}} - y'}{b^{\frac{1}{2}}},$$

لكن

$$\frac{b^{\frac{1}{2}} - y'}{b^{\frac{1}{2}}} < \frac{b^{\frac{1}{2}} - y'}{y'},$$

فيكون

$$\frac{x'}{\left(\frac{c}{b}\right)} < \frac{b^{\frac{1}{2}}}{y'},$$

وبالتالي

$$x'.y' < c.b^{-\frac{1}{2}} \quad (٢)$$

نفرض أن \mathcal{H} لا ينفذ إلى داخل \mathcal{C} ونأخذ:

$$P = P(X, Y) \in \mathcal{H} \cap \Delta$$

حيث Δ هو المستقيم BS

$$\Delta = \left\{ (x, y) ; y = \frac{y'}{x'} \cdot x \right\}$$

يكون P عندئذٍ خارج \mathcal{C} ، فيكون:

$$X.Y < x'.y' ;$$

لكن P موجود على \mathcal{H} ، وبالتالي فإن لدينا:

$$X.Y = cb^{-\frac{1}{2}}$$

إذاً، واستناداً إلى (٢) يكون:

$$x'.y' < X.Y$$

وهو خُلف. لذلك، فإن \mathcal{C} و \mathcal{H} يلتقيان في نقطة G تساوي $G(x_0, y_0)$ ، ويكون x_0 حلاً للمعادلة ٢٠؛ ولبرهان ذلك، نلاحظ أن لدينا،

$$x_0 \cdot y_0 = c \cdot b^{-\frac{1}{2}},$$

وذلك لأن $G \in \mathcal{H}$. فيكون:

$$y_0 \left(x_0 - \frac{c}{b} \right) = \frac{c}{b} (b^{\frac{1}{2}} - y_0),$$

ويكون

$$b^{\frac{1}{2}} \left(x_0 - \frac{c}{b} \right) = x_0 (b^{\frac{1}{2}} - y_0),$$

وبالتالي يكون:

$$\frac{b}{x_0^2} = \frac{(b^{\frac{1}{2}} - y_0)^2}{\left(x_0 - \frac{c}{b}\right)^2} \quad (٣)$$

وبما أن $G \in \mathcal{C}$ ، يكون:

$$(b^{\frac{1}{2}} - y_0)^2 = \left(x_0 - \frac{c}{b}\right) (a - x_0) ,$$

واستناداً إلى (٣) يكون:

$$\frac{b}{x_0^2} = \frac{a - x_0}{x_0 - \frac{c}{b}} ,$$

وبالتالي فإن لدينا:

$$x_0^3 + bx_0 = ax_0^2 + c ,$$

في الحالة $\frac{c}{b} = a$ نتحقق من أن $x_0 = a$ هو حل للمعادلة، ذلك لأن:

$$a^3 + b.a = a.a^2 + c.$$

نشير، في هذه الحالة، إلى أن C و D هما النقطة نفسها، وأن \mathcal{C} مختزلة إلى نقطة وأن $\mathcal{C} \cap \mathcal{H}$ مختزلة إلى النقطة C ذات الإحداثية السينية $x_0 = a$.

في الحالة الثالثة، $\frac{c}{b} > a$ ، يلتقي \mathcal{H} و \mathcal{C} أيضاً في نقطة G تساوي $G(x_0, y_0)$ ، غير النقطة D ، وذلك للأسباب نفسها التي وردت سابقاً؛ ونبرهن أن x_0 حل للمعادلة ٢٠. فلدينا

$$\left(\frac{c}{b} - x_0\right) . b^{\frac{1}{2}} = x_0(y_0 - b^{\frac{1}{2}}) ,$$

وبالتالي

$$\frac{x_0^2}{b} = \frac{\left(\frac{c}{b} - x_0\right)}{(x_0 - a)} ,$$

فيكون

$$x_0^3 + bx_0 = ax_0^2 + c .$$

وينتهي الطوسي دراسته لهذا النوع من المعادلات بحل عددي لثلاثة أمثلة منها (انظر الفصل الأول، الفقرة سادساً، الجداول أرقام (١ - ٢١) و (١ - ٢٢) و (١ - ٢٣)).

ملاحظة ١: يمكن أن تحل المعادلة ٢٠ عن طريق القطع المكافئ \mathcal{P}

$$y = x^2 - ax ,$$

والقطع الزائد \mathcal{H}

$$y = \frac{c}{x} - b .$$

ملاحظة ٢ : المعادلة ٢٠ هذه هي المسألة الوحيدة التي طرح فيها الخيām مسألة برهان وجود نقاط التقاء للمنحنيين المستخدمين. لكن مقارنة طريقته في البرهان مع طريقة الطوسي تظهر فوارق واضحة. فنلاحظ أن الطوسي يُدخل مفهوم المسافة من نقطة إلى خط مستقيم ويستخدم هذا المفهوم ليضع حداً أقصى لبعض المسافات؛ كما أنه يستخدم في الوقت نفسه معادلة المنحني بشكل صريح. إلا أن الخيām يستخدم قضية تتعلق بإنشاء هندسي وضعها أبولونيوس ويستنتج، عن طريق محاولة برهان هندسي. وسوف نرى في ما سيتبع، أن نهج الطوسي العام كان بشكل ما تحليلياً - هندسياً.

تعليقات إضافية^(١)

[2.8] عبارة «المعادلة» التي أدخلها الناسخ المجهول، استعملها الطوسي، على أية حال، مرتين في مجرى «الرسالة». لكن، هنا، كما عند الختّام وباقي الجبريين، المقصود بهذه العبارة هو مساواة بين أنواع مختلفة - عدد، «شيء»، مربع، مكعب، ... الخ. على هذا الأساس كتب الختّام «واستخراجات الجبر إنما تتم بالمعادلة، أعني بمعادلة هذه المراتب بعضها ببعض على ما هو مشهور».

وهذا هو المعنى نفسه الذي نلتقيه في رسالة الطوسي كما في النصوص الجبرية العربية الأخرى.

[2.8] عبارة «التخت» فارسية معربة لها معانٍ عدة، منها «المكان المسطح». وقبل القرن العاشر، كانت هذه العبارة، في الحساب الهندي، تعارضاً مع الحساب الاصبعي، تشير إلى لوح تنثر عليه طبقة رقيقة من الرمل الناعم^(٢) وتُرسَم عليه الأرقام حيث تجري عليها عمليات الإزاحة أو المحو بواسطة أقلام خاصة أو، بكل بساطة، بواسطة الاصبع.

وقد عرض الإقليدسي في القرن العاشر [٣٤١هـ/ ٩٥٢ - ٩٥٣م] استبعاد هذه الوسيلة المادية مع الإبقاء على وظيفتها، مقدماً الورق بديلاً عنها لتدوين العمليات الحسابية المتتالية، مبقياً على عبارة «التخت» للإشارة إلى اللوحة^(٣) التي تودع عليها نتائج كل مرحلة. ويشرح الإقليدسي دواعي هذا التغيير كما يلي: «وذلك أن كثيراً من الناس يكره إظهار التخت بين يديه عند حاجته إلى استعمال هذا الفن من الحساب لما فيه من سوء تأويل من يحضره أو يراه بين يديه فينقص ذلك منه إذ كان يُرى بين يدي من لا خلاق له من المتكسبين بالتنجيم على الطرقات ومما لا يزال يعرض للحاسب به من استئثار اعتبار ما يحسبه فيه وشدة حاجته في أكثر الأمر إلى إعادته وتكشف معانيه في هبوب الريح من تغيير رسومه وما يلحقه فيه من تدنيس كفه وغير ذلك من الأسباب

(١) يرمز الرقمان داخل المعقوفتين إلى: الأول رقم الصفحة بحسب الأرقام العربية، والثاني رقم السطر في الفصل الرابع: النصوص.

(٢) الغبار. (المترجم).

(٣) المكان من الورقة. (المترجم).

المفسدة لما انتظم منه» [الإقليدسي، الفصول في الحساب الهندي، تحقيق أحمد سعيدان، تاريخ علم الحساب العربي؛ ج ٢ (عمان: الأردنية للتعريب والنشر والترجمة، ١٩٧٣)، ص ٣١٥].

كلمة «الجدول» تعود إلى أصل يعبر عن «التوالي المنتظم». وقد يعني «الساقية»، «مجرى الماء» كما قد يعني مخطط كتاب أو لائحة محتويات هذا الكتاب. إنها بالتحديد الكلمة التي استعارها مترجمو كتاب المجسطي العرب لترجمة كلمة «κανών»: وكأحد الأمثلة على ذلك، نأخذ ترجمة الحجاج للعبارة:

καὶ ἐστὶν ἡ τοῦ κανονίου καταγραφὴ τοιαύτη

التي أوردها كما يلي: «وهكذا تخطيط الجداول» [مخطوطة ليدن شرقيات، ٦٨٠، ورقة ٨^١ [1.35]، و: [Heiberg, t. 1, p. 47, [1.21]]. وهو ما تحول مع حنين بن اسحق إلى «وهكذا رسم الجداول». المقصود بهذه العبارة إذن، اللوحة التي تودع عليها نتائج الحساب أو القيم التي تنتج من الملاحظة.

إذا ما توقفنا عند كتب جبريّ القرنين الحادي عشر والثاني عشر، نستنتج أن هناك فرقاً واضحاً بين هذين النوعين من اللوحات. فعبارة «تخت»، «لوح الرمل»^(٤) تستعمل في حالة عملية حسابية واحدة على الأعداد الصحيحة أو على التعابير الجبرية. بينما يعني «الجدول» في غالب الأحيان، لوحة يُودع عليها مجموع النتائج أو مجموع الأمثلة. هذا التفريق بين العبارتين يُستخلص من استعمالهما ليس فقط في «رسالة» الطوسي وإنما في كتابي معاصره السموال [انظر: السموال بن يحيى بن عباس المغربي: الباهر في الجبر، تحقيق وتحليل صلاح أحمد ورشدي راشد، سلسلة الكتب العلمية؛ ١٠ (دمشق: جامعة دمشق، ١٩٧٢)، ص ٤٤ وما بعدها، وص ١٩٤ وما بعدها، والقوامي في الحساب الهندي (Mss. Medicea Laurenziana, Orient) 238, f. 5^r sqq., et f. 96^v sqq (دمشق: وهنا، كما فعل السموال، كان كل ما مارسه الطوسي يتفق مع نهج متبع في ذلك العصر.

[2.9] من السابق لأوانه المعرفة الدقيقة لمدى رسالة الطوسي وللتأثير الذي تركته في الرياضيات، سواء في الشرق أو في الغرب. ونعرف حالياً أن هذه الرسالة قد قرئت من قبل رياضيين في القرن الثالث عشر. لكننا رأينا، من جهة أخرى أن استنساخها استمر حتى القرن التاسع عشر. وقد كان لهذا الأمر أن يُفسر على أنه عملية دفعت إليها هواية مكتبية، لو لم نجد أثراً مما يتميز به الطوسي، ظاهراً على النشاطات الرياضية

(٤) أو الغبار. (المترجم).

المتأخرة. فيصمات الطوسي تظهر بديهياً، بالتحديد في رسالة كُتبت في أصفهان عام ١٨٢٤م وحوّت على ما يبدو نتائج أخرى من رياضيات القرون الوسطى. إن استمرار بقاء النهج الرياضي، هذا، في كثير من بلدان الشرق، موضوع يهم بالدرجة الأولى سوسيولوجيا العلوم، كما أن له أهميته في مجال تاريخ العلوم. وقد شكل هذا الاستمرار أحياناً، وسيلة قيمة للتخفيف من النتائج السلبية لفقدان الرسائل الأصلية. وسنستخدم هذه الأداة التي أهملها مؤرخو العلم العربي - الإسلامي، لكي نبين بعض مظاهر تأثير مساهمة الطوسي في الأعمال اللاحقة.


ففي العام ١٨٢٤م ألّف ميرزا علي محمد بن محمد بن حسين الأصفهاني كتاباً بعنوان تكملة العيون، كان الهدف منه على ما يبدو، إتمام رسالة عيون الحساب لليزدي. وكتاب الأصفهاني هذا هو عبارة عن مخطوطة أصيلة [مخطوطة جامعة طهران رقم ٣٥٥٢]. هذا الكتاب الذي لم يتفحصه أحد حتى الآن، مكرّس للمعادلات الخمس والعشرين من الدرجة الثالثة وما دون ويتكامل بالتالي مع تقليد الخيام والطوسي. إن عنوانها لا يترك أي مجال للإيهام بشأن المشروع المحرّك لهذا العمل: «في استخراج خمس وعشرين مسألة من المسائل الجبرية خمس منها مشهورة والباقي غير مذكور». لكن التصنيف الذي اعتمده يختلف عن تصنيف الطوسي. فهو لا يعتمد كمعيار، سوى عدد الحدود: فلدينا بالتالي ست معادلات ذات حدّين، اثنتا عشرة ذات ثلاثة حدود، أربع رباعية الحدود - طرف من حد مساوٍ لطرف من ثلاثة حدود - وأخيراً ثلاث معادلات رباعية الحدود حيث كل طرف من المعادلة يحوي حدّين.

ولسنا هنا لنعرض النتائج التي يحويها هذا الكتاب؛ لن نتعرض بشكل أساسي سوى للحل العددي للمعادلات، حيث نجد طرقاً تعود إلى القرون الوسطى وبصورة خاصة إلى طريقة الطوسي. نبدأ بتقديم هذه الطريقة كما يُطبّقها الأصفهاني في حل المعادلات العددية. إن التحوير الوحيد الملحوظ هو تطبيقه لهذه الطريقة في تحديد القيم التقريبية، ولكي نبين مسعاه بالمقارنة مع مسعى الطوسي، سنحلل أحد أمثلته، مستعينين باللغة التي تبيّناها عند تحليل نص هذا الأخير.

لنأخذ المعادلة:

$$(E) \quad f(x) = x^3 - bx + c = 0$$

ذات المعاملات الصحيحة ونأخذ الحالة التي تحوز فيها على جذرين موجبين x_1 و x_2 . إن الرسم البياني لـ $y = f(x)$ هو:



ولنشكّل استقرائياً المعادلات التالية :

$$(E_0) \quad f_0(x) = f(x) = x^3 + a_0x^2 + b_0x + c_0 ; (a_0 = 0, b_0 = -b, c_0 = c)$$

.....

$$(E_r) \quad f_r(x) = f_{r-1}(x + t_r) = x^3 + a_rx^2 + b_rx + c_r \quad (r = 1, 2, \dots)$$

ولنذكر [راجع الفصل الأول] أن جذور (E_r) هي بالضبط جذور (E_{r-1}) بإنقاص t_r من كل منها؛ وبالإمكان القول إنها أيضاً جذور (E_0) بإنقاص $(t_1 + t_2 + \dots + t_r)$ من كل منها.

وإذا بدأنا بتطبيق $Tab(3; t_k; a_{k-1}, b_{k-1}, c_{k-1})$ حيث $(k = 1, 2, \dots)$ ، والذي مخارجه هي: a_k, b_k, c_k ، نجد:

$$a_k = 3(t_1 + \dots + t_k) = T_k \quad (1)$$

$$b_k = 3T_k^2 - b,$$

$$c_k = T_k^3 - bT_k + c = f(T_k).$$

ويعطي الأصفهاني طريقة لإيجاد قيمة مقرّبة (بالنقصان) لـ x_1 على الشكل:

$$T_k = t_1 + t_2 + \dots + t_k.$$

نشير هنا إلى أنه يأخذ في الاعتبار ضمناً، استمرارية الدالة f_k وتناقص الدالة f في الفترة $[0, x_1]$. وتعتمد طريقة الأصفهاني تحديد t_k على الشكل التالي:

$$\left[t_{k+1} \text{ هي قيمة مقرّبة بالنقصان لـ } \frac{c_k}{b}, \text{ حيث } (k = 0, 1, \dots) \right].$$

نستطيع، إذاً، أن نبين العلاقة (P_k) التالية، (انظر الشكل البياني):

$$(P_k) \quad 0 < T_k = t_1 + \dots + t_k \leq x_1, \quad (k = 1, 2, \dots)$$

وهذا يعطي:

$$c_k = f(T_k) \geq f(x_1) = 0.$$

ف لدينا

$$x_1^3 - bx_1 + c = 0$$

ومنها

$$0 < x_1^3 = bx_1 - c,$$

التي تعطي

$$x_1 > \frac{c}{b} \geq t_1.$$

فالعلاقة (P_k) هي، إذاً، محققة عند كون $k = 1$. ولنفرض الآن أنها محققة في ما يتعلق بكل عدد صحيح h ، $(h \leq k)$ ، أي أن:

$$x_h = x_1 - T_h \geq 0.$$

بما أن x_k جذر لـ (E_k) يكون لدينا:

$$f_k(x_k) = x_k^3 + a_k x_k^2 + b_k \cdot x_k + c_k = 0,$$

من هنا، وأخذاً في الاعتبار (١) يكون لدينا:

$$0 < x_k^3 + 3T_k^2 x_k^2 + 3T_k x_k = bx_k - c_k,$$

فيكون

$$x_k > \frac{c_k}{b} > t_{k+1},$$

$$x_1 - t_k > t_{k+1}$$

أي

ويكون

$$x_1 - T_{k+1} > 0.$$

ومما سبق يتبين أن (P_k) محققة بالنسبة إلى أي عدد صحيح k .

وإذا كان القصد مقارنة x_1 بواسطة T_r ، فمن الواضح أن متابعة الطريقة، أو إيقافها، يتعلق بـ c_r كما تظهر العلاقة:

$$c_r = f_r(0) = f_{r-1}(t) = \dots = f(t_1 + t_2 + \dots + t_r) = f(T_r).$$

فإذا كان $c_r = 0$ مثلاً يكون T_r هو الجذر المطلوب؛ وإذا كان c_r قريباً من الصفر بما فيه الكفاية، نستطيع أن نستنتج، استناداً إلى تواصل f ، أن T_r هي قيمة مقربة من x (بالقصان). ويستخدم الأصفهاني عبارة مكافئة:

$$c_r = T_r^3 - T_{r-1}^3 + (c_{r-1} - bt_r) \quad (٢)$$

صالحة بالنسبة إلى $(r = 1, 2, \dots)$ شرط اعتبار $T_0 = 0$. وإذا ما سمينا T_r^3 الكعب من المرتبة r و $R_r = (c_{r-1} - bt_r)$ «الباقي» من المرتبة r كما فعل الأصفهاني، فيمكن كتابة (٢) على الشكل التالي:

$c_r =$ الكعب من المرتبة r ناقص الكعب من المرتبة $(r-1)$ زائد الباقي من المرتبة r .

ويجد الأصفهاني الباقي من المرتبة r بواسطة القسمة بكل بساطة. ولشرح كيفية احتسابه لـ $T_r^3 = (t_1 + t_2 + \dots + t_r)^3$ ، حيث $(r = 1, 2, \dots)$ ، نفرض أن:

$$T_r = t_1 + \dots + t_r = a_0 10^m + \dots + a_m + \gamma_1 10^{-1} + \dots + \gamma_h 10^{-h}$$

ونضع

$$a_k 10^{m-k} = s_k$$

$$\sum_{-1} = 0, \quad \sum_k = s_0 + \dots + s_k; \quad (k = 0, 1, \dots, m)$$

$$\Gamma_0 = \sum_m; \quad \Gamma_j = 10^j \sum_m + 10^{j-1} \gamma_1 + \dots + \gamma_j \quad (j = 1, 2, \dots, k).$$

إن الأصفهاني يطبق أولاً:

$$Tab(3; s_k; 3 \sum_{k-1}, 3 \sum_{k-1}^2, \sum_{k-1}^3)$$

حيث $k = 0, 1, \dots, m$

$$(k.1) \quad 3 \sum_{k-1} \quad 3 \sum_{k-1}^2 \quad \sum_{k-1}^3$$

$$(k.2) \quad \frac{s_k}{3 \sum_{k-1} + s_k} \quad \frac{(3 \sum_{k-1} + s_k) s_k}{3 \sum_{k-1}^2 + (3 \sum_{k-1} + s_k) s_k} \quad \frac{\{3 \sum_{k-1}^2 + (3 \sum_{k-1} + s_k) s_k\} s_k}{\sum_{k-1}^3 + \{3 \sum_{k-1}^2 + (3 \sum_{k-1} + s_k) s_k\} s_k} = \sum_k^3$$

$$(k.4) \quad \frac{s_k}{3 \sum_{k-1} + 2s_k} \quad \frac{(3 \sum_{k-1} + 2s_k) s_k}{3 \sum_{k-1}^2 + (6 \sum_{k-1} + 3s_k) s_k} = 3 \sum_k^2$$

$$(k.6) \quad \frac{s_k}{3 \sum_{k-1} + 3s_k} = 3 \sum_k$$

$$(k.7)$$

ومن ثم يُطبق، $(10\Gamma_{j-1})^3$ ، $3(10\Gamma_{j-1})^2$ ، $3\gamma_j$ ؛ Tab حيث $j = 1, 2, \dots, h$.

$$\begin{array}{lll}
 (j,1)' & 3(10\Gamma_{j-1}) & 3(10\Gamma_{j-1})^2 \quad (10\Gamma_{j-1})^3 \\
 (j,2)' & \frac{\gamma_j}{3 \times 10\Gamma_{j-1} + \gamma_j} & \frac{(3 \times 10\Gamma_{j-1} + \gamma_j)}{3(10\Gamma_{j-1})^2 + (3 \times 10\Gamma_{j-1} + \gamma_j)\gamma_j} \quad \frac{(3(10\Gamma_{j-1})^2 + (3 \times 10\Gamma_{j-1} + \gamma_j)\gamma_j)\gamma_j}{(10\Gamma_{j-1})^3 + (3(10\Gamma_{j-1})^2 + (3 \times 10\Gamma_{j-1} + \gamma_j)\gamma_j)\gamma_j} = \Gamma_j^3 \\
 (j,3)' & & \\
 (j,4)' & \frac{\gamma_j}{3 \times 10\Gamma_{j-1} + 2\gamma_j} & \frac{(3 \times 10\Gamma_{j-1} + 2\gamma_j)\gamma_j}{3(10\Gamma_{j-1})^2 + (6 + 10\Gamma_{j-1} + 3\gamma_j)\gamma_j} = 3\Gamma_j^2 \\
 (j,5)' & & \\
 (j,6)' & \frac{\gamma_j}{3 \times 10\Gamma_{j-1} + 3\gamma_j} = 3\Gamma_j & \\
 (j,7)' & &
 \end{array}$$

إن تكرار هذا المخطط يعطي في الكرة الـ h مخرجاً هو :

$$\Gamma_h^3 = [10^h(s_0 + \dots + s_m + \gamma_1 10^{-1} + \dots + \gamma_h \cdot 10^{-h})]^3 = (10^h T_r^3),$$

مما يعطي $(T_r)^3$ ، بواسطة إزاحة بسيطة. وهذا يسمح باحتساب c_r ، استناداً إلى أن احتساب c_{r-1} قد حصل.

إن التحليل السابق يبين أن الطريقة المتبعة هي طريقة الطوسي. كما يُظهر أن التوسيع الذي قدمه الأصفهاني لهذه الطريقة يتناول الظاهر أكثر مما يطال الجوهر. يبقى أن الأصفهاني أدخل بعض التحويرات اللغوية التي تعود إلى تقليد الجبريين الحسابيين مثل الكاشي عند استتصال الجذر النوني لعدد صحيح. فجرباً على هذا التقليد، نجد أنه سقى العمود الأول من اللوحة «عمود الضلع»، والعمود الثاني «عمود المربع»، والثالث «عمود الكعب». نشير أخيراً إلى أن الأصفهاني، عند بنائه للوحات، كان يُهمَل السطور البديهية (المبتدلة). وإنهاء لهذه النقطة، نأخذ مثلاً من أمثلة الأصفهاني:

$$b = 144000, \quad c = 661\,4136$$

القسم الأول

$$\begin{array}{l}
 T_1^3 = t_1^3 = 91125 \\
 R_1 = 134134 \\
 c_1 = 225259
 \end{array}$$

$$c = t_1 \cdot b + R_1 = 45 \times 144000 + 134136$$

$$\begin{array}{ll}
 (0.3.3) = (1.1.3) & 6\,4\,0\,0\,0 \\
 (1.2.3) & 2\,7\,1\,2\,5 \\
 (1.3.3) & \underline{9\,1\,1\,2\,5} = t_1^3 \\
 (0.3.2) & 1\,6\,0\,0 \\
 (0.4.2) & 3\,2\,0\,0 \\
 (0.5.2) = (1.1.2) & 4\,8\,0\,0 \\
 (1.2.2) & \underline{6\,2\,5} \\
 (1.3.2) & \underline{5\,4\,2\,5} \\
 (0.3.1) & 4\,0 \\
 (0.5.1) & 8\,0 \\
 (0.7.1) = (1.1.1) & \underline{1\,2\,0} \\
 (1.3.1) & 1\,2\,5
 \end{array}$$

القسم الثاني

$$\begin{aligned} T_2^3 &= 100544,625 \\ T_1^3 &= 91125 \\ T_2^3 - T_1^3 &= 9419,625 \\ R_2 &= 9261 \\ c_2^2 &= 18680,625 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_1 &= t_2 b + R_2 = 1,5 \times 144000 + 9261 \\ t_1 + t_2 &= 45 + 1,5 = 46,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (0.3.3) &= (1.1.3) & 6 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ & (1.2.3) & 3 & 3 & 3 & 3 & 6 \\ & (1.3.3) & 9 & 7 & 3 & 3 & 6 \\ & (1.1.3)' & 9 & 7 & 3 & 3 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ & (1.2.3)' & 3 & 2 & 0 & 8 & 6 & 2 & 5 \\ & (1.3.3)' & 1 & 0 & 0 & 5 & 4 & 4 & 6 & 2 & 5 = (10T_2)^3 \\ \hline & (0.3.2) & 1 & 6 & 0 & 0 \\ & (0.4.2) & 3 & 2 & 0 & 0 \\ & (0.5.2) = (1.1.2) & 4 & 8 & 0 & 0 \\ & (1.2.2) & 7 & 5 & 6 \\ & (1.3.2) & 5 & 5 & 5 & 6 \\ & (1.4.2) & 7 & 9 & 2 \\ & (1.5.2) & 6 & 3 & 4 & 8 \\ & (1.1.2)' & 6 & 3 & 4 & 8 & 0 & 0 \\ & (1.2.2)' & 6 & 9 & 2 & 5 \\ & (1.3.2)' & 6 & 4 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ \hline & (0.3.1) & 4 & 0 \\ & (0.5.1) & 8 & 0 \\ & (0.7.1) & 1 & 2 & 0 \\ & (1.3.1) & 1 & 2 & 6 \\ & (1.4.1) & 6 \\ & (1.5.1) & 1 & 3 & 2 \\ & (1.6.1) & 6 \\ & (1.7.1) & 1 & 3 & 8 \\ & (2.3.1)' & 1 & 3 & 8 & 5 \end{aligned}$$

القسم الثالث

T_3^3	=	101325,045528	
T_2^3	=	100544,625	(0.3.3) = (1.1.3)
$T_3^3 - T_2^3$	=	780,420528	(1.2.3)
R_3	=	1400,625	(1.3.3)
c_3	=	2181,045528	(1.3.3)'
			(1.2.3)'
			(1.3.3)'
			(2.1.3)'
			(2.2.3)'
			(2.3.3)'
			(0.3.2)
			(0.4.2)
			(0.5.2) = (1.1.2)
			(1.2.2)
			(1.3.2)
			(1.4.2)
			(1.5.2)
			(1.1.2)'
			(1.2.2)'
			(1.3.2)'
			(1.4.2)'
			(1.5.2)'
			(2.1.2)'
			(2.2.2)'
			(2.3.2)'
			(0.3.1)
			(0.5.1)
			(0.7.1)
			(1.3.1)
			(1.5.1)
			(1.7.1)
			(1.3.1)'
			(1.5.1)'
			(1.7.1)'
			(2.3.1)'

القسم الرابع

$$i_1 + i_2 + i_3 + i_4 = 46,62 + 0,015 = 46,635$$

$$c_3 = i_4 \times b + R_4 = 2181,045528 = 0,015 \times 144000 + 21,045528,$$

(0.0.3) = (1.1.3)	6 4 0 0 0
(1.2.3)	3 3 3 3 6
(1.3.3)	9 7 3 3 6
(2.1.3)'	9 7 3 3 6 0 0 0
(2.2.3)'	3 8 5 8 6 9 6
(2.3.3)'	1 0 1 1 9 4 6 9 6
(3.1.3)'	1 0 1 1 9 4 6 9 6 0 0 0
(3.2.3)'	1 9 5 5 6 6 2 4 7
(3.3.3)'	1 0 1 3 9 0 2 6 2 2 4 7
(4.1.3)'	1 0 1 3 9 0 2 6 2 2 4 7 0 0 0
(4.2.3)'	3 2 6 1 8 8 5 0 8 7 5
(4.3.3)'	1 0 1 4 2 2 8 8 1 0 9 7 8 7 5 = (10 ³ T ₄) ³
(0.3.2)	1 6 0 0
(0.4.2)	3 2 0 0
(0.5.2) = (1.1.2)	4 8 0 0
(1.2.2)	7 5 6
(1.3.2)	5 5 5 6
(1.4.2)	7 9 2
(1.5.2)	6 3 4 8
(1.1.2)'	6 3 4 8 0 0
(1.2.2)'	8 3 1 6
(1.3.2)'	6 4 3 1 1 6

(1.4.2)'	8 3 5 2
(1.5.2)'	6 5 1 4 6 8
(2.1.2)'	6 5 1 4 6 8 0 0
(2.2.2)'	4 1 9 4 9
(2.3.2)'	6 5 1 8 8 7 4 9
(2.4.2)'	4 1 9 5 8
(2.5.2)'	6 5 2 3 0 7 0 7
(3.1.2)'	6 5 2 3 0 7 0 7 0 0
(3.2.2)'	6 9 9 4 7 5
(3.3.2)'	6 5 2 3 7 7 0 1 7 5
(0.1.1)	4 0
(1.3.1)	1 2 6
(1.4.1)	6
(1.5.1)	1 3 2
(1.6.1)	6
(1.7.1)	1 3 8
(1.3.1)'	1 3 8 6
(1.4.1)'	6
(1.5.1)'	1 3 9 2
(1.6.1)'	6
(1.7.1)'	1 3 9 8
(2.3.1)	1 3 9 8 3
(2.4.1)'	3
(2.5.1)'	1 3 9 8 6
(2.6.1)'	3
(2.7.1)'	1 3 9 8 9
(3.3.1)'	1 3 9 8 9 5

[3.6] نذكر بأن «الضلع القائم» للقطع المكافئ هو ضعف وسيطه^(٥)، هكذا انتقل إلى العربية التعبير اليوناني «*ὀρθία*» (وُضِعَناً «*πλευρά*»). نسجل بأن مصطلحات الطوسي في هذا الجزء التمهيدي هي عينها مصطلحات ترجمة كتاب المخروطات لأبولونيوس التي درج الرياضيون على تبنيها قبل الطوسي بزمان طويل.

[3.15] «قطع مكافئ»: المقصود في الواقع هو نصف القطع المكافئ. ولقد كان هذا الاستعمال مهيماً في ذلك العصر. لذلك لن نعود إلى الإشارة إليه في ما بعد.

[4.5] «فهو عمود على قطر القاعدة». ليكن \mathcal{P} سطح القطع. السطحان \mathcal{P} و (ABC) متعامدين حسب المعطيات ويلتقيان على الخط EF . فمطلق خط مرسوم في \mathcal{P} عمودياً على EF هو عمود على (ABC) . يكون GF إذن في قاعدة المخروط ويكون بالتالي عموداً على BC .

[8.3] كانت هذه القضية محط اهتمام الرياضيين منذ ترجمة المخروطات. كما أنها شغلت الفلاسفة السابقين للطوسي. ففي المخروطات، 2.14، نقرأ:

Αἱ ἀσύμπτωτοι καὶ ἡ τομὴ εἰς ἄπειρον ἐκβαλλόμεναι ἔγγιον τε
προσάγουσιν ἑαυταῖς καὶ παντός τοῦ δοθέντος διαστήματος εἰς
ἐλάττον ἀφικνοῦνται διάστημα

وهو ما نقله المترجم العربي كما يلي:

«الخطان اللذان لا يقعان على القطع وخط القطع - إذا أخرجت - فإنها كلما بعدت من الزاوية التي يحيط بها الخطان قرب الخطان من القطع. وإن فرض مقدار ما فسيوجد مقدار آخر فيما بين القطع وكل واحد من الخطين أقل منه».

يعود الطوسي إلى هذه «القضية» مرتين: هنا وفي «الكتيب» الذي كرسه لها. لكن، قبله بمدة لا بأس بها، كتب في ما خصّ هذا الموضوع ثلاثة من الرياضيين رسائل سنحقتها وندرسها في مكان آخر. وهؤلاء الرياضيون هم: السُّجْزِي، القَمِّي وابن الهيثم. وفي كل حال لم يكن هؤلاء الرياضيون الوحيدين الذين عالجوا هذه المسألة. فقد حقق مارشال كلاغيت (M. Clagett) في مؤلفه الضخم: *Archimedes in the Middle Ages* ترجمة لاتينية لمذكّرة عربية لم يتم إيجادها حتى الآن تحت عنوان «Tractatus de duabus lineis semper approximantibus sibi invicem et numquam concurrentibus» بها جان دو باليرم (Jean de Palerm). ومن دون أن ندخل في وصف وتحليل مختلف المذكرات هذه، نسجل فقط أن مقارنتها مع نص الطوسي تظهر أن هذا النص لم يكن أعمق منها ولا أشمل. وهنا، كما في «الكتيب» يجيب الطوسي عن السؤال المطروح

(٥) الوسيط هو البارامتر، أي p في المعادلة $y^2 = 2px$ (المترجم).

أمامه بالتحديد وهو: دراسة معادلة المنحني - القطع الزائد - في نظام متحاور آخر، بهدف استخدامها لاحقاً عند بناء جذور المعادلات.

[14.7] نستطيع مقارنة هذه المسألة بالقضية 2.4 من كتاب المخروطات يتخذ الطوسي هنا، خلافاً لأبولونيوس، زاوية قائمة BAC ونقطة D ، أقرب إلى AB .

[15.11 وما يليها] «الواحد الخطي»، «الواحد السطحي»، «الواحد الجسمي»؛ «الجذر الخطي»، «الجذر السطحي»، «الجذر الجسمي»؛ «المربع (المال) السطحي»، «المال المجسم»؛ هذه المصطلحات التي أعدها وحددها الطوسي تستجيب لهدفين مترابطين = إسناد المعادلات إلى قاعدة هندسية متينة من جهة؛ وتأمين التجانس الذي يقتضيه هذا الإسناد من جهة أخرى. ومن المعروف أن قاعدة التجانس أو الـ *lex* *homogeneorum* كما كتب فييت (Viète) ترتبط مباشرة - تاريخياً ومنطقياً - بمجمل عمل ترجمة المعطيات الجبرية إلى البنى الهندسية. لذلك فليس من المستغرب أو المفاجيء عدم مصادفة شيء من هذا القبيل في رسائل ومذكرات الجبر الحسابي مثل أعمال الكرجي ومن أتى بعده. إن فكرة إجراء حسابات على قطع من خط مستقيم، اختيرت عليه وحدة قياسية، هي فكرة تصادفها للمرة الأولى في أعمال الخيام، حيث نجد معها في الوقت نفسه فكرة مراعاة التجانس بين طرفي المعادلة. ابتداءً من هنا، كان على هذين الطرفين أن يحافظا على البعد نفسه [انظر بخاصة عمر الخيام، رسائل الخيام الجبرية، حققها وترجمها وقدم لها رشدي راشد وأحمد جبار، مصادر ودراسات في تاريخ الرياضيات العربية؛ ٣ (حلب: معهد التراث العلمي العربي، ١٩٨١)، ص ٥؛ ١٠ - ١١؛ ٢٧ و ٨٧ - ٨٩]. والواقع أن الخيام أعطى في هذا المجال صياغة عامة من دون أن يجهد نفسه في إبراز المفاهيم الضرورية، لكن الطوسي هو الذي تولى هذه المهمة. فالمعادلة بالنسبة إلى الطوسي مساواة بين طرفين تكون الحدود في أي منهما من البعد نفسه. فمعادلة من الشكل:

$$x^3 + ax = b$$

هي مساواة بين مجسمين في طرف، ومجسم (واحد) في طرف آخر. و a بالنسبة إليه، هي مساحة منسوبة إلى الوحدة السطحية؛ أما b فهو حجم منسوب إلى الوحدة الجسمية. نذكر أخيراً أنه، وإن احترق قانون التجانس في بداية رسالته، إلا أنه غالباً ما ينسب هذا القانون في ما بعد. ولئن تقدّم التجانس عند الطوسي كأساس انطلق منه في بناء نظرية المعادلات، فإن اقتضاه في الكتاب كان يتزايد باستمرار، بقدر ما كانت تتطور دراسة الخصائص الموضوعية.

[17.15] يستطيع الطوسي، بفضل المفاهيم التي سبق أن أدخلها، أن يشرع في مثل هذا النقاش مفسراً عبارة الخيام المقتضية: «فيكون الجذر معلوماً باضطرار وحكمها في العدد والمساحات واحد» [المصدر نفسه، ص ٩].

[18.8] سنقدم، في ما خص هذه المسألة وما سيليها، ملاحظات مشابهة للملاحظة السابقة. نذكر أيضاً بأن الطوسي يفترض في القارئ دراية باستخراج الجذر التربيعي - وفي ما بعد، باستخراج الجذر التكعيبي - بواسطة طريقة روفيني - هورنر (انظر الفصل الأول). وهنا، كما في المسائل اللاحقة، نستطيع مقارنة نص الطوسي بدراسة الخيام. وتقادياً لإثقال هذه الملاحظات الإضافية، ولأسباب بديهية أخرى، منها خاصة، الأسبقية التاريخية، اخترنا أن نحقق أولاً عمل الخيام الجبري، بحيث أصبح من الممكن إرجاع القارئ إليه.

[2 - 1, 22] إن مسألة إدخال متوسطين هي إحدى المسائل التي ورثها العرب عن الذين سبقوهم من الرياضيين الإغريق. وفي هذه الحالة، كما في جميع المسائل المجسمة يجدر التفريق بوضوح بين البناء الهندسي للمسألة وبين ترجمتها الجبرية؛ هذا ما سبق أن كتبناه غير مرة. فهذان الفعلان اللذان لا يتميان للعصر نفسه لا يتميان أيضاً إلى الرياضيات نفسها. ولقد جاء الحل الجبري، متأخراً ما يقرب من أربعة عشر قرناً، لا يرمي إلى حل هذه المسألة لذاتها بقدر ما يقصد حلها من أجل استخدامها كمقدمة أساسية من مقدمات حل المعادلات التكعيبية. ولقد شكّل عدم التفريق بين هذين المسعين خطأً في الرؤية وقع فيه الكثيرون، موحياً بأن الرياضيين قبل القرن العاشر كانوا يرون في هذه المسألة معادلة جبرية.

ولقد كتب تاريخ البناء الهندسي للمسائل المجسمة في الرياضيات اليونانية مرّات عديدة. [انظر مثلاً: Th. Heath, *A History of Greek Mathematics* (Oxford: [n.pb.], Oskar Becker, *Das mathematische Denken der Antike* (1921), vol. 1, pp. 244 sqq; Studienhefte zur Altertumswissenschaft; Heft 3 (Göttingen: Vandenhoeck V. Ruprecht, 1966), pp. 75 sqq] فمن غير المجدي إيجاز موضوع سبق أن فضّله العديد من المؤرخين. لكننا لا بد من أن نذكر بالمرحلة الأساسية:

تتخذ المسألة في البداية الشكل البسيط لمسألة مضاعفة الكعب [انظر Archimède, *Commentaires d'Entocius*, éd. Ch. Mugler (Paris: Les Belles lettres, 1972), t. IV, pp. 64 sqq]. وهي مسألة بناء مكعب يكون حجمه ضعف مكعب معطى. وينسب إلى أبيقراط الكيوسي (نسبة إلى مدينة كيوس (Chio)) أنه حوّل هذه المسألة إلى مسألة إدخال متوسطين بين طولين مُعطيين. إن هذا الإدخال يصبح في لغة الجبر المتأخرة التالي: إذا كان a و $2a$ الطولان المعطيان وكان x و y المتوسطان بينهما، يكون:

$$\frac{x}{a} = \frac{y}{x} = \frac{2a}{y}$$

فيكون $x^3 = 2a^3$.

كان أول تعميم - إذا صح التعبير - لهذه المسألة هو التعامل مع مقدارين a و b أيّا كانا بدل التعامل مع a و $2a$.

وكان الحل الأبسط لهذه المسألة هو الحل الذي نسبهُ أوطوقوس إلى أفلاطون. وهو حل تفرعت منه حلول عدة. وقد كانت هناك حلول أخرى، منسوبة إلى إيراتوستين ومينيشم وديوقليس استخدمت قطعاً مخروطية. كما وجدت حلول أخرى مثل حل أرشيتاس، استخدمت أسطوانة ومخروطاً وقولباً طوقياً (طارة (tore)).

وقد عاود الرياضيون دراسة هذه المسألة ابتداء من القرن التاسع. فقد اعتمد ثابت بن قرة (المتوفى سنة ٩٠١م) في حلّه على تقاطع دائرة مع قطع زائد، وتبعه في ذلك رياضيون آخرون كالخازن والقوهي. إلا أن تعميم المسألة لم يتأخر. فمن مؤلفات كتاب السير كالفطحي [انظر: أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، تاريخ الحكماء، وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء، تحقيق يوليوس ليرت (البيتزج: [ديريخ، ١٩٠٣]، ص ١٦٨] وابن أبي أصيبعة [انظر: أبو العباس أحمد بن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، شرح وتحقيق نزار رضا (بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٦٥)، ص ٥٥٩]. نعرف أن ابن الهيثم [المتوفى سنة ١٠٤٠م] ألّف رسالة بشأن «إيراد أربعة خطوط بين خطين لتتوالى الستة على نسبة واحدة». وهذا ما أكده الخيام في القرن الحادي عشر للميلاد عندما كتب في مؤلفه الجبري، بخصوص المعادلة $[x^6 = a]$ ، «فيحتاج إلى المقدمة المذكورة ولا يمكن استخراجها بطرقنا» [الخيام، رسائل الخيام الجبرية، ص ٦٥].

فلنأخذ إذن العلاقة:

$$\frac{\alpha}{x} = \frac{x}{y} = \frac{y}{z} = \frac{z}{u} = \frac{u}{\beta}$$

التي نحصل منها على $y^3 = \alpha^2 \beta^2$. وإذا استخدمنا التقنية نفسها فسنعتمد تقاطع المنحنين:

$$yz = \alpha\beta$$

$$y^3 = \alpha x^2$$

ويعود الأمر هنا، كما نرى، إلى تقاطع قطع مخروطي مع منحنٍ تكعيبي - وليس إلى تقاطع قطعين مخروطيين - وهذا ما قد يوحي بأن ابن الهيثم كان يحوز على طريقة تشبه طريقة فيرما في مؤلفه *Dissertatio Tripartita*.

ونحن، وإن لفتنا الانتباه إلى مساهمة ابن الهيثم [انظر: الخيام، المصدر نفسه، ص ٦٦]، فإننا نبرهن هنا بأن التعميم الحقيقي لهذه المسألة لم يحصل، على ما يبدو، قبل القرن الحادي عشر للميلاد. ومن المحتمل أن يكون هذا التعميم من عمل أحد رياضيي الأندلس: عبد الرحمن بن سيّد. ففي كتيب خصصه لأعمال هذا الرياضي في نظرية المخروطات يذكر الفيلسوف ابن باجة، أنه استخدم تقاطع مساحة غير مسطحة مع

مساحة مخروطية. وذلك يعني أن ابن سيد قد عمل، بشكل عام، على منحنيات منحرفة^(٦). ومن بين ما ينسبه ابن باجة بالذات إلى ابن سيد، طريقة يمكن بها استخراج «كم خطأ يشاء، بين خطين تتوالى على نسبة واحدة، وبهذا السبيل قسم الزاوية بأي نسبة عددية شاء» [انظر: أبو بكر محمد بن يحيى بن باجة، رسائل فلسفية لأبي بكر بن باجة: نصوص فلسفية غير منشورة، [تحقيق] جمال الدين العلوي (بيروت: دار الثقافة، ١٩٨٣)، ص ٨٦]. إن النص المذكور صعب وذو أسلوب إضماري موجز. إنه يتطلب تعمقاً بالمواضيع التي يطرحها قبل تحقيقه بشكل نهائي وصائب، أضف إلى ذلك أن أعمال ابن سيد لا تزال مفقودة حتى الآن.

(٦) Gauche. (المترجم).

القسم الثاني

الفصل الثالث

نقل وتعليق رياضي

(المعادلات ٢١ - ٢٥)

تكرّس القسم الأول من «الرسالة» لـ:

- بناء الجذور الحقيقية الموجبة لمعادلات الدرجة الثالثة وما دون، بواسطة منحنيات جبرية مختارة؛

- حل عددي لهذه المعادلات؛

- تبرير خوارزمية الحل العددي.

تلك هي العناصر المكونة لنظرية المعادلات التي أعاد الطوسي صياغتها ضمن التقليد الخيامي.

ولقد أردنا في المقدمة تشخيص الأسباب التي دعت الطوسي إلى التحوّل في رياضياته، مفجّراً وحدة «الرسالة». فلقد سبق، في الواقع، إلى طرح مسألة تفريق الجذور، وبالتالي مسألة حدودها. وهذا ما حصل ابتداءً من المعادلة ٢١ وحتى نهاية «الرسالة»، أي فيما يتعلّق بتلك المعادلات التي يمكن ألا تحوز على حلول موجبة. إن حل هذه المشكلة هو الذي قاد رياضيّي القرن الثاني عشر هذا إلى اكتشاف النهج الموضوعي والتحليلي وإلى إحداث شرح ضمن الرسالة في المفهوم وفي الأسلوب، وهذا ما خوّّلنا تقسيمها إلى جزأين. أما تعليقنا على القسم الثاني فسيعتمد الطريقة نفسها التي اتبعناها بالنسبة إلى القسم الأول.

معادلات الدرجة الثالثة II

$$x^3 + c = ax^2 \quad \text{المعادلة ٢١:}$$

لنأخذ $AB = a$ ؛ بما أن $(x \cdot x^2 = x^3)$ و $(ax^2 = x^3 + c)$ ، فإن $a > x$ ؛ لكن

$(ax^2 - x^3 = c)$ ، لذلك فمن الضروري أن يكتب a على الشكل :

$$a = x + (a - x) ,$$

مع كون

$$x^2 \cdot (a - x) = c .$$

ليكن $AC = \frac{AB}{3}$ ، ولتكن D و E نقطتين على AB . فمهما كانت وضعية النقطة D بين A و C ووضعية النقطة E بين B و C ، (الشكلان رقما (١ - ٣) و (٢ - ٣))، يكون لدينا:

$$BC^2 \cdot AC > BD^2 \cdot DA ,$$

و

$$BC^2 \cdot AC > BE^2 \cdot EA .$$



الشكل رقم (١ - ٣)



الشكل رقم (٢ - ٣)

دراسة النهاية العظمى (انظر الشكل رقم (٣ - ٣)):



الشكل رقم (٣ - ٣)

لنبرهن أولاً أن

$$BC^2 \cdot AC > BD^2 \cdot AD .$$

لدينا

$$BC^2 \cdot AC = BC^2 \cdot AD + BC^2 \cdot DC ,$$

وكذلك

$$BD^2 \cdot AD = BC^2 \cdot AD + (BD^2 - BC^2) \cdot AD ;$$

فإذا ألقينا $AD \cdot BC^2$ من كل من $AD \cdot BC^2$ و $AD \cdot BD^2$ ، يبقى علينا مقارنة $DC \cdot BC^2$ مع $AD \cdot (BD^2 - BC^2)$. ولكن

$$(BD^2 - BC^2) \cdot AD = (DB + BC)CD \cdot AD ,$$

كما أن

$$BC^2 = 2BC \cdot AC = 2BC \cdot AD + 2BC \cdot DC ,$$

و

$$(DB + BC) \cdot AD = 2BC \cdot AD + DC \cdot AD .$$

وبعد التبسيط لا يبقى سوى مقارنة $DC \cdot AD$ و $2BC \cdot DC$ ؛

لكن

$$BC > AC ,$$

فيكون لدينا

$$BC > AD ,$$

ومنها

$$2BC \cdot DC > DC \cdot AD$$

فيكون

$$2BC \cdot CA = 2BC \cdot DC + 2BC \cdot AD$$

و

$$2BC \cdot CA > DC \cdot AD + 2BC \cdot AD = (DB + BC) \cdot AD ,$$

فيكون

$$BC^2 > (DB + BC)AD ,$$

وبالتالي

$$\frac{DB + BC}{BC} < \frac{BC}{AD} ,$$

فيكون

$$\frac{DC(DB + BC)}{BC^2} < \frac{DC}{AD} ,$$

لكن

$$DC(DB + BC) = BD^2 - BC^2 ,$$

فيكون

$$AD(BD^2 - BC^2) < BC^2 \cdot DC ;$$

فإذا أضفنا $AD \cdot BC^2$ إلى كل من الطرفين يحصل لدينا:

$$BD^2 \cdot AD < BC^2 \cdot AC.$$

ولنبرهن الآن أن:

$$BC^2 \cdot AC > BE^2 \cdot AE. \quad (\text{الشكل رقم (٣ - ٤)})$$



الشكل رقم (٣ - ٤)

بما أن

$$BC^2 \cdot AC = BE^2 \cdot AC + (CB + BE) \cdot EC \cdot AC,$$

و

$$BE^2 \cdot AE = BE^2 \cdot CE + BE^2 \cdot AC,$$

لذلك يبقى علينا مقارنة $BE^2 \cdot CE$ مع $(BC + BE)EC \cdot AC$.

وطالما أن

$$BC^2 = 2AC \cdot BC,$$

و

$$2BC \cdot AC - (CB + BE) \cdot AC = EC \cdot AC,$$

و

$$(CB + BE) \cdot CE > AC \cdot EC,$$

لأن

$$CB + BE > AC,$$

يحصل لدينا إذن:

$$BC^2 - BE^2 > BC^2 - (CB + BE)AC,$$

ومنها

$$\frac{CB + BE}{BE} > \frac{BE}{AC}$$

و

$$\frac{CE}{BE} \cdot \frac{CB + BE}{BE} > \frac{CE}{BE} \cdot \frac{BE}{AC}$$

فيكون

$$(CB + BE) \cdot CE \cdot AC > CE \cdot BE^2$$

و

$$(CB + BE) \cdot CE \cdot AC + BE^2 \cdot AC > CE \cdot BE^2 + BE^2 \cdot AC$$

ومنها

$$CB^2 \cdot AC > BE^2 \cdot AE.$$

هكذا نكون قد برهنا أن $\frac{a}{3} \cdot \left(\frac{2a}{3}\right)^2 = AC \cdot BC^2$ هي النهاية العظمى لحاصل الضرب $AM \cdot BM^2$ حيث M هي أية نقطة موجودة بين A و B ، أي النهاية العظمى لـ $(a-x) \cdot x^2$ ، حيث $(0 < x < a)$. لذلك نستطيع القول انه:

- إذا كان $c > \frac{4a^3}{27}$ ، تكون المسألة مستحيلة؛

- وإذا كان لدينا $c = \frac{4a^3}{27}$ يكون للمسألة حلّ هو $BC = \frac{2a}{3} = x$ ، لأن

$$BC^2 \cdot BC = x^3,$$

و

$$BC^2 = x^2,$$

و

$$BC^2 \cdot AB = ax^2 = BC^3 + BC^2 \cdot AC = x^3 + c,$$

وبالتالي

$$ax^2 = x^3 + c.$$


وهذا الحل هو الوحيد ولا توجد أي نقطة أخرى C' على AB تحقق:

$$BC'^2 \cdot AC' = c.$$

- وإذا كان $c < \frac{4a^3}{27}$ يكون للمعادلة حلان x_1 و x_2 يحققان:

$$\frac{2a}{3} < x_2 < a \quad \text{و} \quad 0 < x_1 < \frac{2a}{3}$$

تحديد الجذر الأكبر: $x_2 = BE$ (انظر الشكل رقم (٣ - ٥)):



الشكل رقم (٣ - ٥)

لنأخذ $AB = a$, $BC = \frac{2a}{3}$, $AC = \frac{a}{3}$ حيث $c < \frac{4a^3}{27}$. ولنأخذ $K = \frac{4a^3}{27} - c$ ولتكن D نقطة على AB بحيث يكون:

$$AD^3 + a \cdot AD^2 = K \quad (\text{المعادلة ١٥}),$$

ولنأخذ $CE = AD$ ؛ فيكون $BE = BC + AD$ ويكون:

$$BE^2 \cdot AE = c.$$

فلدينا:

$$\begin{aligned} BC^2 \cdot AC &= BC^2 \cdot AE + BC^2 \cdot CE = BC^2 \cdot AE + 2BC \cdot AC \cdot CE, \\ &= BC^2 \cdot AE \cdot (2BC \cdot AE + 2BC \cdot EC) \cdot CE, \\ &= BC^2 \cdot AE + 2BC \cdot AE \cdot CE + 2BC \cdot CE^2, \end{aligned}$$

لكن

$$\begin{aligned} 2BC \cdot CE^2 &= (BC + CA + CE + EA) \cdot CE^2, \\ &= AB \cdot CE^2 + EA \cdot CE^2 + CE^3, \end{aligned}$$

وبالتالي

$$BC^2 \cdot AC = BC^2 \cdot AE + 2BC \cdot CE \cdot AE + CE^3 \cdot AB + CE^2 \cdot AE + CE^3,$$

لكن

$$BE^2 \cdot AE = 2BC \cdot CE \cdot AE + BC^2 \cdot AE + CE^2 \cdot AE,$$

فيكون

$$\begin{aligned} BC^2 \cdot AC &= BE^2 \cdot AE + CE^2 \cdot AB + CE^3 \\ &= BE^2 \cdot AE + AD^2 \cdot AB + AD^3 \\ &= BE^2 \cdot AE + AD^2 \cdot DB; \end{aligned}$$

لكن

$$AD^2 \cdot DB = AD^3 + a \cdot AD^2 = K = BC^2 \cdot AC - c,$$

فيكون

$$AD^2 \cdot DB + c = BC^2 \cdot AC = AD^2 \cdot DB + BE^2 \cdot AE,$$

وبالتالي

$$c = BE^2 \cdot AE;$$

فيكون BE هو الجذر المطلوب و $BE > \frac{2a}{3}$.

تحديد الجذر الأصغر: $x_1 = BI$ (الشكل رقم (٣ - ٦)):



الشكل رقم (٣ - ٦)

لنأخذ $(BE = x_2)$ ، $(AE = a - x_2)$ ؛ BE و AE معروفان ولدينا $BE > AE$.
ولنأخذ $BG = AE$ ولنضع:

$$\alpha = BG, \quad \beta = BE \cdot AE$$

ونأخذ IG ، الحل للمعادلة ٧:

$$X^2 + aX = \beta.$$

فيكون

$$BE \cdot AE = IG \cdot IB,$$

ومنها

$$\frac{BE}{IB} = \frac{IG}{AE} = \frac{IG}{GB}$$

وبالتالي

$$\frac{EB + IB}{IB} = \frac{IG + GB}{GB} = \frac{IB}{AE}$$

ومنها

$$\frac{EI(EB + IB)}{IB^2} = \frac{EI}{AE}$$

لكن

$$EI(EB + IB) + IB^2 = EB^2,$$

فيكون

$$\frac{EB^2}{IB^2} = \frac{AI}{AE},$$

وبالتالي

$$EB^2 \cdot AE = BI^2 \cdot AI,$$

لكن

$$EB^2 \cdot AE = c,$$

لذلك

$$BI^2 \cdot AI = c,$$

ويكون BI بالتالي هو الحل المطلوب.

يبقى أن نبرهن أن $BI < \frac{2a}{3}$.

لدينا $BI \neq BE$ ؛ ذلك لأننا إذا فرضنا العكس أي $BI = BE$ ،

يكون

$$AE \cdot EB = EB \cdot EG$$

ومنها

$$EG = GB = AE = \frac{1}{3}AB = AC$$

فيكون

$$EB = \frac{2}{3}AB,$$

وهذا محال (خلف).

من جهة أخرى، لدينا $BI \neq BC$ ، لأننا إذا فرضنا أن $BI = BC$


يكون

$$c = BI^2 \cdot AI = BC^2 \cdot AC$$

وهذا خلف.

وهكذا، يكون، في نهاية الأمر: $BI < BE$ و $BI < \frac{2a}{3}$.

العلاقة بين المعادلة ٢١ والمعادلة ١٥ (الشكل رقم (٣ - ٧)):



الشكل رقم (٣ - ٧)

نكتب المعادلة ١٥ على الشكل التالي:

$$X^3 + aX^2 = K.$$

لنأخذ $(AB = a)$ ، $\left(BC = \frac{2a}{3}\right)$ و $\left(BC^2 \cdot AC = \frac{4a^3}{27} = c_0\right)$ ؛ و c_0 نسميه «العدد الأعظم». ولنأخذ BE ، الجذر الكبير للمعادلة ٢١. يكون لدينا إذاً:

$$c = BE^2 \cdot AE$$

ومن جهة أخرى

$$c_0 = BC^2 \cdot AC = BC^2 \cdot AE + BC^2 \cdot CE$$

حيث $CE \cdot BC^2$ هو القسم «الذي يخص» $c_0^{(1)}$ ،

كما أن لدينا

$$c = BE^2 \cdot AE = BC^2 \cdot AE + (BC + BE) \cdot CE \cdot AE$$

و

$$(BC + BE) \cdot CE \cdot AE$$

هو القسم «الذي يخص» $c^{(1)}$ ، أما $c - c_0 = k$ ، «عدد التفاوت»^(١)، فهو معروف:

$$k = BC^2 \cdot CE - (BC + BE)CE \cdot AE.$$

فإذا وضعنا $EC = X$ ، نحصل على:

$$k = \left(\frac{2a}{3}\right)^2 X - \left(\frac{4a}{3} + X\right) \cdot X \cdot \left(\frac{a}{3} - X\right)$$

ومن هنا

$$k = X^3 + aX^2 ;$$

(١) نص الطوسي، ص ٨. (المترجم).

فيكون CE جذر المعادلة ١٥ و $\left(BE = BC + CE = \frac{2a}{3} + X \right)$ هو الجذر x_2 للمعادلة ٢١.

مثال: لتكن المعادلة:

$$x^3 + 14837904 = 465x^2.$$

في هذه الحالة، يكون:

$$\frac{a}{3} = 155, \quad \frac{2a}{3} = 310, \quad \frac{4a^2}{9} = 96100,$$

$$\frac{4a^3}{27} = c_0 = 14895500, \quad k = c_0 - c = 57596.$$

فيكون لدينا المعادلة

$$57596 = X^3 + 465X^2$$

التي تحل بحسب الطريقة المتبعة في المعادلة ١٥ وتعطي $X = 11$ فيكون:

$$x_2 = X + 310 = 321.$$

دراسة الجذر الأصغر (الشكلان رقما (٨ - ٣) و ((٩ - ٣):

تمهيد ١: إذا كانت BC قطعة مستقيم و D نقطة منها، يكون لدينا:

$$CD \cdot DB \cdot CB = CD^2 \cdot DB + BD^2 \cdot CD;$$

وبرهانه يستند إلى كون CB مساوياً لـ $(CD + DB)$ وإلى إبدالية وتجميعية الضرب والجمع وإلى توزيعية الضرب بالنسبة إلى الجمع:



الشكل رقم (٣ - ٨)

تمهيد ٢: لتكن AB قطعة مستقيم ولنكن C نقطة على AB بحيث $AC = \frac{AB}{3}$ و D نقطة على CB ؛ فيكون لدينا:

$$CB^2 \cdot AC = BD^2 \cdot DA + (CD^2 \cdot AC + CD^2 \cdot DB)$$

$$u = v + w$$

فبالنسبة إلى المجسم الأول u ، لدينا:

$$u = (CD + DB)^2 \cdot CA = CD^2 \cdot CA + DB^2 \cdot CA + 2CD \cdot DB \cdot CA$$

أما بالنسبة إلى المجسمين الباقيين فلدينا:

$$v = BD^2 \cdot DA = BD^2 \cdot AC + BD^2 \cdot DC.$$

$$w = CD^2 \cdot AC + CD^2 \cdot DB.$$

لكن $AC \cdot BD^2$ مشترك بين u و v ، كما أن $AC \cdot CD^2$ مشترك بين u و w . وإذا أخذنا بالاعتبار كون $(2CA = CD + DB)$ يكون لدينا، استناداً إلى التمهيد ١:

$$2CA \cdot CD \cdot DB = BD^2 \cdot DC + CD^2 \cdot DB,$$

ويكون بالتالي

$$u = v + w$$

فإذا كان $v = \frac{1}{2}u$ ، يكون $v = w$ ، و $BD = DC = \frac{1}{3}AB$ ؛ وإذا كان $v > \frac{1}{2}u$ يكون $BD < \frac{1}{3}AB$ ، وإذا كان $v < \frac{1}{2}u$ ، يكون $BD > \frac{1}{3}AB$ و $\left(BD > \frac{1}{2}BC > DC \right)$.



الشكل رقم (٣ - ٩)

قضية: ليكن $AB = a$ ولتكن C نقطة على AB بحيث يكون $AC = \frac{a}{3}$ و $BC = \frac{2a}{3}$ ؛ فإذا كان BD الجذر الأصغر وكان k عدد التفاوت، يكون لدينا:

$$CD^3 + k = CD^2 \cdot AB.$$

فبما أن BD هي الجذر الأصغر للمعادلة ٢١، يكون لدينا

$$BD^3 \cdot AD = c,$$

ويكون بالتالي

$$CD^3 + c_0 - c = CD^2 \cdot AB.$$

فلدينا

$$BD^3 \cdot DA + c_0 - c = BC^2 \cdot AC,$$

لكن، استناداً إلى التمهيد ٢:

$$BD^3 \cdot DA + (CD^3 \cdot AC + CD^2 \cdot DB) = CB^2 \cdot AC$$

فيكون

$$c_0 - c = CD^2 \cdot AC + CD^2 \cdot DB.$$

فإذا وضعنا $CD = X$ ، يكون

$$(AC + DB) = a - X, \quad X^2(a - X) = c_0 - c; \quad (c_0 - c = k);$$

وهذا يعني

$$aX^2 = X^3 + k. \quad (*)$$

فيكون

$$CD^3 + k = AB \cdot CD^2.$$

قضية: في ظل معطيات القضية السابقة يكون

$$BD^3 + c = BD^2 \cdot AB \quad (\text{الشكل رقم (٣ - ١٠)})$$



الشكل رقم (٣ - ١٠)

فلدينا

$$BD^2 \cdot AB = BD^2(AD + BD),$$

$$BD^2 \cdot AB = BD^3 + BD^2 \cdot AD,$$

ومنها

$$BD^2 \cdot AB = BD^3 + c.$$

مثال: لتكن المعادلة

$$x^3 + 66152322 = 963x^2$$

$$\text{حيث } c = \frac{c_0}{2} = 66152322.$$

نحل هذه المعادلة بالطريقة المعتادة (راجع الجدول في النص الأصلي - المعادلة ٢١، ص ١٣ من الترقيم في الأعلى). والحل هو:

$$321 = \frac{963}{3} = \frac{a}{3}.$$

ملاحظة: إذا كان $c = \frac{c_0}{2}$ يكون $X = \frac{1}{3}a$ وبالتالي $BD = x_1 = \frac{a}{3}$ وذلك لأن

$$BD = \frac{2a}{3} - X$$

وإذا كان $c > \frac{c_0}{2}$ يكون $c_0 - c = k < \frac{c_0}{2}$ ، فتُحل المعادلة (*) ويطرح حلها X من $\frac{2a}{3}$ ، لأن $x_1 = \frac{2a}{3} - X$.

أما إذا كان $c < \frac{c_0}{2}$ ، فنضع، في الجدول، العددين:

$$a = AB \quad \text{و} \quad c = BD^2 \cdot AD$$

فلو كان AD معلوماً لحصلنا على $x_1^2 = BD^2 = \frac{c}{AD}$ ؛ إلا أن المعلوم هو $AB = a$ ، لا AD المساوي لـ $a - x_1$. ولكي نحدد الرقم الأول من x_1 ، نأخذ $\frac{c}{a}$ ؛ لدينا $\frac{c}{a} < \frac{c}{AD}$ أي $\frac{c}{a} < \frac{c}{a - x_1}$ (٢). لنفرض أن $x_1 = s_1 + s_2 + s_3$ ؛ إن $\frac{c}{a}$ يتيح لنا تحديد العدد s_1 وهو العدد الأصغر الذي يحقق العلاقة:

$$\frac{c}{a} \leq s_1^2 < s_1^2.$$

وهنا نجد أنفسنا أمام حالتين:

١- $s_1' = s_1$ ؛ وهنا، إذا وضعنا $f(x) = x^2(a - x)$ ، نحصل على:


$$f(x_1) - f(s_1) = c - c_1 = \varphi(s_2, s_3)$$

٢- $s_1' < s_1$ ، وهنا يمكن أن نكتب $s_1' = s_1 - \varepsilon$ ويكون s_1 من مرتبة القسم الأخير من x_1 .

ليكن $s_1 = BE$ ، $a - s_1 = AE$. نحتسب $AE \cdot BE^2 - c$ الذي نضعه في الجدول، ويكون لدينا:

$$\begin{aligned} c - BE^2 \cdot AD &= (BD^2 - BE^2)AD \\ &= 2BE \cdot ED \cdot AD + ED^2 \cdot AD. \end{aligned}$$

ليكن DE هو الرقم الثاني المطلوب، $DE = s_2$ ، ولنأخذ بالتالي المساحات التالية:



الشكل رقم (٣ - ١١)

(٢) يمكن أن يكون $\frac{c}{a}$ أصغر من $\frac{c}{AD}$. وطالما أن الطوسي لا يعتبر الحالة $c = 0$ أو الحالة $x_1 = 0$ ، تقرأ هذه العبارة كما يلي: $\frac{c}{a}$ أصغر من $\frac{c}{AD}$.

$$S = BE \cdot AE = BE \cdot AD + BE \cdot DE$$

$$\begin{aligned} S_1 &= (AE - BE) \cdot BE = AE \cdot BE - BE^2 \\ &= AD \cdot BE + DE \cdot BE - BE^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2 &= (AE - 2BE - DE) \cdot DE = (AD - 2BE) \cdot DE \\ &= AD \cdot DE - 2BE \cdot DE \end{aligned}$$

$$S_1 + S_2 = AD \cdot BE + DE \cdot BE - BE^2 + AD \cdot DE - 2BE \cdot DE$$

$$S + S_1 + S_2 = 2AD \cdot BE + AD \cdot DE - BE^2$$

$$\begin{aligned} (S + S_1 + S_2) \cdot DE &= 2AD \cdot BE \cdot DE + AD \cdot DE^2 - BE^2 \cdot DE \\ &= (BD^2 - BE^2) \cdot AD - BE^2 \cdot DE \end{aligned}$$

$$c - (S + S_1 + S_2) \cdot DE = c + BE^2 \cdot DE - (BD^2 - BE^2) \cdot DA.$$

وإذا فرضنا أن $(s_2 = EI < DE)$ ، (الشكل رقم (٣ - ١٢)) لحصلنا، بالطريقة نفسها على:

$$\begin{aligned} c - 2AI \cdot BE \cdot EI - AI \cdot IE^2 + BE^2 \cdot IE &= c + BE^2 \cdot IE - (BI^2 - BE^2) \cdot IA \\ &= c - BI^2 \cdot AI + BE^2 \cdot IE + BE^2 \cdot IA \end{aligned}$$



الشكل رقم (٣ - ١٢)

ويتابع مشيراً إلى أن المساحة:

$$2BI \cdot AD + 2BI \cdot AI - BI^2$$

والطول $(AI - 2BI)$ ، سيدخلان في البحث عن DI ويذكر بأن هذه العملية عملية تكرارية.

ولنعد إلى الحالة $c > \frac{c_0}{2}$ ؛ في هذه الحالة، الجذر الأصغر، x_1 للمعادلة

$BD^3 + c = BD^2 \cdot AB$ ، أي للمعادلة $ax^3 + c = ax^2$ ، هو جذر أصغر يحقق العلاقة

$x_1 > \frac{a}{3}$. ولكي نجد CD ، نستخدم المعادلة

$$X^3 + k = aX^2$$

حيث $k = c_0 - c$ ، (أي $k < \frac{c_0}{2}$). ففي العملية التكرارية المتبعة، يجب أن يكون $x_1 \leq \frac{a}{3}$ لكي نستطيع طرح x_1 من AB أي من a ثلاث كرات، وهذا الشرط غير متوفر عند كون $c > \frac{c_0}{2}$. ونستخدم k عند البحث عن $CD = X$ ، لأن $CD < \frac{a}{3}$. عند ذلك نحصل على:

$$x_1 = \frac{2a}{3} - X.$$

تعليق

تكتب المعادلة

$$ax^2 = x^3 + c.$$

على الشكل

$$c = x^2 \cdot (a - x) \quad (١)$$

لنأخذ الدالة التالية:

$$f(x) = x^2 \cdot (a - x) \quad (٢)$$

إن دراسة المعادلة تُظهر ما يلي:

- إذا كان $c > \frac{4a^3}{27}$ يكون لـ (١) جذر واحد، سالب.

- إذا كان $c = \frac{4a^3}{27}$ يكون لها جذر سالب وجذر مزدوج $x_0 = \frac{2a}{3}$.

- إذا كان $0 < c < \frac{4a^3}{27}$ ، يكون لها جذر سالب وجذران موجبان x_1 و x_2 :

$$0 < x_1 < \frac{2a}{3} < x_2 < a.$$

- إذا كان $c = 0$ ، يكون لها جذر موجب $x_2 = a$ وجذر مزدوج $x_1 = 0$.

- إذا كان $c < 0$ ، يكون لها جذران غير حقيقيين وجذر موجب x_2 ، $x_2 > a$.

يبدأ الطوسي بملاحظة أن أي جذر للمعادلة (١) هو أصغر من a ، وهذا صحيح لأنه يعتبر $c > 0$. وهنا يفرق بين حالات ثلاث:

- $c > \frac{4a^3}{27}$ ، وهنا تكون المسألة مستحيلة؛

$$c = \frac{4a^3}{27}, \text{ فيجد الجذر المزدوج } x_0 = \frac{2a}{3}$$

حيث $c < \frac{4a^3}{27}$ ، فيهمل الجذر السالب (يجهله) ويحدد الجذرين الموجبين x_1 و x_2

$$0 < x_1 < \frac{2a}{3} < x_2 < a.$$

ومسار عمله هو التالي:

١ - دراسة النهاية العظمى للدالة (٢)

يأخذ الطوسي $x_0 = \frac{2a}{3}$ ويبرهن ما يلي:

$$f(x_0) = \sup_{x \in [0, a]} f(x) \quad (٣)$$

وذلك ببرهانه أن $f(x) < f(x_0)$ له في كل من الحالتين: $x > x_0$ و $x < x_0$.

في هذه الحالة لدينا $x_1 > x_0$ وبالتالي وهي تعود إلى برهان العلاقة: $x_1 > x_0 \implies f(x_1) < f(x_0)$

$$\begin{aligned} x_0^2(a - x_0) &= x_0^2(a - x_1) + x_0^2(x_1 - x_0), \\ x_1^2(a - x_1) &= x_0^2(a - x_1) + (x_1 + x_0)(x_1 - x_0)(a - x_1), \\ x_0^2 &= 2x_0 \cdot (a - x_0), \\ &= 2x_0(a - x_1) + 2x_0(x_1 - x_0), \\ (x_1 + x_0)(a - x_1) &= 2x_0(a - x_1) + (x_1 - x_0)(a - x_1), \end{aligned}$$

ومنها

$$f(x_0) - f(x_1) = 2x_0(x_1 - x_0)^2 - (a - x_1)(x_1 - x_0)^2.$$

لكن

$$x_0 > a - x_0 > a - x_1,$$

فيكون بالتالي:

$$f(x_0) > f(x_1).$$

الحالة الثانية وهي تعود إلى برهان العلاقة: $x_2 < x_0 \implies f(x_2) < f(x_0)$

في هذه الحالة لدينا $x_2 < x_0$ وبالتالي

$$\begin{aligned}
x_0^2(a-x_0) &= x_2^2(a-x_0) + (x_0+x_2)(x_0-x_2)(a-x_0), \\
x_2^2(a-x_2) &= x_2^2(a-x_0) + x_2^2(x_0-x_2), \\
x_0^2 &= 2x_0(a-x_0), \\
2x_0(a-x_0) - (x_0+x_2)(a-x_0) &= (x_0-x_2)(a-x_0), \\
(x_0+x_2)(x_0-x_2) &> (x_0-x_2)(a-x_0),
\end{aligned}$$

فيكون

$$x_0^2 - x_2^2 > x_0^2 - (x_0+x_2)(a-x_0),$$

ومنها

$$x_2^2 < (x_0+x_2)(a-x_0)$$

وبالتالي

$$f(x_2) < f(x_0).$$

ملاحظة: لا يشير الطوسي هنا إلى التصرف الذي قاده لإيجاد x_0 ، $\left(x_0 = \frac{2a}{3}\right)$. لكنه، سيعمد لاحقاً، كما سنرى إلى حل المعادلة:

$$f'(x) = 0$$

٢ - احتساب النهاية العظمى

$$f(x_0) = f\left(\frac{2a}{3}\right) = \frac{4a^3}{27} \quad (٤)$$

وهذا ما يبرر اعتباره للحالات الثلاث التي أشار إليها.

في الحالة الثالثة حيث $c < \frac{4a^3}{27}$ ، يوجد بالنسبة إلى الطوسي حلان x_1 و x_2 بحيث $0 < x_1 < \frac{2a}{3} < x_2 < a$.

٣ - تحديد x_2

ليكن $k = c_0 - c = \frac{4a^3}{27} - c$ وليكن X الجذر الموجب للمعادلة من النوع ١٥:

$$x^3 + ax^2 = k$$

عند ذلك يكون $x_2 = x_0 + X$ الجذر الأكبر للمعادلة ٢١. فيما أن:

$$x_0 = \frac{2a}{3} = 2(a-x_0),$$

يكون

$$\begin{aligned} c_0 &= x_0^2(a - x_0) = x_0^2(a - x_2) + x_0^2(x_2 - x_0) \\ &= x_0^2(a - x_2) + 2x_0(a - x_0)(x_2 - x_0) \\ &= x_0^2(a - x_2) + 2x_0(a - x_2)X + 2x_0X^2. \end{aligned}$$

لكن، بما أن:

$$2x_0 = a + (a - x_0) = a + (a - x_2) + X,$$

فيكون

$$c_0 = x_0^2(a - x_2) + 2x_0X(a - x_2) + aX^2 + (a - x_2)X^2 + X^3.$$

ومن جهة أخرى، لدينا:

$$\begin{aligned} x_2^2(a - x_2) &= (x_0 + X)^2(a - x_2) \\ &= x_0^2(a - x_2) + X^2(a - x_2) + 2x_0X(a - x_2), \end{aligned}$$

فيكون بالتالي:

$$c_0 = x_2^2(a - x_2) + aX^2 + X^3,$$

وبما أن

$$aX^2 + X^3 = k = c_0 - c,$$

يكون

$$x_2^2(a - x_2) = c,$$

ويكون x_2 بالتالي جذراً للمعادلة (٢١).

٤ - تحديد x_1

إن التحويل الأفيني $x_1 = x_0 - X$ يقود إلى معادلة من النوع نفسه (٢١) لكن مع c' مختلف عن c . هنا يبذل الطوسي طريقته، فيأخذ الجذر الموجب X للمعادلة من النوع ٧، التالية:

$$X^2 + (a - x_2)X = x_2(a - x_2),$$

حيث x_2 و $a - x_2$ معلومان، $x_2 > a - x_2$ ؛ ومنها يحصل على:

$$X(X + a - x_2) = x_2(a - x_2),$$

ومن ثم على:

$$\frac{x_2}{X + a - x_2} = \frac{X}{a - x_2},$$

وبالتالي

$$\frac{X + a}{X + a - x_2} = \frac{X + a - x_2}{a - x_2} \quad (١)$$

ومنها

$$\frac{[x_2 - (X + a - x_2)](X + a)}{(X + a - x_2)^2} = \frac{x_2 - (X + a - x_2)}{a - x_2} \quad (٢)$$

وذلك بعد ضرب كل من طرفي (١) بـ $\frac{x_2 - (X + a - x_2)}{X + a - x_2}$.

وعند إضافة العدد ١ إلى كل من طرفي المعادلة (٢) نحصل على:

$$\frac{x_2^2}{(X + a - x_2)^2} = \frac{x_2 - X}{a - x_2}.$$

ومنها

$$c = x_2^2(a - x_2) = (X + a - x_2)^2(x_2 - X)$$

فإذا وضعنا $x_1 = X + a - x_2$ ، نكون قد حصلنا على:

$$c = x_1^2(a - x_1).$$

ملاحظة ١: العلاقة بين المعادلة ٢١ والمعادلة ٧.

يمكن كتابة المعادلة ٢١ على الشكل $g(x) = 0$ حيث:

$$g(x) = -x^3 + ax^2 - c$$

وكون $g(x_2) = 0$ يمكننا من كتابة:

$$\begin{aligned} g(x) &= (x - x_2) [-x^2 + (a - x_2) \cdot x + x_2(a - x_2)] \\ &= (x - x_2) \cdot h(x) \end{aligned}$$

ليكن x_1 الحل الإيجابي للمعادلة $h(x) = 0$. فإذا وضعنا $x_1 = X + (a - x_2)$ ، يكون X حلاً للمعادلة من النوع ٧:

$$X^2 + (a - x_2) \cdot X = x_2(a - x_2)$$

وهو حل أعطاه الطوسي. نلاحظ إذن، أن الطوسي يعتمد إلى تحليل الحدودية $g(x)$ إلى عوامل^(٣). ومن ثم يعتمد الطوسي إلى تحويل $h(x)$ بواسطة التحويل الأفيني

$$x = X + a - x_2$$

ويحصل على

$$h(X + a - x_2) = -X^2 - (a - x_2)X + x_2(a - x_2)$$

(٣) تعميلها. (المترجم).

ومن هنا معادلة الطوسي التي منها يستخرج x_1 .

ملاحظة ٢: عند كتابة $x_1 = X + a - x_2$ ، يعرض الطوسي في الواقع الجذر الثالث للمعادلة ٢١، وهو الجذر السالب $-X$ ، فلدينا:

$$a = x_1 + x_2 - X ,$$

لكنه لم يتعرف بتاتاً إلى هذا الجذر .

بعد تحديد x_1 يبرهن الطوسي أن $x_1 \neq x_0$ وأن $x_1 \neq x_2$ ؛ فعندما يفترض أن $x_1 = x_2$ يحصل على:

$$x_2(a - x_2) = x_2 [x_2 - (a - x_2)],$$

وذلك استناداً إلى:

$$x_2(a - x_2) = X[X + a - x_2] \quad \text{و} \quad X = x_1 + x_2 - a;$$

ومن ذلك يحصل على $x_2 = \frac{2a}{3}$ وهو خُلف .

ويبرهن أن $x_1 \neq x_0 = \frac{2a}{3}$ استناداً إلى أن:

$$x_1^2 \cdot (a - x_1) < \frac{4a^3}{27} .$$

هكذا يكون الطوسي قد برهن بأن $x_1 \neq x_0$ و $x_1 \neq x_2$. لكن، استناداً إلى برهانه أن $x_2 = x_0 + X$ حيث X هو الجذر الموجب الوحيد للمعادلة ١٥، يكون x_2 هو الحل الوحيد للمعادلة ٢١، الأكبر من x_0 ويكون بالتالي:

$$[x_1 \neq x_2 , \quad x_1 \neq x_0] \Rightarrow x_1 < x_0$$

٥ - العلاقة بين المعادلة ٢١ والمعادلة ١٥

يرر الطوسي هنا استخدامه للتحويل الأفيني الذي يقوده إلى المعادلة ١٥ . فليكن

$$f(x_0) = x_0^2 \cdot (a - x_0) = \frac{4a^3}{27} \quad \text{فيكون} \quad x_0 = \frac{2a}{3}$$

ولیکن $x_2 = x_0 + X$ الجذر الأكبر، فيكون:

$$f(x_2) = x_2 \cdot (a - x_2) = c .$$

لذلك يكون:

$$c_0 = f(x_0) = x_0^2(a - x_0) = x_0^2(a - x_2) + x_0^2(x_2 - x_0),$$

$$c = f(x_2) = x_0^2(a - x_2) + (x_2^2 - x_0^2)(a - x_2),$$

$$= x_0^2(a - x_2) + (x_2 - x_0)(x_2 + x_0)(a - x_2),$$

ومنها

$$c_0 - c = f(x_0) - f(x_2) = x_0^2(x_2 - x_0) - (x_2 - x_0)(x_2 + x_0)(a - x_2).$$

وإذا وضعنا $X = x_2 - x_0$ ، نصل إلى:

$$c_0 - c = f(x_0) - f(x_2) = \frac{4a^2}{9}X - X \cdot \left(\frac{4a}{3} + X\right) \left(\frac{a}{3} - X\right);$$

$$c_0 - c = f(x_0) - f(x_2) = aX^2 + X^3;$$

فإذا وضعنا $c_0 - c = k$ ، نحصل على:

$$(المعادلة ١٥) \quad k = aX^2 + X^3$$

هكذا يكون الطوسي قد برهن في الفقرة السابقة ما يلي:

- إذا كان X الجذر الموجب للمعادلة ١٥ فإن $x_2 = x_0 + X$ هو جذر للمعادلة ٢١. لكنه هنا يبرهن العكس:

- إذا كان x_2 جذراً للمعادلة ٢١ يكون $X = x_2 - x_0$ جذراً للمعادلة ١٥.

٦ - دراسة x_1

لنستجّل أننا نحصل على المعادلة ١٥ عن طريق التحويل الأفيني:

$$x \longrightarrow X = x - x_0,$$

ولهذه المعادلة، بالإضافة إلى الجذر الموجب الذي يعطي x_2 ، جذر سالب يعطينا x_1 . لكن الطوسي لا يتعرف إلى مثل هذا الجذر؛ هذا ما اضطره إلى تغيير طريقته. وقد سبق وأشرنا إلى أنه، توسل في بحثه عن x_1 تحليل حدودية أوصلته إلى حل معادلة من الدرجة الثانية. وهنا يعتمد التحويل الأفيني:

$$x \longrightarrow X = x_0 - x$$

الذي يقوده إلى معادلة من النوع ٢١

$$X^3 + k = aX^2$$

حيث $c \neq k$. ولقد بدأ ببرهان التمهيديتين ١ و ٢ التاليتين:

١ - مهما كان العددا a و b يكون:

$$ab(a + b) = a^2b + b^2a$$

٢ - إذا كانت الأعداد a ، b و c تحقق

$$b+c=\frac{2k}{3} \quad \text{و} \quad a=\frac{k}{3} \quad , \quad a+b+c=k$$

يكون

$$a(b+c)^2 = b^2(a+c) + c^2(a+b).$$

ويبرهن، من ثم، أنه إذا كان $x_0 = \frac{2a}{3}$ وإذا كان x_1 الجذر الأصغر للمعادلة فإن $X = x_0 - x_1$ يكون حلاً للمعادلة:

$$X^3 + c_0 - c = aX^2.$$

فلدينا

$$c_0 = f(x_0) = x_0^2(a - x_0),$$

$$c = f(x_1) = x_1^2(a - x_1)$$

ومنها

$$x_1^2(a - x_1) + c_0 - c = x_0^2(a - x_0);$$

لكن، استناداً إلى ٢،

$$x_1^2(a - x_1) + (x_0 - x_1)^2(a - x_0 + x_1) = x_0^2(a - x_0)$$

فيكون

$$c + (x_0 - x_1)^2(a - x_0 + x_1) = c_0 ;$$

فيكون إذن

$$X^2 \cdot (a - X) = c_0 - c ,$$

وبتعبير آخر

$$(المعادلة ٢١) \quad aX^2 = X^3 + k$$

وهي معادلة من النوع ٢١.

ولقد رأينا أنه إذا كان $c = \frac{c_0}{2}$ يكون $X = \frac{a}{3}$ فيكون $x_1 = \frac{a}{3}$ ؛ وإذا كان $c > \frac{c_0}{2}$

يكون $k < \frac{c_0}{2}$. إن حل المعادلة ٢١ يعطي X ومنه نحصل على $x_1 = x_0 - X$.

ويختتم الطوسي عرضه بحسابات تقريبية متتالية لمختلف أرقام x_1 عند كون $c < \frac{c_0}{2}$.

$$x^3 + c = bx$$

المعادلة ٢٢:

من هذه المعادلة نحصل على:

$$b > x^2.$$

نأخذ $(AC) = b$ و $(AC) = AB^2$ فيكون $AB > x$. ونأخذ $AE = x$ فنكون

النقطة E بين A و B - و $(AG) = AE^2$ ، فيكون:


$$(AC) \cdot AE = x^3 + c, \quad (\text{الشكل رقم (٣ - ١٣)})$$

و

$$(AC) \cdot AE = AE^3 + (CG) \cdot AE,$$

ومنها

$$(CG) \cdot AE = c.$$



الشكل رقم (٣ - ١٣)

فتكون المسألة ممكنة عند وجود حجم - «علم مجسم» - مساوٍ لـ c .

دراسة النهاية العظمى

ليكن AE بحيث

$$(AG) = AE^2 = \frac{1}{3} AB,$$

ولنأخذ


$$c_0 = (CG) \cdot AE = (b - AE^2) \cdot AE.$$

الحالة الأولى: $AI > AE$ (الشكل رقم (٣ - ١٤)):

إذا كان AI . $(b - AI^2)$. c يكون $c < c_0$.

وليبيان ذلك نأخذ $(CJ) = b - AI^2$ فيكون:

$$c_0 = (CJ) \cdot AE + (JG) \cdot AE,$$



الشكل رقم (٣ - ١٤)

و

$$c = (CJ) \cdot AE + (CJ) \cdot EI.$$

فيبقى علينا مقارنة $(CJ) \cdot EI$ مع $(JG) \cdot AE$

لكن، بما أن

$$(AG) = \frac{1}{3}(AC),$$

يكون

$$(CG) = 2(AG)$$

ويكون

$$(CG) = (AB + AE) \cdot BE = 2AE^2.$$

لكن

$$(IA + AE) \cdot AE = (IE + 2AE) \cdot AE > 2AE^2$$

و

$$(CJ) = (AB + AI) \cdot BI < 2AE^2$$

لأن

$$(CJ) < (CG).$$

فيكون

$$(AB + AI) \cdot BI < (AI + AE) \cdot AE,$$

ومنها

$$\frac{AB + AI}{AI + AE} < \frac{AE}{BI}$$

و

$$\frac{AB + AI}{AI + AE} \times \frac{BI}{IE} < \frac{AE}{IE} ,$$

فيكون

$$\frac{(CJ)}{(JG)} < \frac{AE}{IE}$$

و

$$(CJ) \cdot EI < (JG) \cdot AE,$$

فيكون

$$(CJ) \cdot AI = (CJ) \cdot EI + (CJ) \cdot AE < (JG) \cdot AE + (CJ) \cdot AE = (CG) \cdot AE$$

وبالتالي

$$c < c_0.$$

الحالة الثانية: $AI < AE$ (الشكل رقم (١٥ - ٣)):

إذا كان $AI = (CJ) \cdot c$ ، يكون $c < c_0$.

ذلك لأن

$$(CG) = (AB + AE) \cdot BE = 2AE^2$$

و

$$(AE + AI) \cdot AI = 2AI^2 + AI \cdot EI < 2AE^2$$

فيكون

$$\frac{AB + AE}{AE + AI} > \frac{AI}{BE} ,$$

ومنها

$$\frac{(CG)}{(GJ)} = \frac{AB + AE}{AE + AI} \times \frac{BE}{EI} > \frac{AI}{IE}$$

و

$$(CG) \cdot IE > (GJ) \cdot AI$$

ومنها

$$(CG) \cdot AE = (CG) \cdot IE + (CG) \cdot AI > (GJ) \cdot AI + (CG) \cdot AI = (CJ) \cdot AI$$

وبالتالي

$$c_0 > c.$$

مما سبق نستنتج ما يلي:

- إذا كان $c > c_0$ ، أي $c > \frac{2}{3}b \cdot \left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{1}{3}}$ ، تكون المسألة مستحيلة؛

- إذا كان $c = \frac{2}{3}b \cdot \left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{1}{3}}$ ، يكون الجذر المطلوب $x = \left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{1}{3}}$ ، لأن:

$$x \cdot (AC) = bx$$

و

$$bx - x^3 = b \cdot \left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{1}{3}} - \left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{3}{3}} = \frac{2}{3}b \cdot \left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{1}{3}} = c$$

فيكون

$$x = \left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{1}{3}}.$$

هو الجذر الوحيد؛ فإذا كان x_1 جذراً آخر، يكون لدينا:

$$bx_1 - x_1^3 = c = c_0;$$

وهذا مستحيل لأننا بيتا أنه مهما كان x ، $\left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{1}{3}} \neq x$ ، يكون

$$bx - x^3 < c_0,$$

- إذا كان $c < \frac{2}{3}b \cdot \left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{1}{3}}$ ، يكون للمسألة حلان، x_1 و x_2 يحققان:

$$x_1 < x_0 < x_2 < b^{\frac{1}{3}}.$$

تحديد الجذر الأصغر x_1

ليكن $(AC) = b$ ، $(AC) = AB^2$ ، $(AC) = \frac{1}{3}AC$ ، $(AG) = \frac{1}{3}AC$ ، (الشكل رقم (٣ - ١٦)).
ولیکن k عدداً (موجباً) بحيث $c_0 - c = k$ ؛ (نذكر أن الطوسي في نصه يبدل الحرف c بـ e ، أي ج بـ ي)، وليكن $AH = 2AE$ ، فيكون

$$EH = 3AE.$$

لنأخذ المعادلة

$$x^3 + k = EH \cdot x^2 \quad (\text{المعادلة (٢١)})$$

وليكن EL جذرها الأصغر (انظر التعليق على المعادلة ٢٢) وليكن $EJ = EL$ ، فيكون لدينا:

$$EL^2 \cdot JH = k.$$

ولنبرهن الآن أن $EL < AE$ وأن $AJ = AE - EJ = x_1$ لدينا $AE^2 = \frac{(AC)}{3}$ وبالتالي $(CG) = \frac{2}{3}(AC) = 2AE^2$ ، فيكون:

$$c_0 = (CG) \cdot AE = 2AE^3.$$

لكن $AH = 2AE$ ، فيكون

$$AE^2 \cdot AH = 2AE^3 = c_0 \quad (١)$$

لكن

$$(CG) = 2BE \cdot AE + BE^2 = 2AE^2,$$

ومنها

$$BE < AE \quad (٢)$$

وليكن $BE = AM$ ؛ فيكون

$$AM^2 + 2AE \cdot AM = 2AE^2,$$

ومنها

$$AM^2 = 2AE \cdot EM;$$

فيكون

$$\frac{EM}{AM} = \frac{AM}{2AE} = \frac{AM}{AH} \quad (٣)$$

ليكن $HS = AM$ و $OS = EM$ فيكون $OE = AH$ ويحصل:

$$\frac{OS}{SH} = \frac{SH}{OE}$$

ومنها

$$\frac{OH + HS}{HS} \times \frac{OS}{HS} = \frac{OH + HS}{HS} \times \frac{SH}{OE}$$

وهذا يعني

$$\frac{(OH + HS) \cdot OS}{HS^2} = \frac{OH + HS}{OE},$$

ومنها

$$(OH + HS) \cdot OS \cdot OE = (OH + HS) \cdot HS^2,$$

فيكون

$$\begin{aligned} OH^2 \cdot OE &= (OH + HS) \cdot OS \cdot OE + HS^2 \cdot OE, \\ &= (OH + HS) \cdot HS^2 + HS^2 \cdot OE = EB^2 \cdot BH. \end{aligned}$$

لكن

$$HO = AE \quad \text{و} \quad OE = AH,$$

فيكون

$$, HO^2 . EO = AE^2 . AH = 2AE^3 \quad (٤)$$

واستناداً إلى (١) يكون لدينا^(٤)

$$AE^2 . AH = c_0$$

وأيضاً

$$AE^2 . AH > k.$$

لكن لدينا

$$EL^2 . JH = k$$

وبالتالي

$$AE^2 . AH > EL^2 . JH;$$

وعلماً بأن

$$AH < JH,$$

يكون

$$AE > EL.$$

ولدينا $EJ = EL$. فإذا وضعنا $x_1 = AE - EJ = AJ$ ، يكون x_1 حلاً.

ولدينا

$$c_0 = (CG) . AJ + (CG) . EJ,$$

و

$$(CG) = 2AE^2$$

(٤) في الواقع، يستتج الطوسي بشكل آخر؛ فمن (٤)، استناداً إلى (١)، يحصل على:

$$BE^2 . BH = 2AE^3 = c_0$$

وبالتالي

$$BE^2 . BH > k$$

لكن

$$(معطية) \quad EL^2 . JH = k$$

فيستتج من دون أي تبرير آخر

$$EL < BE$$

ومنها

$$EL < AE$$


لأن $BE < AE$ ، استناداً إلى (٢).

ومنها

$$(CG) \cdot EJ = 2AE^2 \cdot EJ = 2(GD) \cdot EJ + 2AJ^2 \cdot EJ,$$

لكن

$$((\text{الشكل رقم } ١٦ - ٣)) \quad (GD) = EJ \cdot (AE + AJ)$$



الشكل رقم (١٦ - ٣)

ومنها

$$2(GD) \cdot EJ = EJ^2 \cdot 2AE + EJ^2 \cdot AJ + EJ^2 \cdot AJ,$$

لكن

$$2AJ^2 \cdot EJ + EJ^2 \cdot AJ = (GD) \cdot AJ,$$

و

$$EJ^2 \cdot 2AE + EJ^2 \cdot AJ = EJ^2 \cdot HJ,$$

وبالتالي

$$\begin{aligned} c_0 &= (CG) \cdot AJ + (GD) \cdot AJ + EJ^2 \cdot HJ \\ &= (CD) \cdot AJ + EJ^2 \cdot HJ. \end{aligned}$$

لكن

$$c_0 = c + k,$$

و

$$EJ^2 \cdot HJ = k,$$

فيكون

$$(CD) \cdot AJ = c.$$


وإذا وضعنا $AJ = x_1$ ، نحصل على:

$$bx_1 = (AC) \cdot x_1 = (AD) \cdot AJ + (CD) \cdot AJ = AJ^3 + c$$

ومنها

$$bx_1 = x_1^3 + c.$$

تحديد الجذر الأكبر x_2 (الشكل رقم (٣ - ١٧)):



الشكل رقم (٣ - ١٧)

لدينا

$$(CG) \cdot AE = c_0 = c + k.$$

ليكن $AH = 2AE$ ، $EH = 3AE$ ، ولنأخذ المعادلة (من النوع ١٥)

$$x^3 + EH \cdot x^2 = k$$

وليكن EJ حل هذه المسألة. فيكون لدينا:

$$EJ^2 \cdot HJ = k$$

ونبرهن كما سبق أن

$$BJ < BE$$

فيكون $x_2 = AE + EJ = AJ$ حلاً، وذلك يعني أن لدينا:

$$(CM) \cdot AJ = c.$$

ولدينا كذلك

$$(CG) \cdot AE = (CM) \cdot AE + (MG) \cdot AE,$$

لكن

$$(MG) = 2EJ \cdot AE + EJ^2,$$

ومنها

$$(MG) \cdot AE = 2EJ \cdot AE^2 + EJ^2 \cdot AE;$$

ومنها

$$(CG) = 2AE^2$$

و

$$2EJ \cdot AE^2 = (CG) \cdot EJ = (CM) \cdot EJ + (MG) \cdot EJ,$$

و

$$2EJ \cdot AE \cdot EJ = 2AE \cdot EJ^2,$$

ومنها

$$(MG) \cdot EJ = EJ^2 \cdot AE + EJ^2 \cdot AE + EJ^3,$$

و

$$3EJ^2 \cdot AE + EJ^3 = EJ^2 \cdot HJ,$$

فيكون

$$c + k = c_0 = (CM) \cdot AJ + EJ^2 \cdot HJ,$$

ومنها

$$c_0 = (CM) \cdot AJ + k,$$

و

$$c = (CM) \cdot AJ,$$

فيكون


$$bx_2 = (AC) \cdot AJ = AJ^2 \cdot AJ + (CM) \cdot AJ = AJ^3 + c$$

ومنها

$$bx_2 = x_2^3 + c,$$

فيكون x_2 حلاً للمعادلة ٢٢.

العلاقة بين المعادلة ٢٢ والمعادلة ١٥ (الشكل رقم (٣ - ١٨) :



الشكل رقم (٣ - ١٨)

ليكن $(AC) = b$ و $AE = \sqrt{\frac{b}{3}} = x_0$ ؛ ولنأخذ المعادلة ١٥ التالية :

$$X^3 + 3AE \cdot X^2 = k.$$

وليكن $AJ = x_2$ الجذر الأكبر للمعادلة ٢٢؛ فيكون

$$c_0 = (CG) \cdot AE \quad (\text{المجسم الأول})$$

و

$$c = (CG) \cdot AJ \quad (\text{المجسم الثاني})$$

والقسمان اللذان يخصصان هذين المجسمين هما بالتتالي $AE \cdot (MG)$ و $JE \cdot (CM)$ فيكون لدينا:

$$k = c_0 - c = (MG) \cdot AE - (CM) \cdot JE,$$

ومنها

$$k + (CM) \cdot JE = (MG) \cdot AE.$$

وإذا وضعنا $EJ = X$ ، نحصل على:

$$\begin{aligned} (MG) \cdot AE &= (2AE + X)X \cdot AE, \\ &= (2AE \cdot X + X^2)AE = 2AE^2 \cdot X + AE \cdot X^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (CM) \cdot JE &= (BA + AJ)BJ \cdot JE = (BA + AE + X)(BE - X)X, \\ &= [2AE^2 - (AB + AE)X + BE \cdot X - X^2]X, \\ &= (2AE^2 - 2AE \cdot X - X^2)X = 2AE^2 \cdot X - 2AE \cdot X^2 - X^3. \end{aligned}$$

فيكون لدينا بالتالي:

$$2AE^2 \cdot X - 2AE \cdot X^2 - X^3 + k = 2AE^2 \cdot X + AE \cdot X^2,$$


ومنها

$$k = X^3 + 3AE \cdot X^2;$$

فنحصل على X ، أي على $x_2 - x_0$ ، ومنها على:

$$x_2 = x_0 + X.$$

العلاقة بين المعادلة ٢٢ والمعادلة ٢١ (الشكل رقم (٣ - ١٩)):



الشكل رقم (٣ - ١٩)

ليكن $(AC) = b$ ، $(AG) = AE^2 = \frac{1}{3}b = x_0^2$ ، و $x_1 = AJ$ الجذر الأصغر. القسمان اللذان 'يخصان' المجسمين الأول والثاني هما بالتتالي $(CG).JE$ و $(MG).AJ$ ، فيكون

$$k = c_0 - c = (CG) \cdot EJ - (MG) \cdot AJ$$

ويكون

$$k + (MG) \cdot AJ = (CG) \cdot EJ.$$

فإذا وضعنا $X = EJ$ ، نحصل على:

$$(CG) \cdot EJ = \frac{2}{3}b \cdot X,$$

$$\begin{aligned}
(MG) \cdot AJ &= (AJ + AE) \cdot EJ \cdot AJ, \\
&= (2AE - X) \cdot X \cdot (AE - X), \\
&= (X^2 + 2AE^2 - 3AE \cdot X)X, \\
&= X^3 + \frac{2}{3}bX - 3AE \cdot X^2,
\end{aligned}$$

ومنها المعادلة من النوع ٢١ :

$$X^3 + k = 3AE \cdot X^2$$

فإذا كان $EJ = X$ هو الجذر الأصغر لهذه المعادلة، يكون لدينا

$$x_2 = AE - X = x_0 - X.$$

ويمكن إيجاز ما سبق كما يلي: يُحتسب العدد

$$c_0 = \frac{2b}{3} \sqrt{\frac{b}{3}};$$

- فإذا كان $c > c_0$ تكون المسألة مستحيلة كما في المثال :

$$x^3 + 7524872 = 309123x,$$

حيث: $\frac{b}{3} = 103041$ و $\sqrt{\frac{b}{3}} = 321$ ، فيكون $c = 66152322 < c_0$.

- وإذا كان $c_0 = c$ يكون للمعادلة جذر واحد $x = x_0$.

- وإذا كان $c < c_0$ يكون لها جذران؛ وإذا وضعنا $k = c_0 - c$ نحصل على الجذر الأكبر بواسطة المعادلة:

$$X^3 + \sqrt{\frac{b}{3}} X^2 = k,$$

حيث $x_2 = x_0 + X$ ، وذلك كما في المثال:

$$x^3 + 13957722 = 146523x,$$

حيث

$$\frac{b}{3} = 48841, \quad \sqrt{\frac{b}{3}} = 221, \quad c_0 = 21587722, \quad k = 7630000, \quad 3 \cdot \sqrt{\frac{b}{3}} = 663.$$

فمنها نحصل على المعادلة:

$$X^3 + 663X^2 = 7630000,$$

وجذرها (الموجب) $X = 100$ وبالتالي:

$$x_2 = x_0 + 100 = 321.$$

ولإيجاد الجذر الأصغر، نستخدم المعادلة ٢١:

$$X^3 + k = 3\sqrt{\frac{b}{3}} X,$$

فيكون $x_1 = x_0 - X$ ، كما في المثال:

$$x^3 + 137606922 = 531723x,$$

$$\frac{b}{3} = 177241, \sqrt{\frac{b}{3}} = 421 = x_0, c_0 = 149236922, K = 11630000,$$

ومنها نحصل على المعادلة

$$X^3 + 11630000 = 1263 X^2,$$

وجذرها الأصغر 100، فيكون

$$x_1 = x_0 - X = 321$$

تعليق

تكتب المعادلة

$$x^3 + c = bx$$

على الشكل
(١)

$$(b - x^2) \cdot x = c$$

فلنضع
(٢)

$$f(x) = (b - x^2) \cdot x$$

١ - دراسة النهاية العظمى لـ (٢)

ياخذ الطوسي $x_0 = \sqrt{\frac{b}{3}}$ ويبرهن ما يلي:

$$f(x_0) = \sup_{x \in \mathbb{R}} [f(x)] \quad (٣)$$

وذلك ببرهانه أن $f(x) < f(x_0)$ في كل من الحالتين، $x > x_0$ و $x < x_0$.

الحالة الأولى: يكفي برهان ما يلي:

$$x_1 > x_0 \implies f(x_1) < f(x_0).$$

لدينا $x_1 > x_0$ وبالتالي:

$$f(x_0) = (b - x_1^2)x_0 + (x_1^2 - x_0^2)x_0,$$

$$f(x_1) = (b - x_1^2)x_0 + (b - x_1^2)(x_1 - x_0).$$

لكن

$$2x_0^2 = b - x_0^2 = (b^{\frac{1}{2}} + x_0) (b^{\frac{1}{2}} - x_0),$$

ومنها

$$(x_1 + x_0)x_0 = [(x_1 - x_0) + 2x_0]x_0 > 2x_0^2,$$

وأيضاً

$$b - x_1^2 = (b^{\frac{1}{2}} + x_1) (b^{\frac{1}{2}} - x_1) < b - x_0^2,$$

ومنها

$$b - x_1^2 < 2x_0^2,$$

فيحصل

$$(b^{\frac{1}{2}} + x_1) (b^{\frac{1}{2}} - x_1) < [(x_1 - x_0) + 2x_0]x_0,$$

ويكون

$$(b - x_1^2) (x_1 - x_0) < (x_1^2 - x_0^2) \cdot x_0$$

ومنها

$$f(x_1) < f(x_0).$$

الحالة الثانية: يكفي برهان ما يلي:

$$x_2 < x_0 \implies f(x_2) < f(x_0).$$

لدينا

$$2x_0^2 = b - x_0^2 = (b^{\frac{1}{2}} + x_0) (b^{\frac{1}{2}} - x_0),$$

ومنها

$$(x_2 + x_0)x_2 = 2x_2^2 + (x_0 - x_2)x_2 < 2x_0^2$$

وأيضاً

$$(b^{\frac{1}{2}} + x_0) (b^{\frac{1}{2}} - x_0) > (x_2 + x_0)x_2;$$

لكن، أخذاً في الاعتبار أن $x_2 < x_0$ لدينا:

$$f(x_0) = (b - x_0^2)x_2 + (b - x_0^2) (x_0 - x_2)$$

ومنها

$$f(x_0) > (b - x_0^2)x_2 + (x_2 + x_0) (x_0 - x_2) \cdot x_2 > (b - x_2^2)x_2,$$

فيكون

$$f(x_0) > f(x_2);$$

وبنتيجة دراسة الحالتين المذكورتين نكون قد حصلنا على (٣).

ملاحظة: على غرار ما قام به بالنسبة إلى المعادلة ٢١، لا يشير الطوسي إلى ما أوصله لإيجاد $x_0 = \sqrt{\frac{b}{3}}$.

٢ - احتساب النهاية العظمى

النهاية العظمى لـ $f(x)$ هي:

$$f(x_0) = \frac{2b}{3} \cdot \sqrt{\frac{b}{3}} = 2\left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{3}{2}} = 2x_0^3 \quad (٤)$$

مما يسمح بتمييز الحالات التالية:

- إذا كان $c > 2\left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{3}{2}}$ فالمسألة لا حل لها.

- إذا كان $c = 2\left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{3}{2}}$ يكون $x_0 = \left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$ حلاً مزدوجاً، فلدينا:

$$b \cdot \left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{1}{2}} - \left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{3}{2}} = 2\left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{3}{2}} = c$$

وهو الحل الوحيد في هذه الحالة لأن دراسة النهاية العظمى أظهرت أن:

$$x' \neq x_0 \Rightarrow f(x') < f(x_0)$$

- وأخيراً، إذا كان $c < 2\left(\frac{b}{3}\right)^{\frac{3}{2}}$ يكون للمعادلة حلان، x_1 و x_2 :

$$x_1 < x_0 < x_2.$$

٣ - تحديد الجذر الأصغر x_1

ليكن $c_0 = f(x_0)$ وليكن X حل المعادلة من النوع ٢١:

$$X^3 + (c_0 - c) = 3x_0X^2 \quad (٥)$$

نذكر أن لهذه المعادلة، في ظل شروط الطوسي، حلين وأن X هو الحل الأصغر. فلكي يكون لـ (٥) حل يكفي أن يتحقق الشرط:

$$c_0 - c < 4x_0^3.$$

لكن $c_0 = 2x_0^3$ ، فالشرط المذكور محقق.

ومن جهة أخرى، إذا كان X_1 و X_2 حلّي المعادلة (٥) يكون

$$X_1 < 2x_0 < X_2 .$$

ولقد رأينا، إضافة إلى ذلك، ونحن بصدد دراسة المعادلة ٢١ أنه عندما يكون $c_0 - c_1 < 2x_0^3$ ، يكون $X_1 < x_0$. إلا أن الطوسي، يصل إلى هذه النتيجة، بطريقة مختلفة بدل استنتاجها من دراسة المعادلة ٢١.

بعد ذلك يبرهن الطوسي أن $x_1 = x_0 - X$ ، مستخدماً:

$$\begin{aligned} f(x_0) &= (b - x_0^2) \cdot x_1 + (b - x_0^2) \cdot X \\ &= (b - x_0^2)x_1 + (x_0^2 - x_1^2) \cdot x_1 + X^2 \cdot (3x_0 - X), \end{aligned}$$

ومنها يستنتج استناداً إلى (٥)

$$f(x_0) = (b - x_1^2) \cdot x_1 + f(x_0) - c$$

فيكون

$$c = (b - x_1^2) \cdot x_1,$$

ويكون x_1 بالتالي الجذر الأصغر.

٤ - تحديد الجذر الأكبر x_2

إذا كان X الجذر الوحيد للمعادلة من النوع ١٥ التالية:

$$X^3 + 3x_0X^2 = f(x_0) - c \quad (٦)$$

يكون $x_0 < X$ و $x_2 = x_0 + X$.

وهنا لا يقدّم الطوسي أي برهان، مرجعاً القارئ إلى ما تقدّم - انظر الهامش رقم (٤) من دراسة هذه المعادلة في هذا الفصل.

إن دراسة المعادلة (٦) تظهر أن $X < x_0$ وأن تأكيد الطوسي صحيح. لنبرهن أن $x_2 = x_0 + X$. فلدينا ما يلي:

$$(b - x_0^2) \cdot x_0 = (b - x_2^2)x_0 + (x_2^2 - x_0^2) \cdot x_0.$$

لكن

$$(x_2^2 - x_0^2) = 2Xx_0 + X^2$$

فيكون

$$(x_2^2 - x_0^2)x_0 = 2x_0^2 \cdot X + X^2x_0.$$

لكن

$$\begin{aligned} 2x_0^2 &= (b - x_2^2) + (x_2^2 - x_0^2) \\ &= (b - x_2^2) + (2x_0 + X)X; \end{aligned}$$

فيحصل

$$f(x_0) = c_0 = (b - x_2^2)x_0 + (b - x_2^2)X + (2x_0 + X)X^2 + x_0X^2,$$

ومنها

$$c_0 = (b - x_2^2)x_2 + 3x_0X^2 + X^3.$$

لكن

$$3x_0X^2 + X^3 = c_0 - c,$$

ومنها

$$c_0 = (b - x_2^2)x_2 + c_0 - c$$

فيكون

$$x_2^3 + c = bx_2,$$

ويكون x_2 جذراً للمعادلة ٢٢.

٥ - العلاقة بين المعادلة ٢٢ والمعادلة ١٥

إذا كان x_2 الجذر الأكبر للمعادلة ٢٢ يكون $X = x_2 - x_0$ جذر المعادلة من النوع ١٥ :

$$X^3 + 3x_0X^2 = c_0 - c$$

فمن المعطيات، لدينا :

$$c = (b - x_2^2) \cdot x_2$$

ولدينا

$$c_0 = (b - x_0^2) \cdot x_0,$$

فإذا ألقينا القسم المشترك وهو $(b - x_2^2)x_0$ نحصل على :

$$c_0 - c = (x_2^2 - x_0^2)x_0 - (b - x_2^2)(x_2 - x_0).$$

لكن

$$(x_2^2 - x_0^2)x_0 = (2x_0 + X)X \cdot x_0 = 2x_0^2X + x_0X^2$$

و

$$\begin{aligned} (b - x_2^2)(x_2 - x_0) &= (3x_0^2 - x_2^2)X \\ &= [2x_0^2 - (x_2^2 - x_0^2)]X = [2x_0^2 - (2x_0 + X) \cdot X]X \\ &= 2x_0^2X - 2x_0X^2 - X^3. \end{aligned}$$

فينتج

$$c_0 - c = 3x_0X^2 + X^3.$$

وهذه المعادلة تعطي X التي تعطي بدورها x_2 ($x_2 = x_0 + X$).

٦ - العلاقة بين المعادلة ٢٢ والمعادلة ٢١

إذا كان x_1 الجذر الأصغر للمعادلة ٢٢ يكون $X = x_0 - x_1$ جذر المعادلة من النوع ٢١ التالية:

$$X^3 + c_0 - c = 3x_0X^2$$

فلدينا

$$c_0 = (b - x_0^2)x_0 = (b - x_0^2)x_1 + (b - x_0^2) \cdot X$$

ولدينا

$$c = (b - x_1^2)x_1 = (b - x_0^2)x_1 + (x_0^2 - x_1^2)x_1,$$

فيكون

$$c_0 - c = (b - x_0^2)X - (x_0^2 - x_1^2)x_1.$$

لكن

$$\begin{aligned} (x_0^2 - x_1^2)x_1 &= (x_0 + x_1)(x_0 - x_1)x_1 \\ &= (2x_0 - X) \cdot X \cdot (x_0 - X) = (2x_0^2 - 3x_0X + X^2)X \\ &= X^3 + 2x_0^2X - 3x_0X^2; \end{aligned}$$

فينتج

$$c_0 - c = 3x_0X^2 - X^3,$$

أو

$$X^3 + c_0 - c = 3x_0X^2$$

والمعادلة الأخيرة هذه تعطي X فينتج $x_1 = x_0 - X$.

$$x^3 + ax^2 + c = bx \quad \text{المعادلة ٢٣}$$


ليكن

$$BC = a \quad \text{و} \quad (AD) = AB^2 = b$$


نكتب المعادلة على الشكل:

$$bx - x^3 = c + ax^2$$

فيكون إذن $b > x^2$ و $AB > x$.



الشكل رقم (٣ - ٢١)



الشكل رقم (٣ - ٢٠)

ولیکن $BE = x$ ، فيكون لدينا:

$$\begin{aligned} (AD) \cdot BE &= b \cdot BE = BE^3 + a \cdot BE^2 + c \\ &= (BG) \cdot BE + [(AD) - (BG)] \cdot BE, \end{aligned}$$

فيكون

$$(IG) \cdot BE = [(AD) - (BG)] \cdot BE = BC \cdot (BG) + c \quad (١)$$

فإذا تعدّرت قسمة AB على نقطة E بحيث تتحقق العلاقة (١)، تكون المسألة مستحيلة.

دراسة النهاية العظمى

ليكن $BH = \frac{2a}{3}$ وليكن BE حلّ المعادلة:

$$x^2 + \frac{2}{3}a \cdot x = \frac{1}{3}b \quad (٢)$$

وليكن $(BG) = BE^2$ ؛ فإذا وضعنا:

$$(IG) \cdot BE - (BG) \cdot BC = c_0,$$

فلن يوجد أي عدد x ، $(x \neq BE)$ ، يحقق

$$bx - x^3 - ax^2 \geq c_0,$$

هذا يعني أن أي عدد x ، مختلف عن BE يحقق حتماً

$$bx - x^3 - ax^2 < c_0,$$

فإذا كان $c > c_0$ تكون المسألة مستحيلة.

الحالة الأولى: $BJ > BE$ (الشكل رقم (٣ - ٢١)):

إذا وضعنا $BJ^2 . BJ - BC . BJ^2 = (b - BJ^2) . BJ - BC$. $c = (b - BJ^2) . BJ - BC$ يكون $c < c_0$. وإذا كانت K نقطة بحيث يكون $BJ^2 = (BK)$ ، يكون لدينا:

$$(IG) . BE = (IK) . BE + (KG) . BE \quad (٣)$$

$$(b - BJ^2) . BJ = (b - BJ^2) . BE + (b - BJ^2) . EJ \quad (٤)$$

$$= (IK) . BE + (IK) . EJ.$$

فمن (٣) يبقى $BE . (KG)$ ومن (٤) يبقى $EJ . (IK)$. ولكن، لدينا

$$(BG) . BC < (BK) . BC,$$

كما أن لدينا

$$(BK) . BC = (BG) . BC + (KG) . BC.$$

فتوجب علينا إذن مقارنة:

$$(IK) . EJ - (BK) . BC \text{ و } (KG) . BE - (BG) . BC$$

أي مقارنة

$$(IK) . EJ - (KG) . BC \text{ و } (KG) . BE$$

أو

$$(IK) . EJ \text{ و } (KG) . (BE + BC)$$

أي في النهاية، مقارنة

$$(IK) . EJ \text{ و } (KG) . EC.$$

فإذا برهنا أن

$$(KG) . EC > (IK) . EJ$$

نكون قد برهنا العلاقة المطلوبة.

لهذه الغاية، نذكر أن لدينا:

$$3BE^2 + 2BC . BE = (AD),$$

وبالتالي

$$2EC . BE = 2BE^2 + 2BC . BE = (AD) - BE^2 = (IG), \quad (٥)$$

فيكون

$$2EC \cdot BE = (AB + BE) \cdot AE,$$

ومنها

$$\frac{AB + BE}{2BE} = \frac{EC}{AE} \quad (٦)$$

لكن

$$(IK) < (IG),$$

فيكون

$$(AB + BJ) \cdot AJ < 2EC \cdot BE,$$

ونحصل على

$$\frac{AB + BJ}{2BE} < \frac{EC}{AJ}.$$

لكن

$$(BJ > BE \text{ لأن } \frac{AB + BJ}{2BE} > \frac{AB + BJ}{BE + BJ})$$

فيكون

$$\frac{AB + BJ}{BE + BJ} < \frac{EC}{AJ}.$$

فتتبع

$$\frac{AB + BJ}{BE + BJ} \cdot \frac{AJ}{JE} = \frac{(IK)}{(KG)} < \frac{EC}{AJ} \cdot \frac{AJ}{JE} = \frac{EC}{EJ},$$

ومنها

$$(IK) \cdot JE < (KG) \cdot EC;$$

فنحصل على المتباينة المطلوبة.

الحالة الثانية: $BM < BE$ (الشكل رقم (٣ - ٢٢)):

إذا وضعنا

$$c = (b - BM^2)BM - BC \cdot BM^2$$

يكون $c < c_0$. فإذا وضعنا $(BN) = BM^2$ يكون


$$(IG) \cdot BE = (IG) \cdot BM + (IG) \cdot EM$$

ويكون

$$(b - BM^2) \cdot bM = (IN) \cdot BM = (IG) \cdot BM + (GN) \cdot BM$$

فتبقى علينا مقارنة

$$(GN) \cdot BM - BC \cdot BM^2 \quad \text{و} \quad (IG) \cdot EM$$



الشكل رقم (٣ - ٢٢)

لكن

$$BC \cdot BM^2 = BC \cdot (BN) = BG \cdot (BG) - BC \cdot (GN),$$

فيتوجب علينا مقارنة

$$(GN) \cdot (BM + BC) = (GN) \cdot MC \quad \text{و} \quad (IG) \cdot EM$$

ولكن، لدينا

$$\frac{AB + BE}{2EB} = \frac{CE}{AE}$$

وكذلك

$$\frac{AB + BE}{EB + BM} > \frac{AB + BE}{2BE}$$

و

$$\frac{CM}{AE} < \frac{CE}{AE},$$

وبالتالي

$$\frac{AB + BE}{EB + EM} > \frac{CM}{AE}.$$

فيكون

$$\frac{(AB + BE)}{EB + BM} \cdot \frac{AE}{EM} = \frac{(IG)}{(GN)} > \frac{CM}{AE} \cdot \frac{AE}{EM} = \frac{CM}{EM},$$

ونحصل على

$$(IG) \cdot EM > (GN) \cdot CM,$$

وهذا ما يعطي المتباينة المطلوبة.

وبعد أن برهن الطوسي على أنه لو كان BE جذراً للمعادلة (٢) فإن E يحقق (٦)، يبرهن العكس: إذا كان E يحقق (٦)، يكون BE ، العدد الأول المطلوب، جذراً للمعادلة (٢).

فالعلاقة (٦) تكتب على الشكل التالي:

$$(AB + BE) \cdot AE = 2BE \cdot EC,$$

فإذا وضعنا $BE = x$ نحصل على:

$$(\sqrt{b} + x)(\sqrt{b} - x) = 2x(a + x),$$

أي على

$$b - x^2 = 2x^2 + 2ax,$$

ومنها

$$b = 3x^2 + 2ax,$$

أي

$$\frac{b}{3} = x^2 + \frac{2a}{3}x.$$

ليكن الآن x_0 حلاً لهذه المعادلة، فيكون

$$c_0 = (b - x_0^2) \cdot x_0 - ax_0^2.$$

إن الدراسة السابقة تُظهر أن لدينا ما يلي:

- إذا كان $c > c_0$ تكون المسألة مستحيلة.

- إذا كان $c = c_0$ تكون المسألة ممكنة ويكون x_0 حلاً.

- إذا كان $c < c_0$ يكون للمسألة حلان x_1 و x_2 يحققان:


$$x_1 < x_0 < x_2.$$

تحديد الجذر الأكبر x_2 (الشكل رقم (٣ - ٢٣)):

ليكن $BC = a$ على امتداد AB وليكن $CO = 2BE$ ، فيما أن BO ، BC و CO معلومة، يكون EO معلوماً.

ليكن $k = c_0 - c$ ولناخذ المعادلة من النوع (١٥)

$$x^3 + EO \cdot x^2 = k$$



الشكل رقم (٣ - ٢٣)

وليكن EJ حل هذه المعادلة. يستنتج الطوسي (راجع التعليق) أن $EJ < AE$ ويبرهن أن $BJ = BE + EJ$ هو الحل المطلوب. فلدينا ما يلي:

$$(GK) \cdot CE = 2BE \cdot CE \cdot EJ + EJ^2 \cdot CE.$$

لكن، استناداً إلى (٥)، لدينا $2BE \cdot CE = IG$ ، فيكون

$$\begin{aligned} (GK) \cdot CE &= EJ^2 \cdot CE + (IG) \cdot EJ, \\ &= EJ^2 \cdot CE + (IK) \cdot EJ + (KG) \cdot EJ. \end{aligned}$$

لكن

$$(GK) \cdot EJ = 2BE \cdot EJ^2 + EJ^3 = CO \cdot EJ^2 + EJ^3$$

فيكون

$$\begin{aligned} (GK) \cdot EC &= EJ^2 \cdot EC + EJ^2 \cdot CO + EJ^3 + (IK) \cdot EJ \\ &= EJ^2 \cdot JO + (IK) \cdot EJ. \end{aligned}$$

وبطرح $BC \cdot (KG)$ من كلا الطرفين

$$(KG) \cdot BE = (IK) \cdot EJ + EJ^2 \cdot OJ - (KG) \cdot BC;$$

وبإضافة $BE \cdot (IK)$ إلى كل من الطرفين

$$(IG) \cdot BE = (IK) \cdot BJ + EJ^2 \cdot OJ - (KG) \cdot BC;$$

وبطرح $BE^2 \cdot BC$ من كلا الطرفين

$$\begin{aligned} (IG) \cdot BE - BE^2 \cdot BC &= (IK) \cdot BJ + EJ^2 \cdot OJ - (BK) \cdot BC \\ &= (IK) \cdot BJ - BJ^2 \cdot BC + EJ^2 \cdot OJ. \end{aligned}$$

لكن، استناداً إلى المعادلة ١٥، لدينا:

$$c + EJ^2 \cdot JO = c_0,$$

فيكون $(IK) \cdot BJ - BJ^2 \cdot BC + EJ^2 \cdot JO = c + EJ^2 \cdot JO,$


ومنها $(IK) \cdot BJ - BJ^2 \cdot BC = c,$

وبالتالي $(AB^2 - BJ^2)BJ - BJ^2 \cdot BC = c$

فيكون $BJ^3 + aBJ^2 + c = b \cdot BJ$

فيكون BJ الجذر الأكبر للمعادلة ٢٣.

تحديد الجذر الأصغر x_1 (الشكل رقم (٣ - ٢٤)):



الشكل رقم (٣ - ٢٤)

ليكن $k = c_0 - c$ ، $CO = 2BE$ ، وليكن EM حلاً للمعادلة

$$x^3 + k = EO \cdot x^2$$

وهي من النوع ٢١، فيكون

$$EM^2 \cdot MO = k,$$

واستناداً إلى المسألة السابقة

$$EM < BE$$

ويكون الحل المطلوب هو $BM = BE - EM$. وبرهانه أن لدينا، استناداً إلى (٥)

$$(IG) = 2BE \cdot CE$$

ومنها

$$(IG) \cdot EM = 2BE \cdot CE \cdot EM$$

$$= (GS) \cdot EC + EM^2 \cdot EC$$

$$= (GS) \cdot EM + (GS) \cdot MC + EM^2 \cdot EC$$

$$= EM^2 \cdot EB + BM \cdot EM^2 + (GS) \cdot MC + EM^2 \cdot EC.$$

لكن

$$EM^2 \cdot EC = EM^2 \cdot EB + EM^2 \cdot BC,$$

فيكون

$$\begin{aligned}(IG) \cdot EM &= 2EM^2 \cdot BE + EM^2 \cdot (MB + BC) + (GS) \cdot MC \\ &= EM^2 \cdot MO + (GS) \cdot MC.\end{aligned}$$

فإذا طرحنا $BC \cdot (GS)$ من كلا الطرفين نحصل على:

$$(IG) \cdot EM - (GS) \cdot BC = (GS) \cdot MB + EM^2 \cdot MO;$$

وإذا أضفنا $BM \cdot (IG)$ إلى كلا الطرفين نحصل على:

$$(IG) \cdot EB - (GS) \cdot BC = (IS) \cdot MB + EM^2 \cdot MO;$$

وإذا طرحنا $BC \cdot BM^2$ من كلا الطرفين نحصل على:

$$c_0 = (IG) \cdot EB - (BG) \cdot BC = (IS) \cdot MB + EM^2 \cdot MO - BM^2 \cdot BC.$$

لكن

$$c_0 = k + c = EM^2 \cdot MO + c$$

فيكون

$$c = (AB^2 - MB^2) \cdot MB - BC \cdot BM^2$$

أي

$$c = b \cdot MB - MB^3 - a \cdot BM^2,$$

فيكون BM هو الحل المطلوب.

العلاقة بين المعادلة ٢٣ والمعادلة ١٥ (الشكل رقم (٣ - ٢٥)):

تبين مما سبق أن:


$$c_0 - c = (KG) \cdot EC - (IK) \cdot JE.$$

وبوضع $EJ = X$ نحصل على:

$$\begin{aligned}(KG) \cdot EC &= (BE + BJ)EJ \cdot EC = (2BE + EJ)EJ \cdot EC \\ &= (2x_0 + X) \cdot X \cdot EC\end{aligned}$$

و

$$\begin{aligned}(IK) \cdot JE &= (AB + BJ) \cdot AJ \cdot JE \\ &= (AB + BE + EJ) (AE - EJ) \cdot JE \\ &= (AB + BE) \cdot AE \cdot JE - (AB + BE)EJ^2 + AE \cdot EJ^2 - EJ^3.\end{aligned}$$



الشكل رقم (٣ - ٢٥)

فيكون

$$(IK) \cdot JE + c_0 - c = (KG) \cdot EC = 2BE \cdot CE \cdot EJ + CE \cdot EJ^2$$

و

$$(AB + BE) \cdot AE \cdot JE + c_0 - c = JE^2(2BE + CE) + JE \cdot 2BE \cdot CE + JE^3,$$

لكن، استناداً إلى (٥)، لدينا:

$$(AB + BE)AE = 2BE \cdot CE,$$

ومنها المعادلة من النوع ١٥:

$$c_0 - c = k = X^2(3x_0 + a) + X^3$$

وحل هذه المعادلة هو $X = EJ$ ، لذلك يكون

$$x_2 = x_0 + X = BE + EJ = BJ.$$

العلاقة بين المعادلة ٢٣ والمعادلة ٢١ (الشكل رقم (٣ - ٢٦)):

لقد بينّا أن:


$$c_0 - c = (IG)EM - (GN)MC.$$

وبوضع $EM = X$ نحصل على:

$$c_0 - c = (IG)X - (EM + BM) \cdot X \cdot (EC - X),$$

ومنها

$$\begin{aligned} k = c_0 - c &= (IG)X - (2BE \cdot X - X^2)(EC - X) \\ &= (IG) \cdot X - [2BE \cdot CE \cdot X + X^3 - X^2(2BE + EC)] \end{aligned}$$



الشكل رقم (٣ - ٢٦)

و

$$k + 2BE \cdot CE \cdot X + X^3 = (AB + BE)AE \cdot X + X^2(2BE + EC)$$

ومنها المعادلة من النوع ٢١:

$$k + X^3 = X^2(3x_0 - a)$$

هذه المعادلة تعطي $X = EM$ فنحصل على:

$$x_1 = x_0 - X = BE - EM = BM.$$

مثال: (يكون فيه x_0 جذراً).

في المعادلة

$$x^3 + 30x^2 + 69\,243\,552 = 328\,383x.$$

نحسب $\frac{2a}{3}$ و $\frac{b}{3}$:

$$\frac{b}{3} = 109\,461, \quad \frac{2a}{3} = 20.$$

فكتب المعادلة

$$x^2 + \frac{2a}{3}x = \frac{b}{3}$$

على الشكل

$$x^2 + 20x = 109\,461$$

ومنها نحصل على

$$x_0 = 321.$$

ونحسب:

$$x_0^2 = 103\,041, \quad b - x_0^2 = 225\,342,$$

ومنها

$$c_0 = 321 \times 225\,342 - 30 \times 103\,041,$$

$$c_0 = 72\,334\,782 - 3\,091\,230 = 69\,243\,552.$$

فيكون $c_0 = c$ ويكون للمعادلة حلٌ وحيد هو $x_0 = 321$.

ولو كان $a' = a$ ، $b' = b$ ، $c' = c + \alpha$ حيث α عدد موجب، لكانت المعادلة ذات المعاملات a' ، b' و c' ، مستحيلة.

مثال عن احتساب x_2 :

نأخذ المعادلة

$$x^3 + 60x^2 + 57\,127\,086 = 300\,267x.$$

فيكون للمعادلة $x^3 + \frac{2a}{3}x = \frac{b}{3}$ جذرٌ هو $x_0 = 297$ ، فيكون

$$c_0 = 57\,688\,686$$

ويكون $c_0 > c$ ، فالمسألة ممكنة؛ ونحسب

$$c_0 - c = 561\,600 \quad , \quad 3x_0 + a = 951$$

ونضع المعادلة من النوع ١٥

$$x^3 + 951x^2 = 561\,600$$

ذات الجذر $X = 24$ ، فيكون

$$x_2 = x_0 + X = 321.$$

مثال عن احتساب x_1 :

نأخذ المعادلة

$$x^3 + 60x^2 + 88\,651\,854 = 398\,475x.$$

فنجد $x_0 = 345$. نحسب $3x_0 + a = 1095$ ، و $c_0 - c$ ونضع المعادلة من النوع ٢١:

$$x^3 + c_0 - c = 1095x^2$$

فيكون $X = 24$ أحد جذري هذه المعادلة ونستنتج:

$$x_1 = x_0 - X = 321.$$

تعليق

نكتب المعادلة

$$x^3 + ax^2 + c = bx$$

على الشكل

$$c = x(b - x^2) - ax^2 \quad (١)$$

حيث $0 < x < b$.

لنضع

$$f(x) = x(b - x^2) - ax^2 \quad (٢)$$

١ - دراسة النهاية العظمى لـ (٢)

لدينا

$$f'(x) = b - 3x^2 - 2ax \quad (٣)$$

ولنأخذ الجذر الموجب، x_0 ، للمعادلة $(f'(x) = 0)$. إن كل x ، مخالف لـ x_0 ، يحقق العلاقة $x \in]0, b[$ ،

$$f(x) < f(x_0).$$

الحالة الأولى: $x > x_0$ يكفي أن نبرهن العلاقة:

$$x_1 > x_0 \implies f(x_1) < f(x_0).$$

لدينا:

$$(b - x_0^2)x_0 = (b - x_1^2)x_0 + (x_1^2 - x_0^2)x_0,$$

$$(b - x_1^2)x_1 = (b - x_1^2)x_0 + (b - x_1^2)(x_1 - x_0)$$

ومن جهة أخرى

$$ax_0^2 < ax_1^2;$$

فمن الممكن أن نكتب

$$ax_1^2 = ax_0^2 + a(x_1^2 - x_0^2).$$

فلنبرهن أن

$$(x_1^2 - x_0^2)(x_0 + a) > (b - x_1^2)(x_1 - x_0).$$

لدينا، استناداً إلى (٣):

$$3x_0^2 + 2ax_0 = b,$$

ومنها

$$2(x_0 + a)x_0 = b - x_0^2,$$

لكن

$$b - x_1^2 < b - x_0^2,$$

ومنها

$$(b - x_1^2) < 2(x_0 + a)x_0 < (x_0 + a)(x_1 + x_0)$$

فنحصل على

$$(b - x_1^2)(x_1 - x_0) < (x_1^2 - x_0^2)(x_0 + a),$$

ومنها

$$(b - x_1^2)x_0 + (b - x_1^2)(x_1 - x_0) - ax_1^2 < (b - x_1^2)x_0 \\ + (x_1^2 - x_0^2)(x_0 + a) - ax_0^2 - a(x_1^2 - x_0^2),$$

فيكون

$$f(x_1) < f(x_0).$$

الحالة الثانية: $x < x_0$ يكفي أن نبرهن العلاقة:

$$x_2 < x_0 \implies f(x_2) < f(x_0).$$

لدينا

$$(b - x_0^2)x_0 = (b - x_0^2)x_2 + (b - x_0^2)(x_0 - x_2),$$

$$(b - x_2^2)x_2 = (b - x_0^2)x_2 + (x_0^2 - x_2^2)x_2,$$

$$ax_2^2 = ax_0^2 - a(x_0^2 - x_2^2).$$

فلنبرهن أن

$$(x_0^2 - x_2^2)(a + x_2) < (b - x_0^2)(x_0 - x_2).$$

لدينا

$$b - x_0^2 = 2x_0(x_0 + a)$$

ومنها

$$b - x_0^2 > (x_0 + x_2)(a + x_2)$$

فيكون

$$\frac{(a+x_2)}{x_0-x_2} < \frac{b-x_0^2}{x_0^2-x_2^2};$$

وبالتالي

$$(a+x_2)(x_0^2-x_2^2) < (x_0-x_2)(b-x_0^2)$$

ومنها

$$f(x_2) < f(x_0).$$

نتيجة لدراسة الحالتين الأولى والثانية يتبين أن $f(x_0)$ هي النهاية العظمى لـ $f(x)$.
لذلك يكون لدينا:

- إذا كان $c > f(x_0)$ تكون المسألة مستحيلة.

- إذا كان $c = f(x_0)$ يكون x_0 حلاً (وحيداً) لها.

- إذا كان $c < f(x_0)$ يكون للمسألة حلان x_1 و x_2 بحيث $x_1 < x_0 < x_2$.

٢ - تحديد x_2

ليكن X الحل الموجب للمعادلة من النوع ١٥:

$$x^3 + (3x_0 + a)x^2 = f(x_0) - c = c_0 - c \quad (٤)$$

حيث $X < b^{\frac{1}{3}} - x_0$.^(٥)

(٥) تظهر دراسة المعادلة ١٥ أن للمعادلة

$$\varphi(x) = x^3 + (3x_0 + a)x^2 = k$$

جذراً موجباً وحيداً، x . ولكي نبرهن أن $x < b^{\frac{1}{3}} - x_0$ ، يكفي أن نبرهن أن:

$$\varphi(b^{\frac{1}{3}} - x_0) > k$$

ذلك لأن φ تزايدية على الفسحة $[0, +\infty[$.

$$\begin{aligned} \varphi(b^{\frac{1}{3}} - x_0) &= (b^{\frac{1}{3}} - x_0)^2(b^{\frac{1}{3}} + 2x_0 + a) \\ &= b^{\frac{1}{3}} - 3b^{\frac{1}{3}}x_0^2 + 2x_0^3 + ax_0^2 - 2ab^{\frac{1}{3}}x_0. \end{aligned}$$

ولكن، استناداً إلى (٣) لدينا $2ax_0 = b - 3x_0^2$ ، لذلك

$$2ab^{\frac{1}{3}}x_0 = b^{\frac{1}{3}} - 3b^{\frac{1}{3}}x_0^2.$$

فيكون

$$\varphi(b^{\frac{1}{3}} - x_0) = 2x_0^3 + ax_0^2.$$

=

ولنضع $x_2 = x_0 + X$. إن جذر للمعادلة ٢٣. فلدينا

$$(x_2^2 - x_0^2)(a + x_0) = 2x_0 \cdot X(a + x_0) + X^2(a + x_0)$$

فيكون، استناداً إلى (٣):

$$(x_2^2 - x_0^2)(a + x_0) = X^2 \cdot (a + x_0) + (b - x_2^2)X + (x_2^2 - x_0^2)X \quad (٥)$$

ومن جهة أخرى

$$(x_2^2 - x_0^2) \cdot X = 2x_0X^2 + X^3,$$

فيكون

$$(x_2^2 - x_0^2)(a + x_0) = (3x_0 + a + X)X^2 + (b - x_2^2)X,$$

فإذا أضفنا

$$(b - x_2^2)x_0 - ax_2^2$$

إلى كل من الطرفين، نحصل على:

$$f(x_0) = (b - x_2^2)x_2 - ax_2^2 + (X + 3x_0 + a)X^2 \quad (٦)$$

لكن، استناداً إلى (٤)

$$c + (X + 3x_0 + a)X^2 = f(x_0),$$

فيكون

$$c = f(x_2)$$

ويكون $x_2 = x_0 + X$ جذراً للمعادلة ٢٣.

نذكر هنا أن النتيجة (٦) التي حصل عليها الطوسي ليست إلا نتيجة للتوسيع

$$f(x_2) = f(x_0 + X) = f(x_0) + Xf'(x_0) - X^2(X + 3x_0 + a)$$

= ومن جهة أخرى، لدينا:

$$k = bx_0 - ax_0^2 - x_0^3 - c$$

$$\varphi(bx - x_0) > k \iff 2x_0^3 + ax_0^2 > bx_0 - ax_0^2 - x_0^3 - c$$

$$\iff c > x_0(b - 2x_0 - 3x_0^2).$$

لكن، استناداً إلى (٣)، لدينا

$$b = 2ax_0 + 3x_0^2$$

فهذا الشرط إذن محقق ويكون لدينا

$$x < bx - x_0$$

حيث $f'(x_0) = 0$ وهذا ما استخدمه في (٥).

٣ - تحديد x_1

ليكن X الجذر الأصغر للمعادلة من النوع ٢١:

$$x^3 + f(x_0) - c = (3x_0 + a)x^2 \quad (٧)$$

لدينا $X < x_0$ ^(٦). وإذا وضعنا $x_1 = x_0 - X$ ، يكون x_1 هو الجذر الأصغر المطلوب.

فاستناداً إلى (٣)، لدينا

$$b - x_0^2 = 2x_0(x_0 + a),$$

ومنها

$$\begin{aligned} (b - x_0^2)X &= x_0X^2 + x_1X^2 + (x_0^2 - x_1^2)(x_1 + a) + X^2(x_0 + a) \\ &= X^2(x_1 + a + 2x_0) + (x_0^2 - x_1^2)(x_1 + a). \end{aligned}$$

(٦) للمعادلة (٧)

$$x^3 + k = ax_2$$

جذران موجبان في الواقع a_1 و a_2 وذلك استناداً إلى دراسة المعادلة ٢١. فلدينا

$$k = bx_0 - ax_0^2 - x_0^3 - c$$

وأخذاً بعين الاعتبار (٣)، يكون لدينا

$$k = ax_0^2 + 2x_0^3 - c$$

ومن جهة أخرى لدينا

$$\frac{4}{27}(3x_0 + a)^3 = 4x_0^3 + 4ax_0^2 + \frac{4a^2x_0}{3} + \frac{4a^3}{27}$$

فيتحقق الشرط:

$$k < \frac{4}{27}(3x_0 + a)^3$$

نضع الآن

$$\varphi(x) = x^2(3x_0 + a) - x^3$$

الدالة φ تصاعدية ضمن الفترة $\left[0, 2x_0 + \frac{2a}{3}\right]$ ، ولدينا

$$0 < a_1 < 2x_0 + \frac{2a}{3} < a_2$$

ولكن نبرهن أن $a_1 < x_0$ يكفي أن نبرهن أن

$$k < \varphi(x_0)$$

وهذا الشرط محقق لأن

$$\varphi(x_0) = x_0^2(3x_0 + a) - x_0^3 = 2x_0^3 + ax_0^2$$

وبإضافة

$$(b - x_0^2)x_1 - (x_0^2 - x_1^2)a - ax_1^2 ,$$

إلى كلا الطرفين، نحصل على:

$$f(x_0) = f(x_1) + X^2(a + 3x_0 - X) \quad (٨)$$

واستناداً إلى (٧) نحصل على:

$$c = f(x_1)$$

ويكون $x_1 = x_0 - X$ جذراً للمعادلة (٢٣).

ونستطيع أن نقدم بخصوص العلاقة (٨) ملاحظة شبيهة بالتي قدمناها بخصوص العلاقة (٦).

٤ - العلاقة بين المعادلة ٢٣ والمعادلة ١٥

إذا كان x_2 الجذر الأكبر للمعادلة ٢٣، يكون $X = x_2 - x_0$ جذراً للمعادلة من النوع ١٥ التالية:

$$x^3 + (3x_0 + a)x^2 = c_0 - c \quad (٤)$$

فبرهن كما في السابق أن:

$$f(x_0) - f(x_2) = (x_2^2 - x_0^2)(x_0 + a) - (b - x_2^2)(x_2 - x_0);$$

ونضع $x_2 - x_0 = X$ ، فنحصل على:

$$f(x_0) - f(x_2) = X(X + 2x_0)(x_0 + a) - [b - (x_0 + X)^2]X.$$

لكن، استناداً إلى (٣)، لدينا

$$b = 3x_0^2 + 2ax_0,$$

فيكون، بعد التبسيط

$$c_0 - c = X(aX + 3x_0X + X^2) ,$$

ومنها

$$c_0 - c = X^3 + (3x_0 + a)X^2,$$

فيكون $X = x_2 - x_0$ جذراً للمعادلة (٤).

٥ - العلاقة بين المعادلة ٢٣ والمعادلة ٢١

إذا كان x_1 الجذر الأصغر للمعادلة ٢٣، يكون $X = x_0 - x_1$ جذراً للمعادلة من النوع ٢١ التالية:

$$x^3 + c_0 - c = (3x_0 + a)X^2 \quad (٧)$$

فلدينا

$$f(x_0) - f(x_1) = (b - x_0^2)(x_0 - x_1) - (x_0^2 - x_1^2)(a + x_1),$$

وإذا وضعنا $X = x_0 - x_1$ ، نحصل على:

$$f(x_0) - f(x_1) = (b - x_0^2)X - X(2x_0 - X)(a + x_0 - X);$$

لكن، استناداً إلى (٣)، لدينا

$$b - x_0^2 = 2x_0^2 + 2ax_0,$$

فيكون

$$f(x_0) - f(x_1) = X(aX + 3x_0X - X^2),$$

ومنها

$$X^3 + (c_0 - c) = (3x_0 + a)X^2,$$

فيكون $X = x_0 - x_1$ جذراً للمعادلة (٧).

$$x^3 + bx + c = ax^2 \quad \text{المعادلة ٢٤:}$$

ليكن $AB = a$ و $BC = b^{\frac{1}{2}}$.

تمهيد ١: إذا كان $BC \geq \frac{AB}{2}$ فالمسألة مستحيلة.

فمن المعادلة نحصل على $a > x$. وليكن $BD = x$. بما أن:

$$AB = BD + AD$$

يكون

$$BD^3 + AD \cdot BD^2 = AB \cdot BD^2;$$

لكن

$$AB \cdot BD^2 = BD^3 + BD \cdot BC^2 + c,$$

ومنها


$$AD \cdot BD^2 = BD \cdot BC^2 + c.$$

فلنبرهن أنه إذا كان $BC \geq \frac{AB}{2}$ يكون لدينا العلاقة:

$$AD \cdot BD^2 \leq BC^2 \cdot BD, \quad (1)$$

التي تدل على استحالة المسألة.

ليكن \mathcal{C} نصف الدائرة ذات القطر AB والمركز G ؛ وليكن EG عموداً على AB ، فيكون $EG = \frac{AB}{2}$. فإذا كان x جذراً للمعادلة، يكون لدينا حالات ثلاث (الشكل رقم (٣ - ٢٧)).



الشكل رقم (٣ - ٢٧)

الحالة الأولى: $x = BG = \frac{AB}{2}$.

لدينا

$$\left(\frac{AB}{2}\right)^3 = AG \cdot BG^2 = BG \cdot BC^2 + c;$$

لكن

$$BC^2 \cdot BG \geq BG^2 \cdot EG,$$

فيكون

$$BC^2 \cdot BG \geq AG \cdot BG^2$$

وتكون العلاقة (١) محققة.

الحالة الثانية: $x \leq \frac{AB}{2}$.

نأخذ $x = BH$ ونأخذ $HI \perp AB$ ، فيكون

$$(H \text{ قدرة النقطة } H) \quad BH \cdot AH = HI^2$$

فيكون

$$\frac{BH^2}{HI^2} = \frac{BH}{AH} \quad \text{و} \quad \frac{BH}{HI} = \frac{HI}{AH}$$

ومنها

$$BH^2 \cdot AH = HI^2 \cdot BH;$$

لكن

$$BC^2 \geq BG^2 \quad \text{و} \quad HI^2 < BG^2$$

فيكون

$$BC^2 \cdot BH \geq HI^2 \cdot BH = AH \cdot BH^2.$$

وتكون العلاقة (١) محققة.

الحالة الثالثة: $x > \frac{AB}{2}$.

نضع $x = BJ$ ونأخذ $JK \perp AB$ ، فيكون

$$\frac{BJ^2}{JK^2} = \frac{BJ}{AJ},$$

ومنها

$$BJ^2 \cdot AJ = JK^2 \cdot BJ;$$

لكن

$$BC^2 \geq BG^2, \quad \text{و} \quad JK^2 < BG^2$$

فيكون

$$BC^2 \cdot BJ \geq JK^2 \cdot BJ = AJ \cdot BJ^2,$$

وتكون بالتالي العلاقة (١) محققة.

نتيجة لما ورد في الحالات الثلاث السابق ذكرها تبين صحة التمهيد المذكور

فيكون:


$$BC < \frac{AB}{2}$$

شروطاً ضرورياً لإمكانية حل المعادلة .

إلا أن هذا الشرط الضروري ليس كافياً .

فليكن $BD = \frac{2}{3}AB$ ولتكن E نقطة من BD بحيث يكون

(الشكل رقم (٣ - ٢٨)) $BE \cdot ED = \frac{1}{3}BC^2$



الشكل رقم (٣ - ٢٨)

فيكون BE جذراً للمعادلة

$$x^2 + \frac{1}{3}b = \frac{2}{3}ax \quad (٢)$$

ولیکن G منتصف AB ، فيكون

$$DG = \frac{1}{3}BG = \frac{1}{6}AB,$$

ويكون

$$DG \cdot BG = \frac{1}{3}BG^2 > \frac{1}{3}BC^2,$$

ولذلك

$$BE \cdot ED < DG \cdot BG \quad (٣)$$

ولیکن H منتصف BD ، لدينا، استناداً إلى قضية معروفة

$$BG \cdot GD + GH^2 = BE \cdot ED + EH^2 = \frac{BD^2}{4};$$

واستناداً إلى (٣)

$$GH < EH$$

فيكون

$$DE < DG \quad \text{و} \quad BE > BG$$

ومنها $BE > \frac{AB}{2}$

دراسة النهاية العظمى


ليكن:

$$c_0 = BE^2 \cdot AE - BC^2 \cdot BE$$

فإذا كان $c_0 < c$ تكون المسألة مستحيلة. ولتبيان ذلك، سنبرهن أن كل x مخالف لـ BE يحقق العلاقة التالية:

$$(a - x) \cdot x^2 - bx < c_0.$$

الحالة الأولى: $x = BI > BE$ (الشكل رقم (٣ - ٢٩)):



الشكل رقم (٣ - ٢٩)

لدينا

$$BI^2 \cdot AI - BC^2 \cdot BI < c_0$$

ليكن $EK \perp AB$ و $EK = BC$ ولنصل BK . فيكون لدينا:

$$BE^2 \cdot AE = BE^2 \cdot AI + BE^2 \cdot IE,$$

$$BI^2 \cdot AI = BE^2 \cdot AI + (MN)AI.$$

ولنأخذ

$$BE^2 \cdot AE - KE^2 \cdot BE$$

و

$$BI^2 \cdot AI - KE^2 \cdot IB = BI^2 \cdot AI - KE^2 \cdot EB - KE^2 \cdot EI,$$

فيكون

$$\begin{aligned}[BE^2 \cdot AE - KE^2 \cdot EB] - [BI^2 \cdot AI - KE^2 \cdot IB] \\ = BE^2 \cdot IE + KE^2 \cdot EI - (MN)AI \\ = BK^2 \cdot IE - (MN)AI.\end{aligned}$$

ولكن، استناداً إلى (٢)، لدينا:

$$3DB \cdot BE = 3BE^2 + BC^2,$$

فيكون

$$2AB \cdot BE = 3BE^2 + BC^2,$$

ومنها

$$2AE \cdot BE = BE^2 + BC^2,$$

$$2AE \cdot BE = BK^2 \quad (٤)$$

لكن

$$2BE \cdot AE = 2BE \cdot AI + 2BE \cdot EI,$$

و

$$(IB + BE) \cdot AI = 2BE \cdot AI + IE \cdot AI,$$

لكن، بما أن $BE > \frac{AB}{2}$ ، يكون $BE > AE$ وبالتالي $2BE > AI$ وبالتالي يكون:

$$2BE \cdot IE > AI \cdot EI$$

و

$$BK^2 = 2BE \cdot AE = 2BE \cdot (EI + AI) > AI \cdot (EI + 2BE),$$

أي أن

$$BK^2 > AI \cdot (IB + BE).$$

فينتج

$$\frac{IB + BE}{BK} < \frac{BK}{AI}$$

ومنها


$$\frac{(IB + BE) \cdot IE}{BK^2} < \frac{IE}{AI},$$

فيكون

$$(MN) \cdot AI < BK^2 \cdot IE;$$

ويستج أن $c_0 > c$.

الحالة الثانية: $x = BI < BE$ (الشكل رقم (٣٠ - ٣)):



الشكل رقم (٣٠ - ٣)

لدينا

$$BI^2 \cdot AI - BC^2 \cdot BI < c_0$$

وإذا أخذنا:

$$EK = IU = BC \text{ و } IU \perp AB, EK \perp AB$$

يكون لدينا:

$$BI^2 \cdot AI = BI^2 \cdot IE + BI^2 \cdot AE,$$

و

$$BE^2 \cdot AE = BI^2 \cdot AE + (LM) \cdot AE.$$

ولنأخذ

$$BI^2 \cdot IE - KE^2 \cdot IB$$

و

$$(LM)AE - KE^2 \cdot BE = (LM)AE - [KE^2 \cdot IB + KE^2 \cdot IE];$$

فيكون

$$\begin{aligned} & [(LM) \cdot AE - KE^2 \cdot BE] - [BI^2 \cdot IE - KE^2 \cdot BI] \\ & = (LM) \cdot AE - [KE^2 \cdot IE + BI^2 \cdot IE]. \end{aligned}$$

فإذا كان

$$(LM) . AE > KE^2 . IE + BI^2 . IE$$

تكون المتباينة $c_0 > c$ محققة. ولكن

$$(KE^2 + BI^2) . IE = BU^2 . IE$$

واستناداً إلى (٤)، لدينا:

$$KB^2 = 2BE . AE = KE^2 + BE^2 ,$$

$$UB^2 = UI^2 + IB^2;$$

$$UI^2 = KE^2;$$

فيكون

$$KB^2 - UB^2 = BE^2 - BI^2 = (EB + BI)EI.$$

ولدينا

$$2EB . AE - (EB + BI)AE = IE . AE,$$

لكن

$$AE < EB + BI,$$

فيكون

$$AE . EI < (EB + BI) . EI,$$

ويكون بالتالي

$$BK^2 - (BE + BI) . AE < BK^2 - UB^2,$$

وبالتالي

$$(BE + BI)AE > UB^2,$$

ومن هنا

$$\frac{BE + BI}{UB} > \frac{UB}{AE} ,$$

و

$$\frac{EI(BE + BI)}{UB^2} > \frac{EI}{AE} ,$$

أي أن لدينا

$$(LM) . AE > UB^2 . EI;$$

وتتحقق المتباينة $c_0 > c$.

نتيجة لما ورد في الحالتين السابق ذكرهما يكون c_0 النهاية العظمى.

$$x_0 = BE \text{ تحديد}$$

يبرهن الطوسي أنه، عندما يحقق E العلاقة (٤)، يكون BE جذراً للمعادلة (٢).
فالعلاقة (٤) تكتب كما يلي:

$$2BE \cdot AE = BK^2 = BE^2 + EK^2,$$

أي

$$2ax_0 - 2x_0^2 = b + x_0^2$$

ومنها

$$\frac{2}{3}ax_0 = \frac{b}{3} + x_0^2 ;$$

فيكون x_0 جذراً للمعادلة (٢).

ومعرفة x_0 تسمح باحتساب c_0 ؛ وهنا لدينا حالات ثلاث:

- إذا كان $c > c_0$ ، تكون المسألة مستحيلة.

- إذا كان $c = c_0$ ، يكون $x_0 = BE$ حلّاً للمسألة.

- إذا كان $c < c_0$ ، يكون للمسألة حلان x_1 و x_2 بحيث

$$x_1 < x_0 < x_2$$

تحديد الجذر الأكبر x_2 ؛ $x_2 > BE$ (الشكل رقم (٣ - ٣١)):

نأخذ E على AB بحيث يكون:

$$MO = AE \quad \text{و} \quad BM = BE \quad , \quad BE = x_0$$


فيما أن $BE > \frac{AB}{2}$ فإن $BE > AE$ وبالتالي $BM > AE$.

ولنأخذ المعادلة من النوع ١٥.

$$x^3 + EO \cdot x^2 = c_0 - c \quad (٥)$$

وليكن $X = GE$ جذرها. فيكون لدينا:

$$GE^2 \cdot GO = c_0 - c.$$



الشكل رقم (٣ - ٣١)

ويكون الحل المطلوب هو:

$$BE + EG = BG = x_2.$$

فلدينا، استناداً إلى (٤):

$$BK^2 = 2BE \cdot AE$$

ولدينا

$$2BE \cdot AE \cdot GE = 2BE \cdot GE^2 + 2BE \cdot AG \cdot GE,$$

فيكون

$$BK^2 \cdot GE = EM \cdot GE^2 + ME \cdot GE \cdot AG.$$

ومن جهة أخرى، لدينا

$$BG^2 - BE^2 = 2BE \cdot GE + GE^2$$

وبالتالي

$$(BG^2 - BE^2)AG = ME \cdot GE \cdot AG + GE^2 \cdot AG;$$

فيكون

$$BK^2 \cdot GE - (BG^2 - BE^2)AG = EM \cdot GE^2 - GE^2 \cdot AG$$

$$= EM \cdot GE^2 + EG^2 \cdot GE - (EG^2 \cdot AG + EG^2 \cdot EG)$$

فلنبرهن أن $BI = BE - EI$ هو الجذر المطلوب.

ليكن

$$IU = EK = BC.$$

لدينا، استناداً إلى (٤):

$$BK^2 = 2BE \cdot AE = ME \cdot AE$$

فيكون

$$BK^2 \cdot EI = ME \cdot AE \cdot EI.$$

ومن جهة أخرى، لدينا

$$EB^2 - IB^2 = MI \cdot IE,$$

فيكون

$$(EB^2 - IB^2) \cdot AE + IE^2 \cdot AE = ME \cdot AE \cdot EI$$

ومنها

$$(EB^2 - IB^2) \cdot AE = BK^2 \cdot EI - IE^2 \cdot AE.$$

ومن جهة أخرى

$$BU^2 + EI \cdot IM = BK^2,$$

فيكون

$$BU^2 \cdot EI + EI^2 \cdot IM = BK^2 \cdot EI.$$

لكن

$$(BE^2 - IB^2) \cdot AE + IE^2 \cdot AE = ME \cdot AE \cdot EI = BK^2 \cdot EI,$$

فيكون بالتالي

$$\begin{aligned} BU^2 \cdot EI + EI^2 \cdot IO &= BU^2 \cdot EI + EI^2 \cdot IM - EI^2 \cdot MO \\ &= BK^2 \cdot EI - IE^2 \cdot AE \\ &= (BE^2 - IB^2) \cdot AE, \end{aligned}$$

ومنها

$$\begin{aligned} BU^2 \cdot EI + EI^2 \cdot IO - UI^2 \cdot EI &= (BE^2 - IB^2)AE - UI^2 \cdot EI \\ &= BI^2 \cdot EI + EI^2 \cdot IO. \end{aligned}$$

وإذا أضفنا $AE \cdot BI^2$ إلى كلا الطرفين نحصل على:

$$BI^2 \cdot AI + EI^2 \cdot IO = BI^2(EI + AE) + EI^2 \cdot IO \\ = BE^2 \cdot AE - IU^2 \cdot EI$$

فيكون

$$BI^2 \cdot AI + EI^2 \cdot IO - UI^2 \cdot BI = BE^2 \cdot AE - UI^2 \cdot BE = c_0$$

ويكون بالتالي

$$(BI^2 \cdot AI - IU^2 \cdot BI) + c_0 - c = c_0$$

ومنها


$$BI^2 \cdot (AB - BI) - BC^2 \cdot BI = c$$

و

$$aBI^2 = c + b \cdot BI + BI^3,$$

فيكون BI جذراً للمعادلة ٢٤.

حصر الجذور



الشكل رقم (٣ - ٣٣)

ليكن $AB = a$ ولتكن \mathcal{C} نصف الدائرة ذات القطر AB والمركز P (الشكل رقم (٣ - ٣٣)) وليكن $BE = x_0$ و $BD = \frac{2}{3}AB$.

برهنا أن

$$\frac{AB}{2} < BE < \frac{2}{3}AB,$$

لذلك يكون

$$BP < BE < BD$$

وتكون النقطة E بين P و D .

وبرهنا أيضاً أن $BC < \frac{AB}{2}$. فليكن $SQ \perp AB$ و $KM \perp AB$ ، بحيث يكون:

$$SQ = KM = BC ;$$

فيكون لدينا (قدرة K):

$$KM^2 = KB \cdot KA$$

ومنها

$$KM^2 \cdot BK = BK^2 \cdot KA = BK^2(AB - BK) \\ = AB \cdot BK^2 - BK^3.$$

وإذا كان BK جذراً للمعادلة ٢٤ يكون لدينا

$$b \cdot BK + c = BK^2 \cdot AK = KM^2 \cdot BK = BC^2 \cdot BK = b \cdot BK,$$

وهذا خُلف؛ ف BK ليس جذراً.

ليكن $BL < BK$ و $LN \perp AB$. إن BL ليس جذراً للمعادلة ٢٤. فإذا فرضنا أن BL جذر لهذه المعادلة يكون لدينا

$$c + b \cdot BL = a \cdot BL^2 - BL^3 = BL^2 \cdot AL = LN^2 \cdot BL;$$

لكن $LN < KM$ ، لذلك يكون

$$LN^2 \cdot BL < BC^2 \cdot BL = b \cdot BL,$$

ويكون بالتالي

$$c + b \cdot BL < b \cdot BL,$$

وهذا خُلف.

وهكذا لا يكون للمعادلة ٢٤ جذر أصغر من BK . لنبرهن الآن أن ليس لها جذر أكبر من AK أو مساوٍ لـ AK .

لدينا $QS = MK$ ، لذلك $AS = KB$ و $BS = AK$. لكن

$$\frac{BS^2}{QS^2} = \frac{BS}{AS}$$

أو

$$BS^2 \cdot AS = QS^2 \cdot BS = BC^2 \cdot BS.$$

فإذا كان $AK = BS$ جذراً يكون:

$$BC^2 \cdot BS = BS^2 \cdot AS + c$$

ومنها

$$BS^2 \cdot AS = BS^2 \cdot AS + c,$$

وهو خُلف. فلا يمكن أن يكون $AK = BS$ جذراً للمعادلة ٢٤.

ولنبرهن أن $AK > BJ = x$ ليس جذراً للمعادلة ٢٤. فإذا أخذنا $JU \perp AB$ يكون:

$$BJ^2 \cdot AJ = JU^2 \cdot BJ,$$

ومنها

$$c + b \cdot BJ = BJ^2 \cdot AJ = JU^2 \cdot BJ,$$

لكن

$$SQ^2 > JU^2,$$

فيكون

$$JU^2 \cdot BJ < SQ^2 \cdot BJ = b \cdot BJ,$$

وهذا خُلف.


هكذا ينتج أن أي جذر x للمعادلة ٢٤ يحقق

$$BK < x < AK = BS \quad (٧)$$

فكل قطعة مستقيم تمثل جذراً تنطلق من B يجب أن توجد نهايتها على القطعة KS . وبالنسبة إلى الجذرين $x_1 = BI$ و $x_2 = BG$ ، لدينا:

$$BK < BI < BE < BG < BS = AK.$$

وبطريقة عكسية، إذا ما أعطينا x_1 أو x_2 ، يمكننا تحديد العدد c ؛ وهذا يعني أنه يمكننا تحديد معادلة من النوع ٢٤ (الشكل رقم (٣ - ٣٤)).



الشكل رقم (٣ - ٣٤)

أ - إذا ما أعطينا $x_2 = BG$ ؛ بحيث $BE < BG < BS$ ؛

رأينا أن $GO = GE^2 - c_0$ ، فمن الضروري أن يكون

$$c_0 > GE^2 \cdot GO$$

ومن جهة أخرى

$$BG^2 \cdot AG + GE^2 \cdot GO - BC^2 \cdot BG = c_0,$$

فيكون

$$BG^2 \cdot AG > BC^2 \cdot BG = SQ^2 \cdot BG;$$

ويكون بالتالي

$$SQ^2 \cdot BG < BG^2 \cdot AG.$$

فإذا كان $BG \geq BS$ يكون لدينا، بناءً على خصائص الدائرة:

$$BG \cdot AG \leq SQ^2,$$

وبالتالي

$$BG^2 \cdot AG \leq SQ^2 \cdot BG,$$

وهذا خُلف. لذلك فإن $BG < BS$ ونستطيع بالتالي احتساب c .

ب - إذا ما أعطينا $x_1 = BI$ ؛ بحيث $BK < BI < BE$ لدينا:

$$c_0 - c = IE^2 \cdot IO$$

فمن الضروري أن يكون

$$c_0 > IE^2 \cdot IO.$$

لكن

$$BI^2 \cdot AI + EI^2 \cdot IO - MK^2 \cdot BI = c_0$$

لذلك

$$BI^2 \cdot AI > MK^2 \cdot BI.$$

فإذا كان $BI \leq BK$ يكون لدينا (كما في السابق)

$$BI^2 \cdot AI \leq MK^2 \cdot BI,$$

وهذا خُلف، فيكون $BK < BI$ ونستطيع بالتالي احتساب c . ولمعرفة الجذرين x_1 و x_2 نحسب التفاوتين $(x_2 - x_0)$ و $(x_0 - x_1)$.

العلاقة بين المعادلة ٢٤ والمعادلة ١٥ (الشكل رقم (٣ - ٣٥):

نأخذ $EK = BC$ و $EK \perp AB$ ، فيكون

$$c_0 = BE^2 \cdot AE - EK^2 \cdot EB$$


ومن جهة أخرى، إذا كان $BG = x_2$ يكون لدينا

$$c = BG^2 \cdot AG - EK^2 \cdot BG.$$

ومنها

$$c_0 = BE^2 \cdot AG + BE^2 \cdot GE - EK^2 \cdot BE$$

العلاقة بين المعادلة ٢٤ والمعادلة ٢١ (الشكل رقم (٣ - ٣٦):



الشكل رقم (٣ - ٣٦)

ليكن $x_1 = BI$ الجذر الأصغر . لدينا

$$c = BI^2 \cdot AI - KE^2 \cdot BI .$$

وكما في السابق، لدينا

$$c_0 - c = (EB + BI)EI \cdot AE - BU^2 \cdot EI$$

فيكون

$$BU^2 \cdot EI + c_0 - c = (EB + BI)EI \cdot AE.$$

وإذا وضعنا $EI = X$ ، نحصل على:

$$(EB + BI)EI \cdot AE = 2AE \cdot BE \cdot X - AE \cdot X^2,$$

ويكون

$$\begin{aligned} BU^2 &= BI^2 + IU^2 = (BE - EI)^2 + IU^2, \\ &= BE^2 + EI^2 - 2BE \cdot EI + BK^2 - BE^2 = BK^2 + X^2 - 2BE \cdot X, \end{aligned}$$

وبالتالي

$$BU^2 \cdot EI = BK^2 \cdot X + X^3 - 2BE \cdot X^2,$$

فيكون

$$c_0 - c + BK^2 \cdot X + X^3 - 2BE \cdot X^2 = 2AE \cdot BE \cdot X - AE \cdot X^2;$$

لكن $2AE \cdot BE = BK^2$ ، فيكون لدينا

$$X^3 + c_0 - c = (2BE - AE)X^2,$$

أي، المعادلة من النوع ٢١:

$$X^3 + c_0 - c = (3x_0 - a)X^2$$

نحصل إذن على $X = EI$ ونستج $x_1 = BI = x_0 - X$.

خلاصة

أ - إذا كان $\sqrt{b} \geq \frac{a}{2}$ تكون المسألة مستحيلة (راجع التعليق)؛ مثال على ذلك،
المسألة $x^3 + 16x + 20 = 8x^2$.

ب - إذا كان $\sqrt{b} < \frac{a}{2}$ ، نحل المعادلة

$$x^2 + \frac{b}{3} = \frac{2a}{3}x,$$

فنحصل على x_0 ونحسب c_0 . ونكون أمام حالات ثلاث:

- إذا كان $c > c_0$ تكون المسألة مستحيلة؛

- إذا كان $c = c_0$ يكون للمسألة حل هو x_0 ؛

- إذا كان $c < c_0$ يكون للمسألة حلان x_1 و x_2 بحيث:

$$x_1 < x_0 < x_2.$$

نضع $c_0 - c = k$. إذا كان X جذراً للمعادلة

$$X^3 + (3x_0 - a)X^2 = k,$$

يكون $x_2 = x_0 + X$ الجذر الأكبر للمعادلة ٢٤. وإذا كان X جذراً للمعادلة

$$X^3 + k = (3x_0 - a)X^2$$

يكون $x_1 = x_0 - X$ الجذر الأصغر للمعادلة ٢٤.

تعليق

$$x^3 + bx + c = ax^2$$

من هذه المعادلة يتج $x < a$ و $x < (a - x)$. $b < (a - x)$.

- إذا كان $\sqrt{b} \geq \frac{a}{2}$ تكون المسألة مستحيلة.

- فإذا كان $x = \frac{a}{2}$ يكون $x = \frac{a}{2} \leq b < (a - x)$ وهذا خلف؛

- وإذا كان $x \neq \frac{a}{2}$ ، يكون $x < \frac{a^2}{4}$ وذلك لأن $(a-x) \cdot x$ له نهاية عظمى $\frac{a^2}{4}$ ، يصلها عندما يكون $x = \frac{a}{2}$ ؛ فيكون إذن $(a-x) \cdot x < b$ ، وهذا خُلف.

لذلك فإن $\sqrt{b} < \frac{a}{2}$ هو شرط ضروري لإمكانية حل المسألة. إلا أن هذا الشرط ليس كافياً^(٧).

(٧) ن سجل أن الشرط $b < \frac{a^2}{4}$ الذي يتيه الطوسي بالخُلف يأتي من دراسة إشارة الدالة

$$f(x) = ax^2 - x^3 - bx = x[x(a-x) - b]$$

في الفسحة $0 < x < a$ ، حيث تكون إشارة $f(x)$ هي نفسها إشارة

$$x(a-x) + b$$

إن النهاية العظمى للدالة $x(a-x)$ هي $\frac{a^2}{4}$ ، تصلها عندما يكون $x = \frac{a}{2}$ ، ومن هنا الشرط $b < \frac{a^2}{4}$ الضروري لكون $f(x) > 0$.


وإذا وضعنا

$$\varphi(x) = x(a-x) - b$$

وإذا كان $b < \frac{a^2}{4}$ ، يكون للمعادلة $\varphi(x) = 0$ جذران λ_1 و λ_2 ، يدرسهما الطوسي في ما بعد عند تعرضه لحصر الجذر، ويكون لدينا $\varphi(x) > 0$ وذلك في ما يتعلق بكل $x \in]\lambda_1, \lambda_2[$ ؛ فيكون بالتالي $f(x) > 0$ على الفسحة نفسها.

نلاحظ أيضاً أن الشرط $b < \frac{a^2}{4}$ يمكن إيجاده إذا ما درسنا مسألة وجود إشارة النهاية العظمى للدالة $f(x)$. فهذه الدراسة تظهر أنه، إذا كان $b < \frac{a^2}{3}$ يكون لـ $f(x)$ نهاية عظمى عند $x = x_0$ وحيث $x_0 > 0$ كما تدل أن لدينا

$$c_0 = f(x_0) > 0 \Rightarrow b < \frac{a^2}{4}$$



١ - دراسة النهاية العظمى

ليكن x_0 الحل الموجب للمعادلة

$$3x^2 - 2ax + b = 0 \quad (١)$$

بما أن $\frac{a^2}{4} < b$ ، فلهذه المعادلة جذران a_1 و a_2 يحققان

$$a_1 < \frac{a}{3} < a_2 < \frac{2a}{3}.$$

وإذا وضعنا $x_0 = a_2$ ، يكون لدينا، استناداً إلى الشكل القانوني للمعادلة (١):

$$\left(x_0 - \frac{a}{3}\right)^2 = \frac{a^2 - 3b}{9}$$

ومنها

$$\left(x_0 - \frac{a}{3}\right)^2 > \frac{a^2}{36}$$

وبالتالي

$$x_0 > \frac{a}{2}.$$

ومن الواضح أن الطوسي أخذ $x_0 = a_2$ دون أن يُصرِّح بذلك.

ليكن

$$f(x_0) = x_0^2(a - x_0) - bx_0$$

مهما يكن x حيث $x \neq x_0$ ، $x > 0$ ، يكون لدينا $f(x) < f(x_0)$.

الحالة الأولى: $x > x_0$ ؛

$$x > x_0 \implies f(x) < f(x_0).$$

لدينا $x > x_0$ ، فيكون

$$x_0^2(a - x_0) = x_0^2(a - x) + x_0^2(x - x_0),$$

$$x^2(a - x) = x_0^2(a - x) + (x^2 - x_0^2)(a - x),$$

ولدينا

$$bx = bx_0 + b(x - x_0)$$

فيكون

$$f(x) < f(x_0) \iff (x^2 - x_0^2)(a - x) < (x_0^2 + b)(x - x_0),$$

وهذا يعني

$$(x + x_0) (a - x) < x_0^2 + b,$$

أي، استناداً إلى (١):

$$(x + x_0) (a - x) < 2x_0(a - x_0)$$

لكن

$$2x_0(a - x_0) = 2x_0(a - x) + 2x_0(x - x_0),$$

و

$$(x + x_0) (a - x) = 2x_0(a - x) + (x - x_0) (a - x);$$

لكن، بما أن $x_0 > \frac{a}{2}$ لدينا:

$$x_0 > a - x_0 \quad \text{و} \quad a - x < 2x_0$$

فيتتج

$$2x_0(x - x_0) > (a - x) (x - x_0),$$

ومنها النتيجة المطلوبة.

الحالة الثانية: $x < x_0$

$$x < x_0 \implies f(x) < f(x_0).$$

فإذا ما تصرفنا كما فعلنا في الحالة السابقة، يبقى أن نبرهن:

$$x^2 + b < (x_0 + x) (a - x_0) \quad (٢)$$

لكن

$$\begin{aligned} x_0^2 + b - (x^2 + b) &= (x_0 + x) (x_0 - x), \\ x_0^2 + b - (x_0 + x) (a - x_0) &= 2x_0(a - x_0) - (x_0 + x) (a - x_0) \\ &= (x_0 - x) (a - x_0), \end{aligned}$$

وبما أن

$$a - x_0 < x_0 + x$$

فتتج العلاقة (٢) ومنها النتيجة المطلوبة.

لذلك، نتيجة لما ورد في الحالتين السابقتين، تكون $f(x_0)$ النهاية العظمى للدالة $f(x)$ ويتتج ما يلي:

- إذا كان $c > f(x_0)$ تكون المسألة مستحيلة.

- إذا كان $c = f(x_0)$ يكون x_0 حلاً للمسألة.

- إذا كان $c < f(x_0)$ يكون للمسألة حلان x_1 و x_2 بحيث :

$$x_1 < x_0 < x_2 .$$

٢ - تحديد الجذر x_2

ليكن X حل المعادلة من النوع ١٥ :

$$x^3 + (3x_0 - a)x^2 = f(x_0) - c = c_0 - c \quad (٣)$$

عند ذلك يكون $x_2 = x_0 + X$ حلاً للمعادلة ٢٤ . فلدينا ، استناداً إلى (١) :

$$x_0^2 + b = 2x_0(a - x_0),$$

ومنها

$$(x_0^2 + b)X = 2x_0X^2 + 2x_0X(a - x_2) = I,$$

ومن جهة أخرى لدينا :

$$x_2^2 - x_0^2 = 2x_0X + X^2,$$

ومنها

$$(x_2^2 - x_0^2)(a - x_2) = 2x_0X(a - x_2) + X^2(a - x_2) = II,$$

وبالتالي يكون

$$I = II + 2x_0X^2 - X^2(a - x_2) = II + X^2[2x_0 + X - (a - x_2) + X],$$

أي

$$I = II + X^2[X + 3x_0 - a].$$

فإذا طرحنا bX من كلا الطرفين نحصل على :

$$x_0^2X = (x_2^2 - x_0^2)(a - x_2) + X^2(X + 3x_0 - a) - bX;$$

ومن ثم نضيف $x_0^2(a - x_2) - bx_0$ إلى كلا الطرفين فنحصل على :

$$x_0^2(a - x_0) - bx_0 = x_2^2(a - x_2) + X^2(X + 3x_0 - a) - b(x_0 + X).$$

لكن ، استناداً إلى (٣) لدينا :

$$X^2(X + 3x_0 - a) = c_0 - c ,$$

فيكون

$$c_0 = ax_2^2 - x_2^3 - bx_2 + c_0 - c$$

ويكون

$$c + x_2^3 + bx_2 = ax_2^2,$$

فيكون $x_2 = x_0 + X$ جذراً للمعادلة ٢٤.

٣ - تحديد الجذر x_1

ليكن X حلاً موجباً للمعادلة من النوع ٢١:

$$x^3 + f(x_0) - c = (3x_0 - a)x^2 \quad (٤)$$

فيكون لدينا

$$f(x_0) - c = (3x_0 - a - X)X^2,$$

إن $x_1 = x_0 - X$ هو جذر للمعادلة ٢٤. فلدينا استناداً إلى (١):

$$x_0^2 + b = 2x_0(a - x_0)$$

ولدينا أيضاً

$$x_0^2 - x_1^2 = X(2x_0 - X)$$

ومنها

$$\begin{aligned} (x_0^2 - x_1^2)(a - x_0) &= 2x_0(a - x_0)X - (a - x_0)X^2 \\ &= (x_0^2 + b)X - (a - x_0)X^2. \end{aligned}$$

كما أن لدينا

$$(x_0^2 + b)X - (x_1^2 + b)X = X^2(2x_0 - X),$$

فيكون

$$(a - x_0)(x_0^2 - x_1^2) = bX + Xx_1^2 + X^2(3x_0 - a - X).$$

ويحصل

$$(a - x_0)(x_0^2 - x_1^2) - bX + x_1^2(a - x_0) = Xx_1^2 + X^2(3x_0 - a - X) + x_1^2(a - x_0)$$

ومنها

$$x_0^2(a - x_0) - bx_0 = x_1^2(a - x_1) + X^2(3x_0 - a - X) - bx_1$$

فيكون

$$f(x_0) = x_1^2(a - x_1) - bx_1 + f(x_0) - c$$

وبالتالي

$$c = f(x_1).$$

نلاحظ أن الطوسي يفترض، من دون برهان، أن X موجود وأنه موجب. وهذا صحيح. فمن دراسة المعادلة ٢١، يتبين أن المعادلة (٤):

$$x^3 + c_0 - c = (3x_0 - a)x^2$$

لها جذران a_1 و a_2 ، عندما يكون

$$c_0 - c < \frac{4}{27}(3x_0 - a)^3.$$

ونعلم أن

$$c_0 = x_0^2(a - x_0) - bx_0;$$

وإذا أخذنا في الاعتبار أن

$$x_0^2 = \frac{1}{3}(2ax_0 - b),$$

نحصل على

$$c_0 = \frac{2a^2x_0}{3} - \frac{ab}{3} - \frac{2ax_0^2}{3} - \frac{2bx_0}{3},$$

وأخيراً، يكون لدينا

$$c_0 = \frac{2ax^2x_0}{9} - \frac{2bx_0}{3} - \frac{ab}{9}.$$

ومن جهة أخرى، لدينا

$$\frac{4}{27}(3x_0 - a)^3 = 4\left(x_0^3 - ax_0^2 + \frac{a^2x_0}{3} - \frac{a^3}{27}\right);$$

وبما أن

$$x_0^2 = \frac{1}{3}(2ax_0 - b)$$

يكون

$$\frac{4}{27}(3x_0 - a)^3 = 4\left(\frac{2a}{3}x_0^2 - \frac{a^2x_0}{3} - \frac{bx_0}{3} + \frac{ab}{3} - \frac{a^3}{27}\right);$$

ونحصل أخيراً على:

$$\frac{4}{27}(3x_0 - a)^3 = \frac{4a^2x_0}{9} - \frac{4bx_0}{3} + \frac{4ab}{9} - \frac{4a^3}{27}.$$

ولكي يكون للمعادلة (٤) جذران موجبان يكفي أن يكون

$$\frac{2a^2x_0}{9} - \frac{2bx_0}{3} - \frac{ab}{9} < \frac{4a^2x_0}{9} - \frac{4bx_0}{3} + \frac{4ab}{9} - \frac{4a^3}{27},$$

وهذا ما يمكن كتابته على الشكل

$$0 < \frac{2a^2}{9} \left(x_0 - \frac{a}{3} \right) + \frac{b}{9} (5a - 6x_0).$$

لكننا رأينا أن

$$\frac{a}{2} < x_0 < \frac{2a}{3},$$

فيكون بالتالي

$$5a - 6x_0 > 0 \quad \text{و} \quad x_0 - \frac{a}{3} > 0$$

ويكون الشرط المطلوب محققاً، ومن هنا وجود a_1 و a_2 .

تظهر دراسة المعادلة ٢١ أن لدينا، في هذه الحالة،

$$0 < a_1 < 2 \left(x_0 - \frac{a}{3} \right) < a_2$$

فيكون

$$0 < a_1 < x_0$$

وقد اختار الطوسي $a_1 = X$ دون أن يصرّح بذلك.

٤ - حصر الجذور

ليكن x_0 الجذر الأكبر للمعادلة $f'(x) = 0$. لدينا:

$$\frac{a}{2} < x_0 < \frac{2a}{3},$$

وذلك لأن

$$f'\left(\frac{a}{2}\right) > 0; \quad f'(x_0) = 0, \quad f'\left(\frac{2a}{3}\right) < 0$$

كما أن لدينا $\frac{a}{2} < \sqrt{b}$.

لنأخذ المعادلة

$$ax = x^2 + b \quad (٥)$$

المستخلصة من المعادلة ٢٤ بوضع $c = 0$. لكي يحل الطوسي هذه المعادلة، يقطع الدائرة $y^2 = ax - x^2$ بالمستقيم $y = b$ ^(٨).

عندما يكون a و b ثابتين ويكون c كما اتفق، $0 < c < c_0$ ، يبرهن الطوسي أن الجذور الموجبة

$$x_2 = f_2(c) \quad \text{و} \quad x_1 = f_1(c)$$

لعائلات المعادلات من النوع ٢٤، تحقق العلاقة

$$\lambda_1 = f_1(0) < f_1(c) < x_0 < f_2(c) < f_2(0) = \lambda_2$$

حيث λ_1 و λ_2 هما جذري المعادلة (٥).

أ - كل c ضمن الفسحة $[0, c_0]$ يحقق:

$$\lambda_1 = f_1(0) < f_1(c)$$

فإذا كان $\lambda_1 = f_1(c)$ ، يكون لدينا، استناداً إلى المعادلتين ٢٤ و (٥)

$$\lambda_1^2 \cdot (a - \lambda_1) = b\lambda_1 + c = b\lambda_1,$$

وهذا محال.

وإذا كان

$$\lambda_1 > f_1(c) = x_1,$$

يكون

$$x_1(a - x_1) < \lambda_1(a - \lambda_1) = b,$$

فيكون

$$x_1^2(a - x_1) < bx_1,$$

ومنها

$$bx_1 + c < bx_1,$$

وهذا أيضاً محال.

ب - كل c حيث $0 < c < c_0$ ، يحقق:

$$f_2(c) < f_2(0) = \lambda_2.$$

(٨) الالتقاء موجود إذا كان $\frac{a}{2} < b$ وهذا شرط عرضه الطوسي منذ البداية.

فإذا كان $\lambda_2 = f_1(c)$ ، يكون لدينا، استناداً إلى المعادلتين ٢٤ و (٥) ما يلي:

$$\lambda_2^2 \cdot (a - \lambda_2) = b\lambda_2 + c = b\lambda_1$$

وهذا محال.

وإذا كان $\lambda_2 < f_2(c)$ ، استناداً إلى المعادلة (٢٤):

$$x_2^2(a - x_2) = bx_2 + c$$

ومن جهة أخرى، إذا كان لدينا

$$\frac{a}{2} < \lambda_2 < x_2 ,$$

يكون

$$x_2(a - x_2) < \lambda_2(a - \lambda_2) = b,$$

فيكون

$$x_2^2(a - x_2) < bx_2 ,$$

وبالتالي

$$bx_2 > bx_2 + c,$$

وهذا خُلف.

النتيجة المطلوبة نستخلصها، إذن، من دراسة الحالتين أ و ب.

ويبرهن الطوسي العكس؛ أي أننا لأي عدد γ ، $\lambda_2 \in]x_0, \lambda_2[$ ، نستطيع إيجاد عدد c ، $c_0 \in]0, c[$ بحيث يكون γ الجذر الأكبر للمعادلة ٢٤ الخاصة بـ c ، أي $ax^2 + bx + c = x^3$. ويبرهن كذلك أن أي عدد β ، $\beta \in]\lambda_1, x_0[$ ، يقابله عدد c' ، بحيث يكون β الجذر الأصغر للمعادلة ٢٤ الخاصة بـ c' .

فإذا كان γ جذراً للمعادلة ٢٤، $\lambda_2 \in]x_0, \gamma[$ ، يكون:

$$\gamma^2 \cdot (a - \gamma) - b\gamma = c ;$$

فمن الضروري أن يكون:

$$\gamma(a - \gamma) > b \quad (٦)$$

فلا يمكن أن يكون $\gamma = \lambda_2$ لأن $\lambda_2(a - \lambda_2) = b$. كما لا يمكن أن يكون $\gamma > \lambda_2$ لأنه، عند ذلك، يكون $\gamma \cdot (a - \gamma) < b$. وهذا مخالف لـ (٦). لكن هذا الشرط يتحقق عند كون $\gamma \in]x_0, \lambda_2[$.

وكذلك، إذا كان β ، $\beta \in]\lambda_1, x_0[$ ، جذراً للمعادلة ٢٤، فسيوجد c بحيث يكون

$$\beta^2(a - \beta) - b\beta = c ;$$

فمن الضروري أن يكون

$$\beta(a - \beta) > \beta.$$

وكما تقدم، يبرهن الطوسي أنه عندما يكون $\beta \leq \lambda_1$ يكون هذا الشرط مستحيلًا. إلا أن هذا الشرط يتحقق عند كون $\beta \in]\lambda_1, x_0[$.

بهذا يكون الطوسي قد بين أن لكل $c \in]0, c_0[$ يوجد $x_1(c)$ و $x_2(c)$.

$$x_2(c) \in]x_0, \lambda_2[\quad , \quad x_1(c) \in]\lambda_1, x_0[$$

بحيث يكون $x_1(c)$ و $x_2(c)$ جذري المعادلة ٢٤ الخاصة بـ c . وبالعكس، فكل $\beta \in]\lambda_1, x_0[$ يقابله $c(\beta) \in]0, c_0[$ بحيث يكون β الجذر الأصغر للمعادلة ٢٤ الخاصة بـ $c(\beta)$ ؛ كما أن كل $\gamma \in]x_0, \lambda_2[$ يقابله $c(\gamma) \in]x_0, \lambda_2[$ بحيث يكون γ الجذر الأكبر للمعادلة ٢٤ الخاصة بـ $c(\gamma)$. وإذا لاحظنا أن $c = 0$ يقابله $x_1(0) = \lambda_1$ و $x_2(0) = \lambda_2$ وأن $c = c_0$ يقابله $x_0 = x_1(c_0) = x_2(c_0)$ يكون من البديهي أن الطوسي حدد الدالتين التقابليتين التاليتين:

$$x_1 : [0, c_0] \longrightarrow [\lambda_1, x_0],$$

$$x_2 : [0, c_0] \longrightarrow [x_0, \lambda_2].$$

٥ - العلاقة بين المعادلة ٢٤ والمعادلة ١٥

إذا كان x_2 الجذر الأكبر للمعادلة ٢٤ يكون $X = x_2 - x_0$ جذراً للمعادلة (٣) السابق ذكرها

$$x^3 + (3x_0 - a)x^2 = c_0 - c.$$

فبرهن، كما سبق أن فعلنا، أن

$$c_0 - c = f(x_2) - f(x_0) = (x_2 - x_0)(x_0^2 + b) - (x_2^2 - x_0^2)(a - x_2),$$

ومنها

$$c_0 - c + (x_2 - x_0)(x_2 + x_0)(a - x_2) = (x_2 - x_0)(x_0^2 + b).$$

وإذا وضعنا $x_2 - x_0 = X$ نحصل على:

$$c_0 - c + X(X + 2x_0)(a - x_0 - X) = X(x_0^2 + b)$$

ومنها

$$c_0 - c + 2x_0(a - x_0)X - X^2(3x_0 - a) - X^3 = X(x_0^2 + b);$$

لكن، استناداً إلى (١) لدينا:

$$2x_0(a - x_0) = x_0^2 + b,$$

فيكون

$$c_0 - c = X^3 + X^2(3x_0 - a);$$

أي أن X هو جذر للمعادلة (٣)، وهي من النوع ١٥.

٦ - العلاقة بين المعادلة ٢٤ والمعادلة ٢١

إذا كان x_1 الجذر الأصغر للمعادلة ٢٤، يكون $X = x_0 - x_1$ جذراً للمعادلة (٤) التالية:

$$x^3 + (c_0 - c) = (3x_0 - a)x^2.$$

فبرهن كما فعلنا سابقاً أن:

$$c_0 - c = f(x_1) - f(x_0) = (x_0 + x_1)(x_0 - x_1)(a - x_0) - (x_0 - x_1)(b + x_0^2).$$

فإذا وضعنا $X = x_0 - x_1$ ، نحصل على:

$$c_0 - c = (2x_0 - X) \cdot X \cdot (a - x_0) - X(b + x_0^2 + X^2 - 2x_0X),$$

ومنها

$$c_0 - c = 2x_0(a - x_0)X - (a - x_0)X^2 - X(b + x_0^2) + 2x_0X^2 - X^3;$$

ومن المعروف استناداً إلى (١) أن

$$(b + x_0^2) = 2x_0(a - x_0)$$

فيكون

$$X^3 + c_0 - c = X^2(3x_0 - a),$$

ويكون $X = x_0 - x_1$ جذراً للمعادلة (٤)، وهي من النوع ٢١.

وفي الموجز الذي يعطيه الطوسي في نهاية دراسته للمعادلة ٢٤، يؤكد أنه عندما يكون $\frac{a}{2} \geq h$ تكون المسألة مستحيلة. لكن، في حالة كون $\frac{a}{2} = h$ يكون $\frac{3a}{2} = x_0$

$c_0 = 0$. فإذا كان $c = 0$ يكون للمعادلة جذر مزدوج هو $x_0 = \frac{3a}{2}$ ؛ فلا يوجد استحالة إلا عند استبعاد الحالة $c = 0$.

وفي المثال الذي يعطيه الطوسي:

$$x^3 + 16x + 20 = 8x^2$$

يكون $x_0 = 4$ و $c_0 = 0$. وبما أن $c = 20 > c_0$ فليس للمعادلة جذر موجب، وهذا ما أكدته الطوسي.


ومما تقدم يتبين أن الطوسي لم يتعرض للحالة $c = 0$ إلا عندما أراد تحديد λ_1 و λ_2 بهدف الحصول على حصر للجذور (حيث $c_0 > 0$).

$$x^3 + c = ax^2 + bx \quad \text{المعادلة ٢٥:}$$

سوف نعالج هذه المسألة في كل من الحالات الثلاث التالية:

$$a < b^{\frac{2}{3}}, \quad a > b^{\frac{2}{3}}, \quad a = b^{\frac{2}{3}}$$

الحالة الأولى: $a = b^{\frac{2}{3}}$ (الشكل رقم (٣ - ٣٧)).



الشكل رقم (٣ - ٣٧)

تمهيد: إذا كان $c > a^3$ تكون المسألة مستحيلة.

فليكن $AB = b^{\frac{2}{3}}$ ، $BA = CG = a$. إذا كان x حلاً للمعادلة ٢٥ يكون:

$$AB^2 \cdot x + GC \cdot x^2 = x^3 + c \quad (١)$$

نفرض أولاً أن $x = BD > AB = a$ ، فيكون لدينا

$$x^3 - ax^2 = x^2(x - a) = BD^2 \cdot AD,$$

و

$$bx = AB^2 \cdot BD,$$

لكن

$$AB^2 \cdot BD - AB^2 \cdot AD = AB^3$$

و

$$AB^2 \cdot BD - BD^2 \cdot AD = c = AB^3 - (AB + BD)AD^2;$$

فيكون $a^3 < c$.

نفرض الآن أن $x = BE < AB = a$ فيكون لدينا:

$$ax^2 - x^3 = AB \cdot BE^2 - BE^3 = AE \cdot BE^2$$

فيكون

$$c - bx = AE \cdot BE^2$$


ومنها

$$c = AE \cdot BE^2 + AB^2 \cdot BE = AE \cdot BE^2 + (AB^3 - AB^2 \cdot AE)$$

وبالتالي

$$c = AB^3 - (AB + BE) \cdot AE^2,$$

فيكون $a^3 < c$ (الشكل رقم (٣ - ٣٨)).



الشكل رقم (٣ - ٣٨)

هكذا يكون قد تبين أنه:

- إذا كان $c > a^3$ فلا حل للمسألة؛

- إذا كان $c = a^3$ يكون $x = a$ حلاً؛

- إذا كان $c < a^3$ يكون للمسألة حلان x_1 و x_2 يحققان


$$x_1 < a < x_2.$$

تحديد الجذر الأكبر x_2

ليكن $BK = AB$ (الشكل رقم (٣ - ٣٩)) ولناخذ المعادلة من النوع ١٥ التالية:

$$x^3 + AK x^2 = a^3 - c \quad (٢)$$

ليكن (AD) حل المعادلة (٢). ولنبرهن أن $x_2 = BD$ هو حل للمعادلة (١).



الشكل رقم (٣ - ٣٩)

لدينا

$$AD^2(AD + AK) = AB^3 - c$$

فيما أن

$$AD^2 \cdot DK = AD^2 \cdot (DB + BA) = DA \cdot (IM)$$

يكون

$$(IM) \cdot AD + c = AB^3$$

ومنها

$$AB^2 \cdot AD + (IM) \cdot AD + c = AB^3 + AB^2 \cdot AD,$$

فيكون

$$BD^2 \cdot AD + c = AB^2 \cdot BD,$$

وبإضافة $AB \cdot DB^2$ إلى كلا الطرفين، نحصل على:

$$BD^2 \cdot BD + c = AB^2 \cdot BD + BD^3 \cdot AB,$$

وهذا يعني

$$BD^3 + c = b \cdot BD + a \cdot BD^2;$$

فيكون BD جذراً لـ (١).

حصر الجذر الأكبر: $a < x_2 < 2a$

بيّنّا أن لدينا، استناداً إلى (٢):

$$AD^2 \cdot DK = AB^3 - c$$

فيكون لدينا

$$AD^2 \cdot DK < AB^3 \quad (٣)$$

فلنبرهن أن $AD < AB$. فإذا فرضنا أن $AD \geq AB$ يكون
 $AD^2 \cdot DK \geq 3AB \cdot DA^2 > AB^3$,

وهذا خلف، استناداً إلى (٣).

لذلك يكون لدينا

$$DB = DA + AB < 2AB \quad \text{و} \quad DA < AB$$


تحديد الجذر الأصغر x_1

ليكن AE حلاً للمعادلة من النوع ٢١ التالية:

$$x^3 + AB^3 - c = AK \cdot x^2 \quad (٤)$$

فيكون لدينا:

$$AE^2 \cdot EK = AB^3 - c;$$



الشكل رقم (٣ - ٤٠)

فلنبرهن أن $EB = x_1$ جذر للمعادلة (١)؛ (الشكل رقم (٣ - ٤٠)). لدينا أن:

$$AB^3 = AB^2 \cdot BE + AB^2 \cdot AE = AB^2 \cdot BE + BE^2 \cdot AE + (IM) \cdot AE,$$

لكن

$$(IM)AE = AE^2 \cdot EK,$$

فيكون

$$AB^3 = AB^2 \cdot BE + BE^2 \cdot AE + AE^2 \cdot EK,$$

لكن

$$AB^3 = c + AE^2 \cdot EK,$$

فيكون

$$AB^2 \cdot BE + BE^2 \cdot AE = c;$$

وبإضافة BE^3 إلى كلا الطرفين:

$$BE^3 + c = AB^2 \cdot BE + BE^2 \cdot AB,$$

ويكون BE جذراً لـ (١).

حصر الجذر الأصغر x_1 : $0 < x_1 < a$

فهما كان BE ، $(BE < AB = a)$ ، يكون

$$AB \cdot BE^2 - BE^3 = BE^2 \cdot AE;$$

وإذا وضعنا

$$c' = AB^2 \cdot BE + BE^2 \cdot AE,$$

نحصل على $AB^3 < c'$. فإذا وضعنا $c' = c$ ، يكون BE جذراً للمعادلة (١).

فأي عدد أصغر من AB مهما بلغ حدّه من الصّغر هو جذر لمعادلة من النوع ٢٥.

العلاقة بين المعادلة ٢٥ والمعادلة ١٥

تبين أنه إذا كان $BD = x_2$ يكون

$$AB^3 - c = (BD + AB) \cdot AD^2, \quad (\text{الشكل رقم (٣ - ٤١)})$$



الشكل رقم (٣ - ٤١)

وبوضع $AD = X$ ، نحصل على

$$(2BA + X)X^2 = 2AB \cdot X^2 + X^3 = AB^3 - c,$$

فيكون $AD = X$ حلاً للمعادلة (٢) ويكون

$$AD + AB = BD,$$

أي

$$x_2 = BD = X + a.$$

العلاقة بين المعادلة ٢٥ والمعادلة ٢١ (الشكل رقم (٣ - ٤٢))



الشكل رقم (٣ - ٤٢)

تبين أنه عندما يكون $BE = x_1$ ، يكون

$$AB^3 - c = (AB + BE) \cdot AE^2,$$

وبوضع $X = AE$ ، نحصل على:

$$AB^3 - c = (2AB - AE) \cdot AE^2 = 2AB \cdot X^2 - X^3,$$

فيكون

$$X^3 + AB^3 - c = 2AB \cdot X^2,$$

ويكون $X = AE$ حلاً للمعادلة (٤) ويكون

$$x_1 = BE = AB - AE = a - X.$$

وخلاصة لهذه النقطة يمكن القول:

$$c_0 = AB^3 = a^3 \text{ ليكن}$$

- إذا كان $c > c_0$ تكون المسألة مستحيلة؛

- إذا كان $c = c_0$ يكون a الحل الوحيد؛

- إذا كان $c < c_0$ يكون للمسألة حلان x_1 و x_2 يحققان:

$$0 < x_1 < a < x_2 < 2a.$$

نضع $k = c_0 - c$ ونأخذ المعادلة

$$x^3 + 2ax^2 = k;$$

فإذا كان X حل هذه المعادلة، يكون لدينا

$$X + a = x_2.$$


ونأخذ المعادلة

$$x^3 = k + 2ax^2,$$

فإذا كان X حلاً لهذه المعادلة، يكون لدينا:

$$a - X = x_1.$$

الحالة الثانية: $a > b^{\frac{1}{2}}$ (الشكل رقم (٣ - ٤٣)):



الشكل رقم (٣ - ٤٣)

نضع $BC = a$ و $AB^2 = b$ ، $BC > AB$. نُكتب المعادلة ٢٥ على الشكل التالي:

$$BC \cdot x^2 - x^3 + AB^2 \cdot x = c \quad (٥)$$

دراسة النهاية العظمى

لنأخذ المعادلة

$$\frac{1}{3}AB^2 + \frac{2}{3}BC \cdot x = x^2 \quad (٦)$$

وليكن $x_0 = BD$ جذرها. لدينا

$$AB < BD < BC.$$

فلنبرهن أولاً أن $BD > AB$. لدينا

$$BD = \frac{2}{3}BC + (BD - \frac{2}{3}BC),$$

واستناداً إلى (٦)

$$BD \left(BD - \frac{2}{3}BC \right) = \frac{1}{3}AB^2.$$

فإذا كان $BD = AB$ ، يكون

$$AB^2 = \frac{1}{3}AB^2 + \frac{2}{3}BC \cdot AB,$$

ومنها

$$\frac{2}{3}AB^2 = \frac{2}{3}BC \cdot AB,$$

وهذا خُلف .

وإذا كان $BD < AB$ ، يكون

$$BD\left(BD - \frac{2}{3}BC\right) = \frac{1}{3}AB^2 > \frac{1}{3}AB \cdot BD$$

وبالتالي

$$\frac{1}{3}AB < BD - \frac{2}{3}BC;$$

لكن، من المعطيات

$$\frac{2}{3}BC > \frac{2}{3}AB,$$

فيكون

$$BD > AB,$$

وهذا خُلف .

لذلك يكون لدينا $AB < BD$.

لنبرهن الآن أن $BD < BC$. لدينا:

$$BD\left(BD - \frac{2}{3}BC\right) = \frac{1}{3}AB^2;$$

لكن $BD > AB$

$$\frac{1}{3}AB > BD - \frac{2}{3}BC,$$

وبما أن $BC > AB$ من المعطيات:

$$\frac{1}{3}BC > BD - \frac{2}{3}BC,$$

يكون

$$BD < BC.$$

ويكون بالتالي

$$b^2 = AB < BD = x_0 < BC = a.$$

ومن جهة أخرى نُكتب العلاقة (٦) على الشكل:

$$AB^2 + 2BD \cdot DC = BD^2,$$

فيكون لدينا

$$2DC \cdot BD = BD^2 - AB^2 = (DB + BA) \cdot DA \quad (v)$$

ولدينا

$$BC \cdot BD^2 - BD^3 = (BC - DB)DB^2 = DC \cdot DB^2.$$

فإذا كان BD جذراً للمعادلة (٥) يكون

$$BC \cdot BD^2 - BD^3 = DC \cdot DB^2 = c_0 - AB^2 \cdot BD$$

فيكون

$$c_0 = AB^2 \cdot BD + DC \cdot BD^2$$

نقضية: ليكن

$$c_0 = AB^2 \cdot BD + DC \cdot BD^2$$

إن كل x غير $BD = x_0$ يحقق العلاقة

$$c = BC \cdot x^2 - x^3 + AB^2 \cdot x < c_0$$

(وسيتيم البرهان في كل من الحالتين ١ و ٢ التاليتين) (المترجم).

١ - إذا كان

$$BD < x = BE < BC$$

يكون $c < c_0$ (الشكل رقم (٣ - ٤٤)).



الشكل رقم (٣ - ٤٤)

فلدينا

$$BC \cdot BE^2 = BE^3 + CE \cdot BE^2,$$

ومنها

$$c = AB^2 \cdot BE + CE \cdot BE^2;$$

لكن

$$c_0 = AB^2 \cdot BD + DC \cdot BD^2 = AB^2 \cdot BD + CE \cdot BD^2 + ED \cdot BD^2;$$

ومن جهة أخرى لدينا

$$BE^2 \cdot CE = BD^2 \cdot CE + (EB + BD) \cdot ED \cdot CE,$$

وكذلك

$$AB^2 \cdot BE = AB^2 \cdot ED + AB^2 \cdot BD.$$

فتبقى مقارنة

$$(DB + BA) \cdot AD \cdot DE \quad \text{مع} \quad (BE + BD) \cdot ED \cdot CE.$$

لكن

$$2DB \cdot CD = 2DB \cdot DE + 2DB \cdot CE$$

و

$$(BE + BD)CE = 2DB \cdot CE + DE \cdot CE$$

ولدينا

$$2DB \cdot DE > DB \cdot CE$$

وهذا يعني

$$2DE > CE$$

وذلك لأن لدينا، استناداً إلى (٦):

$$DB > \frac{2}{3}BC$$

لذلك يكون

$$2DB \cdot CD > (BE + BD)CE;$$

ورأيانا، استناداً إلى (٧) أن

$$2DC \cdot DB = (DB + BA)DA$$

فيكون

$$\frac{DB + BA}{EB + BD} > \frac{CE}{AD},$$

ومنها

$$\frac{(DB + BA) \cdot DA}{(EB + BD) \cdot DE} > \frac{CE}{DE},$$


ويحصل

$$(DB + BA) \cdot DA \cdot DE > (EB + BD) \cdot DE \cdot CE,$$

وهذا يعني أن

$$c_0 > c.$$

نفرض الآن أن $BD < BE = x = BC$ ؛ في هذه الحالة لدينا:
 ((الشكل رقم (٣ - ٤٥)) $c = AB^2 \cdot BC$.



الشكل رقم (٣ - ٤٥)

لكن

$$c_0 = AB^2 \cdot BD + DC \cdot BD^2;$$


فتبقى مقارنة $AB^2 \cdot DC$ مع $BD^2 \cdot DC$ ولكن لدينا

$$DB^2 \cdot DC = AB^2 \cdot DC + (DB + AB)AD \cdot DC$$

فيكون


$$c_0 > c.$$

نفرض أخيراً أن $x = BS > BC > BD$ ؛ في هذه الحالة لدينا
 ((الشكل رقم (٣ - ٤٦)) $c = AB^2 \cdot BS - SC \cdot BS^2 < AB^2 \cdot BC < c_0$



الشكل رقم (٣ - ٤٦)

هكذا يكون قد تبين أنه مهما كان x ، $x > BD = x_0$ ، يكون $c < c_0$.
 ٢ - إذا كان $AB < x = BM < BD < BC$ ، ((الشكل رقم (٣ - ٤٧))، يكون $c < c_0$.



الشكل رقم (٣ - ٤٧)

فلدينا

$$c = MC \cdot BM^2 + AB^2 \cdot BM$$

و

$$c_0 = AB^2 \cdot BD + BD^2 \cdot CD.$$

لكن

$$(DB + BM)CD + DM \cdot CD = 2DB \cdot CD,$$

و

$$(MB + BA) \cdot MA + (DB + BM)DM = (DB + BA) \cdot DA;$$

لكن

$$(DB + BM) \cdot DM > DM \cdot CD,$$

وكذلك استناداً إلى (٧):

$$2DB \cdot CD = (DB + BA)DA$$

فيكون

$$(DB + BM) \cdot CD > (MB + BA)MA,$$

ويكون

$$\frac{MB + BA}{DB + BM} < \frac{CD}{AM},$$

وبالتالي

$$\frac{(MB + BA) \cdot AM}{(DB + BM) \cdot MD} < \frac{CD}{MD},$$

فيكون

$$(MB + BA) \cdot AM \cdot MD < (DB + BM) \cdot MD \cdot CD;$$

وإذا أضفنا $CD \cdot BM^2$ و $AB^2 \cdot DM$ إلى كلا الطرفين، نحصل على:

$$BM^2 \cdot CM < BD^2 \cdot CD + AB^2 \cdot DM.$$

وإذا أضفنا $BM \cdot AB^2$ إلى كلا الطرفين:

$$BM^2 \cdot CM + AB^2 \cdot BM < BD^2 \cdot CD + AB^2 \cdot BD,$$

وهذا يعني:

$$c < c_0.$$

نفرض الآن أن $x = AB = BM < BD$ فيكون


$$c = AB^2 \cdot BC \quad (\text{الشكل رقم (٣ - ٤٨)})$$

لكن

$$c_0 = AB^2 \cdot BD + BD^2 \cdot CD = BC \cdot AB^2 + (DB + BA) \cdot AD \cdot CD;$$

فيكون

$$c_0 > c.$$



الشكل رقم (٣ - ٤٨)



الشكل رقم (٣ - ٤٩)

نفرض أخيراً أن $x = BE < AB < BC$ ، فيكون

$$c = BC \cdot BE^2 + (AB + BE) \cdot AE \cdot EB$$

ويكون

$$c_0 = AB^2 \cdot BD + BD^2 \cdot CD > BC \cdot AB^2.$$

لكن

$$c < BC \cdot BE^2 + (AB^2 - EA^2) \cdot BC$$

فيكون

$$c < BC \cdot AB^2 < c_0.$$

هكذا يكون قد تبين أن لكل x ، حيث $x < BD$ ، لدينا $c < c_0$.

نتيجة لما عُرِض في الحالتين السابقتين ١ و ٢ يكون قد تم برهان القضية. وهكذا يكون لدينا ما يلي:

- إذا كان $c > c_0$ تكون المسألة مستحيلة؛

- إذا كان $c = c_0$ يكون $x_0 = BD$ الحل الوحيد؛

- إذا كان $c < c_0$ يكون للمسألة حلان، x_1 و x_2 بحيث يكون

$$x_1 < x_0 < x_2.$$

تحديد الجذر الأكبر x_2

١ - إذا كان $c > AB^2$ ، CB يكون $c > AB^2$ ، $BD < x_2 < AB$ (الشكل رقم (٣ - ٥٠)).



الشكل رقم (٣ - ٥٠)

وهذا يعني أنه إذا كان $c_0 < c < ab$ يكون $x_0 < x_2 < a$.

ليكن J على امتداد DB بحيث يكون $BJ = BD$ ولنفصل $MG = CD$ ونأخذ المعادلة من النوع ١٥ :

$$x^3 + DMx^2 = c_0 - c \quad (٨)$$

إذا كان X جذر هذه المعادلة يكون $X < CD$.

فبما أن $c > ab$ يكون

$$c_0 - BA^2 \cdot BC > c_0 - c,$$

لكن

$$c_0 = DB^2 \cdot DC + BA^2 \cdot BD,$$

و

$$BA^2 \cdot BC = BA^2 \cdot BD + BA^2 \cdot CD,$$

فيكون

$$c_0 - BA^2 \cdot BC = (DB + BA) \cdot AD \cdot CD,$$

وبناءً على (٧) يكون

$$(DB + BA)DA = 2DB \cdot CD,$$

فيكون

$$c_0 - BA^2 \cdot BC = 2DB \cdot CD^2;$$

لكن

$$DJ \cdot CD^2 = CD^2 \cdot CM = CD^3 + CD^2 \cdot DM > c_0 - c \quad (٩)$$

و

$$c_0 - c = X^3 + DM \cdot X^2,$$

فنستنتج بسهولة أن $X < CD$.

لنفرض الآن أن $X = DO$ ولنبرهن أن:

$$x_2 = BO = BD + DO$$

فلدينا

$$(DB + BA)DA = JD \cdot CD,$$

فيكون

$$\begin{aligned} (DB + BA) \cdot DA \cdot DO &= JD \cdot DO \cdot CO + DO^2 \cdot CO + DO^2 \cdot OM \\ &= JO \cdot DO \cdot CO + DO^2 \cdot OM \\ &= (OB + BD)OD \cdot CO + DO^2 \cdot OM. \end{aligned}$$

وإذا أضفنا $BO \cdot BA^2$ إلى كلا الطرفين نحصل على:

$$BD^2 \cdot DO + BA^2 \cdot BD = (OB + BD) \cdot OD \cdot CO + DO^2 \cdot OM + BA^2 \cdot BO;$$

وإذا أضفنا $BD^2 \cdot CO$ إلى كلا الطرفين نحصل على:

$$c_0 = BD^2 \cdot CD + BA^2 \cdot BD = BO^2 \cdot CO + DO^2 \cdot MO + BA^2 \cdot BO.$$

لكن، بناءً على (٨)، لدينا $OM = OD^2 \cdot c_0 - c$ ، فيكون

$$c + BO^3 = BO^2 \cdot BC + BA^2 \cdot BO$$

ويكون $BO = x_2$ الجذر المطلوب.

٢ - إذا كان $BC = a \cdot b$ يكون $c = AB^2$ يكون $x_2 = a$ (الشكل رقم (٣ - ٥١)).



الشكل رقم (٣ - ٥١)

فلدينا

$$b \cdot x_2 = AB^2 \cdot CB = a \cdot b = c$$

و

$$x_2^3 = CB^3 = ax_2^2$$

فيكون

$$x_2^3 + c = ax_2^2 + bx_2.$$

يلاحظ الطوسي أن $AB = \sqrt{b}$ هو، في هذه الحالة، الجذر الأصغر x_1 ،

فلدينا : $x_1 < x_0$

$$AB^3 = b \cdot AB,$$


و

$$a \cdot AB^2 = CB \cdot AB^2 = c,$$

فيكون

$$b \cdot AB + a \cdot AB^2 = c + AB^3.$$

٣- إذا كان $BC = ab$ ، $c < AB^2$ ، يكون $x_2 > BC = a$ ؛ (الشكل رقم (٣ - ٥٢)).



الشكل رقم (٣ - ٥٢)

فإذا كان X حل المعادلة (٨) ، يكون $X > CD$ ؛ فلدينا ، استناداً إلى (٩)

$$c_0 - c > c_0 - AB^2 \cdot BC = CD^3 + CD^2 \cdot DM,$$

وبالتالي

$$X^3 + DM \cdot X^2 > CD^3 + CD^2 \cdot DM,$$

فنستنتج بسهولة أن $X > CD$.

ليكن الآن $X = DI$ ولنبرهن أن

$$x_2 = BI = BD + DI;$$

فلنضع

$$I = BA^2 \cdot BD + BD^2 \cdot CB$$

و

$$II = BD^3.$$

لدينا

$$I' = I + AB^2 \cdot DI = BA^2 \cdot BI + BD^2 \cdot CB$$

$$II' = II + AB^2 \cdot DI = BD^3 + BA^2 \cdot DI$$

و

$$I' - II' = I - II = c_0.$$

ومن جهة أخرى

$$II'' = I' + (IB + BD)DI \cdot CB = BA^2 \cdot BI + BI^2 \cdot CB$$

$$II'' = II' + (IB + BD)DI \cdot CB = (IB + BD) \cdot DI \cdot CB + BA^2 \cdot DI + BD^3$$

وكذلك

$$I'' - II'' = c_0.$$

ومهما كان العدد g يكون لدينا

$$I'' - (II'' + g) = c_0 - g;$$

فإذا كان

$$g = (DB + BA)AD \cdot ID + (IB + BD)ID \cdot IC$$

نحصل على:

$$II'' + g = BI^3,$$

فيكون

$$BA^2 \cdot BI + CB \cdot BI^2 - BI^3 = I'' - (II'' + g) = c_0 - g \quad (١٠)$$

لكن

$$(DB + BA) \cdot AD \cdot ID = 2DB \cdot CD \cdot ID,$$

و

$$(IB + BD) \cdot ID \cdot CI = 2BD \cdot CI \cdot ID + ID^2 \cdot CI,$$

فيكون

$$\begin{aligned} g &= 2BD \cdot ID^2 + ID^2 \cdot CI = JD \cdot ID^2 + ID^2 \cdot CI \\ &= (CM + CI)ID^2 = IM \cdot ID^2; \end{aligned}$$

واستناداً إلى (٨)، يكون

$$IM \cdot ID^2 = c_0 - c$$

فَنُكْتَب (١٠) على الشكل التالي

$$BA^2 \cdot BI + CB \cdot BI^2 - BI^3 = c,$$


ويكون BI هو الجذر الأكبر x_2 .

حصر الجذر الأكبر

لتكن المعادلة

$$x^2 = ax + b \quad (١١)$$

حيث $a = BC$ و $b = AB^2$ (الشكل رقم (٣ - ٥٣))، وليكن BI جذرها I ليست النقطة التي أُشير إليها سابقاً بهذا الحرف).



الشكل رقم (٣ - ٥٣)

مهما كان الجذر الأكبر x_2 للمعادلة (٥)، يكون $x_2 < BI$.

فلدنا، استناداً إلى (١١)

$$BI^2 = BI \cdot CB + AB^2$$

فيكون

$$BI^3 = BI^2 \cdot CB + AB^2 \cdot IB,$$

فلا يكون BI جذراً للمعادلة (٥)، وكل جذر x_2 لهذه المعادلة يكون أصغر من BI .
(نلاحظ أن الطوسي لا يبرر تأكيده الأخير هذا - راجع التعليق).

وبالعكس، فإن أي x حيث $BD < x < BI$ يمكن أن يكون جذراً لمعادلة من الشكل (٥) أي لمعادلة من النوع ٢٥.

فإذا وضعنا $x = BO$ (الشكل رقم (٣ - ٥٤))، نحصل على:



الشكل رقم (٣ - ٥٤)

$$BI^3 - BO^3 = OB^2 \cdot IO + (IB + BO)IO \cdot IB;$$

لكن، استناداً إلى (١١):

$$BI^3 = BI^2 \cdot CB + AB^2 \cdot BI$$

وبما أن $AB < BO$ و $BC < BI$

$$(BI^2 \cdot CB + AB^2 \cdot BI) - (BO^2 \cdot CB + AB^2 \cdot BO) =$$

$$AB^2 \cdot IO + (IB + BO) \cdot IO \cdot BC < BI^3 - BO^3,$$

فيكون

$$BO^3 < BO^2 \cdot CB + AB^2 \cdot BO.$$

وإذا وضعنا

$$c = BO^2 \cdot CB + AB^2 \cdot BO - BO^3$$

نحصل على معادلة من النوع ٢٥ يكون BO جذراً لها.

تحديد الجذر الأصغر x_1

لتكن المعادلة من النوع ٢١:

$$x^3 + c_0 - c = DM \cdot x^2 \quad (١٢)$$

وليكن DE حلاً لها (الشكل رقم (٣ - ٥٥)).



الشكل رقم (٣ - ٥٥)

١ - إذا كان $DE < AD$ يكون $x_1 = BE = BD - DE$ ؛ فلدينا، استناداً إلى (٧)

$$\begin{aligned} 2BD \cdot CD \cdot DE &= (DB + BA)DA \cdot DE \\ &= (EB + BA)AE \cdot DE + (DB + BE) \cdot DE^2. \end{aligned}$$

لكن

$$(DB + BE) \cdot DE^2 = DE^2 \cdot JE$$

و

$$2BD \cdot DE \cdot CD = (DB + BE) \cdot DE \cdot CD + DE^2 \cdot CD,$$

وإذا طرحنا $DE^2 \cdot CD$ ، نحصل على:

$$(EB + BA) \cdot AE \cdot DE + DE^2 \cdot EM = (DB + BE) \cdot DE \cdot CD.$$

وإذا أضفنا $BE^2 \cdot CD + BA^2 \cdot DE$ إلى كلا الطرفين، نحصل على:

$$BE^2 \cdot CE + DE^2 \cdot EM = BD^2 \cdot CD + BA^2 \cdot DE;$$

وإذا أضفنا إلى كلا الطرفين $BA^2 \cdot DE$ ، نحصل على:

$$BE^2 \cdot CE + BA^2 \cdot BE + DE^2 \cdot EM = c_0;$$

لكن، استناداً إلى (١٢)، لدينا

$$DE^2 \cdot EM = c_0 - c$$

فيكون

$$BE^2 \cdot CE + BA^2 \cdot BE = c,$$

ويكون BE حلاً للمعادلة (٥).

٢ - إذا كان $DE = AD$ ، يكون $x_1 = AB$ ؛ (الشكل رقم (٣ - ٥٦)).



الشكل رقم (٣ - ٥٦)

فلدينا

$$2BD \cdot CD \cdot DA = (DB + BA) \cdot DA^2 = AJ \cdot DA^2,$$

لكن

$$2BD \cdot DA = (DB + BA) \cdot AD + AD^2,$$

فيكون

$$2BD \cdot AD \cdot CD - AD^2 \cdot CD = DA^2(AJ - CD) = DA^2 \cdot AM,$$

فيكون

$$DA^2 \cdot AM = (DB + BA) \cdot AD \cdot CD,$$

وبالتالي

$$DA^2 \cdot AM + AB^2 \cdot CD = DB^2 \cdot CD;$$

فنحصل على

$$DA^2 \cdot AM + AB^2 \cdot BC = DB^2 \cdot CD + BA^2 \cdot BD = c_0.$$

لكن، بناءً على (١٢)، لدينا


$$DA^2 \cdot AM + c = c_0$$

فيكون

$$c = AB^2 \cdot BC = BC \cdot AB^2 + AB^2 \cdot AB - AB^3,$$

ويكون x_1 الجذر الأصغر للمعادلة (٥).

٣ - إذا كان $DE > AD$ يكون $DE = BE$ يكون $x_1 = BE$ ؛ (الشكل رقم (٣ - ٥٧)).



الشكل رقم (٣ - ٥٧)

فبما أن $DB + BE = JE$ و $DB = BJ$ يكون

$$(DB + BE) \cdot DE^2 = JE \cdot DE^2;$$

لكن

$$(DB + BA) \cdot DA \cdot DE = 2BD \cdot CD \cdot DE,$$

فيكون

$$2BD \cdot CD \cdot DE + (DB + BE)DE^2 = (DB + BA) \cdot DA \cdot DE + JE \cdot DE^2,$$

لكن

$$(DB + BE)CD \cdot DE + DE^2 \cdot CD = 2DB \cdot CD \cdot DE,$$

فيكون

$$(DB + BE) \cdot DE \cdot CE = (DB + BA) \cdot DA \cdot DE + DE^2 \cdot EM \quad (١٣)$$

لكن

$$BC \cdot BE^2 + AB^2 \cdot BE - BE^3 < AC \cdot BD^2 + AB^2 \cdot BD - BD^3,$$

وبالتالي

$$BD^2 \cdot BC + AB^2 \cdot BD - (BE^2 \cdot BC + AB^2 \cdot BE) > BD^3 - BE^3 \quad (١٤)$$

ومن جهة أخرى، لدينا

$$BC \cdot BD^2 - (DB + BE)DE \cdot CB = BE^2 \cdot CB,$$

$$AB^2 \cdot BD - AB^2 \cdot DE = AB^2 \cdot BE,$$

$$BD^3 - [BD^2 \cdot DE + (DB + BE) \cdot DE \cdot BE] = BE^3,$$

فيكون

$$\begin{aligned} & (BC \cdot BD^2 + AB^2 \cdot BD) - (BC \cdot BE^2 + AB^2 \cdot DE) \\ & = (DB + BE)DE \cdot CB + AB^2 \cdot DE. \end{aligned}$$

ولنبرهن الآن أن

$$(DB + DE) \cdot DE \cdot CB + AB^2 \cdot DE = BD^3 - BE^3 + DE^2 \cdot EM.$$

لنضع

$$I = BD^3 - BE^3$$

ونضع

$$II = (DB + BE)DE \cdot CB + AB^2 \cdot DE.$$

فإذا طرحنا $BE \cdot DE \cdot (DB + BE)$ ، من I و II ، يبقى

$$I' = DB^2 \cdot DE$$

$$II' = (DB + BE) \cdot DE \cdot CE + AB^2 \cdot DE;$$

وإذا طرحنا $DE \cdot AB^2$ من I' و II' يبقى

$$I'' = (DB + BA) \cdot DA \cdot DE$$

$$II'' = (DB + BE) \cdot DE \cdot CE;$$

لكن، لدينا، استناداً إلى (١٣)

$$(DB + BE) \cdot DE \cdot CE - (DB + BA)DA \cdot DE = DE^2 \cdot EM,$$

فيكون لدينا، استناداً إلى (١٤)

$$BC \cdot BD^2 + AB^2 \cdot BD - BD^3 = BC \cdot BE^2 + AB^2 \cdot BE - BE^3 + DE^2 \cdot EM,$$

لكن

$$DE^2 \cdot EM = c_0 - c$$

فيكون

$$BC \cdot BE^2 + AB^2 \cdot BE - BE^3 = c;$$


ويكون $BE = x_1$ الجذر الأصغر المطلوب.

العلاقة بين المعادلة ٢٥ والمعادلة ١٥

١ - إذا كان $c < c_0 < BC$ ، يكون $x_2 < BC$ ؛ فليكن $x_2 = BE$ (الشكل

رقم (٣ - ٥٨)؛ برهنا أن

$$(DB + BA)DA \cdot DE = (DB + BE) \cdot DE \cdot CE + DE^2 \cdot EM;$$



الشكل رقم (٣ - ٥٨)

ولنضع $DE = X$ ، فيكون لدينا

$$\begin{aligned}(DB + BE)DE \cdot CE &= (2DB + X)(CD - X)X \\ &= 2BD \cdot CDX - (2BD - CD)X^2 - X^3\end{aligned}$$

وأيضاً

$$(DB + BA)DA \cdot DE = (DB + BA)DA \cdot X,$$

وبالتالي

$$(DB + BA)DA \cdot X + X^3 + X^2(2BD - CD) = 2BD \cdot CD \cdot X + c_0 - c;$$

ولدينا، استناداً إلى (٧)

$$(DB + BA)DA = 2BD \cdot CD,$$


فيكون

$$X^3 + X^2(2BD - CD) = c_0 - c;$$

وهذه المعادلة تعطي $X = DE = x_2 - x_0$.

٢ - إذا كان $BC = AB^2$ ، $c = AB^2$ ، يكون $x_2 = BC$ ؛ هذه النتيجة قدمها الطوسي من دون استخدام معادلة وسيطة.

٣ - إذا كان $BC < AB^2$ ، $c < AB^2$ ، يكون $x_2 = BE > BC$ ؛ (الشكل رقم (٣ - ٥٩)).



الشكل رقم (٣ - ٥٩)

تمهيد: إذا كان $p > q$ و $s > t$ ، يكون

$$(p + s) - (q + t) = (p - q) - (t - s).$$

لدينا

$$\begin{aligned}BD^3 + c_0 &= BD^2 \cdot BC + BD \cdot AB^2 \\ BD \cdot AB^2 + ED \cdot AB^2 &= BE \cdot AB^2 \\ BD^2 \cdot BC + (EB + BD)ED \cdot BC &= EB^2 \cdot BC\end{aligned}$$

وبالتالي

$$EB^2 \cdot BC + BE \cdot AB^2$$

$$= (BD \cdot AB^2 + BD^2 \cdot BC) + (ED \cdot AB^2 + (EB + BD)ED \cdot BC).$$

ومن جهة أخرى

$$BD^3 + BD^2 \cdot ED + (EB + BD)ED \cdot BE = BE^3;$$

فيكون لدينا

$$c = BC \cdot BE^2 + AB^2 \cdot BE - BE^3 = c_0 -$$

$$- \{BD^2 \cdot ED + (EB + BD)DE \cdot BE -$$

$$- [AB^2 \cdot ED + (BE + BD)DE \cdot BC]\};$$

فلنضع

$$t = BD^2 \cdot ED + (EB + BD) \cdot DE \cdot BE,$$

$$s = AB^2 \cdot ED + (BE + BD) \cdot DE \cdot BC.$$

ولنطرح $(BE + BD) \cdot ED \cdot BD$ من كل من s و t ، فنحصل على:

$$t - s = BE^2 \cdot ED - [ED \cdot AB^2 + (EB + BD)ED \cdot CD];$$

وبطرح $AB^2 \cdot ED$ من كل من الحدين نحصل على

$$t - s = (EB + BA)AE \cdot ED - (EB + BD)ED \cdot CD.$$

وإذا وضعنا $DE = X$ نحصل على:

$$(EB + BA) \cdot AE \cdot ED = (BD + BA + X) (DA + X) \cdot X$$

$$= [(DB + BA)DA + 2BD \cdot X + X^2]X.$$

$$(EB + BD)ED \cdot CD = (2BD + DE)DE \cdot CD$$

$$= 2BD \cdot CD \cdot X + CD \cdot X^2;$$

ومعلوم أن

$$(DB + BA)DA = 2DB \cdot CD$$

فيكون بالتالي

$$t - s = (2BD - CD)X^2 + X^3 = c_0 - c_1$$

ونحل المعادلة

$$(2BD - CD)X^2 + X^3 = c_0 - c,$$


فنحصل على $X = DE$ ونستج $x_2 = BD + DE = x_0 + X$

العلاقة بين المعادلة ٢٥ والمعادلة ٢١

نأخذ المعادلة من النوع ٢١

$$x^3 + c_0 - c = (2BD - CD)x^2 \quad (١٢)$$

ليكن $X = DE$ (الشكل رقم (٣ - ٦٠)).



الشكل رقم (٣ - ٦٠)

١ - إذا كان $DE < BD - AB = AD$ ، يكون $x_1 = BD - BE > AB$ بما أن

$$\begin{aligned} c_0 &= AB^2 \cdot BD + BD^2 \cdot CD \\ &= AB^2 \cdot BE + AB^2 \cdot ED + EB^2 \cdot CD + (BD + BE) \cdot DE \cdot CD \end{aligned}$$

و

$$c = AB^2 \cdot BE + EB^2 \cdot CD + EB^2 \cdot ED,$$

يكون لدينا

$$c_0 - c = AB^2 \cdot ED + (BD + BE)DE \cdot CD - EB^2 \cdot ED.$$

وإذا طرحنا $DE \cdot AB^2$ من كلا الطرفين، نحصل على

$$c_0 - c = (BD + BE)DE \cdot CD - (EB + AB)AE \cdot ED,$$

فيكون

$$\begin{aligned} c_0 - c &= (2DB - X)X \cdot CD - (BD + BA - X)(DA - X)X \\ &= 2DB \cdot CD \cdot X - CD \cdot X^2 - (BD + BA)DA \cdot X - X^3 + 2BD \cdot X^2; \end{aligned}$$

لكن لدينا

$$2DB \cdot CD = (BD + BA)DA$$

فيكون

$$c_0 - c = (2BD - CD)X^2 - X^3,$$

ويكون $X = DE$ حلاً للمعادلة (١٢) ونستج

$$x_1 = BE = BD - DE = x_0 - X.$$

٢ - إذا كان $DE = BD - AB$ ، يكون $x_1 = AB$.

٣ - إذا كان $DE > BD - AB$ ، يكون $x_1 < AB$. ليكن $x_1 = BG$ (الشكل رقم (٣ - ٦١)).



الشكل رقم (٣ - ٦١)

سوف نستخدم التمهيد السابق.

لدينا ما يلي:

$$\begin{aligned} AB^2 \cdot BD - AB^2 \cdot DG &= AB^2 \cdot BG, \\ AB^2 \cdot BD - AB^2 \cdot DG &= AB^2 \cdot BG, \\ BD^2 \cdot BC - (BD + BG) \cdot DG \cdot BC &= BG^2 \cdot BC, \\ BD^3 - [(BD + BG) \cdot DG \cdot DB + BG^2 \cdot DG] &= BG^3, \end{aligned}$$

لكن

$$c = AB^2 \cdot BG + BG^2 \cdot BC - BG^3$$

فيكون

$$\begin{aligned} c_0 - c &= AB^2 \cdot DG + (BD + BG)DG \cdot BC - \\ &\quad - [BG^2 \cdot DG + (BD + BG) \cdot DG \cdot DB]; \end{aligned}$$

وإذا طرحنا $BG \cdot (BD + BG)DG$ من حذّي الفرق نحصل على

$$\begin{aligned} c_0 - c &= AB^2 \cdot DG + (BD + BG) \cdot DG \cdot GC - \\ &\quad - [BG^2 \cdot DG + (BD + BG) \cdot DG \cdot DG]; \end{aligned}$$

وإذا طرحنا من الحذّين $AB^2 \cdot DG$ ، نحصل على

$$c_0 - c = (BD + BG)DG \cdot GC - (BD + BA)DA \cdot DG.$$

وإذا وضعنا $DG = X$ ، يكون لدينا

$$c_0 - c = (2DB - X)X(CD + X) - (DB + BA) \cdot DA \cdot X;$$

وإذا أخذنا بالاعتبار أن

$$2DB \cdot CD = (BD + BA)DA$$

نحصل على

$$c_0 - c = (2DB - CD)X^2 - X^3$$

أي على

$$X^3 + c_0 - c = (2DB - CD)X^2;$$

إن $X = DG$ حل لهذه المعادلة، فنستج

$$x_1 = BG = BD - DG = x_0 - X.$$

خلاصة:

نأخذ المعادلة

$$x^2 = \frac{2}{3}BC \cdot x + \frac{1}{3}AB^2 \quad (٦)$$

التي يسمح جذورها x_0 باحتساب c_0

$$c_0 = bx_0 + x_0^2 (a - x_0);$$

- فإذا كان $c_0 > c$ تكون المسألة مستحيلة؛

- وإذا كان $c = c_0$ يكون للمسألة حلٌّ هو x_0 ؛

- وإذا كان $c_0 < c$ يكون لها حلان x_1 و x_2 بحيث يكون

$$x_1 < x_0 < x_2.$$

وفي الحالة الأخيرة هذه:

- إذا كان $c = ab$ يكون $x_2 = a$ و $x_1 = \sqrt{b}$.

- إذا كان $c < ab$ أو $c > ab$ ، نأخذ المعادلة

$$x^3 + (3x_0 - a)x^2 = c_0 - c \quad (٨)$$

ونسمي X حلُّها؛ فيكون $x_2 = x_0 + X$. من ثم نأخذ المعادلة

$$x^3 + (c_0 - c) = (3x_0 - a)x^2 \quad (١٢)$$

فإذا كان X حلًّا لها (انظر التعليق) يكون $x_1 = x_0 - X$.

الحالة الثالثة: $a < b$ ، أي $BC < AB$.

ليكن BD جذراً للمعادلة

$$\frac{b}{3} + \frac{2a}{3}x = x^2 \quad (٦)$$

فيكون

$$\frac{AB^2}{3} + \frac{2BC}{3} \cdot BD = BD^2.$$

لنبرهن أن

(الشكل رقم (٣ - ٦٢)) $BC < BD < AB$



الشكل رقم (٣ - ٦٢)

١ - لدينا $BD > BC$ ؛ فإذا كان $BD = BC$ ، يكون لدينا، استناداً إلى (٦)

$$\frac{BD^2}{3} = BD^2 - \frac{2}{3}BD \cdot BC = \frac{1}{3}AB^2$$

لكن

$$\frac{1}{3}BD^2 = \frac{1}{3}BC^2 < \frac{1}{3}AB^2,$$

فهذا خُلف. وإذا كان $BD < BC$ يكون

$$BD^2 - \frac{2}{3}BD \cdot BC < \frac{1}{3}BD^2 < \frac{1}{3}BC^2 < \frac{1}{3}AB^2,$$

وهذا خُلف.

٢ - ولدينا $BD < AB$. فإذا كان $BD = AB$ يكون

$$BD^2 - \frac{2}{3}BC \cdot BD = AB^2 - \frac{2}{3}BC \cdot AB = \frac{1}{3}AB^2;$$

لكن

$$AB^2 - \frac{2}{3}BC \cdot AB > \frac{1}{3}AB^2,$$

وهذا خُلف.

وإذا كان $BD > AB$ ، يكون

$$BD^2 - \frac{2}{3}BC \cdot BD > BD^2 - \frac{2}{3}AB \cdot BD > BD^2 > \frac{1}{3}AB^2,$$

وهذا خُلف. فيكون في النتيجة $BD < AB$.

دراسة النهاية العظمى

لدينا، استناداً إلى (٦)

$$AB^2 \cdot 2BC \cdot BD = 3BD^2,$$

فيكون

$$(AB + BD) \cdot AD + 2BC \cdot BD = 2BD^2,$$

فيكون

$$(AB + BD) \cdot AD = 2BD \cdot CD;$$

وبالتالي

$$\frac{AB + BD}{2BD} = \frac{CD}{AD}.$$

نضع، في المعادلة ٢٥، $BD = x$ ، فيكون لدينا

$$bx = x^3 + (AB + BD) \cdot AD \cdot BD$$

ويكون

$$c - ax^2 = (AB + BD) \cdot AD \cdot BD.$$

ومن ثم نضع

$$c_0 = BD^2 \cdot BC + (AB + BD) \cdot AD \cdot BD,$$

فإذا برهنا أنه بالنسبة إلى كل x (إن كان $x = BE > BD$ ، أو كان $x = BE < BD$)،
لدينا

$$c = BE^2 \cdot BC + (AB + BE) \cdot AE \cdot BE < c_0,$$

نكون قد برهنا استحالة المسألة إذا ما كان $c > c_0$.

١ - نفرض أن $x > BD$ (الشكل رقم (٣ - ٦٣))



الشكل رقم (٣ - ٦٣)

١ - ١. إذا كان $BD < BE < BA$ ، يكون $c < c_0$.

فلدينا، استناداً إلى (٦)

$$2BD \cdot CD = (AB + BD) \cdot AD$$

لكن

$$(AB + BE) \cdot AE < (AB + BD) \cdot AD,$$

و

$$(EB + BD) \cdot DC > 2BD \cdot DC,$$

فيكون

$$(EB + BD) \cdot DC > (AB + BE) \cdot AE,$$

وبالتالي

$$\frac{EB + BD}{AB + BE} > \frac{AE}{DC},$$

فيكون

$$\frac{(EB + BD) \cdot DE}{(AB + BE) \cdot AE} > \frac{DE}{DC},$$

ويكون

$$(EB + BD) \cdot DE \cdot DC > (AB + BE) \cdot AE \cdot DE;$$

وإذا طرحنا $(AB + BE) \cdot AE \cdot DC$ من كلا الطرفين:

$$(AB + BD) \cdot AD \cdot DC > (AB + BE) \cdot AE \cdot EC;$$

وإذا أضفنا

$$(AB + BE)AE \cdot BC + (BE + BD) \cdot ED \cdot BC,$$

إلى طرفي المعادلة، نحصل على:

$$(AB + BD) \cdot AD \cdot BD > (AB + BE)AE \cdot EB + (BE + BD) \cdot ED \cdot BC;$$

وإذا أضفنا إلى كلا الطرفين $DB^2 \cdot BC$ ، نحصل على

$$c_0 > (BA + BE)AE \cdot BE + BE^2 \cdot BC,$$

فيكون

$$c_0 > c.$$

١ - ٢ - إذا كان $BD < BE = AB$ ، يكون $c < c_0$ (الشكل رقم (٣ - ٦٤)).



الشكل رقم (٣ - ٦٤)

فلدينا

$$c = BC \cdot BE^2 = BC \cdot AB^2$$

فيكون بالتالي

$$c < c_0.$$

١ - ٣. لنضع الآن $x = BI$ ولنبرهن أنه إذا كان $BD < AB < BI$ ، يكون $c < c_0$ (الشكل رقم (٣ - ٦٥)).



الشكل رقم (٣ - ٦٥)

بما أن لدينا

$$BI^3 - AB^2 \cdot BI = (BI + BA)AI \cdot BI,$$

يحصل

$$c = BC \cdot BI^2 - (BI + BA)AI \cdot BI;$$

لكن

$$c < BC \cdot BI^2 - (IB + BA) \cdot AI \cdot BC = BA^2 \cdot BC,$$

وبالتالي يكون

$$BA^2 \cdot BC < c_0,$$

ومنه النتيجة المطلوبة.

٢. نفرض أن $x < BD$.

١ - ٢. لنضع $x = BG$ ولنبرهن أنه إذا كان $BC < BG < BD$ ، يكون $c < c_0$ (الشكل رقم (٣ - ٦٦)).



الشكل رقم (٣ - ٦٦)

لدينا

$$AB^2 \cdot BG - BG^3 = (AB + BG)AG \cdot BG$$

وبالتالي

$$c = BC \cdot BG^2 + (AB + BG) \cdot AG \cdot BG;$$

لكن استناداً إلى (٦) لدينا

$$2BD \cdot CD = (AB + BD)AD,$$

فيكون

$$(AB + BD) \cdot AD > (DB + BG)CG,$$

ومنها

$$\frac{AB + BD}{DB + BG} > \frac{CG}{AD}$$

فيكون

$$\frac{(AB + BD) \cdot AD}{(DB + BG) \cdot DG} > \frac{CG}{DG}$$

وبالتالي

$$(AB + BD) \cdot AD \cdot DG > (DB + BG)DG \cdot CG;$$

وإذا أضفنا $(AB + BD)AD \cdot CG$ إلى كلا الطرفين، نحصل على

$$(AB + BD)AD \cdot DC > (AB + BG)AG \cdot CG;$$

وإذا أضفنا

$$[(AB + BD) \cdot DA + (BD + BG) \cdot DG] \cdot BC,$$

إلى كلا الطرفين، نحصل على

$$(BA + BD) \cdot AD \cdot BD + (BD + BG) \cdot DG \cdot BC > (BA + BG)AG \cdot BG;$$

وبإضافة $BC \cdot BG^2$ إلى كلا الطرفين نحصل على:

$$c_0 > c$$

٢ - ٢. إذا كان $BG = BC < BD$ يكون $c < c_0$ (الشكل رقم (٣ - ٦٧)).



الشكل رقم (٣ - ٦٧)

فلدينا

$$c = AB^2 \cdot BG = AB^2 \cdot BC$$

وأيضاً

$$(AB + BD) \cdot AD \cdot BD > (AB + BD) \cdot AD \cdot BC;$$

وإذا أضفنا $(DB + BC) \cdot DC \cdot BC$ إلى كلا الطرفين، نحصل على


$$(AB + BD) \cdot AD \cdot BD + (DB + BC)DC \cdot BC > (AB + BC) \cdot AC \cdot BC;$$

وإذا أضفنا BC^3 إلى كلا الطرفين، نحصل على:

$$c_0 > AB^2 \cdot BC,$$

ومنها النتيجة المطلوبة.

٢ - ٣ - لنضع $x = BJ$ ولنبرهن أنه إذا كان $BJ < BC < BD$ يكون $c < c_0$ (الشكل رقم (٣ - ٦٨)).



الشكل رقم (٣ - ٦٨)

فلدينا

$$BC \cdot BJ^2 - BJ^3 = BJ^2 \cdot JC,$$

لذلك

$$c = AB^2 \cdot BJ + BJ^2 \cdot JC,$$

لكن

$$AB^2 \cdot BC > AB^2 \cdot BJ + BJ^2 \cdot JC,$$

فيكون

$$c_0 > AB^2 \cdot BC,$$

وبالتالي

$$c_0 > c.$$

من ١ و ٢ نستنتج أن أي x يعطي $c > c_0$. لذلك نستطيع أن نقول ما يلي:

- إذا كان $c > c_0$ تكون المسألة مستحيلة؛

- إذا كان $c = c_0$ يكون $BD = x_0$ الحل الوحيد؛

- إذا كان $c < c_0$ يكون للمسألة حلان x_1 و x_2 يحققان

$$x_1 < x_0 = BD < x_2 .$$


تحديد الجذر الأكبر x_2

ليكن $BK = BD$ ولنضع $KM = DC$ ولنأخذ المعادلة من النوع ١٥ التالية:

$$x^3 + DM \cdot x^2 = c_0 - c \quad (١٥)$$

ولیکن $X = DE$ حلها (الشكل رقم (٣ - ٦٩))، فيكون

$$c_0 - c = DE^2 \cdot EM$$



الشكل رقم (٣ - ٦٩)

١ - إذا كان $DE < AD$ ؛ في هذه الحالة يكون $x_2 = BE = BD + DE$

فلدینا، استناداً إلى (٦)

$$2DB \cdot CD = (AB + BD) \cdot AD ,$$

ولدينا

$$(EB + BD) \cdot DE = DE^2 + 2BD \cdot ED.$$

فيكون

$$I = (EB + BD) \cdot DE \cdot DC = DE^2 \cdot DC + (AB + BD)AD \cdot ED.$$

ونضع

$$II = (AB + BE)AE \cdot ED ,$$

فنحصل على

$$I = DE^2 \cdot DC + II + (EB + ED)ED^2 ,$$

$$I = II + ED^2 \cdot EM .$$

وبإضافة $DC \cdot AE \cdot (AB + BE)$ إلى كلا الطرفين، نحصل على

$$(AB + BD)AD \cdot DC = (AB + BE) \cdot AE \cdot EC + ED^2 \cdot EM;$$

وإذا أضفنا $BC \cdot ED \cdot (EB + BD) + AE \cdot (AB + BE)$ إلى كلا الطرفين، نحصل على:

$$(AB + BD)AD \cdot DB =$$

$$= (AB + BE)AE \cdot EB + (EB + BD)ED \cdot BC + ED^2 \cdot EM;$$

وأخيراً، إذا أضفنا $BC \cdot BD^2$ إلى كلا الطرفين، نحصل على:

$$c_0 = (AB + BE) \cdot AE \cdot EB + EB^2 \cdot BC + ED^2 \cdot EM;$$

لكن، استناداً إلى (١٥)، لدينا

$$c_0 - c = EM \cdot ED^2$$

وبالتالي

$$c = AB^2 \cdot EB + BC \cdot EB^2 - EB^3$$

فيكون BE الحل الأكبر للمعادلة ٢٥.

٢ - إذا كان $DE = AD$ ؛ في هذه الحالة يكون $x_2 = AB$.

فلدينا

$$c = AB^2 \cdot BC,$$

لكن

$$\begin{aligned} AD^2 \cdot AM &= AD^2 \cdot MK + AD^2(AD + DK), \\ &= AD^2 \cdot DC + AD^2(AB + BD), \end{aligned}$$

وبالتالي

$$AD^2 \cdot AM = (AB + BD) \cdot AD \cdot DC.$$

وإذا أضفنا $BC \cdot (AB + BD)AD$ إلى كلا الطرفين، نحصل على

$$AD^2 \cdot AM + (AB + BD)AD \cdot BC = (AB + BD)AD \cdot BD;$$

ومن ثم، إذا ما أضفنا إلى كلا الطرفين $BC \cdot BD^2$ ، نحصل على

$$AD^2 \cdot AM + AB^2 \cdot BC = c_0;$$

لكن

$$AD^2 \cdot AM = c_0 - c,$$

ومنها


$$c = AB^2 \cdot BC,$$

فيكون $x_2 = AB$ الجذر الأكبر للمعادلة ٢٥.

٣ - إذا كان $X = DI$ حل المعادلة (١٥)، يكون

$$c_0 - c = DI^2 \cdot IM.$$

فإذا كان $DI > AD$ ، يكون $x_2 = BI = BD + DI$ (الشكل رقم (٣ - ٧٠)).



الشكل رقم (٣ - ٧٠)

فقد برهنا أن

$$c_0 = BC \cdot BD^2 + AB^2 \cdot BD - BD^3 = (AB + BD)AD \cdot BD + BD^2 \cdot BC.$$

ولنضع

$$I = BD^3, II = BC \cdot BD^2 + AB^2 \cdot BD.$$

وإذا أضفنا $ID \cdot BC + AB^2 \cdot ID$ إلى كلا الحدين، نحصل على

$$I' = BD^3 + (IB + BD)ID \cdot BC + AB^2 \cdot ID,$$

$$II' = BI^2 \cdot BC + AB^2 \cdot BI,$$

والفرق بينهما لا يتغير وهو مساوٍ لـ c_0 .

وبإضافة $ID \cdot AI \cdot (IB + BA) \cdot CD + (IB + BD) \cdot ID$ إلى I' ، نحصل على

$$III + I' = BI^3,$$

فيكون

$$c_0 - III = BI^2 \cdot BC + AB^2 \cdot BI - BI^3 \quad (١٦)$$

لكن

$$\begin{aligned} (IB + BD)ID \cdot CD &= ID^2 \cdot CD + 2BD \cdot CD \cdot ID \\ &= ID^2 \cdot CD + (AB + BD)AD \cdot ID \end{aligned}$$

فيكون

$$\begin{aligned}
 III &= ID^2 \cdot CD + (IB + BD) \cdot ID^2 \\
 &= ID^2 \cdot KM + (ID + 2BD) \cdot ID^2 \\
 &= ID^2 \cdot KM + (ID + DK)ID^2 \\
 &= ID^2 \cdot KM + IK \cdot ID^2 \\
 &= ID^2 \cdot IM;
 \end{aligned}$$

لكن

$$ID^2 \cdot IM = c_0 - c,$$

فَنَحْصِلُ اسْتِنَاداً إِلَى (١٦) عَلَى

$$c = AB^2 \cdot BI + BC \cdot BI^2 - BI^3,$$

لذلك، فإن $BI = x_2$ هو الجذر الأكبر للمعادلة ٢٥.


حصر الحل الأكبر

لنأخذ المعادلة (١١)

$$x^2 = BC \cdot x + AB^2$$

ولیکن BI حلها (النقطة I هنا تختلف عن النقطة I المذكورة سابقاً). ولنبرهن أنه مهما كان الجذر الأكبر للمعادلة ٢٥، يكون لدينا

$$BD < x_2 < BI \quad (\text{الشكل رقم (٣ - ٧١)})$$



الشكل رقم (٣ - ٧١)

فلدينا

$$BI^2 = BC \cdot BI + AB^2,$$

ومنها

$$BI^3 = BC \cdot BI^2 + AB^2 \cdot BI$$

فلا يمكن لـ BI أن يكون جذراً للمعادلة ٢٥؛ فلو كان كذلك لَحْصَلْ


$$BI^3 + c = BC \cdot BI^2 + AB^2 \cdot BI = BI^3,$$

وهذا خُلف.

وكذلك، فإن أي حل للمعادلة ٢٥، هو أصغر من BI . نسجل هنا أن الطوسي

لا يبرر تأكيده هذا. (راجع التعليق).

ولنبرهن الآن أن أي x ، $x = BO$ ، $BD < BO < BI$ ، يمكن اعتباره حلاً لمعادلة من النوع ٢٥، (الشكل رقم (٣ - ٧٢)).



الشكل رقم (٣ - ٧٢)

فليكن $x = BO$ ؛ لدينا:

$$BI^3 - BO^3 = BO^2 \cdot IO + (IB + BO)IO \cdot IB$$

فيكون، استناداً إلى (١١)

$$BI^3 - BO^3 = BC \cdot BI^2 + AB^2 \cdot BI - BO^3,$$

لكن

$$(BC \cdot BI^2 + AB^2 \cdot BI) - (BC \cdot BO^2 + AB^2 \cdot BO)$$

$$= AB^2 \cdot IO + (IB + BO) \cdot IO \cdot BC,$$

وبما أن $BI > BC$ ، يكون لدينا

$$AB^2 \cdot IO + (IB + BO)IO \cdot BC < OB^2 \cdot IO + (IB + BO)IO \cdot IB$$

وبالتالي

$$BO^3 < BC \cdot BO^2 + AB^2 \cdot BO;$$

فإذا وضعنا

$$BC \cdot BO^2 + AB^2 \cdot BO - BO^3 = c$$

يكون BO حلاً لمعادلة من النوع ٢٥.

تحديد الجذر الأصغر

لنأخذ المعادلة من النوع ٢١


$$x^3 + c_0 - c = DM \cdot x^2 \quad (١٢)$$

وليكن DE حلاً لها؛ فيكون

$$DE^2 \cdot EM = c_0 - c$$

١ - إذا كان $DE < DC$ ؛ في هذه الحالة يكون

$$x_1 = BE = BD - DE \quad (\text{الشكل رقم (٣ - ٧٣)})$$



الشكل رقم (٣ - ٧٣)

فلقد رأينا أن

$$I = (AB + BD)AD \cdot DE = 2BD \cdot CD \cdot DE$$

ولدينا

$$\begin{aligned} II &= 2BD \cdot CD \cdot DE = 2BD \cdot DE \cdot CD \\ &= DE^2 \cdot DC + (DB + BE)DE \cdot DC. \end{aligned}$$

لكن

$$(DB + BE) \cdot DE^2 = EK \cdot DE^2$$

و

$$DE^2 \cdot DC = MK \cdot DE^2$$

فيكون

$$(DB + BE) \cdot DE^2 + DE^2 \cdot DC = EM \cdot DE^2.$$

وإذا أضفنا إلى I و II $(AB + BD)AD \cdot EC$ ، نحصل على

$$I' = (AB + BD) \cdot AD \cdot DC,$$

$$II' = (AB + BE) \cdot AE \cdot EC + DE^2 \cdot EM;$$

وإذا أضفنا إلى I' و II' $(AB + BD) \cdot AD \cdot BC$ ، نحصل على

$$I'' = (AB + BD) \cdot AD \cdot DB$$

$$II'' = (AB + BE) \cdot AE \cdot EC + DE^2 \cdot EM + (AB + BD)AD \cdot BC;$$

وإذا أضفنا إلى I'' و II'' $(DB + BE) \cdot DE \cdot BC$ ، نحصل على

$$I''' = (AB + BD) \cdot AD \cdot DB + (DB + BE) \cdot DE \cdot BC,$$

$$II''' = (AB + BE) \cdot AE \cdot BE + DE^2 \cdot EM;$$

وأخيراً إذا أضفنا $BE^2 \cdot BC$ ، إلى كلا التعبيرين، نحصل على

$$c_0 = (AB + BD) \cdot AD \cdot BD + BD^2 \cdot BC$$

$$= (AB + BE) \cdot AE \cdot EB + BE^2 \cdot BC + DE^2 \cdot EM$$


لكن

$$c_0 = c + DE^2 \cdot EM,$$

فيكون

$$AB^2 \cdot EB + BC \cdot EB^2 - AB^3 = c$$

٢ - إذا كان $DE = DC$ ؛ في هذه الحالة يكون $x_1 = BC$ (الشكل رقم (٧٤ - ٣)).



الشكل رقم (٧٤ - ٣)

فلقد رأينا أن

$$(AB + BD) \cdot AD \cdot CD = 2BD \cdot CD^2 = DK \cdot CD^2 = CM \cdot CD^2;$$

وإذا أضفنا $(AB + BD) \cdot AD \cdot BC$ نحصل على

$$(AB + BD) \cdot AD \cdot BD = (AB + BD) \cdot AD \cdot BC + CM \cdot CD^2;$$

وإذا أضفنا أيضاً $BD^2 \cdot BC$ إلى كلا الطرفين، نحصل على

$$c_0 = (AB + BD) \cdot AD \cdot BD + BD^2 \cdot BC = AB^2 \cdot BC + DC^2 \cdot CM;$$

لكن

$$c_0 - c = DC^2 \cdot CM,$$

فيكون

$$c = AB^2 \cdot BC;$$


لكن، لدينا

$$BC^3 + AB^2 \cdot BC - BC \cdot BC^2 = AB^2 \cdot BC = c,$$

فيكون $BC = x_1$ الجذر الأصغر للمعادلة ٢٥.

٣ - إذا كان جذر المعادلة ١٢، DI يحقق

$$DC < DI < DB = x_0 \quad \text{(الشكل رقم (٧٥ - ٣))}$$



الشكل رقم (٧٥ - ٣)

في هذه الحالة يكون $x_1 = BI = BD - DI$ جذراً للمعادلة ٢٥.

فلدينا

$$BC \cdot BD^2 + AB^2 \cdot BD - BD^3 = c_0.$$

وإذا وضعنا

$$II = BD^3 \text{ و } I = BC \cdot BD^2 + AB^2 \cdot BD$$

$$c_0 = I - II.$$

فإذا طرحنا $(DB + BI) \cdot DI \cdot BI + DB^2 \cdot DI$ من كلا الطرفين، نحصل على:

$$I' = BC \cdot BD^2 + AB^2 \cdot BD - (DB + BI) \cdot DI \cdot BI - DB^2 \cdot DI$$

و

$$II' = BI^3$$

و

$$c_0 = I' - II'.$$

وإذا وضعنا

$$III = (DB + BI) \cdot DI \cdot CI + (AB + BD) \cdot AD \cdot DI.$$

يكون لدينا

$$c_0 = (I' - III) - II' + III$$

وبالتالي

$$c_0 = BI^2 \cdot BC + AB^2 \cdot BI - BI^3 + III.$$

لكن

$$(AB + BD) \cdot AD \cdot DI = 2BD \cdot CD \cdot DI = DI^2 \cdot DC + (DB + IB)DI \cdot DC$$

فيكون

$$\begin{aligned} III &= DI^2 \cdot MK + (DB + BI)DI \cdot (DC + DI) \\ &= DI^2 \cdot MK + IK \cdot DI^2 = DI^2 \cdot IM = c_0 - c \end{aligned}$$

وبالتالي


$$c = BI^2 \cdot BC + AB^2 \cdot BI - BI^3,$$

فيكون $BI = x_1$ الجذر الأصغر للمعادلة ٢٥.

العلاقة بين المعادلة ٢٥ والمعادلة ١٥

ليكن $x_2 = BE$ الجذر الأكبر للمعادلة ٢٥.

١ - الحالة $DE < DA$ و $BD < BE < BA$ ، (الشكل رقم (٣ - ٧٦)).



الشكل رقم (٣ - ٧٦)

في هذه الحالة يكون

$$c_0 = (BA^2 - BD^2) \cdot BD + BD^2 \cdot BC$$

ومنها

$$c_0 = BD(BA^2 - BE^2) + BD(BE^2 - BD^2) + BD^2 \cdot BC$$

وإذا كان BE جذراً للمعادلة ٢٥، يكون

$$c = BE(BA^2 - BE^2) + BE^2 \cdot BC$$

فيكون

$$c = BD(BA^2 - BE^2) + DE(BA^2 - BE^2) + (BE^2 - BD^2) \cdot BC + BD^2 \cdot BC.$$

فإذا وضعنا

$$I = BD(BE^2 - BD^2)$$

$$II = ED(BA^2 - BE^2) + BC(BE^2 - BD^2)$$

يكون لدينا

$$c_0 - c = I - II;$$

وإذا طرحنا $BC(BE^2 - BD^2)$ من كلا الحدين، يبقى

$$I' = CD(BE^2 - BD^2)$$

و

$$II' = ED(BA^2 - BE^2).$$

وإذا وضعنا $X = DE$ ، نحصل على:

$$I' = 2DB \cdot DC \cdot X + DC \cdot X^2,$$

$$II' = (AB + BD + X)(AD - X) \cdot X,$$

$$= (AB + BD)AD \cdot X - 2BD \cdot X^2 - X^3;$$

لكن

$$I' = II' + c_0 - c$$

فيكون

$$2DB \cdot DC \cdot X + DC \cdot X^2 = (AB + BD) \cdot AD \cdot X - 2BD \cdot X^2 - X^3 + c_0 - c$$

لكن

$$2DB \cdot DC = (AB + BD)AD;$$


فيكون

$$X^2(2BD + DC) + X^3 = c_0 - c,$$

ويكون $X = DE$ جذراً لمعادلة من النوع ١٥. فنحسب DE ونستنتج x_2 ؛
 $x_2 = BE = x_0 + X$

٢. الحالة $DE = DA$ ؛ في هذه الحالة يكون $x_2 = BE = BA$

٣. الحالة $DA > DG$ (الشكل رقم (٣ - ٧٧))، حيث نفرض أن $x_2 = BG$



الشكل رقم (٣ - ٧٧)

فيكون

$$c_0 = BD \cdot AB^2 + BD^2 \cdot BC - BD^3;$$

ومن جهة أخرى

$$BD \cdot AB^2 + GD \cdot AB^2 = (GD + DB)AB^2 = GB \cdot AB^2$$

$$BD^2 \cdot BC + (GB + BD)GD \cdot BC = GB^2 \cdot BC$$

$$BG^3 = BD^3 + BG^2 \cdot GD + (GB^2 - BD^2)BD$$

فإذا وضعنا

$$I = (AB^2 \cdot BG + BC \cdot BG^2) - (AB^2 \cdot BD + BD^2 \cdot BC)$$

$$= AB^2 \cdot GD + (GB^2 - BD^2)BC,$$

$$II = BG^3 - BD^3 = GB^2 \cdot GD + (GB^2 - BD^2) \cdot BD,$$

يكون لدينا

$$c_0 - c = II - I.$$

وإذا طرحنا $BC \cdot (GB^2 - BD^2)$ ، من كلا الحدين، نحصل على

$$\begin{aligned} I' &= AB^2 \cdot GD, \\ II' &= GB^2 \cdot GD + (GB^2 - BD^2) \cdot CD, \end{aligned}$$

وبالتالي يكون

$$c_0 - c = (GB^2 - AB^2)GD + (GB^2 - BD^2) \cdot CD.$$

فإذا وضعنا $GD = X$ ، يكون

$$\begin{aligned} (GB^2 - AB^2) \cdot GD &= (GB + BA)GA \cdot GD = (AB + BD + X)(X - AD) \\ &= 2BD \cdot X^2 + X^3 - (AB + BD)AD \cdot X, \end{aligned}$$

ويكون

$$\begin{aligned} (GB^2 - BD^2)CD &= (GB + BD)GD \cdot CD = (2BD + X) \cdot X \cdot CD \\ &= 2BD \cdot CD \cdot X + CD \cdot X^2. \end{aligned}$$

لكن من المعلوم أن

$$2BD \cdot CD = (AB + BD)AD,$$

فيكون

$$c_0 - c = (2BD + CD)X^2 + X^3,$$

ويكون $X = GD$ جذراً لمعادلة من النوع ١٥، فنجد X ونستنتج
 $x_2 = BD + DG = BG$

العلاقة بين المعادلة ٢٥ والمعادلة ٢١

ليكن $x_1 = BK$ الجذر الأصغر للمعادلة ٢٥، وليكن DK فائض BK على
 $BD = x_0$

١ - الحالة $DK < DC$ و $BD > BK > BC$ (الشكل رقم (٣ - ٧٨)).

في هذه الحالة لدينا

$$AB^2 \cdot BK - KB^3 = KB(AB^2 - BK^2) = KB[(AB^2 - BD^2) + (BD^2 - BK^2)]$$

فيكون

$$c = BC \cdot BK^2 + KB[(AB^2 - BD^2) + (BD^2 - BK^2)],$$

وبالتالي، على

$$X(AB + BD) \cdot AD = c_0 - c + 2BD \cdot CD \cdot X + X^3 - (2BD + CD)X^2;$$

لكننا نعلم أن

$$(AB + BD)AD = 2BD \cdot CD,$$


فيكون

$$X^3 + c_0 - c = X^2(2BD + CD),$$

ويكون $X = DK$ جذراً لمعادلة من النوع ٢١. فما علينا إلا أن نجد $X = DK$ ونستنتج $x_1 = BD - DK = BK$.

٢ - الحالة $DK = DC$ ؛ في هذه الحالة يكون $x_1 = BC = BD - DC$.

٣ - الحالة $x_1 = DE > DC$ ؛ (الشكل رقم (٣ - ٧٩))؛



الشكل رقم (٣ - ٧٩)

نضع

$$x_1 = BE = BD - DE,$$

فيكون لدينا

$$AB^2 \cdot BD - DE \cdot AB^2 = AB^2 \cdot BE,$$

$$CB \cdot BD^2 - DE(DB + BE) \cdot BC = CB \cdot BE^2,$$

وبالتالي

$$AB^2 \cdot BD + CB \cdot BD^2$$

$$= AB^2 \cdot BE + CB \cdot BE^2 + DE \cdot AB^2 + DE(DB + BE) \cdot BC;$$

ومن جهة أخرى، لدينا

$$BD^3 = BE^3 + BD^2 \cdot DE + (BD + BE) \cdot DE \cdot BE,$$

فنستنتج

$$c_0 - c =$$

$$= DE \cdot AB^2 + (DB + BE)DE \cdot BC - [BD^2 \cdot DE + (BD + BE)DE \cdot BE];$$

ونطرح $BE \cdot DE \cdot (DB + BE)$ من حذّي الفرق فنجد:

$$c_0 - c = DE \cdot AB^2 + (DB + BE)DE \cdot EC - DB^2 \cdot DE;$$

وبطرح $DE \cdot DB^2$ من كل من حدي هذا الفرق، نحصل على

$$c_0 - c = DE \cdot (AB + BD) \cdot DA + (DB + BE)DE \cdot EC.$$

فإذا وضعنا $DE = X$ ، نحصل على

$$c_0 - c = (AB + BD)DA \cdot X + (2DB - X)(X - DC) \cdot X,$$

وبالتالي

$$c_0 - c = (AB + BD)DA \cdot X + (2DB + DC)X^2 - X^3 - 2DB \cdot CB \cdot X;$$

لكننا نعلم أن

$$(AB + BD) \cdot DA = 2DB \cdot CB,$$

فيكون

$$c_0 - c + X^3 = (2DB + DC)X^2;$$

ويكون X حلًا لمعادلة من النوع ٢١. نحتسب إذن $X = DE$ ، ثم نستخلص $x_1 = BE = BD - DE$.

خلاصة:

نأخذ المعادلة

$$\frac{2}{3}ax + \frac{1}{3}b = x^2,$$

ونحتسب حلّها x_0 ، ثم نحتسب

$$c_0 = ax_0^2 - x_0^3 + bx_0.$$

- فإذا كان $c > c_0$ تكون المسألة مستحيلة؛

- وإذا كان $c = c_0$ تكون المسألة ممكنة ويكون x_0 حلّها الوحيد؛

- وإذا كان $c < c_0$ يكون للمسألة حلّان x_1 و x_2 بحيث

$$x_1 < x_0 < x_2.$$

فنأخذ التفاوت $c_0 - c$ والمعادلة

$$x^3 + (3x_0 - a)x^2 = c_0 - c;$$

ونأخذ حلها X ، فيكون

$$x_2 = x_0 + X;$$

ثم نأخذ المعادلة

$$x^3 + c_0 - c = (3x_0 - a)x^2$$

ونأخذ حلها الأصغر X ، فيكون

$$x_1 = x_0 - X.$$

تعليق

تكتب المعادلة ٢٥ على الشكل

$$x^3 + c = ax^2 + bx.$$

ويحلها الطوسي في كل من الحالات الرئيسة الثلاث التالية:

الحالة الرئيسة الأولى: $a = b^{\frac{2}{3}}$.

تكتب المعادلة في هذه الحالة كما يلي:

$$x^3 + c = ax^2 + a^2x$$

١ - يميز الطوسي بين حالات ثلاث أ، ب و ج

أ - $a^3 > c$. في هذه الحالة تكون المسألة مستحيلة:

- فإذا كان $x \geq b^{\frac{2}{3}}$ يكون لدينا

$$c = bx - x^2(x - b^{\frac{2}{3}}) \leq bx - b(x - b^{\frac{2}{3}}) = b^{\frac{2}{3}} = a^3;$$

وهذا خُلف.

- وإذا كان $x < b^{\frac{2}{3}}$ يكون

$$c = bx + x^2(b^{\frac{2}{3}} - x) < bx + b(b^{\frac{2}{3}} - x) = b^{\frac{2}{3}} = a^3,$$

وهذا خُلف.

ب - $c = a^3$. في هذه الحالة تصبح المعادلة

$$x^3 + a^3 = ax^2 + a^2x,$$

فيكون $x = a$ حلاً لها .

نسجل أن $x = a$ هو، في هذه الحالة جذر مزدوج وأن $-a$ هو الجذر الثالث .

ج - $a^3 < c$. وفي هذه الحالة يكون للمعادلة جذران x_1 و x_2 يحققان العلاقة التالية :

$$x_1 < a < x_2.$$

نلاحظ أن الطوسي، عند دراسته لهذه الحالة، يتبع الطريق نفسه الذي سلكه لدى معالجته للمعادلة السابقة (المعادلة ٢٤ (المترجم))، لكن من دون أن يصرّح بذلك . فإذا وضعنا

$$f(x) = ax^2 + a^2x - x^3,$$

يكون لدينا

$$f'(x) = 2ax + a^2 - 3x^2,$$

ويكون

$$f'(a) = 0$$

وبالتالي يكون

$$f(a) = \sup_{x>0} f(x) = a^3 \quad (= \text{النهاية العظمى لـ } f(x), x > 0).$$

٢ - تحديد x_2

ليكن X حل المعادلة من النوع ١٥ :

$$x^3 + 2ax^2 = a^3 - c$$

فيكون $x_2 = a + X$ جذراً للمعادلة ٢٥ .

فلدينا

$$X^2(X + 2a) + c = a^3 \quad (1)$$

وإذا أضفنا a^2X إلى كلا الطرفين نحصل على

$$(X + a)^2 \cdot X + c = a^2(a + X),$$

فإذا أضفنا $a \cdot (X + a)^2$ إلى كلا الطرفين، نحصل على

$$(X + a)^3 + c = a(a + X)^2 + b(a + X);$$

ويكون $a + X$ جذراً للمعادلة ٢٥.

حصر x_2

مهما كان العدد c ، $a^3 \in]0, c$ ، يكون لدينا

$$a < x_2 < 2a$$

فلدينا استناداً إلى (١)

$$X^2(X + 2a) < a^3$$

فإذا كان $a \geq X$ ، يكون $(X + 2a) \geq 3a^3$. وهذا خُلف؛ لذلك يكون

$$0 < X < a,$$

ومنها

$$a < x_2 < 2a.$$

لكن الطوسي لا يعالج هنا القضية العكسية (راجع الملاحظة في نهاية هذه الحالة).

٣ - تحديد x_1

ليكن X الجذر الموجب^(٩) للمعادلة من النوع ٢١:

$$x^3 + a^3 - c = 2ax^2,$$

فيكون $x_1 = a - X$ حلاً للمعادلة ٢٥.

فلدينا

$$a^3 = a^2(a - X) + (a - X)^2 \cdot X + (2a - X) \cdot X^2,$$

واستناداً إلى المعادلة ٢١

$$a^3 = X^2(2a - X) + c,$$

وبالتالي

$$a^2(a - X) + (a - X)^2 \cdot X + (a - X)^3 = c + (a - X)^3,$$

فيكون

$$a^2(a - X) + a(a - X)^2 = c + (a - X)^3;$$

(٩) المقصود هنا بالطبع، هو الجذر الأصغر، لأن الجذر الموجب الآخر أكبر من $\frac{4a}{3}$.

ويكون $x_1 = a - X$ حلاً للمعادلة ٢٥.

حصر x_1

مهما كان x_1 ، حيث $a \in]0, x_1[$ ، يوجد عدد c بحيث يكون x_1 جذراً للمعادلة ٢٥ (الخاصة بـ c (المترجم)). فيما أن

$$f(x_1) < f(a) = a^3,$$

يكون $c = f(x_1)$ عدداً مناسباً.

٤ - العلاقة بين المعادلة ٢٥ والمعادلة ١٥

إذا كان x_2 الجذر الأكبر للمعادلة ٢٥ يكون

$$a^3 - c = (x_2 - a)(x_2^2 - a^2);$$

فإذا وضعنا $X = x_2 - a$ يكون

$$a^3 - c = X^2(2a + X);$$

فيكون X جذراً لمعادلة من النوع ١٥، ويكون

$$x_2 = X + a.$$

٥ - العلاقة بين المعادلة ٢٥ والمعادلة ٢١

إذا كان x_1 الجذر الأصغر للمعادلة ٢٥، يكون

$$a^3 - c = (a + x_1)(a - x_1)^2,$$

فإذا وضعنا $X = a - x_1$ ، يحصل

$$a^3 - c = (2a - X)X^2;$$

فيكون X جذراً لمعادلة من النوع ٢١.

إيجازاً للحالة الأولى هذه يمكن القول إن النهاية العظمى لـ

$$f(x) = ax^2 - x^3 + a^2x$$

هي

$$\sup_{x \in]0, 2a[} f(x) = f(a) = a^3.$$

$$x \in]0, 2a[$$

فتكون أمام احتمالات ثلاثة:

- $c > f(a)$ ، فتكون المسألة مستحيلة؛

- $c = f(a)$ ، فيكون a جذراً مزدوجاً؛

- $c < f(a)$ ، فيكون للمعادلة حلان x_1 و x_2 يحققان

$$0 < x_1 < x_2 < 2a.$$

وهنا نضع $c = f(a) - k$ ونبنى معادلة من النوع ١٥ ومعادلة من النوع ٢١،
تعميانا بالتالي x_1 و x_2 .

ملاحظة: عندما يدرس الطوسي حصر الجذور (راجع المعادلة ٢٤)، يضع

$$f(x) = x \cdot g(x),$$

ويأخذ المعادلة

$$g(x) = 0;$$

التي يكون لها، بحسب الظروف، جذر أو جذران (موجبان)، يستخدمهما لحصر x_1
و x_2 . وفي حالتنا هذه لدينا

$$g(x) = ax + a^2 - x^2$$

التي لها جذر موجب واحد هو $\lambda = \frac{a(1+\sqrt{5})}{2}$. ويبرهن الطوسي عادة أن

$$a < x_2 < \lambda;$$

لكنه لا يقدم في هذه الحالة أي برهان ويعطي حصراً أقل دقة:

$$a < x_2 < 2a.$$

ونستطيع هنا أن نبرهن العكس، أي أن أي عدد β ، $\lambda \in]a, \beta[$ ، يقابله عدد
موجب c بحيث يكون β الجذر الأكبر للمعادلة ٢٥ الخاصة بـ c . فإذا كان $\lambda \in]a, \beta[$ ،
يكون $g(\beta) > 0$ فيكون


$$f(\beta) = \beta \cdot g(\beta) > 0$$

فأخذ $c = f(\beta)$.

وإذا لاحظنا أن $c = 0$ يقابله $x_1 = 0$ و $x_2 = \lambda$ ، وأن $c = a^3$ يقابله
 $x_1 = x_2 = a$ ، يكون قد تحدد، بديهياً التطبيقان المتقابلان

$$x_1 : [0, a^3] \longrightarrow [0, a]$$

$$x_2 : [0, a^3] \longrightarrow [a, \lambda].$$



الحالة الرئيسة الثانية: $a > b^{\frac{1}{3}}$

تُكتب المعادلة ٢٥ على الشكل التالي:

$$f(x) = x^2(a - x) + bx = c.$$

١ - دراسة النهاية العظمى

ليكن x_0 الجذر الموجب للمعادلة

$$f'(x) = 2ax + b - 3x^2 = 0 \quad (١)$$

لنبرهن أن

$$b^{\frac{1}{3}} < x_0 < a.$$

فلدينا أن $b^{\frac{1}{3}} \neq x_0$ لأنه لو كان $x_0 = b^{\frac{1}{3}}$ لحصل استناداً إلى (١)

$$2ab^{\frac{1}{3}} = 2b,$$

وهذا خُلف. ومن جهة أخرى، إذا كان $x_0 < b^{\frac{1}{3}}$ ، نحصل استناداً إلى (١) على

$$\frac{b^{\frac{1}{3}}}{3} < x_0 - \frac{2a}{3}$$

وإذا أضفنا $b^{\frac{1}{3}}$ إلى كلا الطرفين نحصل على

$$b^{\frac{1}{3}} < x_0 - \frac{2a}{3} + \frac{2}{3}b^{\frac{1}{3}} < x_0,$$

وهذا خلف. هكذا يتبين أن $b \leq x_0$. ومن جهة أخرى لدينا

$$\left(x_0 - \frac{2a}{3}\right) b \leq \left(x_0 - \frac{2a}{3}\right) x_0 = \frac{b}{3},$$

فيكون

$$\left(x_0 - \frac{2a}{3}\right) < \frac{b}{3} < \frac{a}{3},$$

ويكون بالتالي $x_0 < a$. هكذا نكون قد بينا أن $b \leq x_0 < a$.

لنأخذ الآن

$$f(x_0) = x_0^2(a - x_0) + bx_0;$$

ولنبرهن أن كل عدد x ، $x \neq x_0$ ، يحقق $f(x) < f(x_0)$.

$$x > x_0 \implies f(x) < f(x_0) - 1 - 1$$

هنا يميز الطوسي حالات ثلاثاً أ، ب و ج.

أ - عندما يكون $x_0 < x < a$ ؛ في هذه الحالة لدينا

$$f(x_0) = x_0^2(a - x) + x_0^2(x - x_0) + bx_0$$

$$f(x) = x_0^2(a - x) + (x^2 - x_0^2)(a - x) + bx_0 + b(x - x_0).$$

لكن $x - x_0 > 2x_0 > a - x$ لأن $x_0 > \frac{2a}{3}$ ، استناداً إلى (١)، فيكون

$$2x_0(x - x_0) > (a - x)(x - x_0),$$

ويكون

$$2x_0(a - x_0) > (x + x_0)(a - x)$$

و

$$x_0^2 - b = 2x_0(a - x_0) > (x + x_0)(a - x),$$

ومنها

$$f(x_0) > f(x).$$

ب - عندما يكون $x_0 < x = a$ يكون لدينا

$$f(a) = ab$$

$$f(x_0) = ab - b(a - x_0) + x_0^2(a - x_0);$$

ولكن $b \leq x_0$ ، فيكون

$$f(x_0) > f(x).$$

ج - عندما يكون $x_0 < a < x$ يكون لدينا

$$f(x) = bx - x^2(x - a) < bx - b(x - a),$$

وبالتالي

$$f(x) < ab$$

واستناداً إلى الحالة السابقة، يكون لدينا $f(x) < f(x_0)$.

$$. x < x_0 \implies f(x) < f(x_0) - ٢ - ١$$

وهنا أيضاً يميز الطوسي حالات ثلاثاً:

أ - عندما يكون $b^{\frac{1}{2}} < x < x_0$ يكون لدينا

$$f(x) = (x^2 - b)(x_0 - x) + x^2(a - x_0) +$$

$$+ b(x_0 - x) < x_0^2(a - x_0) + b(x_0 - x) < f(x_0).$$

فلدينا

$$(x_0 + x)(a - x_0) = 2x_0(a - x_0) - (x_0 - x)(a - x_0),$$

$$x^2 - b = (x_0^2 - b) - (x_0^2 - x^2),$$

لكن

$$2x_0(a - x_0) = x_0^2 - b,$$

$$(x_0 - x)(a - x_0) < x_0^2 - x^2,$$

$$، x_0 > \frac{a}{2} \text{ وبالتالي } ، x_0 > \frac{2a}{3} ، (١) \text{ جذر للمعادلة } (١)$$

وبالتالي

$$. x_0 + x > a - x_0 \quad \text{و} \quad x_0 > a - x_0$$

فلدينا إذناً

$$(x_0 + x)(a - x_0) > x^2 - b,$$

وبالتالي

$$(x^2 - b)(x_0 - x) < (x_0^2 - x^2)(a - x_0),$$

ومنها النتيجة المطلوبة.

ب - عندما يكون $x < x_0 = b^{\frac{1}{2}}$ يكون لدينا

$$f(x_0) = ab + (x_0^2 - b)(a - x_0)$$

$$f(x) = ab,$$

فيكون $f(x) < f(x_0)$.

ج - عندما يكون $x_0 < b \leq x$ يكون لدينا، استناداً إلى الحالة السابقة $f(x_0) > ab$ ويكون

$$f(x) = x^2(a - x) + bx < b(a - x) + bx < ab$$

ومنها النتيجة المطلوبة.

إيجازاً لهذه النقطة يمكن القول إنه:

- إذا كان $f(x_0) > c$ فالمسألة مستحيلة؛

- إذا كان $c = f(x_0)$ يكون x_0 حلاً مزدوجاً؛

- إذا كان $c < f(x_0)$ فللمسألة حلان x_1 و x_2 بحيث

$$x_1 < x_0 < x_2.$$

٢ - تحديد الجذر x_2

٢ - ١ - إذا كان $ab < c$ يكون $x_0 < x_2 < a$.

فلنأخذ الجذر X للمعادلة من النوع ١٥

$$x^3 + (3x_0 - a)x^2 = f(x_0) - c,$$

إن X يحقق العلاقة $X < a - x_0$. فبما أن $ab < c$ ، يكون

$$f(x_0) - c < f(x_0) - ab$$

وبالتالي

$$X^3 + (3x_0 - a)X^2 < x_0^2(a - x_0) - b(a - x_0).$$

لكن

$$(a - x_0)(x_0^2 - b) = (a - x_0)^3 + (3x_0 - a)(a - x_0)^2$$

لأن

$$2x_0(a - x_0) = x_0^2 - b.$$

فيكون

$$X^3 + (3x_0 - a)X^2 < (a - x_0)^3 + (3x_0 - a)(a - x_0)^2$$

ومنها

$$X < a - x_0.$$

وإذا وضعنا $x_2 = x_0 + X$ ، يكون

$$X \cdot x_0^2 + bx_0 = (x_0^2 - b)X + b(x_0 + X) = 2Xx_0(a - x_0) + b(x_0 + X)$$

ونحصل على

$$\begin{aligned} x_0^2(a - x_0) + bx_0 &= 2Xx_0(a - x_0) + b(x_0 + X) + x_0^2(a - x_0 - X) \\ &= x_0^2(a - x_2) + bx_2 + X^2(X + 3x_0 - a), \end{aligned}$$

فيكون

$$\begin{aligned} f(x_0) - f(x_2) &= X^3 + (3x_0 - a)X^2 \\ &= f(x_0) - c, \end{aligned}$$

وبالتالي

$$f(x_2) = c,$$

ويكون x_2 جذراً للمعادلة ٢٥ ، ويكون $x_0 < x_2 < a$

٢ - ٢ - إذا كان $c = ab$ يكون $x_2 = a$ وهذا ما يمكن التحقق منه على الفور .
نتحقق في هذه الحالة أيضاً من أن $x_1 \neq a$.

٣ - ٢ - إذا كان $c < ab$ يكون $x_2 > a$.

في هذه الحالة ، نبرهن أن الجذر X للمعادلة ١٥ يحقق العلاقة $X > a - x_0$.
فلدينا

$$f(x_0) - c > f(x_0) - ab,$$

لكن

$$f(x_0) - ab = (a - x_0)^3 + 3(x_0 - a)(a - x_0)^2$$

كما أن

$$f(x_0) - c = X^3 + (3x_0 - a)X^2$$

ومنها النتيجة $X > a - x_0$.

وإذا وضعنا $x_2 = x_0 + X$ يكون x_2 حلاً للمعادلة ٢٥ .

فلدينا

$$bx_0 + ax_0^2 - x_0^3 = f(x_0),$$

ومنها

$$b(x_0 + X) + a(x_0 + X)^2 = f(x_0) + x_0^3 + bX + (2x_0 + X)aX,$$

فيحصل

$$b(x_0 + X) + a(x_0 + X)^2 - (x_0 + X)^3 + X^2(3x_0 + X - a) = f(x_0);$$

لكن

$$f(x_0) - c = X^3 + (3x_0 - a)X^2,$$

وبالتالي

$$f(x_0 + X) = c,$$

وهذا ما سعينا إلى بيانه .

٣ - حصر الجذرين x_1 و x_2

ليكن λ الجذر الموجب للمعادلة

$$x^2 = ax + b.$$

عند ذلك، مهما كان c ، $f(x_0) \in]0, c[$ يكون $\lambda < x_2$.

ف لدينا

$$\lambda^3 = a\lambda^2 + b\lambda,$$

لذلك فليس λ حلاً لمعادلة من النوع ٢٥ يكون فيها $c \neq 0$ ، ويكون بالتالي $\lambda \neq x_2$. ولنبرهن الآن أن $\lambda < x_2$.

فإذا كان $x_2 > \lambda$ يكون:

$$x_2^3 - \lambda^3 = (x_2 - \lambda)x_2^2 + \lambda(x_2 - \lambda)(x_2 + \lambda),$$

$$(ax_2^2 + bx_2) - (a\lambda^2 + b\lambda) = b(x_2 - \lambda) + a(x_2 - \lambda)(x_2 + \lambda);$$

لكن لدينا

$$\lambda^3 = a\lambda + b\lambda,$$

$$\lambda > a,$$

$$x_2^2 > b,$$

فنستنتج

$$x_2^3 > ax_2^2 + bx_2 ;$$

فلا يمكن بالتالي إيجاد عدد موجب c بحيث يكون

$$x_2^3 + c = ax_2^2 + bx_2.$$

وفي الواقع لا يبرهن الطوسي ما سبق بالطريقة نفسها. لكنه يبرهن، بها نفسها، العكس، أي أن أي عدد x ، أصغر من λ ، هو جذر لمعادلة من النوع ٢٥. فإذا كان

$$x_0 < x < \lambda.$$

يمكن أن نكتب

$$\lambda^3 - x^3 = (\lambda - x)x^2 + (\lambda - x) \cdot \lambda \cdot (\lambda + x)$$

و

$$(a\lambda^2 + b\lambda) - (ax^2 + bx) = b(\lambda - x) + a(\lambda - x)(\lambda + x);$$

ويكون بالتالي

$$x^3 < ax^2 + bx.$$

ونلاحظ أن الشرط $x > x_0$ لا دخل له في الاستدلال السابق. فالنتيجة السابقة تنطبق على أي x أصغر من λ . لذلك، فلأي عدد x أصغر من λ يوجد عدد c موجب بحيث يكون x جذراً للمعادلة ٢٥ الخاصة بـ c :

- فإذا كان $x_0 < x < \lambda$ يكون x الجذر الأكبر؛

- وإذا كان $0 < x < x_0$ يكون x الجذر الأصغر.

وهكذا يكون الطوسي قد برهن أن لكل عدد x ، λ ، $x \in]0, \lambda[$ ، يوجد عدد c بحيث يكون x جذراً للمعادلة ٢٥ الخاصة بـ c .

فيكون إذن قد تبين أن كل عدد c ، $c \in]0, f(x_0)[$ ، يقابله جذران من المعادلة ٢٥ هما $x_1(c)$ و $x_2(c)$ حيث λ ، $x_2(c) \in]x_0, \lambda[$ و $x_1(c) \in]0, x_0[$.

والعكس صحيح، فلكل عدد α ، $\alpha \in]0, x_0[$ ، يوجد عدد $c(\alpha)$ ، $c(\alpha) \in]0, f(x_0)[$ ، بحيث يكون α الجذر الأكبر للمعادلة ٢٥ الخاصة بـ $c(\alpha)$. ولكل عدد β ، $\beta \in]x_0, \lambda[$ ، يوجد $c(\beta)$ ، $c(\beta) \in]0, f(x_0)[$ ، بحيث يكون β الجذر الأكبر للمعادلة ٢٥ الخاصة بـ $c(\beta)$.

فإذا لاحظنا أن $c = 0$ يقابله الجذران

$$x_1(0) = 0 \quad \text{و} \quad x_2(0) = \lambda$$


وأن $c = c_0 = f(x_0)$ يقابل الجذر المزدوج

$$x_0 = x_1(c_0) = x_2(c_0)$$

يكون قد تحدد بشكل بديهي التطبيقان التقابليان :

$$x_1 : [0, c_0] \longrightarrow [0, x_0]$$

$$x_2 : [0, c_0] \longrightarrow [x_0, \lambda]$$



٤ - تحديد الجذر x_1

ليكن X الجذر الأصغر للمعادلة من النوع ٢١ :

$$x^3 + f(x_0) - c = (3x_0 - a)x^2 \quad (٢)$$

إن مسألة وجود الجذور لهذه المعادلة واختيار الجذر الأصغر، X ، (الموجب) تعالج وتشرح كما في السابق. يبرهن الطوسي أن :

$$x_1 = x_0 - X$$

وذلك عبر تمييزه للحالات الثلاث، ٤ - ١، ٤ - ٢ و ٤ - ٣، التالية :

$$٤ - ١ : X < x_0 - b^{\frac{1}{3}}$$

في هذه الحالة، لدينا، استناداً إلى (١) :

$$2x_0(a - x_0) = x_0^2 - b \quad (٣)$$

واستناداً إلى (٢)

$$f(x_0) - c = X^2(3x_0 - a - X);$$

فيكون

$$2x_0(a - x_0)X = (x_0^2 - b)X$$

وبالتالي

$$(x_0^2 - x_1^2)(a - x_0) + X^2(a - x_0) = (x_0^2 - x_1^2)X + (x_1^2 - b)X;$$

فيستج

$$(x_0^2 - x_1^2)(a - x_0) = (x_1^2 - b)X + X^2(3x_0 - a - X)$$

و

$$x_0^2(a - x_0) + bx_0 = x_1^2a + bx_1 - x_1^3 + X^2(3x_0 - a - X)$$

وهذا يعني

$$f(x_0) = f(x_1) + f(x_0) - c,$$

وبالتالي

$$f(x_1) = c,$$

أي أن $x_0 - X = x_1$ جذر للمعادلة ٢٥.

$$.X = x_0 - b^{\frac{1}{2}} - ٢ - ٤$$

في هذه الحالة يكون $b^{\frac{1}{2}} = x_1$.

فلدينا، استناداً إلى (٣):

$$2x_0(a - x_0)(x_0 - b^{\frac{1}{2}}) = (x_0 - b^{\frac{1}{2}})^2(x_0 + b^{\frac{1}{2}});$$

لكن

$$2x_0(x_0 - b^{\frac{1}{2}}) = (x_0 + b^{\frac{1}{2}})(x_0 - b^{\frac{1}{2}}) + (x_0 - b^{\frac{1}{2}})^2,$$

وبالتالي

$$(x_0^2 - b)(a - x_0) = (x_0 - b^{\frac{1}{2}})^2(2x_0 - b^{\frac{1}{2}} - a).$$

وبإضافة ab إلى كلا الطرفين نحصل على

$$x_0^2(a - x_0) + bx_0 = X^2(3x_0 - a - X) + ab$$

ومن هنا

$$f(x_0) = f(x_0) - c + ab;$$

لكن

$$؛ f(b^{\frac{1}{2}}) = c \quad \text{ومنها} \quad ab = f(b^{\frac{1}{2}})$$

فيكون بالتالي b^2 جذراً للمعادلة ٢٥.

$$.X > x_0 - b^2 - ٤ - ٣$$

في هذه الحالة لدينا، استناداً إلى (٣):

$$X^2(2x_0 - X) + (x_0^2 - b)X = X^2(2x_0 - X) + 2x_0X(a - x_0);$$

لكن

$$2x_0X(a - x_0) = (x_0^2 - x_1^2)(a - x_0) + X^2(a - x_0),$$

ومنها

$$X^2(3x_0 - a - X) + (x_0^2 - b)X = X(2x_0 - X)(a - x_0 + X),$$

ومنها

$$f(x_0) - c + (x_0^2 - b)X = X(2x_0 - X)(a - x_0 + X);$$

لكن

$$\begin{aligned} f(x_0) - f(x_1) &= a(x_0^2 - x_1^2) + b(x_0 - x_1) - [x_0^2(x_0 - x_1) + (x_0^2 - x_1^2)x_1] \\ &= (x_0^2 - x_1^2)(a - x_1) - (x_0 - x_1)(x_0^2 - b) \\ &= X(2x_0 - X)(a - x_0 + X) - X(x_0^2 - b), \end{aligned}$$

فنتجت

$$f(x_1) = c;$$

ويكون $x_1 = x_0 - X$ جذراً للمعادلة ٢٥.

٥ - العلاقة بين المعادلة ٢٥ والمعادلة ١٥

إذا كان x_2 الجذر الأكبر للمعادلة ٢٥ فإن $X = x_2 - x_0$ جذر لمعادلة من النوع

١٥.

$$٥ - ١ - إذا كان $ab < c < f(x_0)$$$

معلوم، في هذه الحالة أن $x_2 < a$ ولدينا

$$(x_0^2 - b)(x_2 - x_0) = (x_0 + x_2)(x_2 - x_0)(a - x_2) + f(x_0) - c.$$

وإذا وضعنا $x_2 - x_0 = X$ ، نحصل على

$$(x_0^2 - b)X = X(2x_0 + X)(a - x_0 - X) + f(x_0) - c;$$

لكن

$$x_0^2 - b = 2x_0(a - x_0),$$

فيكون

$$X^3 + X^2(3x_0 - a) = f(x_0) - c;$$

لذلك فإن X جذر للمعادلة ١٥.

$$٥ - ٢ - \text{ إذا كان } ab = c;$$

في هذه الحالة يعطي الطوسي النتيجة $x_2 = a$ دون أن يستخدم أي معادلة وسيطة.

$$٥ - ٣ - \text{ إذا كان } ab < c;$$

في هذه الحالة يكون $x_2 > a$ ولدينا

$$\begin{aligned} f(x_0) - c &= f(x_0) - f(x_2) = [x_0^2(x_2 - x_0) + (x_2^2 - x_0^2)x_2] - [b(x_2 - x_0) + a(x_2^2 - x_0^2)] \\ &= (x_2^2 - b)(x_2 - x_0) - (x_2^2 - x_0^2)(a - x_0); \end{aligned}$$

وبالتالي، فإذا وضعنا $x_2 - x_0 = X$ ، نحصل على:

$$f(x_0) - c = X^2(2x_0 + X) + X(x_0^2 - b) - X(2x_0 + X)(a - x_0);$$

وأخذاً بالاعتبار (٣)، يكون لدينا

$$f(x_0) - c = X^3 + X^2(3x_0 - a);$$

ويكون X جذراً لمعادلة من النوع ١٥.

٦ - العلاقة بين المعادلة ٢٥ والمعادلة ٢١

إذا كان x_1 الجذر الأصغر للمعادلة ٢٥ يكون $x_1 < x_0$. فلنبرهن أن $X = x_0 - x_1$ جذر لمعادلة من النوع ٢١.

$$٦ - ١ - \text{ إذا كان } x_1 < x_0 < b;$$

في هذه الحالة نستطيع أن نكتب

$$\begin{aligned} f(x_0) &= bx_1 + b(x_0 - x_1) + x_1^2(a - x_0) + (x_0^2 - x_1^2)(a - x_0) \\ c &= f(x_1) = bx_1 + x_1^2(a - x_0) + x_1^2(x_0 - x_1), \end{aligned}$$

وبالتالي

$$f(x_0) - c = (x_0^2 - x_1^2)(a - x_0) - (x_0 - x_1)(x_1^2 - b);$$

فإذا وضعنا $X = x_0 - x_1$ ، نحصل على

$$f(x_0) - c = X(2x_0 - X)(a - x_0) - X(x_0^2 - 2x_0X + X^2 - b);$$

وأخذاً بالاعتبار العلاقة (٣)، يكون

$$f(x_0) - c = (3x_0 - a)X^2 - X^3;$$

فيكون $X = x_0 - x_1$ جذراً لمعادلة من النوع ٢١.

$$٦ - ٢ - \text{ إذا كان } b \neq 0 \text{ ؛}$$

في هذه الحالة لا يستخدم الطوسي معادلة وسيطة.

$$٦ - ٣ - \text{ إذا كان } b \neq 0 \text{ ؛}$$

في هذه الحالة لدينا

$$\begin{aligned} f(x_0) - c &= b(x_0 - x_1) + a(x_0^2 - x_1^2) - [(x_0^2 - x_1^2)x_0 + x_1^2(x_0 - x_1)] \\ &= (x_0^2 - x_1^2)(a - x_0) - (x_1^2 - b)(x_0 - x_1). \end{aligned}$$

وإذا وضعنا $X = x_0 - x_1$ ، نحصل على

$$f(x_0) - c = X(2x_0 - X)(a - x_0) - X(x_0^2 - 2x_0X + X^2 - b)$$

وأخذاً بالاعتبار العلاقة (٣)، يكون

$$f(x_0) - c = X^2(3x_0 - a) - X^3;$$

فيكون $X = x_0 - x_1$ جذراً لمعادلة من النوع ٢١.

الحالة الرئيسة الثالثة : $a < b$

تكتب المعادلة على الشكل

$$f(x) = x(b - x^2) + ax^2 = c.$$

١ - دراسة النهاية العظمى

لنأخذ المعادلة

$$f'(x) = b - 3x^2 + 2ax = 0 \quad (١)$$

وليكن x_0 جذرها الموجب. لدينا ما يلي:

$$a < x_0 < b^{\frac{1}{3}}.$$

فإذا كان $x_0 = a$ يكون $a^2 = b$ وهذا خُلف. لذلك لدينا $x_0 \neq a$.

وبما أن

$$\frac{b}{3} = x_0 \left(x_0 - \frac{2a}{3} \right)$$

فإذا كان $x_0 < a$ يكون $b^{\frac{1}{3}} < a$ وهذا خُلف. لذلك فإن $x_0 > a$.

من جهة أخرى، لدينا $b^{\frac{1}{3}} < x_0$. فإذا كان $b^{\frac{1}{3}} \geq x_0$ يكون، كما في ما سبق، $a \geq b^{\frac{1}{3}}$ ، وهذا خُلف.

ليكن

$$f(x_0) = x_0(b - x_0^2) + ax_0^2,$$

ولنبرهن أن كل x غير x_0 يحقق العلاقة $f(x) < f(x_0)$.

$$x > x_0 \implies f(x) < f(x_0) - 1 - 1$$

نفرض أولاً أن $b^{\frac{1}{3}} < x < x_0$ ، فيكون لدينا استناداً إلى (١):

$$2x_0(x_0 - a) = b - x_0^2;$$

لكن

$$b - x^2 < b - x_0^2,$$

فيكون

$$(x - x_0)(x + x_0)(x_0 - a) > (b - x^2)(x - x_0);$$

وإذا أضفنا إلى كل الطرفين:

$$(b - x^2)(x_0 - a) + a(b - x^2) + ax^2$$

نحصل على

$$bx_0 - x_0^3 + ax_0^2 > bx - x^3 + ax^2,$$

وهو المطلوب بيانه.

وإذا كان $b^{\frac{1}{3}} < x$ يكون $f(x) = ab < f(x_0)$.

وأخيراً، إذا كان $b^{\frac{1}{3}} < x$ يكون

$$f(x_0) > ab = ax^2 - a(x^2 - b) > ax^2 - x(x^2 - b) = f(x),$$

وذلك لأن $a < b < x$.

$$1 - \text{ب} \quad x < x_0 \implies f(x) < f(x_0)$$

نفرض أولاً أن $a < x < x_0$ ، فيكون لدينا استناداً إلى (١):

$$2x_0(x_0 - a) = b - x_0^2$$

ومنها

$$b - x_0^2 > (x_0 + x)(x_0 - a);$$

فيكون

$$(b - x_0^2)(x_0 - x) + [(b - x_0^2)(x - a) + a(b - x_0^2) + ax_0^2] > \\ > (x_0^2 - x^2)(x_0 - a) + [(b - x_0^2)(x - a) + a(b - x_0^2) + ax_0^2]$$

ويكون بالتالي

$$f(x_0) > f(x).$$

وإذا كان $x = a$ يكون، كما في ما سبق

$$ab = f(x) < f(x_0)$$

وإذا كان $a < x < x_0$ ، يكون، كما في ما سبق

$$f(x) < ab < f(x_0).$$

خلاصة، نستطيع القول إنه

- إذا كان $c > f(x_0)$ ، تكون المسألة مستحيلة؛

- إذا كان $c = f(x_0)$ ، يكون x_0 حلاً مزدوجاً؛

- إذا كان $c < f(x_0)$ ، يكون للمعادلة حلان، x_1 و x_2 بحيث يكون

$$x_1 < x_0 < x_2.$$

٢ - تحديد الجذر x_2

لنأخذ المعادلة من النوع ١٥ التالية:

$$(2) \quad f(x_0) - c = x^3 + (3x_0 - a)x^2$$

وليكن X حلّها الموجب .

٢ - ١ - إذا كان $x_0 = b^{\frac{1}{2}} - X < X$ ؛

في هذه الحالة يكون $x_2 = x_0 + X$ جذراً للمعادلة ٢٥ ويكون $x_2 < b^{\frac{1}{2}}$. فلدينا ، استناداً إلى (١) :

$$2x_0(x_0 - a) = b - x_0^2 \quad (٣)$$

ومن جهة أخرى

$$(x_2^2 - x_0^2) = (x_2 - x_0)^2 + 2(x_2 - x_0)x_0 .$$

فيكون

$$\begin{aligned} (x_2^2 - x_0^2)(x_0 - a) &= (x_2 - x_0)^2(x_0 - a + x_2 + x_0) + (b - x_2^2)(x_2 - x_0); \\ (x_2^2 - x_0^2)(x_0 - a) &= X^2(3x_0 - a + X) + (b - x_2^2)(x_2 - x_0); \end{aligned}$$

وبإضافة $(b - x_2^2)(x_0 - a)$ إلى كلٍّ من الطرفين نحصل على

$$(b - x_0^2)(x_0 - a) = f(x_0) - c + (b - x_2^2)(x_2 - a).$$

$$f(x_0) = f(x_0) - c + f(x_2)$$

$$f(x_2) = c,$$

ويكون $x_2 = x_0 + X$ جذراً للمعادلة ٢٥ .

٢ - ٢ - إذا كان $x = b^{\frac{1}{2}} - x_0$ ؛

في هذه الحالة يكون $x_2 = b^{\frac{1}{2}}$ ويكون

$$f(x_2) = f(b^{\frac{1}{2}}) = ab.$$

فالعلاقة (٢) تعطي

$$\begin{aligned} f(x_0) - c &= (b^{\frac{1}{2}} - x_0)^2(b^{\frac{1}{2}} + 2x_0 - a) \\ &= (b - x_0^2)(b^{\frac{1}{2}} - x_0) + (b^{\frac{1}{2}} - x_0)^2(x_0 - a); \end{aligned}$$

واستناداً إلى (٣) :

$$f(x_0) - c = 2x_0(x_0 - a)(b^{\frac{1}{2}} - x_0) + (b^{\frac{1}{2}} - x_0)^2(x_0 - a),$$

وبالتالي

$$\begin{aligned} f(x_0) - c &= (x_0 - a)(b - x_0^2) \\ &= f(x_0) - ab, \end{aligned}$$

فيكون

$$ab = f(b^2) = c,$$

ويكون $b^2 = x_2$ جذراً للمعادلة ٢٥.

$$٢ - ٣ - \text{ إذا كان } b^2 - x_0 > X$$

في هذه الحالة يكون $x_2 = x_0 + X$ جذراً أكبر من b^2 .

ف لدينا

$$\begin{aligned} f(x_0) &= f(x_2) + [x_0^3 - x_2^3 - a(x_2^2 - x_0^2) - b(x_2 - x_0)] \\ &= f(x_2) + (x_0 - x_2)[x_0^2 + x_0x_2 + x_2^2 - a(x_0 + x_2) - b]. \end{aligned}$$

لكن، استناداً إلى (٣)

$$f(x_0) = f(x_2) + (x_0 - x_2) [(x_2 - a)(x_2 + x_0) - 2x_0(x_0 - a)]$$

وبالتالي

$$f(x_0) = f(x_2) + X^2(X + 3x_0 - a);$$

واستناداً إلى (٢) يكون

$$f(x_0) = f(x_2) + f(x_0) - c,$$

ومنها

$$f(x_2) = c,$$

ويكون $x_2 = x_0 + X$ جذراً للمعادلة ٢٥.

٣ - حصر الجذرين x_1 و x_2

ليكن λ الجذر الموجب للمعادلة

$$x^2 = ax + b \quad (٤)$$

مهما كان العدد c ، $c < f(x_0)$ ، يكون

$$0 < x_1 < x_0 \quad \text{و} \quad x_0 < x_2 < \lambda$$


وبالعكس، فكل عدد x ، حيث $x < \lambda$ ، يقابله عدد c ، $c > 0$ بحيث يكون x جذراً للمعادلة ٢٥ الخاصة بالعدد c .

فإذا كان $0 < x < x_0$ ، يكون x الجذر الأكبر x_2 ؛ أما إذا كان $0 < x < x_0$ فيكون x الجذر الأصغر x_1 .

بيان ذلك يتم بطرق مشابهة للطرق التي أُتبعت في الحالة الثانية. ونلاحظ، كما في الحالة السابقة، أن $x_1 = 0$ و $x_2 = \lambda$ جذران للمعادلة $f(x) = 0$. وهنا أيضاً يتحدد تطبيقان تقابليان

$$x_1 : [0, c_0] \longrightarrow [0, x_0]$$

$$x_2 : [0, c_0] \longrightarrow [x_0, \lambda].$$



٤ - تحديد الجذر x_1

ليكن X جذر المعادلة من النوع ٢١:

$$x^3 + f(x_0) - c = (3x_0 - a)x^2 \quad (٥)$$

إن مسألة وجود الجذور لهذه المعادلة واختيار الجذر الأصغر X ، (الموجب) تعالج وتشرح كما في السابق. يبرهن الطوسي أن

$$x_1 = x_0 - X.$$

وذلك عبر تمييزه للحالات الثلاث ٤ - ١، ٤ - ٢ و ٤ - ٣ التالية:

$$٤ - ١ : \text{إذا كان } X < x_0 - a$$

في هذه الحالة لدينا، استناداً إلى (٣):

$$X(b - x_0^2) = 2x_0(x_0 - a)X = X^2(x_0 - a) + X(2x_0 - X)(x_0 - a);$$

وإذا أضفنا إلى كلا الطرفين:

$$(b - x_0^2)(x_0 - X) + aX(2x_0 - X) + a(x_0 - X)^2,$$

نحصل على

$$f(x_0) = f(x_0 - X) + X^2(3x_0 - a - X),$$

واستناداً إلى (٥)

$$f(x_0) = f(x_0 - X) + f(x_0) - c,$$

وبالتالي

$$f(x_0 - X) = c,$$

فيكون $x_1 = x_0 - X$ جذراً للمعادلة ٢٥.

٤ - ٢ - إذا كان $X = x_0 - a$ ؛

في هذه الحالة يكون $x_1 = a$. فلدينا، استناداً إلى (٣):

$$f(x_0) = f(a) + 2x_0(x_0 - a)^2;$$

لكن، استناداً إلى (٥)

$$f(x_0) - c = 2x_0(x_0 - a)^2,$$

وبالتالي

$$f(a) = c,$$

فيكون $x_1 = a$ جذراً للمعادلة ٢٥.

٤ - ٣ - إذا كان $X > x_0 - a$ ؛

في هذه الحالة يكون $x_1 = x_0 - X < a$ ؛ لدينا

$$f(x_0) = (ax_0^2 + bx_0) - x_0^3 = [ax_0^2 + bx_0 + (x_0 - X)^3 - x_0^3] - (x_0 - X)^3 \quad (\text{ف})$$

وإذا طرحنا

$$a(x_0 - X)^2 + b(x_0 - X),$$

من حدي الفرق الأخير، (ف)، نحصل على

$$f(x_0) = X^2(3x_0 - a - X) + f(x_0 - X),$$

وعلماً بأن

$$X^2(3x_0 - a - X) = f(x_0) - c$$

يكون لدينا

$$f(x_0 - X) = c,$$

ويكون $x_1 = x_0 - X$ جذراً للمعادلة ٢٥.

٥ - العلاقة بين المعادلة ٢٥ والمعادلة ١٥

إذا كان x_2 الجذر الأكبر للمعادلة ٢٥ فإن $X = x_2 - x_0$ جذر لمعادلة من النوع ١٥.

٥ - ١ - إذا كان $x_0 < b$ ؛

في هذه الحالة يكون $b < x_2 < x_0$ ، ويكون لدينا

$$\begin{aligned} f(x_0) &= x_0(b - x_2^2) + x_0(x_2^2 - x_0^2) + ax_0^2 \\ c &= x_0(b - x_2^2) + (x_2 - x_0)(b - x_2^2) + a(x_2^2 - x_0^2) + ax_0^2, \end{aligned}$$

ومنها

$$f(x_0) - c = x_0(x_2^2 - x_0^2) - [(x_2 - x_0)(b - x_2^2) + a(x_2^2 - x_0^2)] \quad (ف)$$

وإذا طرحنا $a(x_2^2 - x_0^2)$ من حدي الفرق (ف)، نحصل على

$$f(x_0) - c = (x_0 - a)(x_2^2 - x_0^2) - (x_2 - x_0)(b - x_2^2),$$

وبالتالي

$$f(x_0) - c = X(x_0 - a)(2x_0 + X) - X(b - x_0^2 - 2x_0X - X^2);$$

وإذا أخذنا بالاعتبار (٣)، نحصل على

$$c_0 - c = X^2(3x_0 - a) + X^3;$$

ويكون X جذراً لمعادلة من النوع ١٥.

٥ - ٢ - إذا كان $x_0 = b$ ؛

يكون $b = x_2$ ؛ ويصل الطوسي إلى هذه النتيجة من دون استخدام معادلة وسيطة.

٥ - ٣ - إذا كان $x_0 > b$ ؛

في هذه الحالة يكون $b < x_2 < x_0$ ؛ ولدينا

$$c = f(x_2) = bx_2 + ax_2^2 + a(x_2^2 - x_0^2) - [x_0^3 + x_2^2(x_2 - x_0) + x_0(x_2^2 - x_0^2)].$$

وبالتالي

$$f(x_0) - c = X(x_0^2 + 2x_0X + X^2 - b) + X(2x_0 + X)(x_0 - a),$$

وإذا أخذنا بالاعتبار (٣)، نحصل على

$$f(x_0) - c = X^3 + X^2(3x_0 - a);$$

ويكون X جذراً لمعادلة من النوع ١٥.

٦ - العلاقة بين المعادلة ٢٥ والمعادلة ٢١

إذا كان x_1 الجذر الأصغر للمعادلة ٢٥، يكون $X = x_0 - x_1$ جذراً لمعادلة من النوع ٢١.

٦ - ١ - إذا كان $X < x_0 - a$ ؛

في هذه الحالة يكون $a < x_1 < x_0$ ويكون لدينا

$$\begin{aligned} c &= f(x_1) = ax_1^2 + x_1(b - x_0^2) + x_1(x_0^2 - x_1^2), \\ f(x_0) &= ax_1^2 + a(x_0^2 - x_1^2) + x_1(b - x_0^2) + (x_0 - x_1)(b - x_0^2), \end{aligned}$$

وبالتالي

$$\begin{aligned} f(x_0) - c &= a(x_0^2 - x_1^2) + (x_0 - x_1)(b - x_0^2) - x_1(x_0^2 - x_1^2) \\ &= X(b - x_0^2) - X(2x_0 - X)(x_0 - a - X) \end{aligned}$$

وإذا أخذنا بالاعتبار (٣)، نحصل على

$$X^3 + f(x_0) - c = X^2(3x_0 - a);$$

ويكون X جذراً للمعادلة الوسيطة من النوع ٢١.

٦ - ٢ - إذا كان $X = x_0 - a$ ، يكون $x_1 = a$ ؛ وهذه النتيجة يعطيها الطوسي من دون استخدام معادلة وسيطة.

٦ - ٣ - إذا كان $X > x_0 - a$ ؛

في هذه الحالة يكون $x_1 < a$ ؛ ولدينا:

$$f(x_0) - c = b(x_0 - x_1) + a(x_0^2 - x_1^2) - [x_0^2(x_0 - x_1) + x_1(x_0^2 - x_1^2)],$$

وبالتالي

$$\begin{aligned} f(x_0) - c &= (x_0 - x_1)(b - x_0^2) + (x_0^2 - x_1^2)(a - x_1) \\ &= X(b - x_0^2) + X(2x_0 - X)(X + a - x_0), \end{aligned}$$

وإذا أخذنا بالاعتبار (٣)، نحصل على:

$$X^3 + f(x_0) - c = X^2(3x_0 - a);$$

ويكون X جذراً لمعادلة من النوع ٢١.

تعليقات إضافية^(١)

[3,12] كلمة «gnomon» هي الكلمة الفرنسية التي اخترناها لنقل كلمة «عَلَم» التي استخدمها الطوسي. ولا يخفى على القارئ العربي معاني كلمة «عَلَم» هذه، فاستخداماتها قديمة في اللغة العربية. [انظر مثلاً أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس، معجم مقاييس اللغة، بتحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، ج ٦ (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٣٦٦ - ١٣٧١هـ)، ج ٤، ص ١٠٩ - ١١١].

والأصل اليوناني γνῶμων يشير أيضاً إلى فكرة العلامة المميزة. والكلمة تعود إلى كلمة γνῶσκω «أنا أعْلَم» وتعني، بحسب تعبير Th. Heath حرفياً «A thing enabling something to be known, observed or verified, a teller or a marker as one might say» [Th. Heath, *Euclid's Elements* (Dover: [n.pb.], 1956), vol. 1, p. 370].

وفي علم الفلك نقلت كلمة «gnomon» إلى العربية بكلمات عدة وبخاصة بكلمة «المقياس» [انظر: Carl Schoy, *Die Gnomonik der Araber, Die Geschichte der Zeitmessung unter der Uhren*; Bd. 1, Lfg. F (Berlin: W. de Gruyter, 1923), p. 5].

وفي الهندسة أيضاً، قصد المترجمون العرب ألا يتعدوا عن معنى الأصل اليوناني فاختروا كلمة «عَلَم».

فلقد قدّم ثابت بن قرّة في ترجمته لـ الأصول التي نَقَحها حنين بن اسحق، قدّم التحديد التالي لكلمة «عَلَم» [انظر: إقليدس، الأصول، II، التحديد ٢]: «كل شكل متوازي الأضلاع، فليسّم أحد السطحين المتوازي الأضلاع اللذين على قطره، أيهما كان، مع كلا السطحين المتممين: العلم»، [انظر: إقليدس، الأصول، ترجمة حنين بن اسحق (مخطوطة هانت رقم ٤٣٥، مكتبة بودلين)، الورقة ١٣^ط].

وهكذا، فإن هذا الاستخدام للكلمة المذكورة، فرض نفسه ابتداءً من القرن التاسع حيث أخذ يتردد في الرياضيات اللاحقة. إن الطوسي يعمّم هذه اللفظة باستخدامه تعبير

(١) تشير إلى كل ملاحظة برقمين، رقم الصفحة (إلى اليسار) ورقم السطر، في النص العربي في المجلد الثاني.

«العلم المجسم» الذي يشير إلى شكل ذي ثلاثة أبعاد.

[140, 13]؛ ليكن $ABCD$ مربعاً بحيث $AB = 10$. المطلوب هو تقسيم هذا المربع إلى أربع مساحات:

$$S_1, S_2, S_3, S_4$$


بحيث يكون:

- S_1 مستطيلاً، ذا ضلع محمول بـ BD .

- كل من S_2, S_3, S_4 ، شبه منحرف، نحصل عليه بوصل كل من رأسي المستطيل الباقيين إلى النقطتين A و C .

ليكن S_2 شبه المنحرف ذا القاعدة AB ، S_3 شبه المنحرف ذا القاعدة DC و S_4 شبه المنحرف ذا القاعدة AC . والمطلوب أيضاً أن يكون لدينا

$$S_2 = 2S_1, \quad S_3 = 5S_1, \quad S_4 = 3S_1$$



المسألة إذن هي مسألة بناء هندسي بواسطة المسطرة والفرجار. لذلك فمن الطبيعي أن نظن، للوهلة الأولى، أن مسألة البناء هذه مستقلة تماماً عن إنجازات الطوسي الجبرية كما عَرَضَها في رسالته عن المعادلات. ويتدغم هذا الانطباع بالعرض الرياضي التركيبي الذي يقدمه الطوسي.

فإلى أي حد، وبأي معنى، استطاعت مفاهيم الطوسي وتقنياته الجبرية أن تلعب دورها في مسألة هي في النهاية مسألة تقليدية، إضافة إلى أنها ظرفية؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه على المؤرخ الذي لا يكتفي بسرد الوقائع ووصفها. إن الإجابة عن هذا السؤال تسمح بتحديد موقع هذه المسألة ضمن عمل الطوسي الرياضي. لكن، وقبل

الشروع في الإجابة عن هذا السؤال، سنلخص أولاً حل الطوسي متلافيين قدر الإمكان الابتعاد عن نصّه أو عن أسلوبه.

ليكن $ABCD$ مربعاً بحيث $AB = 10$ ، ولتكن E نقطة على AB (انظر الشكل التالي).

بني النقطة I بحيث يكون $BI = 10BE$. من ثم نجعل ID ونمدّ من E ، EF متوازيّاً مع ID ؛ (النقطة F على BD)، فيكون لدينا $BF = \frac{1}{10}AB$ ، أي $BF = 1$.

ولتكن I' نقطة كيفما اتفق، على BE ولتكن G و H بحيث يكون $GH = 45 BI'$ ، $I'G = 54 BI'$ ولنجعل GF ونمدّ $HJ//GF$ ، فيكون لدينا

$$BJ = \frac{2}{11}BD \quad \text{أي} \quad BJ = \frac{20}{11}BF$$

من ثم نرسم JS ، ونضع M بين J و S ونضع L من الجهة الأخرى لـ J بحيث يكون

$$JM = 2BF \quad \text{و} \quad JL = \frac{7}{4}BF$$

ولتكن C_b كيفما اتفقت على BD ، ولتكن B_c و J_d بحيث يكون

$$J_d B_c = 725 J C_b \quad \text{و} \quad C_b B_c = 3024 J C_b$$

من ثم نرسم $B_c M$ و $JN//B_c M$ (N على JS)؛ ونضع

$$SO = 5BF + \frac{5}{11}BF = \frac{60}{11}BF$$

ونرسم نصف الدائرة ذات القطر SO ونمدّ من S ، ضمن نصف الدائرة هذا وترّاً SP مساوياً لـ $2JK$ ، وهذا ممكن لأن $SO > LN$. ليكن I منتصف \widehat{SP} وليكن $UQ \perp SO$.

لتكن X كيفما اتفق على UQ ولتكن النقطة T على IQ بحيث

$$XT = \left(1 + \frac{1}{3}\right) QX$$

نرسم TS ونرسم $XR//TS$ ، R على SO . ونضع V على AC بحيث يكون $SV = SR$ ، ومن V نمدّ VK_b موازياً لـ AB ، K_b على BD .

وليكن L_b على BD بحيث $DL_b = \left(2 + \frac{1}{2}\right)BK_b$ ، ومن L_b نمدّ $L_b L_c//AB$

وبناء N يعطي

$$MN = \frac{725}{3025} MJ = \frac{1450}{3025} BF,$$

ومنها

$$JN = JM + MN = \frac{300}{121} BF.$$

لكن قدرة النقطة J بالنسبة إلى الدائرة ذات القطر NL تعطي

$$JN \cdot JL = JK^2,$$

ولدينا

$$\overline{JK}^2 = \frac{300}{121} \cdot \frac{7}{4} \overline{BF}^2 = \frac{525}{11^2} \cdot \overline{BF}^2.$$

لكن، بما أن $SP = 2KJ$ فإن U هو منتصف \widehat{SP} و $SO \perp UQ$. لذلك، فإن مساواة المثلثين، قائمي الزاوية $S\alpha\beta$ و $U\alpha Q$ تعطي $U\alpha Q = S\beta = \frac{1}{2} SP$ ومنها $UQ = KJ$. ومن جهة أخرى، بناءً على قدرة النقطة Q بالنسبة إلى الدائرة ذات القطر SO ، لدينا $QO = \overline{UQ}^2$ ، ومنها

$$SQ \cdot QO = \frac{525}{11^2} \overline{BF}^2.$$

واستناداً إلى بناء R ، لدينا

$$RS = \frac{4}{7} QS \quad \text{و} \quad RQ = \frac{3}{7} QS,$$

وبالتالي

$$OQ \cdot RS = \frac{4}{7} \cdot \frac{525}{11^2} \overline{BF}^2.$$

لكن

$$(K_b V \text{ على } Y) OQ \cdot RS = OQ \cdot QY = (O, Y)$$

وذلك لأن

$$QY = SV = SR,$$

فيكون

$$(OY) = \frac{4}{7} \cdot \frac{525}{11^2} \cdot \overline{BF}^2.$$

ولدينا

$$(V, J) = (V, R) + (R, Y) + (Y, O) + (O, K_b)$$

ولدينا

$$OJ = \frac{50}{11} BF, \quad \text{أي} \quad (O, K_b) = OJ \cdot JK_b = OJ \cdot RS$$

$$(V, J) = \overline{RS}^2 + \frac{3}{4} \overline{RS}^2 + \frac{4}{7} \cdot \frac{525}{11^2} \overline{BF}^2 + \frac{50}{11} BF \cdot RS \quad \text{فيكون}$$

$$= \frac{7}{4} \overline{RS}^2 + \frac{300}{11^2} \overline{BF}^2 + \frac{50}{11} BF \cdot RS.$$

ومن جهة أخرى، لدينا

$$\begin{aligned} (V, W) &= AW \cdot AV = \left(\frac{3}{2} AS + \frac{7}{2} VS \right) (AS + VS) \\ &= \frac{3}{2} \overline{AS}^2 + 5 AS \cdot VS + \frac{7}{2} \overline{VS}^2 \\ &= \frac{3}{2} \left(\frac{20}{11} BF \right)^2 + 5 \cdot \frac{20}{11} BF \cdot RS + \frac{7}{2} \overline{RS}^2 \\ &= \frac{600}{11^2} \overline{BF}^2 + \frac{100}{11} BF \cdot RS + \frac{7}{2} \overline{RS}^2 = 2(V, J). \end{aligned}$$

فيكون لدينا

$$(V, J) = \frac{1}{2} (V, W) = (A, V, Z).$$

لكن

$$(V, B) - (V, J) = (B, S)$$

و

$$(V, B) - (A, V, Z) = (B, K_b, Z, A)$$

ومنها

$$(B, S) = (B, K_b, Z, A).$$

لكن

$$(B, S) = \frac{2}{11} (A, B, C, D),$$

فيكون

$$(B, K_b, Z, A) = \frac{2}{11} (A, B, C, D).$$

ومن جهة أخرى فإن لإشبهى المنحرف (B, K_b, Z, A) و (D, C, O', L_b)

قاعدتين متساويتين، ونسبة ارتفاعيهما BK_6 إلى DL_6 ، تساوي $\frac{2}{5}$ ؛ فيكون لدينا

$$(D, C, O', L_6) = \frac{5}{11} (A, B, C, D).$$

ولدينا

$$(A, Z, O', C) = (A, L_6) - [(A, W, Z) + (C, O', L_6)].$$

لكن

$$(C, O', L_6) = \frac{5}{2} (A, W, Z),$$

فيكون

$$\begin{aligned} (A, Z, O', C) &= (A, L_6) - \frac{7}{2} (V, J) \\ &= AC \cdot AW - \frac{7}{2} AC \cdot VS \\ &= AC \left(\frac{3}{2} AS + \frac{7}{2} VS - \frac{7}{2} VS \right) = \frac{3}{2} AC \cdot AS \\ &= \frac{3}{2} (B, S) = \frac{3}{11} (A, B, C, D). \end{aligned}$$

وفي النهاية، إذا حذفنا من المربع $(ABCD)$ ، شبه المنحرفات الثلاثة، يبقى المستطيل (O', L_6, K_6, Z) الذي تكون مساحته إذن $\frac{1}{11} (A, B, C, D)$.

إن عرض الطوسي كما يظهر هذا الموجز، هو عرض تركيبى حصراً. فلم يكشف الرياضي عن دواعي اختياره للقيم العددية الخاصة بالبناء الهندسي الذي قام به، وذلك في أي من مراحل هذا البناء تقريباً. [منذ البداية أخذ $S_1 = \frac{1}{11} ABCD$ ، كما أخذ النقطة J بحيث $BJ = \frac{2}{11} BD$ وبحيث يكون المستطيل (A, J) يساوي $\frac{2}{11} (ABCD)$ ؛ فيكون (A, J) مساوياً لشبه المنحرف المطلوب S_2]. كما أن الطوسي لا يشرح من جهة ثانية دواعي التسلسل الذي اعتمده في ترتيب بنائه الهندسي. هذا التسلسل الذي لا يمكن تفسيره في الواقع إلا عبر تفحص المسار التحليلي الذي اتبعه الطوسي. وهذا ما يتأكد عند قراءة خاتمة عرض الطوسي، حيث يعترف الرياضي بأهمية التحليل الرياضي بخاصة في مثل هذا النوع من المسائل الحسابية - الهندسية، إلا أنه يرد إغفاله للتحليل إلى أسباب ظرفية دعت إلى الاقتضاب.

فالطوسي يعتبر التحليل ضرورياً للوصول إلى النتيجة المطلوبة ويعتبر «أن أعظم فوائد العلوم الرياضية إنما هو ذلك»، وهو يعلن إلى مراسله، أنه وإن استغنى عن هذا التحليل ولم يعرضه، إلا أنه مستعد لعرضه عليه إن هو رغب في ذلك.

لكن موقف الطوسي المبني هذا لا يغير من واقع الحال في ما يخصنا وهو أن

النص لا يحتوي على أية معلومة بالنسبة إلى التحليل الذي اتبعه في هذه المسألة . فلا يبقى أمامنا إذن إلا إعادة تركيب هذا التحليل مستخدمين فقط الوسائل التي كانت بحوزته . لنضع أمامنا من جديد مسألة الطوسي ، ولناخذ :

$$ZO K_b L_b \text{ المسطحيل } = S_1$$

$$AB K_b Z \text{ المنحرف شبه } = S_2$$

$$CD L_b O' \text{ المنحرف شبه } = S_3$$

$$AZ O' C \text{ المنحرف شبه } = S_4$$

بحيث يكون

$$S_2 = 2S_1, S_3 = 5S_1, S_4 = 3S_1.$$

ولنضع :

$$K_b L_b = x, K_b Z = y, K_b B = t.$$

فنجد ، مباشرة

$$S_1 = \frac{1}{11} (A, B, C, D) = \frac{100}{11}$$

$$S_2 = \frac{2}{11} (A, B, C, D) \iff S_2 = (B, J, S, A)$$

مع كون :

$$BJ = \frac{2}{11} BD = \frac{20}{11}$$

$$S_3 = \frac{5}{2} S_2 \iff DL_b = \frac{5}{2} BK_b.$$

ولناخذ $u = JK_b$ كمجهول مساعد

$$t = \frac{20}{11} + u, \quad z = \frac{50}{11} + \frac{5}{2} u$$

$$x = 10 - t - z = \frac{40}{11} - \frac{7}{2} u$$

$$S_4 = 3S_1 \iff \frac{(10-y)(10+x)}{2} = 3xy$$

فيكون

$$y = \frac{80}{11} - \frac{7}{2} u.$$

وبالتالي

$$AW = 10 - y = \frac{30}{11} + \frac{7}{2} u,$$

فيكون

$$AW = \frac{3}{2}BJ + \frac{7}{2}JK.$$

ويكون من الواضح أن حل المسألة يعود إلى تحديد u . لدينا

$$S_1 = \frac{100}{11} \iff xy = \frac{100}{11} \iff \left(\frac{40}{11} - \frac{7}{2}u\right) \left(\frac{80}{11} - \frac{7}{2}u\right) = \frac{100}{11},$$

وبالتالي

$$\left(\frac{7}{4}u\right)^2 - \frac{60}{11} \left(\frac{7}{4}u\right) + \frac{525}{11^2} = 0,$$

مع كون $\frac{7}{4}u < \frac{20}{11}$ ؛

فيكون

$$\frac{7}{4}u = \frac{60 - \sqrt{375}}{11}.$$

هكذا نكون قد وجدنا، عن طريق ما تقدم من تحليل، معظم القيم العددية التي قدمها الطوسي. لكن الحل الجبري لمعادلة الدرجة الثانية التي وصلنا إليها، يعطي عدداً أصم c فلا يمكن بالتالي أن يشكل جواباً لمسألة البناء المطروحة. فالتحليل يقتضي إذن تحديد جذري المعادلة بوسائل «البناء» إذا صح التعبير. الدائرة التي نحتاج إليها هنا لها بالضرورة قطر SO يعادل

$\frac{60}{11}$ (جمع الجذرين). كما يجب أن يكون مربع

المسافة بين SO والخط δ ، مساوياً لـ $\frac{525}{11^2}$ (ضرب الجذرين).


لكن، إذا أخذنا بالاعتبار الشرط: $\frac{7}{4}u < \frac{20}{11}$ ، نستنتج أن الجذر QS هو الوحيد الذي يناسب هذه المسألة.

لكن، لإنهاء التحليل، يجب أن يكون بالإمكان وضع الخط δ . لذلك، فمن الضروري اعتماد بناء ثانٍ للحصول على قطعة مستقيم ذات طول l بحيث يكون $l^2 = \frac{525}{11^2}$. عند ذلك نحصل على l كمتوسط هندسي بين طولين l_1 و l_2 بحيث يكون: $l_1 \cdot l_2 = \frac{525}{11^2}$ ؛ (l_1, l_2) عددين منطقيين، أي $l_1 \in Q$ و $l_2 \in Q$.

وكان اختيار الطوسي لـ ℓ_1 و ℓ_2 هو التالي :

$$\ell_2 = JN = \frac{300}{121} \quad ; \quad \ell_1 = JL = \frac{7}{4}$$

فنرسم الدائرة ذات القطر LN ونحصل على قطعة المستقيم JK ذات الطول ℓ باستخدام قدرة النقطة J بالنسبة إلى هذه الدائرة.



كان هذا، على ما يبدو لنا، طريق التحليل الذي اتبعه الطوسي. إن هذا التحليل يسمح بأن نفهم أسباب اختياره للقيم العددية الخاصة التي نجدها في تركيب المسألة وللمراحل المتتالية لهذا التركيب. فالواقع أننا تمكنا من إدراك دواعي مختلف البناءات ومن فهم ترتيب تناليها.

ولا يوجد ما يدعو للاستغراب في ما سبق من تحليل: فالمفاهيم والتقنيات التي استعدها هي من بين المفاهيم والتقنيات الأولية الموجودة في رسالته عن المعادلات. فبعد أن باشر باتباع طريق تحليل جبري لدراسة المجاهيل x, y, z, t ، اعتمد تقنية تردد استخدامها عبر كل الرسالة: رد هذه المجاهيل، بواسطة تحويلات أفينية إلى مجهول واحد u ومن ثم إعطاء الحل الهندسي للمسألة المطروحة عبر ترجمة هندسية لعناصر تحليله الجبري.

وإذا صحت فرضيتنا هذه التي عرضناها في ما تقدم، يكون ما صادفناه، في هذا النوع من مسائل البناء الهندسي بواسطة المسطرة والفرجار المعالج من قبل رياضي جبري، يكون ما صادفناه هذا، عبارة عن ترجمتين متواليتين: ترجمة جبرية لمسألة هندسية، تؤول بالمسألة إلى معادلة جبرية؛ ومن ثم، ترجمة هندسية للمسألة الجبرية، تهدف إلى الجواب عن السؤال الأولي بواسطة بناء هندسي (تقاطع دائرة مع مستقيم).

هذا الفرق المهم بين حل مسائل البناء الهندسي من قبل جبريين ودراسة المسائل نفسها من قبل هندسيين، يعود إلى هذه الترجمة المزدوجة. إنه لا يعبر عن علاقات جديدة بين الجبر والهندسة فقط، بل يجعل أيضاً معنى عبارة «التحليل» أكثر مرونة في النقاش الشهير حول التحليل والتركيب.

الفصل الرابع

النصوص

- نص رسالة الطوسي حول «المعادلات (١ - ٢٠)»
- نص رسالة الطوسي حول «المعادلات (٢١ - ٢٥)»
- نص رسالة «في الخطين اللذين يقربان ولا يلتقيان»
- نص رسالة «في عمل مسألة هندسية»

المعادلات

<I>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ف - ١ - ظ
ل - ٣٥ - ظ

أما بعد حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة على رسوله محمد وآله؛
فلاني قصدت في هذا الكتاب تلخيص صناعة الجبر والمقابلة وتهذيب ما
وصل إلي من كلام الفاضل الفيلسوف الأعظم شرف الدين المظفر بن
محمد الطوسي⁵، وتحويل كلامه من إفراط التطويل إلى حد الاعتدال.
وأسقطت الجداول التي رسمها في عمل الحساب واستنباط المسائل، لبعده
عن الطبع واستدعائه طول الزمان الموجب للملال، وثبتت كيفية استخراج
المسائل بالتخت. وجمعت بين العمل والبرهان، وسميته بالمعادلات.
وأستغيث بالله وحده، وهو حسبنا ونعم المعين.

< مَقَدِّمَات >

10


لنقدّم عليه مقدّمةٌ تحتوي على أشكال يُحتاج إليها في تقرير المطالب.
إذا قُطع المخروط بسطحٍ يجوز على سهمه حدثٌ في المخروط مثلث،
ساقاه هما الفضلان المشتركان بين السطح القاطع وبين بسيط / المخروط؛
وقاعدته الفصل المشترك بين هذا السطح القاطع وبين قاعدة المخروط. ثم
قُطع بسطح آخر يقوم على سطح المثلث على زوايا قائمة، فإن الفصل¹⁵
المشترك بين هذا السطح وبين المخروط يقال له القِطْعُ، والخط الذي هو
الفصل المشترك بين سطح القِطْع وسطح المثلث يقال له قُطر القِطْعُ،

6 رسمها: رسمه [ف، ل] - 7 وثبتت: وثبت [ف] ويشته [ل] - 8 بالتخت: بالبحث [ف، ل] -
11 لتقديم: والتقدم [ف] / تحتوي: يحتوي [ف، ل] / يحتاج: محتاج [ف] - 12 حدث: وحدت
[ف، ل] - 14 المخروط: ناقصة [ف] - 14-15 ثم قطع: على تقديره إذا - 16 هو: ناقصة [ف]

والأعمدة الخارجة من محيط القطع إلى القطر يقال لها خطوط الترتيب، فإن كان قطر القطع موازياً لضلع «أو» لآخر من المثلث يسمى القطع مكافئاً، وإن لاقاه من جهة رأس المخروط يسمى زائداً، وإن لاقاه من جهة القاعدة يسمى ناقصاً.

5 والخَطُّ المساوي لضعف ما بين رأس القطع ورأس المخروط من ضلع
الثلث المارَّ بالسهم يُسمى ضلعاً قائماً للقطع المكافئ، والخَطُّ المتصل بقطر
القطع الزائد على الاستقامة فيما بين القطع ونقطة ملاقات الضلع الآخر من
الثلث يقال له القطرُ المُجانب.

ساقا $\overline{اب}$ $\overline{اج}$ من مثلث $\overline{اب}$ ج متساويان، وزاوية $\overline{امنه}$ قائمة،
 10 وأُخرج من زاويته القائمة خط $\overline{اد}$ إلى منتصف القاعدة حتى صار عموداً
 عليه، وفرض على خط $\overline{اب}$ نقطة كيف اتفقت، وأُخرج منها خط مواز
 لخط $\overline{اج}$ وهو $\overline{هـ}$ وفُرض على خط $\overline{هـ}$ و / سطح يمر به، ويقوم على د - ٣٦ -
 سطح المثلث على زوايا قائمة، وتوهمنا حركة مثلث $\overline{ادج}$ مع ثبات $\overline{اد}$
 حتى طابق مثلث $\overline{ادب}$ فيحدث نصف مخروط، ويرسم د ج نصف
 15 دائرة، ويرسم السطح المار بخط $\overline{هـ}$ قطعاً مكافئاً رأسه عند نقطة $\overline{هـ}$
 وسهمه $\overline{هـ}$ و.



- 1 الحارِجَة: الحائِطَة (ف، ل] - 2 اضلع: للضلع (ف، ل / لآخر: لا آخر (ف، لا آخر (ل] - 5 نصف: بنصف (ف، ل] - 6 المكاء: المكاء (ل] - 10 منتصف: منتصف (ف، ل] - 11 وفرض: فرض (ل] / مواز: مواز (ف، ل] - 14 ويرسم: ويرسم (ف، ل] - 13-14 جد... ويرسم: ناقص (ل] - 15 المار: المار (ل] / هـ: هـ، الرائي مهمله في المخطوطين (ف، ل، ولن تشير إلى هذا بما بعد / رأسه: رأسه (ل]


فأقول: إنّ ضرب الجانب مع الخط الذي يفصله خط الترتيب من القطر مما يلي رأس القطع في الخط المفصول مساوٍ لمربع خط الترتيب. لأنّا نخرج من محيط القطع من نقطة ط عموداً أعني خط ترتيب إلى قطر القطع، وليكن ط ك، ونخرج من موقعه خطاً موازياً لخط أ ج، وهو خط ل ك م، وننتوهم سطحاً يمرّ بخط ل ك م، ويقوم على سطح المثلث على زوايا قائمة. فهذا السطح يحدث في المخروط دائرة، لأن خط ل ك م عمود على ب د، وكلّ خط موازٍ ل د ج يرسم بحركته نصف دائرة، ويكون عمود ط ك بعينه هو الفصل المشترك بين السطح القاطع وسطح هذه الدائرة لما مرّ في الشكل المتقدم، ولأن زاوية ه ك م قائمة، وزاوية 10 ه م ك نصف قائمة، تبقى زاوية م ه ك نصف قائمة، فخط ه ك مثل / ك م، وزاوية ز ك ل قائمة وزاوية ز ل ك نصف قائمة، فزاوية ل - 38 - ط ل ز ك نصف قائمة، فز ك مثل ك ل، ولأن ضرب م ك في ك ل مثل مربع ك ط، و ك م مثل ك ه، و ل ك مثل ك ز، فضرب ه ك في ك ز مثل مربع ك ط، وهو خط الترتيب. ولأن سطح القطع قائم على 15 سطح مثلث أ ب ج على زوايا قائمة، وكلّ نقطة تفرض على قطر القطع فإنه يخرج منها إلى محيط القطع عموداً، ويكون خط ترتيب له؛ وذلك ما أردنا بيانه.

خط ب ج محيط قطع زائد، قطره أ م وبجانبه أ ب ومتتصف المجانب نقطة ه، وأخرجنا من نقطة ب - وهي رأس القطع - عموداً

1 يفصله: يفصله [ف] - 5 وننتوهم: ويتوهم [ف، ل] - 6 ل ك م: م س [ف، ل] - 9 هذه: فوق السطر [ل] / ه ك م: ك م [ف، ل] - 10 تنق: ينق [ف] / م ه ك: ه ك م [ف، ل] - 14 الترتيب: التي يب [ل] - 15 تفرض: يفرض [ف] - 16 يخرج: يخرج [ف] - 18 ومتتصف: وتنصف [ل]

على $\overline{أ ب}$ ، وفصلنا منه مثل $\overline{ب ه}$ وهو $\overline{ب ح}$ ، ووصلنا $\overline{ه ح}$ وأخرجناه على استقامة بغير نهاية، وأخرجنا محيط / القطع بغير نهاية.

ف - ٢ - ط



فأقول: إن هذا الخط المستقيم يقرب أبداً من محيط القطع ولا يلقاه. لأننا نفرض على محيط القطع نقطة $\overline{ج}$ ، ونخرج منها عموداً على القطر $\overline{س ب}$ وليكن $\overline{ج ز}$ ، ونخرجه على الاستقامة، فلأن زاوية $\overline{ب من مثلث ه ب ح}$ قائمة، وزاويتي $\overline{ه ح متساويتان}$ ، فكل واحد منهما نصف قائمة، وزاوية

١ وأخرجناه: وأخرجناه $\overline{ه [ف]}$ ، وأخرجنا $\overline{ل [4]}$ القطع: ناقصة $\overline{ف [5]}$ - $\overline{ه ب ح}$: ١ ب ح
 $\overline{ف [ل]}$ - 6 فكل: وكل $\overline{ف [ف]}$ / واحدة: واحد $\overline{ف [ل]}$

- هـ ز ج قائمة فعمود ج ز / يلتقي الخط المستقيم، وليكن على نقطة ط، ل - ٣٩ - و
ونخرج من نقطة ج عموداً على الخط المستقيم وهو ج ك، ونخرج من نقطة
ب أيضاً عموداً على الخط المستقيم وهو عمود ب ل، فلأن زاوية ب هـ ل
نصف قائمة، وزاوية هـ ز ط قائمة، تبقى زاوية ز ط هـ نصف قائمة،
5 فز ط مثل ز هـ، فخط هـ ز ط إذا فرض خطاً مستقيماً فقد قُسم
بقسمين متساويين على ز ومختلفين على ج، فضرب هـ ز ج في ج ط مع
مربع ز ج مثل مربع ز ط، أعني مربع ز هـ، و ا ب قد قُسم بنصفين
على نقطة هـ وزيد فيه خط ب ز، فضرب ا ز في ب ز مع مربع هـ ب
مثل مربع هـ ز، فضرب ا ز في ب ز مع مربع هـ ب مثل ضرب هـ ز ج
10 في ج ط مع مربع ز ج. لكن ضرب ا ز في ب ز مثل مربع ز ج،
لكونه خط الترتيب، فيبقى مربع هـ ب مثل ضرب هـ ز ج في ج ط،
فنسبة هـ ز ج إلى هـ ب كنسبة هـ ب إلى ج ط، وهـ ز ج أعظم من
هـ ب، ف هـ ب أعظم من ج ط، ولأن زاوية هـ نصف قائمة وهـ ل ب
قائمة يبقى هـ ب ل نصف قائمة. فخط هـ ل مثل ب ل، فربع هـ ب
15 مثل مربعي هـ ل ل ب، فهو ضعف مربع ب ل، ولأن زاوية ط نصف
قائمة و ج ك ط قائمة، يبقى ط ج ك / نصف قائمة، ف ج ك مثل ا ل - ٣٩ - ط
ك ط، فربع ج ط مثل مربعي ج ك ك ط، فهو ضعف مربع ج ك،
فضعف مربع ب ل أعظم من ضعف مربع ج ك، فنصفه - وهو مربع
ب ل - أعظم من نصفه وهو مربع ج ك، فخط ب ل أعظم من
20 ج ك. وكذلك لو فرضنا على محيط القطع نقطة د، وأخرجنا منها عموداً

١ نقطة: ناقصة [ف] - 4 تبقى: يتي [ف] - 9 هـ ز: هـ و [ل] - 10 ز ج: و هـ [ل] - 11 لكونه:
لكن نه [ف] - 13 هـ ل ب: هـ ل ر [ل]

على القطر وهو د م ، وأخرجناه على الاستقامة حتى يلتقي الخط المستقيم على نقطة ن ، وأخرجنا من نقطة د عموداً على الخط المستقيم وهو س د فلنا نيين كما بينا أن ج ك أعظم من د س . فقد بان أن الخطين يتقاربان أبداً .
وأقول : إنها لا يلتقيان ، وإلا فليلتقيا على نقطة ص فنخرج منها عمود

5 ص ع ، فلأن خط ص ع مثل ع ه لا مرآئياً ، فضرب آ ع في ع ب مثل مربع ع ص لكونه خط الترتيب ، أعني مربع ع ه ، أعني ضرب آ ع في ع ب مع مربع ه ب ، فضرب آ ع في ع ب مع مربع ه ب مثل ضرب آ ع في ع ب ، هذا خلف . فالخطان لا يلتقيان .

وأقول أيضاً : إن ضرب ه س في س د مثل مربع ه ل .

10 لأن خط ه م مثل م ن لا مرآئياً ، فرب ه م ن إذا فرض خطأً

مستقيماً / فهو أربعة أمثال مربع ه م . ومربع ه ن مثل مربعي ه م ل - ٤٠ - و


م ن ، فرب ه م ن مثل ضعف مربع ه ن ، ومربع د س ن - إذا فرض خطأً مستقيماً - مثل ضعف مربع د ن ، لهذا بعينه ، فنسبة مربع ه م ن إلى مربع ه ن كنسبة مربع د س ن إلى مربع د ن . فنسبة 15 ه م ن إلى ه ن كنسبة د س ن إلى د ن . فضرب ه م ن في د ن مثل ضرب ه ن في د س ن ، لكن ضرب ه م ن في د ن مثل ضرب ه م د في د ن مع مربع د ن ، وضرب ه ن في د س ن مثل ضرب ه س في د س ن مع ضرب س ن في د س ن . فضرب ه م د في د ن مع مربع د ن مثل ضرب ه س في د س ن مع ضرب س ن في

1 وأخرجناه : وأخرجنا [ل] - 2 ن : ب [ف] ، قد تقرأ بد أو به [ل] - 4 يلتقيان : يلتقيان [ف] /
فنخرج : فيخرج [ف] - 5 ع ب : ع ت [ل] - 8 يلتقيان : يلتقيان [ف] - 11 مربعي : مربع [ل] .

د س ن. لكن ضرب س ن في د س ن مثل مربع د ن، يبقى ضرب
 ه س في د س ن مثل ضرب ه م د في د ن، لكن ضرب ه م د في
 د ن / مثل مربع ه ب كما مرّ آنفاً. ف ضرب ه س في د س ن مثل مربع ن - ٣ - و
 ه ب، ف ضرب ه س في نصف د س ن - وهو د س - مثل نصف
 5 مربع ه ب أعني مربع ه ل، وهكذا نبين أن ضرب ه ك في ك ج مثل
 مربع ه ل، فيكون ضرب ه س في د س مثل ضرب ه ك في ك ج؛
 وذلك ما أردنا بيّنه.


نريد أن نعمل قطعاً زائداً / مجانبه خط مفروض وهو خط ا ب. ل - ٤٠ - ظ
 فنعمل عليه مثلثاً متساوي الساقين قائم الزاوية، بأن نعمل كلّ واحدة
 10 من زاويتي ا ب مثل نصف قائمة. فخطاً ا ج ب ج يلتقيان، ولكن على
 نقطة ج، وكلّ واحدة من زاويتي ا ب نصف قائمة، فزاوية ج قائمة
 و ا ج ب متساويان، فنلث ا ب ج متساوي الساقين قائم الزاوية.
 ونُخرج ا ج ب على الاستقامة، ويُفصل ج د ج ه متساويين، ونصل
 د ه، ونُخرج ا ب على الاستقامة حتى يلتق د ه ولكن على نقطة ح،
 15 ونُخرج من نقطة ج خطاً إلى منتصف د ه فيكون عموداً عليه، ف ا ح
 يوازي ج ز. ويُنوهم حركة مثلث ج ز ه مع ثبات ج ز حتى يُطابق مثلث
 ج د ز، فيرسم < نصف > مخروط قاعدته نصف دائرة يرسمها ه ز، وننوهم
 سطحاً يمرّ بخط ا ب ح قائماً على سطح المثلث على زوايا قائمة، فيحدث
 في المخروط قطع زائد رأسه نقطة ب - ومجانبه ا ب المفروض؛ وذلك ما
 20 أردنا بيّنه.

1 د س ن (الأول والثانية): د س ه ن [ف، ل] - 2 د س ن: د س ه ن [ف، ل] - 3-2 لكن
 ضرب ... دن: ناقصة [ل] - 3 آنفاً: أيضاً [ل] - 5 نين: بين [ف] - 15 ونُخرج: ونُخرج [ل] -
 16 يطابق: تطابق [ف، ل] - 17 فيرسم: قوسم [ف، ل] / مخروط: مخروط [ف، ل] / يرسمها: نرسمها
 [ف] / ونوهم: ونوهم [ف]



نريد أن نجد قطعاً زائداً لا يقع عليه خط \overline{AB} ويكون مُجانبه مثل خط مفروض وهو خط \overline{M} .

فنعمل على نقطة \overline{A} من خط \overline{AB} زاوية \overline{HAB} مثل نصف قائمة، \overline{H} - \overline{A} - \overline{B} ونخرج خط \overline{AH} من الجهتين ونفصل منه \overline{AD} \overline{AH} ، كل واحد منهما مثل 5 < نصف > خط \overline{M} ، ونخرج من نقطة \overline{H} عموداً على \overline{AH} وهو \overline{JH} .




4 ونفصل: ونفصل [ل]

فنخرج $\overline{ب د}$ على الاستقامة ونجعل $\overline{ب ه}$ مثل $\overline{ب د}$ ، ونعمل قطعاً زائداً بجانبه $\overline{د ه}$ ورأسه نقطة $\overline{د}$ بالعمل السابق، فلا يقع عليه خطا $\overline{ا ب}$ $\overline{ب ج}$ ؛ وذلك ما أردنا بيانه.

خطا $\overline{ا ب}$ $\overline{ا ج}$ محيطان بزاوية $\overline{ا ج ا}$ القائمة، ونقطة $\overline{د}$ مفروضة فيما بينهما وهي أقرب إلى $\overline{ا ب}$ ، فنريد أن نعمل قطعاً زائداً يمرّ محيطه بنقطة $\overline{د}$ ، ويكون منتصف مُجانبه $\overline{ا}$ ، ولا يقع عليه خطا $\overline{ا ب}$ $\overline{ا ج}$ ، ويقاربان / محيط القطع أبداً.

ل - ٤١ - ط



2 مجانبه: مجانبه [ل] / السابق: السابق [ل] - 6 مجانبه: مجانبه [ل]

فنخرج منها عموداً على أقرب الخطين إليها، وهو خط \overline{AB} وليكن هو عمود \overline{D} ، ونعمل مربعاً مثل ضرب \overline{A} في \overline{D} ، ونفصل \overline{AZ} مثل ضلع ذلك المربع، ونتمم مربع \overline{AZ} فهو مثل ضرب \overline{A} في \overline{D} ، ونعمل \langle قطعاً \rangle زائداً رأسه نقطة \overline{M} ومتتصف بجانبه نقطة \overline{A} ولا يقع عليه خطاً \overline{AB} \overline{AJ} فيمَرَّ بحيطه بنقطة \overline{D} ، وإلا لكان مربع \overline{AZ} مثل ضرب \overline{A} في أطول من \overline{D} أو في أقصر منه، وهذا خلف. فحيط القطع يمر بنقطة \overline{D} ، ولأننا نخرج من نقطة \overline{M} عموداً على قطر القطع ونفصل منه \overline{M} ح مثل \overline{M} ، ف \overline{AB} يقارب محيط القطع أبداً، وأما أن \overline{AJ} يقارب محيط القطع فلهذا بعينه؛ وذلك ما أردناه.

〈 تصنيف المعادلات 〉

10

وإذا تقررَت هذه المقدمات فاعلم أن الواحد الخطي هو خطاً ما مفروضٌ تُنسب إليه سائر الخطوط، والواحد السطحي هو مربع الواحد الخطي، والواحد / الجسمي مجسمٌ قاعدته الواحد السطحي وارتفاعه $\overline{F} - \overline{3} - \overline{ظ}$ الواحد الخطي. والعدد في كل مرتبة أمثال الواحد في تلك المرتبة؛ والجذر الخطي هو ضلع مربع ما مُنْطَقاً كان أو أصمً؛ والجذر السطحي للمربع هو سطح طوله الجذر الخطي وعرضه / واحد خطي، والمربع يسمى مالاً $\overline{L} - \overline{٤٢} - \overline{و}$

١ فنخرج: فيخرج [ف] - 2 ونفصل: ويفصل [ل] - 3 ونتمم: ويتم [ل] / \overline{AZ} م ز: \overline{AZ} م
[ف، ل] - 4 ونمتصف: ونمتصف [ل] - 7 ونفصل: ويفصل [ل] - 8 يقارب: تقارب [ف]، تفاوت [ل]
/ يقارب: تقارب [ف، ل] - 12 تنسب: ينسب [ف] - 12-13 هو مربع ... الخطي: ناقصة [ل]

سطحياً. والمال المجسم هو مجسم قاعدته المال السطحي، وارتفاعه واحدٌ خطي؛ والجذر الجسمي لهذا المال هو مجسم قاعدته الجذر السطحي، وارتفاعه واحدٌ خطي. ويتولد من المعادلة بين الأعداد والجذور والأموال والمكعبات خمس وعشرون مسألة وهي هذه:

5 جذرٌ يعدل عدداً، مالٌ يعدل عدداً، مالٌ يعدل جذوراً، مكعبٌ

يعدل أموالاً، مكعبٌ يعدل جذوراً، مكعبٌ يعدل عدداً، مالٌ وجذورٌ

يعدل عدداً، جذورٌ وعددٌ يعدل مالاً، مالٌ وعددٌ يعدل جذوراً، مكعبٌ

وأموالٌ يعدل جذوراً، أموالٌ وجذورٌ يعدل مكعباً، مكعبٌ وجذورٌ يعدل

أموالاً، مكعبٌ وجذورٌ يعدل عدداً، مكعبٌ وعددٌ يعدل جذوراً، عددٌ

10 وجذورٌ يعدل مكعباً، مكعبٌ وأموالٌ يعدل عدداً، مكعبٌ وعددٌ يعدل

أموالاً، عددٌ وأموالٌ يعدل مكعباً، مكعبٌ وأموالٌ وجذورٌ يعدل عدداً،

عددٌ وجذورٌ وأموالٌ يعدل مكعباً، مكعبٌ وعددٌ وجذورٌ يعدل أموالاً،

مكعبٌ وأموالٌ وعددٌ يعدل جذوراً، عددٌ ومكعبٌ يعدل / جذوراً ل - ٤٢ - ظ

وأموالاً، مكعبٌ وأموالٌ يعدل جذوراً وعدداً، مكعبٌ وجذورٌ يعدل أموالاً

15 وعدداً، فالست الأولى مفردة، والبواقي مقترنة.

أما المفردة:

3 المعادلة: المقالة [ل] - 4 خمس: خمسة [ف. ل] / مسألة: مسله [ف. ل]. ولن نشير لها مرة أخرى
 - 6 أموالاً: أموالاً [ل] / مكعبٌ يعدل جذوراً: كتبنا ناسخ ف قبل «مكعبٌ يعدل أموالاً» - 6-7 مال
 وجذورٌ يعدل: يعني المجموع، ولهذا فإن الفعل «يعدل» يتعلق باسم مذكر هو المجموع. وسنأخذ بذلك في المواضع
 التالية دون أن نشير له مرة أخرى - 11 وجذور: وجذوراً [ل] - 12 وأموال: أموال [ل] - 15 فالست:
 فالستة [ف]

(المعادلات المفردة)


فالمسألة الأولى: جذرٌ يعدل عدداً.

فليكن $\overline{أ ب}$ الواحد الخطي، و $\overline{أ ج}$ آحاد خطية بعدة العدد المذكور في السؤال، ونُخرج من نقطتي $\overline{أ ج}$ عمودين على $\overline{أ ج}$ ، ونفصل منها $\overline{أ هـ}$ 5 $\overline{ج ز}$ ، كل واحدٍ منها مثل الواحد الخطي. ونصل $\overline{هـ ز}$ ، فسطح $\overline{أ ز}$ آحاد سطحية عدتها مثل العدد المذكور في السؤال؛ ونجعل $\overline{د ح}$ مثل $\overline{أ ج}$ فهو ضلع مربع ما، فهو جذر خطي. ونُخرج من نقطتي $\overline{د ح}$ عمودين على $\overline{د ح}$ ، ونفصل منها $\overline{د ط}$ $\overline{ح ك}$ ، كل واحدٍ منها مثل الواحد الخطي؛ ونصل $\overline{ط ك}$ ، ف $\overline{د ك}$ جذر سطحي؛ ونعمل على كل واحد من سطحي $\overline{أ ز}$ $\overline{د ك}$ مجسماً ارتفاعه واحد خطي؛ فالمجسمان متساويان، والمجسم الذي على سطح $\overline{أ ز}$ آحادٌ جسمية بعدة العدد المذكور في السؤال، والمجسم الذي على سطح $\overline{د ك}$ جذرٌ جسي.

فقد وجدنا جذراً خطياً، وجذراً سطحياً، وجذراً جسياً، كل واحدٍ منها مساوٍ للعدد المذكور، وكل واحد منها معلوم لكونه مساوياً للعدد

ل - ٤٣ - و



15 / المعلوم.



2 عدداً: عدد [ل] 3 - أ ج: 1 - ر [ل] 12 - د ك: ر ك [ل] 14 - منها: منها [ل] / مساو:
مساوياً [ف، ل]

المسألة الثانية: مالٌ يعدل عدداً.

فليكن $\overline{أ ب}$ آحاداً سطحيةً بعدة العدد المذكور في السؤال، ونعمل مربع $\overline{ج ه}$ مثل سطح $\overline{أ ب}$ ، ونعمل على كل واحد من سطحي $\overline{أ ب}$ $\overline{ج ه}$ مجسماً ارتفاعه واحد خطي؛ فقاعدتا المجسمين مكافئتان لارتفاعيهما، فهما 5 متساويان، والمجسم الذي على $\overline{أ ب}$ آحاداً جسمية بعدة العدد المذكور في السؤال، والمجسم الذي على مربع $\overline{ج ه}$ مالٌ جسمي. فقد وجدنا مالاً سطحياً ومالاً جسمياً، كل واحدٍ منها مساوٍ للعدد المذكور؛ فنضع العدد على التخت ونستخرج جذره؛ وهو المطلوب.




المسألة الثالثة: مال يعدل جذوراً.

10 فيرجع إلى مسألة: جذر يعدل عدداً. وليكن $\overline{أ ب}$ عدد الجذور، وآحاده $\overline{أ ج د ب}$ ، ونعمل عليه مربع $\overline{آ ز}$ ، ونخرج عمودي $\overline{ج ح}$ $\overline{د ط}$ ، ونفصل $\overline{أ ك}$ مثل الواحد الخطي، ونخرج عمود $\overline{ك م}$ ، فسطوح $\overline{أ ح د د ز}$ جذورٌ سطحية بعدة آحاد $\overline{أ ب}$. فالمال السطحي - وهو

1 المسألة الثانية: ناقصة [ل] - 2 آحاد: احاد [ف]، ل - 4 مكافئتان: مكافئان [ف] - 7 مساو: مساوياً [ف]، ل - 8 فضع: فضع [ل] / التخت: البحث [ل] / جذره: جلده [ل] - 9 المسألة الثالثة: ناقصة [ل] - 11 وآحاده: آحاده [ف] / ونخرج: ونخرج [ل] - 12 ونخرج: ونخرج [ل]

مربع $آز$ - يعدل الجذور السطحية بالعدّة المذكورة في السؤال، و $آم$ آحاد سطحية بعدّة عدد الجذور، وهو جذر واحد سطحيّ. فالجذر مساوٍ لآحادٍ سطحية مثل عدد الجذور. وإذا عملنا على $آز$ بحسماً ارتفاعه بقدر الواحد الخطي، حصل مالٌ جسمي / يعدل جذوراً جسميّة بالعدّة $ل - ٤٣ - ظ$ المذكورة في السؤال. والمجسّم الذي على $آم$ آحادٌ جسميّة بعدّة عدد الجذور المذكورة في السؤال. وتبيّن أن نسبة المال إلى الجذر كنسبة الجذر إلى الواحد، لأن نسبة مربع $آز$ إلى $آم$ كنسبة $آه$ إلى $آك$ ، / وهي ف - ٤ - و كنسبة $آح$ إلى $آل$. فنسبة المال السطحيّ إلى الجذر السطحيّ كنسبة الجذر السطحيّ إلى الواحد السطحيّ. ولأن نسبة المجسّم الذي على $آز$ إلى المجسّم الذي على $آم$ كنسبة $آز$ إلى $آم$ ، وهي كنسبة $آه$ إلى $آك$ ، وهي كنسبة $آح$ إلى $آل$ ، وهي كنسبة المجسّم الذي على $آح$ إلى المجسّم الذي على $آل$ ؛ فنسبة المال الجسميّ إلى الجذر الجسميّ كنسبة الجذر الجسميّ إلى الواحد الجسميّ.




2 آحاد: ا ط ز (كذا) [ف] - 9 ولان: وان [ل]

المسألة الرابعة: مكعب يعدل أموالاً.

فُرجِع أيضاً إلى مسألة: جذر يعدل عدداً. وليكن \overline{AB} عدد الأموال، وآحاده \overline{AJ} جذر \overline{DB} ، ونُخرج عمودي \overline{JC} د \overline{P} ؛ ونفصل \overline{AK} مثل الواحد الخطي، ونعمل على مربع \overline{AZ} مكعباً. فالمجسم الذي 5 الذي على \overline{AM} - وارتفاعه بقدر \overline{AJ} - جذرٌ جسمي، والمجسم الذي على \overline{AZ} - وارتفاعه بقدر \overline{AJ} - مالٌ جسمي؛ والمكعب مساوٍ للمجسمات التي على سطوح \overline{ACH} د \overline{DZ} ، وارتفاعها \overline{AB} ، فيكون ل - ٤ - ٤ - و مساوياً لأموالٍ «جسمية» عدتها مثل عدة الأموال المذكورة في السؤال؛ والمجسم الذي على \overline{AL} - وارتفاعه \overline{AJ} - واحد جسمي، فالمجسم الذي 10 على \overline{AM} آحادٌ جسمية عدتها مثل عدة الأموال المذكورة في السؤال. فالجذر الجسمي مساوٍ لآحادٍ جسمية عدتها مثل عدة الأموال المذكورة في السؤال. ونبين أن نسبة المكعب إلى المال كنسبة المال إلى الجذر؛ لأن نسبة المكعب إلى المجسم الذي على \overline{AM} - وارتفاعه \overline{AB} - كنسبة المال السطحي - وهو مربع \overline{AZ} - إلى الجذر السطحي وهو \overline{AM} ، وهي كنسبة 15 المجسم الذي على \overline{AZ} - وارتفاعه \overline{AJ} - إلى المجسم الذي على \overline{AM} وارتفاعه \overline{AJ} وهو الجذر الجسمي. فنسبة المكعب إلى المال الجسمي كنسبة المال الجسمي إلى الجذر الجسمي. ولأن نسبة المكعب إلى المجسم الذي على \overline{AL} - وارتفاعه بقدر \overline{AB} - كنسبة مربع \overline{AZ} إلى سطح \overline{AL} ، فنسبة المكعب إلى الجذر الجسمي كنسبة المال السطحي إلى الواحد 20 السطحي؛ وذلك ما أردنا بيانه.

١ الرابعة: الرابع [ف] / المسألة الرابعة: ناقصة [ل] - 3 ونخرج: وينجز [ل] - 16 وهو: ناقصة [ل]



المسألة الخامسة: مكعب يعدل جذوراً.

فُرجع إلى مسألة: مال يعدل عدداً. لأن نسبة المكعب إلى المال كنسبة المال إلى الجذر، ونسبة المال إلى الجذر كنسبة الجذر إلى الواحد، فنسبة ل - ٤٤ - ط المكعب إلى المال كنسبة الجذر إلى الواحد؛ فبالتبديل: نسبة المكعب إلى الجذر كنسبة المال إلى الواحد، فنسبة المكعب إلى جذور بالعدة التي في السؤال كنسبة المال إلى آحادٍ عدتها مثلُ عدة الجذور المذكورة في السؤال؛ لكن المكعب مساوٍ لها، فالمال مساوٍ لآحادٍ بتلك العدة، فهو معلوم، فنضع العدد المساوي له < على التخت > ونستخرج جذره؛ فما كان فهو المطلوب.

1 المسألة الخامسة: ناقصة [ل] - 2 فرجع: فرجع [ف] - 4 فالتبديل: فالتبديل (كذا) [ل] - 8 فنضع: فيضع [ل] / ونستخرج: فيخرج، وكعب الناسخ ولوأ تحها [ل]

المسألة السادسة: مكعب يعدل عدداً.

ولتقدم على ذلك مقدمة وهي: إخراج خطين بين خطين لتتوالى الأربعة متناسبة.

فليكن خطاً $\overline{اب م ل}$ مفروضين، و $\overline{اب}$ أطولها، ونخرج من نقطة $\overline{ب}$ عموداً على $\overline{اب}$ ، ونفصل منه $\overline{ب ج}$ مثل $\overline{م ل}$ ، ونعمل قطعاً مكافئاً رأسه نقطة $\overline{ب}$ ، وسهمه $\overline{اب}$ ، وقائمُه مثل $\overline{ب ج}$ ، ونعمل قطعاً آخر مكافئاً رأسه نقطة $\overline{ب}$ ، وسهمه $\overline{ب ج}$ ، وقائمُه مثل $\overline{اب}$ ، ونفصل $\overline{ب ه}$ مثل $\overline{ب ج ه}$ ونخرج من نقطتي $\overline{ه ج}$ عمودين على السهمين، فليتقيان؛ وليكن التقاؤهما على نقطة $\overline{ز}$ ، فسطح $\overline{ه ج}$ مربع. فلأن $\overline{ه}$ نقطة على $\overline{اب}$ ، فيخرج منها عمود، وينتهي إلى محيط القطع الذي سهمه $\overline{اب}$ وقائمُه $\overline{ب ج}$ ، وكذلك نقطة $\overline{ج}$ على خط $\overline{ب ج}$ فيخرج منها عمود، وينتهي إلى محيط القطع الذي سهمه $\overline{ب ج}$ وقائمُه $\overline{اب}$. فلأن ضرب $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب ه}$ - أعني مربع $\overline{ه ج}$ - مثل مربع العمود الذي نخرج من نقطة $\overline{ه}$ وينتهي إلى محيط القطع الذي سهمه $\overline{اب}$ ، وهو مثل مربع $\overline{ه ز}$ ، ف $\overline{ه ز}$ هو العمود المذكور، فنقطة $\overline{ز}$ على محيط ذلك القطع، وضرب $\overline{اب}$ في $\overline{ب ج}$ مثل مربع العمود الذي نخرج من نقطة $\overline{ج}$ وينتهي إلى محيط القطع الذي سهمه $\overline{ب ج}$. لكن ضرب $\overline{اب}$ في $\overline{ب ج}$ أعظم من مربع $\overline{ه ج}$ ، فالعمود الذي نخرج من نقطة $\overline{ج}$ وينتهي إلى محيط القطع الذي سهمه خط $\overline{ب ج}$ أطول من $\overline{ه ز}$ ، فليكن مثل $\overline{ج ط}$ ، فنقطة $\overline{ط}$ على محيط هذا القطع. ونفصل $\overline{ب د}$ مثل $\overline{ب ا}$ ، ونخرج من نقطتي $\overline{ا د}$ عمودين على

1 المسألة السادسة: ناقصة [ل] - 2 ولتقدم [ف] / بين خطين: ناقصة [ل] / لتتوالى: ليتوالى [ف] - 6 وقائمُه: وقائمته [ل]، وكثيراً ما يكتب ناسخ ف: «وقائمة»، ولن نشير لهذا مرة أخرى - 8-20 ما بين النجمتين ناقص في [ل] - 15 المذكور: المذكورة [ف] - 20 وتفصل: ويفصل [ف]

وإذا تقرر هذا، فليكن \bar{A} هو الواحد الخطي، ود \bar{A} آحاد خطية بعدة /
 الآحاد الجسميّة المفروضة، ونُخرج فيما بينها خطي \bar{B} ج لتتوالى ل - ٤٥ - ظ
 الأربعة متناسبة، حتى يكون نسبة \bar{A} إلى \bar{B} كنسبة \bar{B} إلى ج. وج إلى
 د. فلأن نسبة مربع \bar{A} إلى مربع \bar{B} كنسبة \bar{A} إلى \bar{B} مثناة بالتكرير، وهي
 5 كنسبة \bar{B} إلى ج مثناة بالتكرير، ونسبة \bar{B} إلى د كنسبة \bar{B} إلى ج مثناة
 بالتكرير، فنسبة مربع \bar{A} إلى مربع \bar{B} كنسبة خط \bar{B} إلى خط د. فضرِب
 مربع \bar{A} في خط د كضرِب مربع \bar{B} في خط \bar{B} . لكن مربع \bar{A} في د آحاد
 جسمية بالعدّة المذكورة في السؤال، ومربع \bar{B} في خط \bar{B} هو مكعب
 \bar{B} . فقد وجدنا مكعباً مساوياً للعدد المذكور في السؤال؛ وهو معلوم لكونه
 10 مساوياً للعدد المعلوم. فنضع العدد على التخت، ونستخرج ضلعه، فما كان
 فهو المطلوب.

﴿معادلات الدرجة الثانية المقتزنة﴾



وأما المقتزنة فمنها ما لا يجتمع فيها الكعب مع العدد ومنها ما يجتمع. أما
 التي لا يجتمع فست مسائل:

15 المسألة الأولى: مال وجذور يعدل عدداً.

فليكن \bar{A} عدد الجذور وننصفه على ج. وليكن سطح \bar{L} عدداً
 مثل مربع ج \bar{B} وط \bar{L} العدد المذكور في السؤال. فنعمل مربعاً مساوياً

2 لتتوالى: ليتوالى [ف] - 4 إلى ب: الباء ناقصة في [ل]، وفوق السطر في [ف] - 8 خط \bar{B} : خط
 ب ر [ل] - 10 فضع: فيضع [ل] / ونستخرج: ويستخرج [ل] / فما: ما [ل] - 15 المسألة الأولى:
 ناقصة [ل] - 16 وتنصفه: وينصفه [ف]، وينصفه [ل] - 17 فعمل: فيعمل [ف]

لعدد ط م، فصله أطول من ج ب فنخرج ج ب بالاستقامة؛ ويفصل ج د مثل ضلعه، فربع ج د، أعني / العدد مع مربع ج ب، مثل مربعي ل - ٤٦ - و ج ب ب د وضعف ضرب ج ب في ب د، أعني ضرب ا ب في ب د. فنسقط مربع ج ب المشترك، يبقى ضرب ا ب في ب د مع مربع ب د مثل العدد؛ فنعمل على ب د مربع ب ه، ونُخرج ه و بالاستقامة، ونفصل ه ح مثل ا د ونصل ا ح. فسطح ا ه الذي هو من ضرب ا د في د ه أعني د ب مثل العدد؛ فقد وجدنا سطحاً واحداً مساوياً للعدد، مؤلفاً من مالٍ وهو مربع ب د، ومن سطح مضافٍ إلى ه ب مساوٍ لعدد الجذور.



10 وأما استخراج الجذر: فنضع العدد على التخت، ويعدّ مراتبه بجذر، ولا جذر، وحيث وقع عليه الجذر نضع صفراً، ونعرف المرتبة السميّة للجذر الأخير فيكون لها صورٌ ثلاث:

1 فنخرج ج ب: فيخرج ج ب [ف]، ناقصة [ل] - 4 فنسقط: فيسقط [ف] - 6 ونفصل: ويفصل [ف] - 8 ه ب مساوٍ: ا ب مساوياً [ف]، [ل] - 10 نضع: فيضع [ل] / التخت: البحث [ل] - 11 نضع: يضع [ل]

الصورة الأولى:

أن يكون المرتبة السمية للجذر الأخير أرفع من آخر مراتب عدد الجذور؛ مثل قولنا: مألٌ وأحد وثلاثون جذراً يعدل عدد مائة واثنى عشر ألفاً وتسعمائة واثنين وتسعين.

- 5 فيعدّ من المرتبة السمية للجذر الأخير إلى الجذر الأخير. ونعدّ بتلك العدة من أرفع مراتب عدد الجذور، فحيث ينتهي يُنقل إليه أول مراتب عدد الجذور، فيكون بهذه الصورة: 112992 ؛ لأن المرتبة / السمية للجذر ل - ٤٦ - ٥ الأخير إنما هي المئات، والمرتبة السمية لأرفع مراتب عدد الجذور العشرات، فعددنا من المرتبة السمية للجذر الأخير إلى / الجذر الأخير، ف - ٥ - ٥ - ٥ وكان مرتبتان؛ وعددنا من مرتبة العشرات التي هي أرفع مراتب عدد الجذور بتلك العدة، فنقلنا إليه أول مراتب عدد الجذور. ثم نطلب أكثر عددٍ نضعه فوق المرتبة التي وقع عليها الجذر الأخير وننقص مربعه مما تحته، ونضربه في عدد الجذور، وننقص المبلغ من العدد؛ وهو الثلاثة. فنضعه مكان الصفر الأخير، ونعمل به العمل المذكور ليحصل بهذه الصورة: 13692 ، ونضع ضعف المطلوب وهو ستة بخدائه في السطر الأسفل، وننقل مراتب السطر الأسفل «والأعلى» بمرتبة، ونضع مطلوباً ثانياً في الجذر المتقدم على الجذر الأخير؛ وهو اثنان، ونعمل به ما عملنا بالمطلوب الأول، فيحصل بهذه الصورة: 32 ، ثم نزيد ضعف المطلوب الثاني على المرتبة التي بخدائه في السطر الأسفل، وننقل مراتب السطر الأسفل «والأعلى» بمرتبة؛ ونضع مطلوباً ثالثاً في الجذر / الأول، وهو واحد؛ ونعمل به | - ٤٧ - ٥

1 الصورة الأولى: ناقصة [ل] - 4 واثنين: واثنى [ف، ل] - 5 الجذر الأخير: الجذر لا يبق [ف] - 8 مراتب: ومرتب [ل] - 10 هي: تحت السطر [ف] - 11 نطلب: بطلب [ل] - 12 وتنقص: وينقص [ف، ل] - 13 ونضربه: وينقص [ف، ل] - 15 ونضع: ويضع [ل] / وننقل: وينقل [ف، ل] - 16 ونضع: ويضع [ل] - 18 ضعف المطلوب: مكررة [ف، ل] - 19 وننقل: وينقل [ف، ل] - 20 ونضع: ويضع [ل] / ثالثاً: بالثاني [ف]

العمل المذكور، فيرتفع العدد، ويحصل السطر الأعلى بهذه الصورة:
٣٢١ ، وهو الجذر المطلوب.

الصورة الثانية:

أن يكون آخر مراتب عدد الجذور أرفع من المرتبة السّمية للجذر
5 الأخير؛ مثل قولنا: مائاً وألفان واثنا عشر جذراً يعدل عدد سبعمائة ألف
وثمانية وأربعين ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعين.

فنضع عدد الجذور على رسم وضع المقسوم عليه، فيكون بهذه
الصورة: $\frac{748893}{2012}$ ، ونعمل العمل السابق إلى آخره.

الصورة الثالثة:

10 ألا يكون المرتبة السّمية للجذر الأخير أرفع من آخر مراتب عدد
الجذور ولا أنزل.

فنضع عدد الجذور على رسم وضع المقسوم عليه، ونعمل به العمل
المذكور.

وإنما وجب العمل على الوجه المذكور لأن العدد مركّب من المال
15 الحاصل من ضرب الجذر في نفسه، ومن المسطح الحاصل من ضرب
الجذر في عدد الجذور؛ وآخر مراتب المال إنما يحصل من ضرب آخر مراتب
الجذر في نفسه، وآخر مراتب المسطح يحصل من ضرب آخر مراتب

3 الصورة الثانية: ناقصة [ل] - 4 مراتب: المراتب [ف] - 9 الصورة الثالثة: ناقصة [ل] - 10 ألا:
كتبها ناسخ ف وكذلك ناسخ ل وأن لاء، ولن نشير لهذا مرة أخرى - 12 فنضع: فيضع [ل] -
13 المذكور: هذا العمل غير صحيح بوجه عام. مثال مأكس $x^2 + 111x = 128326$ وهنا $s = 307$. وما
يشير الدهشة أن نرى الطوسي خلال حله لمعادلات الدرجة الثالثة وفي موقف مماثل يعطي الحل الصحيح الكامل.
انظر مثال $x^3 + ax = N$ - 16-17 مراتب الجذر: المراتب الجذر [ل]

الجذر في آخر مراتب عدد الجذور. لكن آخر مراتب الجذر / إنما هو المرتبة ل - ٤٧ - ظ
 السمية للجذر الأخير المقابل للعدد، ومنحط ضرب هذه ٥ المرتبة في
 نفسها إنما يقع في مرتبة آخر الجذور المقابلة للعدد، وضربه في آخر عدد
 الجذور في الصورة الأولى أنزل من ضربه في نفسه، فيقع منحط هذا ٥
 5 الضرب قبل مرتبة آخر الجذور المقابلة للعدد؛ فالحاصل مقابل الجذر
 الأخير إنما هو من المال وهو آخره؛ وآخره إنما هو من ضرب آخر الجذر في
 نفسه. فنطلب عدداً ينقص مربعه من المرتبة المقابلة لآخر الجذور المقابلة
 للعدد. وإذا استخرجنا المطلوب نعلم أنه آخر الجذر؛ وهو مضروب في
 مراتب عدد الجذور؛ فيحتاج إلى ضربه في مراتب عدد الجذور ونقصانه
 10 من العدد، فهو مطلوب القسمة بالنسبة إلى عدد الجذور، وعدد الجذور
 هو المقسوم عليه. فإذا علمنا [أن] مطلوب القسمة من أي مرتبة - وهو
 أرفع من جميع مراتب عدد الجذور - علمنا قدر انحطاط مرتبة آخر عدد
 الجذور عن مرتبته، فنقلنا آخر مراتب عدد الجذور إلى المرتبة المنحطة عن
 المرتبة التي فيها المطلوب بقدر انحطاط مرتبته، لأن ضرب المطلوب في آخر
 15 عدد الجذور يقع منحطاً عن ضربه في نفسه بقدر انحطاط مرتبة عدد
 الجذور عن مرتبته، ووضعنا ضعف المطلوب في السطر الأسفل، ونقلنا
 مراتب السطر الأسفل / بمرتبة لأن آخر المراتب الباقية في العدد من ل - ٤٨ - و
 المسطح حاصل من ضرب هذا المطلوب في آخر عدد الجذور؛ ويكون آخر
 المراتب الباقية < في العدد > من المال أرفع من آخر المراتب الباقية من
 20 المسطح، لمامر في المطلوب الأول. فالمطلوب الثاني - وهو المطلوب

2-1 آخر مراتب الجذور... للعدد: يعني هنا أن مرتبة آخر مراتب الجذر هي المرتبة السمية... وهو تجاوز
 مقبول - 4-2 مابين النجمتين ناقص في [ل] - 5 الجذور: الحدود [ل] / للعدد: المقصود هنا أن مرتبة ضرب
 مرتبة آخر عدد الجذور في مرتبة آخر الجذر تقع قبل مرتبة الجذر الأخير (أي الثالث) المقابل للعدد - 7 فنطلب:
 فرطلب [ل] / لآخر: الآخر [ل] - 10 فهو: أي المطلوب الأول / مطلوب: المطلوب [ل] - 13 فنقلنا:
 فيقلنا [ل] - 18 هذا المطلوب: المقصود هنا المطلوب الثاني. ويبدو لنا أن في هذا النص بعض الاضطراب
 الذي قد يرجع إلى النسخ - 20 وهو المطلوب: هو مطلوب [ف]

المضروب في ضعف آخر الجذر، وهو بعينه المطلوب الذي يحصل منه آخر المسطح الباقي - ننقصُ مربعه وهو المال ونضربه في السطر الأسفل، ليحصل ضربه في ضعف المطلوب الأول، وفي مراتب عدد الجذور > وننقص حاصل الضرب من الباقي >. ثم عند النقل نزيد ضعفه على السطر الأسفل لأننا نحتاج إلى ضرب المطلوب الثالث في ضعف المطلوب الأول والثاني، وفي عدد الجذور بعد نقصان مربعه. / وسائر المطالب ف - ه - ط يستمر بيان أعمالها على هذا القياس.

وأما في الصورة الثانية: فلأن آخر مراتب عدد الجذور أرفع من المرتبة الأخيرة للجذر، فأخر مراتب المسطح أرفع من آخر مراتب المال؛ فأخر العدد هو < من > آخر المسطح، فنقلنا آخر عدد الجذور إلى آخر العدد. وإذا علمنا [أن] آخر مراتب الجذر من أي مرتبة فنعمل أن مربعه في أي مرتبة، وهي المرتبة المقابلة للجذر الأخير، فيُنقص مربعه من تلك المرتبة ونضربه في مراتب عدد الجذور، وينقص حاصل الضرب من العدد؛ وبقيّة / البيان ما مرّ.

ل - ٤٨ - ط


15 وأما الصورة الثالثة: فلأن الجذر هو بعينه من مرتبة آخر عدد الجذور، لأنه لو كان مرتبة آخر الجذر أرفع لكان مرتبة آخر الجذور المقابلة للعدد أرفع، ولو كان أنزل لكان أنزل؛ وإذا كان كذلك كان ضرب المطلوب في نفسه وضربه في آخر عدد الجذور يقعان في مرتبة واحدة، وهي مرتبة آخر

2 نقص: فينقص [ف، ل]، والصواب حذف الفاء لأن الجملة خير المبتدأ: المطلوب / وهو: من [ف، ل] / ونضربه: ويضربه [ل] - 4 نزيد: يزيد [ل] - 5 نحتاج: يحتاج [ف، ل] - 6 مربعه: مربعة [ل] - 10 أضفنا هنا ومنه لنفي المساواة التي قد تبدو للوهلة الأولى قائمة في حين أنها ليست محققة في مثال الطوسي نفسه، هذه واحدة، والأخرى أن آخر العدد ينشأ أساساً من آخر المسطح وليس العكس، أوبعبارة أخرى، أن آخر المسطح هو المهيمن / فنقلنا: فنقلنا [ل] / العدد: المسطح [ف، ل] - 11 فنقل: فنقل [ل] - 12 وهي المرتبة: وهي المراتب [ل] - 16 الجذر: الجذور [ف، ل] - 16 مرتبة آخر الجذور: آخر مرتبة الجذور [ف، ل] - 17 ولو: و [ل]

الجنور المقابلة للعدد؛ فينقل آخر عدد الجنور إلى تلك المرتبة؛ وبقية البيان ما مرّ.

المسألة الثانية: جنور وعدد يعدل مالا.

فليكن $\overline{اب}$ عدد الجنور المذكورة في السؤال، و $\overline{طك}$ هو العدد،
 5 وينصف $\overline{اب}$ على نقطة $\overline{ج}$ ، ونعمل $\overline{كل}$ مساوياً لمربع $\overline{جب}$ ، ونعمل
 مربعاً مساوياً لسطح $\overline{طم}$ ، فضله أطول من $\overline{جب}$ ، فنخرج $\overline{جب}$
 بالاستقامة، ويُفصل $\overline{جد}$ مثل ضلعه. فمربع $\overline{جد}$ - أعني العدد - مع
 مربع $\overline{جب}$ مثل مربعي $\overline{جب}$ $\overline{ب د}$ ، وضعف ضرب $\overline{جب}$ في $\overline{ب د}$ ،
 وهو $\overline{اب}$ في $\overline{ب د}$ ، فنسقط مربع $\overline{جب}$ المشترك، يبقى ضرب $\overline{اب}$ في
 10 $\overline{ب د}$ مع مربع $\overline{ب د}$ - أعني ضرب $\overline{اد}$ في $\overline{ب د}$ - مثل العدد؛ ولأن
 ضرب $\overline{اد}$ في $\overline{ب د}$ مع ضرب $\overline{اد}$ في $\overline{اب}$ مثل مربع $\overline{اد}$ ، فقد وجدنا
 مالا، وهو مربع $\overline{اد}$ ، مؤلفاً من العدد وهو $\overline{اد}$ / في $\overline{ب د}$ ومن عدد $\overline{ل - ٤٩ - ٥}$
 الجنور وهو $\overline{اد}$ في $\overline{اب}$..



2 ما مرّ: هنا أيضاً لم يبيّن الطوسي كيفية إيجاد آخر مراتب الجذر، ذلك أنها قد تنتج من وضع عدد الجنور
 على رسم القسوم عليه، وقد تنتج من البحث عن أكبر عدد لا يتجاوز مربعه العدد الفروض، وقد تأتي من
 الحدين معاً، انظر $138627 = x^2 + 111x$ ، $234972 = x^2 + 411x - 3$ المسألة الثانية: ناقصة [ل] -
 5 وينصف: وينصف [ل] - 7 ضلعه: ضلعيه [ف] - 9 فسقط: فسقط [ف]

وأما استخراج الجذر: فليكن $\overline{ا هـ}$ مربع $\overline{ا د}$ ، ونخرج $\overline{ب ز}$ موازياً لـ $\overline{د هـ}$ ، ونجعل $\overline{ب د}$ شيئاً - أعني جذر مال مجهول - و $\overline{ا ب}$ عدد الجذور المذكورة في السؤال، فـ $\overline{ا د}$ عدد الجذور وشيء، فسطح $\overline{ب هـ}$ من ضرب عدد الجذور وشيء في شيء، لكن ضرب شيء في شيء مال مجهول وعدد الجذور في شيء أشياء بعدة الجذور. وهذا المجموع يعدل مسطح $\overline{ب هـ}$ ، وهو العدد المذكور في السؤال، فيكون مال وجذوراً بالعدة المذكورة في السؤال، يعدل العدد الذي في السؤال؛ فيستخرج الجذر بالطريق المذكور في المسألة المتقدمة، فما خرج نزيد عليه عدد الجذور، فما حصل فهو الجذر المطلوب.

مثالها: أحد وعشرون جذراً وعدد سنة وتسعين ألفاً وثلاثمائة يعدل مالاً. فنضع العدد على التخت، ونستخرج الجذر بالطريق المذكور في المسألة المتقدمة، فيحصل بهذه الصورة: ٣٠٠، فنزيد عليه عدد الجذور المذكورة في السؤال، فيحصل بهذه الصورة: ٣٢١، وهو الجذر المطلوب.

١٥ المسألة الثالثة: مالٌ وعددٌ يعدل جنوراً.

فليكن $\overline{ا ب}$ عدد الجذور / وسطح $\overline{ج}$ هو العدد. فلأن الجذر إذا ل - ٤٩ - ط ضرب في نفسه حصل المال فقط، وإذا ضرب في $\overline{ا ب}$ حصل المال مع العدد؛ فـ $\overline{ا ب}$ أعظم من الجذر حتى يكون بعضه على مثال $\overline{ب د}$ ، وهو الجذر، ويكون $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب د}$ هو ضرب الجذر في عدد الجذور. وليكن

6 سطح: سطح [ل] - 11 فنضع: نضع [ل] / التخت: البحث [ل] / ونستخرج: ونستخرج [ل] - 12 فنزيد: فنزيد [ف]، فنزيد [ل] - 15 المسألة الثالثة: نأخذ [ل] - 16 فلأن: قلض (كذا) [ل]



- سطح $\overline{ب ز}$ معادلاً لمجموع المال والعدد. فإذا أخرجنا عمود $\overline{د ه}$ ، فينفصل عن سطح $\overline{ب ز}$ مربع $\overline{ب ه}$ المال. ولأن $\overline{ب ز}$ كان معادلاً للمال والعدد، وقد انفصل منه المال - وهو مربع $\overline{ب د}$ - فيكون سطح $\overline{د ز}$ معادلاً للعدد. فالعدد معادل لضرب $\overline{ا د}$ في $\overline{د ب}$ ، وهو من ضرب أحد قسمي
- 5 عدد الجذور في الآخر. فمن ضرورة صحة هذه المسألة أن ينقسم عدد الجذور إلى قسمين؛ يكون ضرب أحدهما في الآخر مساوياً للعدد. فإن كان العدد أعظم من مربع نصف عدد الجذور، كان أعظم أيضاً من ضرب أحد القسمين / المختلفين في الآخر، لأن مربع النصف أعظم من ضرب $\overline{د - 6 - و}$ أحد القسمين المختلفين في الآخر، فلا يمكن انقسام عدد الجذور بحيث يكون ضرب أحد القسمين في الآخر يعادل العدد. فمن ضرورة صحة هذه
- 10 المسألة ألا يكون / العدد أعظم من مربع نصف عدد الجذور. فلو كان $\overline{د - ٥٠ - و}$ أعظم كانت المسألة مستحيلة. وإذا لم يكن أعظم فنقسم $\overline{ا ب}$ - وهو عدد الجذور - بنصفين على نقطة $\overline{د}$. فإن كان مربع $\overline{ب د}$ مثل سطح $\overline{ج -}$ وهو العدد - ف $\overline{ا ب}$ قد قسم بقسمين على نقطة $\overline{د}$ ، وضرب أحدهما في الآخر مثل العدد؛ وإن كان أقل من مربع $\overline{ب د}$ ، فليكن فضل
- 15 المربع عليه هو سطح $\overline{ط}$. فنعمل مربعاً مساوياً لفضل مربع $\overline{ب د}$ عليه، وليكن $\overline{د ك}$ مثل ضلعه؛ فيكون سطح $\overline{ج -}$ وهو العدد - مع مربع $\overline{د ك}$ مساوياً لمربع $\overline{د ب}$. لكن سطح $\overline{ا ك}$ في $\overline{ك ب}$ مع مربع $\overline{د ك}$ مثل مربع $\overline{د ب}$. فإذا ألقينا مربع $\overline{د ك}$ المشترك، يبقى سطح $\overline{ج -}$ العدد، مثل سطح $\overline{ا ك}$ في $\overline{ك ب}$. وبهذا انقسم $\overline{ا ب}$ ، عدد الجذور، على نقطة $\overline{ك}$ إلى
- 20 قسمين، وضرب أحدهما في الآخر مثل العدد. فإذا علمنا على $\overline{ا ك}$ مربع

١ فينفصل: فنصل [ل] - 8 أعظم: ناقصة [ل] - 12 فنقسم: فيقسم [ف] - 16 هو: من [ل] -
 19 ألقينا: ألقنا [ل] - 20 وبهذا: قد [ف]، هد [ل]


أز وتَمَنَّا سطح آه متوازي الأضلاع، فهو من ضرب أب في ب هـ،
أعني زك الذي هو مثل اك. وسطح زب من ضرب ب ك في ك ز
أعني اك، فهو مثل العدد. فقد وجدنا مالا - وهو مربع أز - مع
العدد، وهو سطح زب، مساوياً لضرب الجذر في عدد الجذور.

5 أيضاً / إذا عملنا على ب ك مربع زب، وتَمَنَّا سطح آه متوازي ل - هـ - ظ
الأضلاع، فقد وجدنا مالا - وهو مربع ك هـ - مع العدد، وهو سطح
أز، مساوياً لضرب الجذر في عدد الجذور.

10 فقد تبين أن العدد المذكور في السؤال إن كان أعظم من مربع نصف
عدد الجذور فالمسألة مستحيلة، وإن كان مساوياً له فالجذر نصف عدد
الجذور، وإن كان أقل فلها جوابان: أحدهما أعظم من نصف عدد
الجذور، والآخر أصغر. وإذا نُقص أحدهما من عدد الجذور بقي الآخر.



2 وسطح: فاسطح [ل] - 3 فقد: وقد [ف] - 4 زب مساويا: د ب مساويا [ف]، د ب متساويا
[ل] - 6 فقد: وقد [ف] - 7 لضرب: يقرب [ل]



وأما استخراج الجوابين: فليكن مثال المسألة: مالٌ مع عددٍ خمسمائةٍ وسبعين ألفاً وثمانية آلافٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين، يعدل جذوراً عددها ألفان ومائة وثلاثة وعشرون، فنضع العدد على التخت ونعد مراتبه بجذر، ولا جذر، ونضع أصفار الجذر، ونضع عدد الجذور تحت العدد على رسم وضع المقسوم عليه بهذه الصورة: $\begin{smallmatrix} ٥٧٨٤٤٢ \\ ٢١٢٣ \end{smallmatrix}$ ، ونطلب أكثر عددٍ نضعه في الجذر الأخير ونقصه من المرتبة التي تحاذيه من عدد الجذور، ونضربه في الباقي من السطر / الأسفل، وينقص المبلغ من العدد، وهو الثلاثة، و - ٥١ - و فنضعها في الجذر الأخير، ونعمل بها العمل المذكور فيحصل بهذه الصورة: $\begin{smallmatrix} ٣١٥٤٢ \\ ١٨٢٣ \end{smallmatrix}$ ، ثم يُنقص المطلوب من المرتبة التي تحاذيه من السطر الأسفل كرةً أخرى، وينقل مراتب السطر الأسفل «والأعلى» بمرتبة، ثم نضع المطلوب الثاني - وهو اثنان - في الجذر المتقدم على الجذر الأخير، ونعمل به العمل المذكور، ثم يُنقص المطلوب الثاني من السطر الأسفل كرةً

١ الجوابين: الجوابين [ل] - 2 وسبعين: وتسعين [ل] / واثنين: واثنان [ل] - 3 فنضع: فيضع [ف.ل] / التخت: البحث [ل] - 4 ونضع أصفار: ويضع أصفار [ل] - 5 ونطلب: ويطلب [ل] / نضعه: يضعه [ل] - 6 ونقصه: وينقصه [ف.ل] / تحاذيه: يحاذيه [ف] / عدد: ناقصة [ل] / ونضربه: ونضربه [ل] - 8 فنضعها: فيضعها [ل] / الأخير: الآخر [ل] - 9 تحاذيه: يحاذيه [ل] - 11 نضع: يضع [ف]

أخرى، ويُنقل الثاني بمرتبة، ثم نضع المطلوب الثالث وهو الواحد، ونعمل به مثل العمل المذكور، فيحصل السطر الأعلى بهذه الصورة ٣٢١ وهو أحد الجوابين، فننقصه من عدد الجذور المذكورة في السؤال، فما بقي فهو الجواب الآخر.

- 5 وإنما وجب العمل هكذا لأن المسطح الحاصل من ضرب الجذر في عدد الجذور مركب من المال والعدد، فالمسطح أزيد من العدد بالمال، فيحتاج أن نزيد المال على العدد، ويقسم المجموع على عدد الجذور ليخرج الجذر. ومنحط المال يقع مقابل الجذر الأخير، فنضع عدد الجذور على رسم المقسوم عليه، ونضع مطلوب القسمة في الجذر الأخير، ويحتاج أن نزيد / مربعه على العدد، ونضربه في مراتب عدد الجذور ويُتقص حاصل ل - ٥١ - ظ
- 10 الضرب من سطر العدد. لكننا لو نقصنا المطلوب من عدد الجذور، ثم ضربناه في البقية، ونقصنا حاصل الضرب من العدد؛ كان ذلك مغنياً عن الضرب أولاً للزيادة، ثم الزيادة، ثم الضرب للنقصان، ثم النقصان، لأننا إذا / نقصنا المطلوب من عدد الجذور وضربناه في البقية كان حاصل ف - ٦ - ظ
- 15 الضرب أقل بمربع المطلوب. فالحاصل الناقص بمربع المطلوب إذا نقصناه من العدد يبقى في بقية العدد زيادةً بمربع المطلوب. وإذا لم نَزِدْ مربع المطلوب على العدد فقد نقصنا مربع المطلوب من المسطح. فلهذا وضعنا المطلوب ونقصناه أولاً من عدد الجذور وضربناه في الباقي، ونقصنا حاصل الضرب من العدد. ثم إذا نقلنا المقسوم عليه ونقصنا هذا المطلوب كَرَّةً أخرى منه - لأننا نحتاج أن يزيد ضرب المطلوب الثاني في ضعف المطلوب
- 3 فنقصه: فينقصه [ف، ل] - 5 الحاصل: الماصل [ل] - 6 مركب: تركب [ل] - 7 نزيد: يزيد [ل] - 8 مقابل الجذر: الجذر ناقصة [ف] / ومنحط ... الأخير: هذا القول يصح في هذا المثال وقد لا يصح في أمثلة أخرى كما في المعادلة $x^2 + 956655 = 455765x$ وجذراها هما 21 و 45555. ومال 21 لا يقع مقابل الجذر الأخير / فضع: فيضع [ل] - 9 ونضع: ويضع [ل] - 10 نزيد: يزيد [ل] / مربعه: مربعة [ل] - 12 مغنياً: مغنياً [ف] - 13 للنقصان: النقصان [ف] - 16 نزيد: يزد [ل] - 18 وضربناه: ومرتبه [ل] - 19 ونقصنا: نقصنا [ف، ل] - 20 نحتاج: يحتاج [ف، ل]

الأول على العدد - فإذا حصل نقصانُ ضعفِ المطلوب الأول من عدد الجذور، ثم ضربنا المطلوب الثاني في البقية ونقصنا حاصلَ الضرب من العدد؛ فيكون في بقية العدد / أيضاً زيادة بمقدار ضرب المطلوب الثاني ج - ٥٢ - د ، في ضعف المطلوب الأول. وإذا لم نزدْ ضرب المطلوب الثاني في ضعف المطلوب الأول على العدد، نقصناه من المسطح، ثم يُنقص المطلوب الثاني من السطر الأسفل؛ لأنه إذا كان منقوصاً منه، ثم نضربه في البقية ويُنقص المبلغ من العدد، يبقى في بقية العدد زيادة بمقدار مربعه. وعملُ سائر المراتب بيانها على هذا الوجه.

المسألة الرابعة: مكعبٌ وأموالٌ يعدل جذوراً.

١٠ فترجع المسألة إلى المسألة: مالٌ وجذورٌ يعدل عدداً.
ولیکن آ هو الكعب، و ب أموالٌ جسميةٌ عددها عددُ الأموال المذكورة في السؤال، و ج جذورٌ جسميةٌ عددها عددُ الجذور المذكورة في السؤال، و د مالٌ سطحي، و ه جذورٌ سطحيةٌ عددها مثل عدد الأموال الجسمية، و ز وحداتٌ سطحيةٌ عددها مثل عدد الجذور الجسمية التي في ج. وليكن ح مالاً واحداً جسياً، و ط جذراً واحداً جسياً، و ل واحداً سطحيًا، و ك جذراً واحداً سطحيًا. فلأن نسبة المكعب إلى < الجذر > الواحد الجسيمي - وهو نسبة آ إلى ط - كنسبة المال الواحد السطحي إلى الواحد السطحي، وهو نسبة د إلى ل، ونسبة ط إلى ج - وهو نسبة الجذر الواحد الجسيمي إلى عدة الجذور الجسمية - / كنسبة ل إلى ج - ٥٢ - ظ

4 نرد: يزد [ل] - 5 نقصناه: فنقصناه [ف]. [ل] - 9 المسألة الرابعة: ناقصة [ل] - 10 فترجع: فيرجع [ف]. [ل] / إلى المسألة: إلى مسألة [ف] - 14 وحدات: وحدات [ف]. [ل] - 19 ل: ل [ل]

إلى $\bar{ز}$ ، فبالساواة: نسبة $\bar{أ}$ إلى $\bar{ج}$ كنسبة $\bar{د}$ إلى $\bar{ز}$. ولأن نسبة $\bar{ب}$ إلى $\bar{ح}$ كنسبة $\bar{هـ}$ إلى $\bar{ك}$ ونسبة $\bar{ح}$ إلى $\bar{ط}$ كنسبة $\bar{ك}$ إلى $\bar{ل}$ ، ونسبة $\bar{ط}$ إلى $\bar{ج}$ كنسبة $\bar{ل}$ إلى $\bar{ز}$ فبالساواة: نسبة $\bar{ب}$ إلى $\bar{ج}$ كنسبة $\bar{هـ}$ إلى $\bar{ز}$. وقد كانت نسبة $\bar{أ}$ إلى $\bar{ج}$ كنسبة $\bar{د}$ إلى $\bar{ز}$ ، فيكون نسبة مجموع $\bar{أ}$ $\bar{ب}$ إلى $\bar{ج}$ كنسبة مجموع $\bar{د}$ $\bar{هـ}$ إلى $\bar{ز}$. لكن مجموع $\bar{أ}$ $\bar{ب}$ - وهو المكعب والأموالُ الجسمية - يعدل $\bar{ج}$ ، وهو الجذور الجسمية. فمجموع $\bar{د}$ $\bar{هـ}$ - وهو المال السطحيّ والجذور السطحية - يعدل $\bar{ز}$ ، وهي الآحاد السطحية على عدة $\bar{ج}$. فإذا كان $\bar{أ}$ كعباً و $\bar{ب}$ أموالاً جسمية و $\bar{ج}$ جذوراً جسمية، ومطلوبُنا الجذر الواحد الجسمي، فنأخذ $\bar{د}$ مالا سطحيّاً، و $\bar{هـ}$ جذوراً سطحية بعدة أموال $\bar{ب}$ ، و $\bar{ز}$ آحاداً سطحية بعدة $\bar{ج}$ ، واستخرجنا الجذر الذي ماله $\bar{د}$ ، وعدة جذوره بعدة $\bar{هـ}$ ، يعدل عدد $\bar{ز}$ المسطح. فقد استخرجنا الجذر الجسمي الذي هو المطلوب؛ وذلك ما أردنا بيانه.

ا
ط
ب
ح
ج
د
ل
هـ
ز

2 (الأولى): ر [ف، ل] - 9 فنأخذ: فنأخذ [ف، ل]

المسألة الخامسة: أموالٌ وجذورٌ يعدل مكعباً.

قترح المسألة إلى المسألة: جذورٌ وعددٌ يعدل مالاً.

فليكن $\bar{آ}$ جذوراً جسمية، و $\bar{ب}$ أموالاً جسمية، و $\bar{ج}$ مكعباً، و $\bar{د}$

آحاداً سطحية بعدة جذور $\bar{آ}$ ، و $\bar{هـ}$ جذوراً سطحية بعدة أموال $\bar{ب}$ ، و $\bar{ز}$

5 / مالاً < سطحيًا >. فبمثل ما تقدم نبين أن نسبة مجموع $\bar{آ} \bar{ب}$ إلى $\bar{ج}$ د - هـ - و

كنسبة مجموع $\bar{د}$ إلى $\bar{ز}$. لكن مجموع $\bar{آ} \bar{ب}$ يعادل $\bar{ج}$ ، فمجموع $\bar{د}$ هـ

يعادل $\bar{ز}$. فنستخرج المطلوب بمسألة: جذورٌ وعددٌ يعدل مالاً؛ وذلك ما

أردنا بيانه.

١
ب
ج
د
هـ
ز

المسألة السادسة: مكعبٌ وجذورٌ يعدل أموالاً.

10 / قترح المسألة إلى مسألة: مالٌ وعددٌ يعدل جذوراً. ف - و - ٧ - و

فليكن $\bar{آ}$ مكعباً، و $\bar{ب}$ جذوراً جسمية، و $\bar{ج}$ أموالاً جسمية، و $\bar{د}$ مالاً

سطحيًا، و $\bar{هـ}$ آحاداً سطحية بعدة $\bar{ب}$ ، و $\bar{ز}$ جذوراً سطحية بعدة $\bar{ج}$. فنبين

بمثل ما تقدم أن نسبة مجموع $\bar{آ} \bar{ب}$ إلى $\bar{ج}$ كنسبة مجموع $\bar{د}$ إلى $\bar{ز}$ ،

فيكون: مالٌ سطحي و آحادٌ سطحية بعدة $\bar{ب}$ يعدل جذوراً سطحية بعدة

15 ج. فإن خرج < المطلوب > صحيح الوجود غير مستحيل فقد خرج الجواب

1 المسألة الخامسة: ناقصة [ل] - 2 قترح: فبرجع [ف] / إلى المسألة: إلى مسئلة [ف] -

7 فنستخرج: فيخرج [ل] - 9 المسألة السادسة: ناقصة [ل] - 10 قترح: فبرجع [ف، ل] -

12 آحاد سطحية: آحاد [ل]

بمسألة: مالٌ وعددٌ يعدل جذوراً؛ وإن كان مستحيلًا فأصل السؤال مستحيل؛ وذلك ما أردنا بيانه.

ا	_____
ب	_____
ج	_____
د	_____
هـ	_____
ز	_____

﴿معادلات الدرجة الثالثة﴾

وأما المسائل التي يجتمع فيها الكعب مع العدد؛ فنها ما لا يقع فيها
5 سؤالٌ مستحيل، ومنها ما يقع.
أما التي لا يقع فيها فهي ثماني مسائل:

المسألة الأولى: مكعبٌ وجذورٌ يعدل عدداً.

فليكن $\overline{ا ب}$ جذرٌ عددٍ الجذور، ومربعٌ $\overline{هـ}$ واحداً سطحياً، وم $\overline{ن}$
/ بعدةً آحادٍ العدد، حتى يكون مربع $\overline{هـ}$ في ارتفاع $\overline{م ن}$ هو العدد. وليكن $ا - هـ - ن$
10 نسبةً الواحد الخطي - وهو ضلع مربع $\overline{هـ}$ - إلى $\overline{ا ب}$ كنسبة $\overline{ا ب}$ إلى
خط $\overline{ع}$. فنسبة الواحد السطحي - وهو مربع $\overline{هـ}$ - إلى مربع $\overline{ا ب}$ كنسبة
الواحد الخطي - وهو ضلع مربع $\overline{هـ}$ - إلى خط $\overline{ع}$. ونجعل نسبة $\overline{م ن}$ إلى
 $\overline{ا ج}$ كنسبة $\overline{ع}$ إلى الواحد الخطي. فلأن نسبة $\overline{ع}$ إلى ضلع مربع $\overline{هـ}$ كنسبة

12 خط $\overline{ع}$ - ناقصة [ل]


مربع $\overline{أ ب}$ إلى مربع $\overline{هـ}$ ؛ فنسبة مربع $\overline{أ ب}$ إلى مربع $\overline{هـ}$ كنسبة $\overline{م}$ إلى $\overline{أ ج}$ ، فمربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{أ ج}$ مثل مربع $\overline{هـ}$ في $\overline{م ن}$. فمربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{أ ج}$ مثل العدد.

فنعمل على $\overline{أ ج}$ نصف دائرة، ونعمل قطعاً مكافئاً رأسه نقطة $\overline{آ}$ ،
 5 وسهمه $\overline{أ ق}$ على استقامة $\overline{أ ب}$ ، وضلعه القائم مثل $\overline{أ ب}$ ؛ فبإسائه $\overline{أ ج}$
 عند نقطة $\overline{آ}$. ونفرض نقطة $\overline{ل}$ بحيث يكون $\overline{آ ل}$ أقل من كل واحد من
 $\overline{أ ب}$ $\overline{ل ج}$ ، ونخرج عمود $\overline{ل ف}$ على $\overline{أ ج}$. فلأن ضرب $\overline{آ ل}$ في $\overline{ل ج}$ مثل
 مربع $\overline{ل ف}$ ، فنسبة $\overline{آ ل}$ إلى $\overline{ل ف}$ كنسبة $\overline{ل ف}$ إلى $\overline{ل ج}$. فنسبة مربع
 $\overline{آ ل}$ إلى مربع $\overline{ل ف}$ كنسبة $\overline{آ ل}$ إلى $\overline{ل ج}$ ؛ و $\overline{آ ل}$ أصغر من $\overline{ل ج}$ ، فمربع
 10 $\overline{آ ل}$ أصغر من مربع $\overline{ل ف}$. ولأننا نخرج من نقطة $\overline{ف}$ عمود $\overline{ف س}$ على
 $\overline{أ ب}$ ؛ فلأن $\overline{أ ب}$ أعظم من $\overline{آ ل}$ و $\overline{آ ل}$ أصغر من $\overline{ل ف}$ فنسبة $\overline{أ ب}$ إلى

/ $\overline{آ ل}$ أعظم من نسبة $\overline{آ ل}$ إلى $\overline{ل ف}$ ، بالخلف. فضرب $\overline{أ ب}$ في $\overline{ل - هـ - و}$
 $\overline{ل ف}$ - أعني $\overline{آ س}$ - أعظم من مربع $\overline{آ ل}$ ، أعني «مربع» $\overline{ف س}$ ،
 بالخلف. لكن ضرب $\overline{أ ب}$ في $\overline{آ س}$ مثل مربع خط الترتيب الذي يخرج
 15 من $\overline{س}$. فخط $\overline{ف س}$ أصغر من خط الترتيب، فالعمود الذي يخرج من
 نقطة $\overline{س}$ حتى يلقى القطع يجاوز نقطة $\overline{ف}$ ويدخل الدائرة؛ وإلا لكان
 $\overline{ل ف}$ «نصف» قطر الدائرة. هذا خلف. فيكون محيط القطع في ذلك
 الموضع داخلياً في الدائرة، فإذا أخرج القطع بغير نهاية قطع الدائرة.
 وليكن على نقطة $\overline{ط}$. ونخرج عمود $\overline{ط ك}$ على السهم، وعمود $\overline{ط ي}$ على
 20 قطر الدائرة. فلأن ضرب $\overline{أ ب}$ في $\overline{آ ك}$ - أعني $\overline{ي ط}$ - مثل مربع
 $\overline{ك ط}$ ، أعني مربع $\overline{آ ي}$ ، فنسبة $\overline{أ ب}$ إلى $\overline{آ ي}$ كنسبة $\overline{آ ي}$ إلى $\overline{ط ي}$.

4 آ: أب [ل] - 6 ونفرض: ونفرض [ل] - 6 آ: ناقصة [ل] - 8 آ: أن [ل] -
 10 ف س: فيد [ل] - 14 يخرج: يخرج [ل] - 15 يخرج: يخرج [ف. ل] - 18 بغير: بصير
 [ف] بصير [ل] - 19 ط ي: ط ج [ل]

- ولأن ضرب $\overline{اي}$ في $\overline{ي ج}$ مثل مربع $\overline{ط ي}$ فنسبة $\overline{اي}$ إلى $\overline{ط ي}$ كنسبة $\overline{ط ي}$ إلى $\overline{ي ج}$. فخطوط $\overline{اب}$ $\overline{اي}$ $\overline{ط ي}$ $\overline{ي ج}$ الأربعة متوالية على النسبة، فضرب مربع $\overline{اب}$ الأول في $\overline{ي ج}$ الرابع مثل مكعب $\overline{اي}$ الثاني، لما مر في مسألة: مكعب يعدل عدداً. فإذا جعلنا خط $\overline{اي}$ جذراً 5 فيكون ضرب مربع $\overline{اب}$ في $\overline{اي}$ جذوراً بالعدّة المذكورة في السؤال. وقد تبين / أن مربع $\overline{اب}$ في $\overline{ي ج}$ مثل مكعب $\overline{اي}$ ؛ فيكون ضرب مربع $\overline{ل - ه - ط}$ $\overline{اب}$ في $\overline{اي}$ وفي $\overline{ي ج}$ مثل مجموع الجذور مع مكعب $\overline{اي}$. وقد تقدم أن مربع $\overline{اب}$ في $\overline{ا ج - أعني في اي}$ وفي $\overline{ي ج}$ - مثل العدد المذكور في السؤال، فيكون مثل مكعب $\overline{اي}$ مع مجموع الجذور بالعدّة المذكورة في 10 السؤال. / فقد وجدنا خطأ وهو $\overline{اي}$ يكون مكعبه وضربه في عدد الجذور $\overline{ف - و - ط}$ مثل العدد المسؤول عنه.



وأما استخراج المطلوب، فنضع العدد على التخت، ونعدّ مراتبه بكعب، ولا كعب، ولا كعب، وكعب، ونضع أصفار الكعب ونعدّ مراتبه أيضاً بجذر ولا جذر، إلى أن ننهي إلى الجذر السمي للكعب الأخير، ونعدّ

- 3 مربع: فرع [ل] / $\overline{اي}$ ناقصة [ف] - 7 تقدم: يقدم [ل] - 10 مكعب: مكعب [ل] -
12 فضع: فيضع [ل] - 13 ونضع: ويضع [ل] - 14 ننهي: ينهي [ف، ل]

عدد الجذور أيضاً بجذرٍ ولا جذرٍ، فالمرتبة السّميّة للجذر الأخير من هذه الجذور هي آخر مراتب جذر عدد الجذور؛ فيكون للمسألة صور ثلاث:

الصورة الأولى:

أن يكون الجذر السّميّ للكعب الأخير أرفع من آخر مراتب جذر عدد الجذور مثل قولنا: مكعبٌ وستّة وثلاثون جذراً يعدل عدد ثلاثة وثلاثين ألف ألفٍ وسبعةٍ وثمانين ألفاً وسبعائةٍ وسبعة عشر.

فنعُدّ ما بين الجذر السّميّ للكعب الأخير وبين مرتبة آخر عدد الجذور، ونعدّ من مرتبة الكعب الأخير في جهة الانحطاط بتلك العدد، فحيث

ننتهي ننقل إليه آخر مراتب عدد الجذور / فيكون بهذه الصورة 33.87117 ج - ٥٥ - د

ثم نرد عدد الجذور إلى الثلث، أعني نأخذ ثلث عدد الجذور، ونضعه

مكان عدد الجذور إن كان آخر مرتبته هو آخر مراتب عدد الجذور؛ وإلا

فنحطّه عنه بقدر انحطاطه عنه. ونستخرج المطلوب الكعب ونضعه في

الكعب الأخير، وهو ثلاثة؛ وينقص مكعبه من العدد، ونضربه في ثلث

عدد الجذور، وينقص ثلاثة أمثال كلّ ضربةٍ من العدد؛ ثم نضع مربع

المطلوب في السطر الأسفل بجذائه، وننقل المطلوب بمرتبتين، والسطر

الأسفل بمرتبة؛ ونضع المطلوب الثاني، وينقص مكعبه من العدد،

ونضربه في المطلوب الأول، ونزيد المبلغ على الأسفل، ونضربه في السطر

الأسفل، ويُنقص ثلاثة أمثال كلّ ضربةٍ من العدد، فيحصل بهذه

الصورة: 33.81197 ج - ١٦ - ١٧

2 فيكون ... ثلاث: ناقصة [ل] - 5-3 الصورة ... عدد الجذور: ناقصة [ل] - 7 فعد: فعد

[ف]. فعد. [ل] / السّميّ: للمسى [ل] - 9 ننتهي: ينهى [ف] / تنقل: ينقل [ف] - 10 نرد: نرد

[ف]، يزد [ل] / نأخذ: يأخذ [ف] - 12 ونستخرج: ونستخرج [ل] - 13 ونضربه: ونضربه [ل] -

14 نضع: يضع [ل] - 15 وننقل: وينقل [ف]، ل - 17 ونزيد: ويزيد [ل] - 19 نزيد: يزيد [ل]

ونضربه في المطلوب الأول ونزيد المبلغ على الأسفل، ويُنقل السطر الأعلى
بمرتبتين، والأسفلُ بمرتبة. ونضع مطلوباً آخر - وهو الواحد - ويُنقص
مكعبه من العدد، ونضربه في المطلوب الأول والثاني، ونزيد المبلغ على
الأسفل ونضربه في الأسفل، ويُنقص ثلاثة أمثال / كلَّ ضربةٍ من العدد؛ ل - ٥٥ - ط
5 فيرتفع العدد، ويحصل السطر الأعلى بهذه الصورة ٣٢١ وهو الجذر
المطلوب.

الصورة الثانية:

أن يكون آخر مراتب جذر عددِ الجذور أرفعَ من الجذر السَّميِّ للكعب
الأخير، مثلُ قولنا: كعبٌ وجذور هذه العدَّة ١٢.٣٣٢١ يعدل عدداً بهذه
10 الصورة: ٤١٩٣٤٢٢.٢.

فنضع ثلث عدد الجذور على رسم وضع المقسوم عليه، ونطلب أكثر
عددٍ يمكن أن يُضرب في آخر ثلثِ عددِ الجذور، ويُنقص من ثلثِ ما
فوقه؛ وإن لم يمكن ذلك يُنقل مراتبُ ثلثِ عددِ الجذور بمرتبةٍ، فيحصل
بهذه الصورة: ٤١٩٣٤٢٢.٢، ٤١.١١.٧، ثم يُطلب أكثر عددٍ شأنه مما ذكرناه، وهو
15 ثلاثة؛ ونضعه في الكعب الأخير، ويُنقص مكعبه من العدد، ونضربه في
مراتب ثلثِ عدد الجذور، ويُنقص ثلاثة أمثال كلِّ ضربةٍ من العدد؛ ثم
نزيد مربعه على الأسفل؛ ثم ننقل «السطر الأعلى» بمرتبتين. والسطر
الأسفل بمرتبةٍ؛ ونعمل العمل السابق إلى آخره، فيحصل السطر الأعلى
بهذه الصورة: ٣٢١.

1 ونزيد: ويزيد [ل] - 2 ونضع: ويضع [ل] - 3 ونزيد: ويزيد [ل] / المبلغ على: في هامش
[ل] - 7 الصورة الثانية: ناقصة [ل] - 11 فنضع: فيضع [ل] / ونطلب: ويطلب [ل] - 15 ونضعه:
ويضعه [ل] / الكعب: الكعب [ف] - 17 نزيد: يزيد [ل] / ننقل: ينقله [ف. ل] - 19 الصورة
٣٢١: الصورة ٢٢١ [ف، ل]

الصورة الثالثة:

ألا يكون الجذر السمي للكعب الأخير أرفع من آخر مراتب جذر عدد الجذور / ، ولا أنزل منه.

و - ٥٦ - ٥

فنضع آخر مراتب ثلث عدد الجذور مقابل الكعب الأخير، ونعمل العمل السابق. 5

وإنما سلكنا طريق العمل كذلك؛ لأن العدد مركب من مكعب الجذر المطلوب، ومن المسطح الحاصل من ضرب الجذر في عدد الجذور؛ فيحتاج أن يتركب العمل - الموصل إلى المطلوب - من القسمة ومن استخراج ضلع الكعب. فإذا كان / الجذر السمي للكعب الأخير أرفع من ف - ٨ - و 10 آخر مراتب جذر عدد الأجزاء، كما في الصورة الأولى، فيكون مال آخر الجذر المطلوب أرفع من آخر عدد الجذور، ويكون حاصل ضربيه في ماله أرفع من ضربيه في آخر عدد الجذور. وضربه في ماله - وهو مكعبه - يقع في المرتبة المقابلة للكعب الأخير. فضربه في آخر عدد الأجزاء - وهو آخر المسطح - يقع أنزل منه؛ فأخر هذا العدد إنما هو آخر الكعب. فإذا 15 استخراجنا مطلوب الكعب - وهو أرفع مراتب الجذر المطلوب - ووضعناه مقابل الكعب الأخير، وعلمنا أن هذا المطلوب من المرتبة السميّة للكعب الأخير؛ علمنا أن منحنى ماله من أي مرتبة يكون. ومعلوم أن أرفع مراتب عدد الجذور من أي مرتبة، فنقلنا أرفع مراتب عدد / الجذور إلى المرتبة ل - ٥٦ - ٥

١ الصورة الثالثة: ناقصة [ل] - 2 مراتب: المراتب [ف] - 3 الجذور: في أسفل الصفحة تحت النص [ل] - 4 فضع: يضع [ل] / الكعب: كعب [ل] - 5 العمل السابق: هذا صحيح في حالات وغير صحيح في حالات أخرى، حيث يجب أن نستخدم في آن واحد المكعب والمسطح الناتج من ضرب الجذر في عدد الجذور، ويشرح الطوسي ذلك في أمثلة أخرى - 6 مركب: المركب [ل] - 8 يتركب: يركب [ف]. تركب [ل] - 11 من آخر: من اجزا [ف] - 12 في آخر: من آخر [ل] - 13 فضربه: فيضربه [ف] - 16 الأخير: الآخر [ل] - 18 فنقلنا: نقلنا [ل]

المنحطة عن مرتبة المطلوب وبقدر انحطاط مرتبة آخر عدد الجذور عن
 منحط مال المطلوب؛ لأن منحط ضرب هذا المطلوب في منحط ماله واقع
 في المرتبة التي هو فيها، فيكون منحط ضرب في أرفع مراتب عدد الجذور
 منحطاً عن المرتبة التي هو فيها بقدر انحطاط المضروبين فيها، أحدهما عن
 5 الآخر. ولأننا نحتاج أن نضرب المطلوب الأول في ماله، وننقصه من
 العدد، ونضربه بعينه في عدد الجذور، وننقصه منه، فلو نقصنا مكعب
 المطلوب الأول ووضعنا ثلث عدد الجذور، وضربنا المطلوب الأول فيه،
 ونقصنا ثلاثة أمثال كل ضربية من العدد؛ كان كذلك. ولأننا نحتاج أن
 نضرب المطلوب الثاني في مال المطلوب الأول، وننقص ثلاثة أمثال كل
 10 ضربة من العدد، ونضربه في المطلوب الأول، ثم في الحاصل، وننقص
 ثلاثة أمثال كل ضربية منه، ونضربه في عدد الجذور وننقصه منه، فلو
 وضعنا مال المطلوب الأول وضربه فيه مع ثلث عدد الجذور، وضربناه في
 المجموع، ونقصنا ثلاثة أمثال كل ضربية من العدد؛ كان كذلك. فلهذا
 جمعنا مال المطلوب الأول وضرب المطلوب الثاني في الأول، مع ثلث
 15 / عدد الجذور في السطر الأسفل.

ل - ٥٧ - و

وأما الصورة الثانية: فلأن آخر جذر عدد الجذور إذا كان أرفع من
 الجذر السمي للكعب الأخير، كان آخر مراتب عدد الجذور أرفع من مال
 الجذر المطلوب، وآخر المسطح حاصل من ضرب أرفع مراتب الجذر المطلوب
 في أرفع مراتب عدد الجذور، وآخر المكعب من ضربه في آخر مراتب
 20 ماله، فيكون آخر المسطح أرفع من آخر المكعب، فيكون آخر العدد إنما هو

1 المطلوب: المقصود هنا المرتبة التي وضع فيها المطلوب الأول / ويقدر: يقدر [ل] - 2 في: من [ل] -
 3 المرتبة: مرتبة [ف] - 5 نحتاج أن نضرب: يحتاج أن يضرب [ف، ل] - 8 - 9 نحتاج أن نضرب: يحتاج أن
 يضرب [ف، ل] - 9 ونقص: وينقص [ف، ل] - 10 ثم في: وفي، تحت السطر [ف] / ونقص:
 وينقص [ف، ل] - 11 ونقصه: وينقصه [ف، ل] - 19 عدد: ناقصة [ف]

آخر المسطح. فإذا كان آخر المسطح معلوماً: فإذا قسمنا آخر المسطح على آخر عدد الجذور؛ فيكون مطلوبُ القسمة هو آخر الجذر المطلوب. وإذا حصل لنا أرفعُ مراتب الجذر علمنا أنه من أي مرتبة هو، ونريد أن ننقص مكعبه من العدد، ومكعبه واقع في مرتبة الكعب السمي مرتبته، فنضعه 5 مقابل ذلك الكعب؛ لأن منحط ضربه في ماله واقع في تلك المرتبة، وكذا منحط ضربه في الصورة التي في تلك المرتبة من عدد الجذور. فإذا ضربنا هذا المطلوب في عدد الجذور، ونقصنا الحاصل من مراتب العدد، ثم نقصنا مكعب المطلوب من مرتبته؛ يكون العمل جارياً على قانون القسمة والمكعب؛ وبقيّة البيان ما مرّ.

10 وأما الصورة / الثالثة: فأخر العدد ليس آخر المسطح مفرداً، ولا آخر ل - ٥٧ - ظ المكعب مفرداً؛ بل هو مختلط منها. فنستخرج المطلوب ونضعه مقابل الكعب الأخير؛ لأن مكعب المطلوب واقع في تلك المرتبة، وضربه في آخر عدد الجذور أيضاً واقع في تلك المرتبة، فينبغي أن يكون المطلوب بحالة يُمكن نقصان مكعبه من تلك المرتبة مع نقصان ضربه في عدد الجذور، 15 ونعمل العمل السابق؛ وذلك ما أردنا بيانه.

المسألة الثانية: عدد جذور يعدل مكعباً.

فليكن مربع \overline{AB} مساوياً لعدد الجذور، وليكن مربع \overline{K} واحداً سطحياً، وخط \overline{C} بعدة آحاد العدد، حتى يكون مربع \overline{K} في \overline{C} هو العدد. وليكن نسبة الواحد الخطّي إلى \overline{AB} كنسبة \overline{AB} إلى \overline{KI} . فنسبة الواحد

3 ونريد: وزيد [ف] / تنقص: ينقص [ف، ل] - 4 مكعبه: ومكعبه [ل] - 5 وكذا: وكذا [ف، ل] - 9 القسمة: القسمة [ل] - 11 فنستخرج: فيستخرج [ف، ل] - 12 الكعب: الكعب [ف] - 15 وهذا مثال معاكس على الصورة الثانية $66176161 = x^3 + 100000x - 16$ المسألة الثانية: ناقصة [ل]

السطحي - وهو مربع $\bar{ك}$ - إلى مربع $\bar{اب}$ كنسبة الواحد الخطي - وهو ضلع مربع $\bar{ك}$ - إلى $\bar{ي}$. ونجعل نسبة $\bar{ع}$ إلى $\bar{اج}$ كنسبة $\bar{ي}$ إلى الواحد الخطي. فلأن نسبة $\bar{ي}$ إلى ضلع مربع $\bar{ك}$ كنسبة مربع $\bar{اب}$ إلى مربع $\bar{ك}$ ، فنسبة مربع $\bar{اب}$ / إلى مربع $\bar{ك}$ كنسبة $\bar{ع}$ إلى $\bar{اج}$. فمربع $\bar{اب}$ في $\bar{اج}$ - ف - ٨ - ٥
 ٥ مثل مربع $\bar{ك}$ في $\bar{ع}$ ، فمربع $\bar{اب}$ في $\bar{اج}$ مثل العدد. ونجعل $\bar{اج}$ عموداً على $\bar{اب}$ ، ونعمل قطعاً مكافئاً، رأسه عند نقطة $\bar{آ}$ /، وسهمه $\bar{آه}$ ، $\bar{ج}$ - ٨ - ٥
 وضلعه القائم مثل $\bar{اب}$ ، وليكن هو قطع $\bar{از}$. ونعمل قطعاً زائداً، رأسه عند نقطة $\bar{آ}$ ، وسهمه $\bar{اق}$ ، ومُجانبه $\bar{اج}$ وهو قطع $\bar{اد}$. ويُفصل $\bar{اس}$ مثل $\bar{اب}$ ويُخرج عمود $\bar{س م}$ ، وهو خط الترتيب في المكافئ، ونقطة $\bar{م}$ على محيط القطع المكافئ، ونُخرج من نقطة $\bar{م}$ عموداً على $\bar{اق}$ ، وهو $\bar{م ن}$. فلأن ضرب القائم في $\bar{اس}$ ، أعني مربع $\bar{اس}$ ، مثل مربع $\bar{س م}$ ؛ ف $\bar{اس}$ - أعني $\bar{ن م}$ - مثل $\bar{س م}$ ، أعني $\bar{ان}$.
 ولأن خط الترتيب الذي يخرج من نقطة $\bar{ن}$ في القطع الزائد يكون مربعه مثل ضرب $\bar{ج ن}$ في $\bar{ان}$ ، فمربع خط الترتيب الذي يخرج (من) $\bar{ن}$ أعظم من مربع $\bar{ن م}$ ، فخط $\bar{ن م}$ هو بعض خط الترتيب الذي يخرج من نقطة $\bar{ن}$ ، فلا بد أن يتجاوز خط الترتيب نقطة $\bar{م}$ حتى ينتهي إلى محيط القطع الزائد. فنقطة $\bar{م}$ في داخل القطع الزائد.

وأيضاً فنفصل $\bar{اه}$ أربعة أمثال $\bar{اب}$ ونزيد عليه زيادة حتى يبلغ $\bar{اف}$ ، بحيث يكون ضرب $\bar{اف}$ في $\bar{اب}$ أعظم من مربع $\bar{اج}$. ونخرج خط ترتيب $\bar{ف ز}$ إلى محيط القطع المكافئ، ونخرج من نقطة $\bar{ز}$ عموداً على

2 ي: ك [ف] - 6 رأسه: هنا توقف ناسخ ف عن الكتابة. وحتى تبدأ مخطوطة ب ستعتمد عل ل وحدها. ولهذا لن نلجأ إلى رمز ل في الصفحات التالية - 8 قطع $\bar{آد}$: قطع $\bar{ا ه}$. وهو ممكن أيضاً. وبذلكناه متابعة للأيجدية - 10 ونخرج: ويخرج - 11 م: ن: م في 12 آ: ن: ار - 13 ن: ق - 14 ن: ق - 16 ن: ق - 13-16 مابين التجميعين أثبت مستلزماً في هامش المخطوط، ومذليلاً بكلمة وصح مع بيان مكانه في السطر بالعلامة المتعارف عليها لدى النساخ - 16 فلا بد أن يتجاوز: فلا بد وأن يتجاوز - 18 فنفصل: فنفصل - 19 آت (الأولى والثانية): ا ب

- ا ق هو ز ق. فلأن ضرب ا ق في ا ب مثل مربع ز ق، فنسبة ا ق إلى ز ق كنسبة ز ق إلى ا ب. فنسبة مربع ا ق - أعني مربع ز ق - إلى مربع ز ق كنسبة ا ق إلى ا ب. فمربع ز ق أعظم من أربعة أمثال مربع ز ق. فخط ز ق أطول من مثلي ز ق، أعني مثلي ا ق. ولأن
- 5 ضرب ا ب في ا ق أعظم من مربع ا ج، وهو مساو لمربع / ز ق، ل - ٥٨ - ط فمربع ز ق أعظم من مربع ا ج. فخط ز ق - أعني ا ق - أعظم من ا ج، فمثلاً ا ق أعظم من ق ج، فخط ز ق - الذي هو أعظم من مثلي ا ق - أعظم من ق ج، فمربعه أعظم من مربع < ق ج >، فهو أعظم من ضرب ا ق في ق ج بكثير. لكن ا ق في ق ج مثل مربع خط الترتيب الذي يخرج من نقطة ق إلى محيط القطع الزائد، فمربع ز ق أعظم
- 10 من < مربع > خط الترتيب المذكور. فالعمود الذي يخرج من نقطة ق ينتهي أولاً إلى محيط القطع الزائد، ويتجاوزه، ثم ينتهي إلى نقطة ز التي هي على محيط القطع المكافئ. فمحيط المكافئ عند نقطة ز خارج عن القطع الزائد، وقد كان داخلاً فيه عند نقطة م، فلا بد أن يقطعه؛ وليكن
- 15 تقاطعها على نقطة د. ونخرج عمودي د ه د ص على السهمين. فنسبة ا ب القائم إلى د ه - أعني ا ص - كنسبة د ه إلى ا ه، أعني ا ص إلى د ص؛ ونسبة ا ص إلى د ص كنسبة د ص إلى ج ص. فخطوط ا ب ا ص د ص ج ص متوالية على النسبة. فمربع ا ب الأول في ج ص الرابع مثل مكعب ا ص الثاني. لما مرّ في مسألة: مكعب يعدل عدداً. لكن مربع ا ب في ج ص ينقسم إلى مربع ا ب في ا ج - وهو
- 20 العدد المذكور في السؤال - وإلى مربع ا ب في ا ص وهو الجذر بالعدة

2 ز ق: ا ز ق - 10 يخرج: نخرج - 11 يخرج: نخرج - 12 أولاً: الاو / ويتجاوزه: ويتجاوزه -
14 أن: وان - 15 نسبة: فبقية - 19 الرابع: الواقع

الصورة الأولى:

- أن يكون الجذرُ السَّميُّ للكعب الأخير أرفعَ من آخر جذر عددِ الجذور، مثلَ قولنا: عددُ هذه الصورة: ٣٢٧٦٧٠٣٨ ، وتسعمائة وثلاثة وستون جذراً يعدل مكعباً. فنعدّ من الجذر السَّميِّ للكعب الأخير إلى آخر مراتب عدد الجذور، ونعدّ من مرتبة الكعب الأخير بتلك العدة في تلك الجهة. فحيث ينتهي نقل إليه آخر عددِ الجذور ونردّه إلى الثلث فيكون هذه الصورة: ٣٢٧٦٧٠٣٨ . ولأنّ الجذر السَّميِّ للكعب الأخير هو الجذر الثالث، / وهو في مقابلة مرتبة عشرات الألوف، وهو أرفع من آخر ٥٩ - ٥ - ٥ مراتب عدد الجذور الذي هو في المئات؛ عددنا من مرتبة الجذر السَّميِّ للكعب الأخير إلى المئات. وعددنا أيضاً من مرتبة الكعب الأخير بتلك العدة فاتمّت إلى عشرات الألوف؛ فوضّعنا آخر ثلث عددِ الجذور في تلك المرتبة، ثمّ نضع المطلوب الكعب وهو الثلاثة مكان الصفر الأخير، وننقص مكعبه مما تحته، ونضربه في مراتب ثلث عدد الجذور، ونزيد ثلاثة أمثال كلّ ضربةٍ على العدد؛ ونضع مربع المطلوب تحت العدد بجذائه على هذه الصورة ٦٠٥٥٩٣٨ وننقص ثلث عدد الجذور من مربع المطلوب، فنبتل ثلث عدد الجذور فيبقى هذه الصورة ٦٠٥٥٩٣٨ ، وينقل الأعلى بمرتبتين والأسفل بمرتبة؛ ثمّ نضع المطلوب الثاني اثنين وننقص مكعبه من العدد، ونضربه في المطلوب الأول، ونزيد المبلغ على الأسفل، ونضربه في الأسفل، وننقص ثلاثة أمثال كلّ ضربةٍ من العدد، ونزيد مربّعه على الأسفل، ونضربه في

6 وزده: ويرده - 7 ولأن: لأن / هو: وهو، الواو فوق كلمة هو - 9 هو: فوق السطر / عددنا: فعدديا، التي تقرأ وعددنا. ولا لزوم للفاء. وقوله «لأن...» متعلق بعددنا - 12 نضع: يضع / وتنقص: وينقص - 15 وتنقص: وينقص / فنبطل: ويبطل - 17 نضع: يضع / اثنين: اثنان / وتنقص: وينقص / يمكننا أن نعطي هذا المثال المعاكس على الصورة الثانية $x^3 = 7284142 + 9999x$ ، وهنا نجد: $x = 211$ / ونضربه: ويضربه - 18 ونضربه: ويضربه / وتنقص: وينقص - 19 ونضربه: ويضربه

المطلوب الأول، ونزيد المبلغ على الأسفل / ، وننقل الأعلى بمرتبتين ج - ٦٠ - د ، والأسفل بمرتبة ؛ ونضع مطلوباً آخر هو الواحد، ونقص مكعبه من العدد، ونضربه في المطلوب الأول والثاني، ونزيد المبلغ على الأسفل ونضربه في الأسفل ونقص ثلاثة أمثال كل ضربة من العدد، فيحصل 5 السطر الأعلى بهذه الصورة ٣٢١ وهو الجذر المطلوب.

الصورة الثانية:

أن يكون آخر مراتب جذر عدد الجذور أرفع من الجذر السمي للكعب الأخير، كما في قولنا: جذور هذه العدة ١٠٢٠٢١ وعدد هذه الصورة ٣٢٧٤٢٠ يعدل مكعباً. فنعدّ عدد الجذور بجذر ولا جذر، ونزيد في العدد مراتب بأن نضع قدامه أصفاراً، ونطلب أرفع الجذور المقابلة لعدد الجذور، ثم نضع أصفار الكعب ونطلب الكعب السمي لذلك الجذر (الأخير)، ونقل المرتبة المحاذية لذلك الجذر من عدد الجذور، إلى محاذة الكعب السمي له، ونضع سائر مراتب عدد الجذور على الترتيب، فيكون بهذه الصورة ٣٢٧٤٢٠، لأن أرفع الجذور التي تقابلها هو الثالث، وهو في 15 مقابلة عشرات الألوف، وسميه الكعب الثالث وهو في ألوف الألوف،

فنقلنا مرتبة / عشرات الألوف من عدد الجذور إلى محاذة الكعب الثالث، ج - ٦٠ - د ، ونطلب أكثر عدد يمكن نقصان مربعه من عدد الجذور - وهو الثلاثة - فنضعه في الكعب الثالث، ونضربه في مراتب عدد الجذور، ونزيد المبلغ

1 ونقل: وينقل - 2 ونضع: ويضع / ونقص: ونقص / مكعبه: مكعبة - 3 ونضربه: ونضربه - 4 ونضربه: ونضربه / ونقص: ونقص - 10 نضع: نضع / ونطلب: ونطلب / الجذور: الحدود / لعدد: العدد - 11 نضع: نضع / ونطلب: ونطلب - 12 ونقل: ونقل / المحاذية: المجاورة / محاذة: مجازاه - 13 ونضع: ويضع - 14 نقابلها: يقابلها. والضمير هنا يعود على المرتبة المحاذية - 16 فنقلنا: فنقلنا / محاذة: مجازاة - 17 ونطلب: ونطلب - 18 فنضعه: فقيعه / ونضربه: ونضربه

على العدد، ونقص مكعبه من العدد، ونزد عدد الجذور إلى الثلث فيكون
مبتدئاً من مرتبة الثلات على هذه الصورة $\overline{31007}^{\overline{31372}}$ ، ثم نضع مربع المطلوب
بجذائه تحت العدد، وينقص منه ثلث عدد الجذور، ويطل السطر الذي
هو ثلث عدد الجذور، ونقل الأعلى بمرتبتين، والأسفل بمرتبة؛ ونعمل
5 العمل السابق إلى آخره.

الصورة الثالثة:

ألا يكون الجذر السميّ للكعب الأخير أرفع من آخر جذر عدد
الأجذار ولا أنزل. فنقل آخر عدد الجذور إلى محاذة الكعب الأخير،
ونستخرج أكثر عدد نضربه في آخر مراتب عدد الجذور ونزيده على
10 العدد، ونقص مكعبه مما تحته من سطر العدد، ونعمل العمل السابق إلى
آخره.

وإنما علمنا كذلك لأن العدد بعض المكعب، والبعض الآخر من ضرب
الجذر في عدد الجذور؛ فعدد / الجذور بعض المال، وبعضه الآخر هو ل - ٦١ - و
الذي ضرب في الجذر المطلوب حتى حصل العدد. فبعض مال المطلوب
15 وبعض مكعبه معلومان، فنحتاج أن نستخرج المطلوب منها. فإذا كانت
المرتبة السميّة لجذر آخر عدد الجذور أنزل من المرتبة السميّة للكعب الأخير
كما في الصورة الأولى، فالعدد المقابل للكعب الأخير إنما هو من مكعب
أرفع مراتب الجذر المطلوب، لأن أرفع مراتب المال ليس في عدد
1 ونقص: وينقص - 2 نضع: يضع - 3 تحت: عث - 4 ونقل: وينقل - 8 أنزل: اندل /
فنقل: فيقل / محاذة: مجازة - 9 ونستخرج: ويستخرج / نضربه: بضربه / ونزيده: ويريده -
10 ونقص: وينقص / مكعبه: مكعبة - 12 بعض: يقض - 15 نستخرج: يستخرج - 16 جذر آخر
عدد الجذور: لعله أراد أن يقول: للجذر الأخير لعدد الجذور - 17 الأخير: الآخر - 18 الجذر المطلوب:
هذا تفكير دائري، وهو من الأمور التي يقتضي تبريرها

الجزور؛ لأن «آخر» جذر عدد الجزور أنزل من المرتبة السمية للكعب الأخير؛ فيكون آخر عدد الجزور أنزل من مربع المرتبة السمية للكعب الأخير. فأرفع مراتب مال الجذر المطلوب ليس موجوداً في عدد الجزور. فهو موجود في القسم الذي ضرب في الجذر المطلوب حتى حصل العدد 5 ضرورة. فيكون مكعب أرفع مراتب الجذر المطلوب حاصلاً في العدد، ويكون مقابلاً للكعب الأخير بالضرورة. ولأننا إذا استخرجنا مطلوب الكعب ووضعناه مقابل الكعب الأخير، يكون هو آخر مراتب الجذر؛ لأن الأعداد الموجودة هناك هي أواخر المكعب، فمطلوب مكعبه / هو آخر ٦١ - ٦٠ ظ الجذر؛ ثم نحتاج أن نضرب مراتب الجذر في مراتب عدد الجزور الذي هو بعض المال، ونزيد حاصل الضرب على العدد، حتى يحصل المكعب، ثم 10 نعمل عمل الكعب. فإذا حصل لنا آخر الجذر المطلوب يجب أن نضربه في عدد الجزور، ونزيده على العدد، وننقص مكعبه منه. فإذا ضربناه في ثلث عدد الجزور وزدنا ثلاثة أمثال كل ضربته على العدد، ونقصنا مكعبه منه، كان كذلك. والمطلوب الذي نستخرجه بعد ذلك ينبغي أن نضربه في 15 مراتب عدد الجزور، ونزيد حاصل الضربات على العدد، ثم نضربه في مال المطلوب الأول ثم ننقص ثلاثة أمثال الضربات منه. فلو وضعنا مربع المطلوب الأول تحت العدد، ونقصنا ثلث عدد الجزور منه، وضربنا المطلوب الذي نستخرجه في الباقي، ونقصنا ثلاثة أمثال الضربات من العدد، كان ذلك مغنياً عن الأمرين؛ لأننا إذا نقصنا ثلث عدد الجزور

3 الجذر: الجزور - 5 مكعب: مكعبة - 7 ووضعناه: ووضعنا / الجذر: المقصود «الجذر المطلوب» -
 8 مكعبه: مكعبة - 9 الجذر: المقصود «الجذر المطلوب» / نحتاج: يحتاج / نضرب: بضرب - 11 نضربه:
 بضربه - 12 وننقص: وننقص - 13 مكعبه: مكعبة - 14 ينبغي: ينبغي / نضربه: بضربه - 16 ننقص:
 ننقص - 18 المطلوب: أي المطلوب الثاني / نستخرجه: يستخرجه

من مال المطلوب الأول؛ يكون المطلوب الذي نستخرجه ونضربه في الباقي؛ فثلاثة أمثال هذا الضرب يكون ناقصاً عن ثلاثة أمثال ضربه في المال - الذي لم ينقص منه ثلث عدد الجذور - بمقدار ضرب هذا

/ المطلوب في عدد الجذور. فإذا نقصناه من العدد، فبمقدار النقصان ل - ٦٢ - و

5 الذي يكون في المنقوص يبقى الزيادة في المنقوص منه؛ وإذا لم نزد ضرب المطلوب - الذي نستخرجه - في عدد الجذور على العدد؛ فقد نقصنا ثلاثة أمثال ضرب هذا المطلوب في المنقوص من مربع المطلوب الأول، فلهذا السبب نقص ثلث عدد الجذور من مال المطلوب الأول، حتى إذا استخرجنا المطلوب الثاني، وعملنا معه عمل الكعب فعند ضربه في باقي مربع المطلوب الأول، ونقصان ثلاثة أمثال الضربات؛ يكون بمنزلة ضربه في عدد الجذور وزيادته على العدد، ثم عمله عمل المكعب. وعلى هذا يستمر العمل إلى آخره.

وأما الصورة الثانية: فمربع آخر الجذر المطلوب يكون في عدد الجذور؛ لأنه لو كان في القسم الذي ضرب في الجذر المطلوب حتى حصل العدد 15 لكان مكعبه حاصلاً في آخر العدد، ويحصل من ضرب مربعه فيه، وليس كذلك. فهو موجود في عدد الجذور، ولا بد أن يكون في أواخر مراتبه؛

1 المطلوب: أي المطلوب الثاني / نستخرجه: يستخرجه - يشرح الطوسي في آخر هذا النص القاعدة:

$$(a-b)+c = a-(b-c)$$

ومثال معاكس للحالة الأولى:

$$x^3 = 9876x + 60049600$$

$$(S = 400)$$

ومثال معاكس آخر

$$x^3 = 999x + 63600400$$

$$(S = 400)$$

4 المطلوب: أي المطلوب الثاني -

6 نستخرجه: يستخرجه - 8 نقص: ينقص -

11 وزيادته: وزمان هـ. ولقد كتب الجزء الأخير فوق الأول - 13-16 تقوم مناقشة الطوسي هنا على التلطاقة: $16 - x^2 = ax + x(x-a)$ فهو: أي مربع آخر الجذر المطلوب / أن: وأن

لأن عدد الجذور أعظم قسمي المال؛ وإلا لما كان مربع آخر الجذر المطلوب حاصلًا فيه، ومنحط مربعه يكون / مقابلًا لآخر الجذور المقابلة د - ٦٢ - ظ
 لعدد الجذور. فمطلوب ذلك الجذر يكون آخر الجذر المطلوب، ويكون
 «في» المرتبة السميّة لآخر الجذور المقابلة لعدد الجذور. فقد عرفنا بهذه
 الجملة آخر الجذر المطلوب. ولا شك أن منحط مكعبه يكون واقعًا في المرتبة
 المقابلة للكعب السميّ لمرتبه، فلذلك نقلنا المرتبة التي فيها عدد الجذور
 المحاذية لآخر الجذور المقابلة لعدد الجذور إلى مرتبة الكعب السميّ لذلك
 الجذر وسائر مراتبه على الترتيب، لأن منحط مربع أرفع مراتب الجذر
 المطلوب موجود فيه، ومنحطات سائر ضرباته في سائر مراتب الجذر
 10 المطلوب موجودة في سائر المراتب على الترتيب. ومعلوم أن ضرب آخر
 الجذر المطلوب في مربعه، يقع محاذيًا للكعب السميّ الذي نقلنا إليه صور
 عدد الجذور، بحيث موضعه. فحاصل ضربات آخر الجذر المطلوب في سائر
 عدد الجذور يكون واقعًا في تلك المراتب التي حصلت فيها صورها بهذا
 النقل. وبقيّة البيان ما مرّ.

15 وأما في الصورة الثالثة: ففرع آخر الجذر المطلوب ليس بكلّيته في عدد
 الجذور «وليس بكلّيته في القسم الآخر من المال»: إذ لو كان كذلك لكان
 / مضروب آخر مراتب القسم الآخر من المال في آخر مراتب الجذر المطلوب د - ٦٣ - و
 إما أرفع أو أنزل من ضرب الجذر «في» عدد الجذور في الصورة المحاذية
 لآخر الجذور المقابلة لعدد الجذور، وليس كذلك؛ لأن كلا المضروبين

1 أعظم: أي مرتبة أعظم - 2 ومنحط، والمقصود هنا موقعه تحت العدد - 4 عرفنا: غير واضحة - 5 واقعًا: وقعه - 6 لمرتبه: لمرتبه / نقلنا: نقلنا / فيها: من - 7 المحاذية: المجاورة - 8 وسائر مراتبه: وسائر مرتبه؛ والتاسخ يرسم كلمة «سائره»: ستاير أو ساير. ولن نشير إليها مرة أخرى - 11 مربعه: مربع / محاذيا: مجازيا / للكعب: أي لمرتبة الكعب / نقلنا: نقلنا - 18 الجذر: جذر - 19 آخر: الآخر

يقعان في المرتبة المحاذية للجزر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور؛ وليس بكليته موجوداً في القسم الآخر من المال، لهذا الدليل بعينه. فبعض مربع آخر الجذر المطلوب مقابل آخر الجذور المقابلة لعدد الجذور، وبعض مكعبه مقابل الكعب الأخير، فنقلنا من عدد الجذور المرتبة المحاذية لآخر الجذور المقابلة لعدد الجذور إلى محاذة الكعب الأخير، لأن ضرب سمي ذلك الكعب في هذه المرتبة يقع في مرتبة ذلك الكعب. فيتبين لنا مكعب آخر الجذور، وهو الكعب الأخير؛ وبعض مكعبه موجود في العدد المقابل لتلك المرتبة ومرفوعاتها، وهو الذي كان من ضرب أحد قسمي ماله فيه؛ والقسم الذي لم يضرب فيه، وهو آخر عدد الجذور. وقد انتقل 10 إلى محاذاته في المرتبة التي يقع فيها مكعبه. فيطلب أكثر عدد؛ إذا ضربناه في مراتب عدد الجذور وزدناه على العدد حصل مكعبه في العدد، وكان في المرتبة المحاذية للكعب الأخير ومرفوعاته. وبقيّة البيان / ما مرّ.


ل - ٦٣ - ظ

المسألة الثالثة: مكعب وأموال يعدل عدداً.

فنعمل مكعباً مساوياً للعدد، وليكن ضلعه خط ك. وليكن $\overline{أ ب}$ عدد الأموال ونخرجه بالاستقامة، ونفصل $\overline{ب ج}$ مثل خط ك، ونعمل على $\overline{ب ج}$ مربع $\overline{ب هـ}$ ، ونعمل على نقطة هـ قطعاً زائداً لا يقع عليه خطاً $\overline{ب د}$ $\overline{ب ج}$ ، وليكن هو قطع $\overline{هـ ح}$. ونعمل على نقطة آ قطعاً مكافئاً ضلعه القائم مثل $\overline{ب ج}$ ، وليكن هو قطع $\overline{أ م}$. فلأن نقطة $\overline{ج د}$ على السهم، فيخرج منها عمود (على السهم) ينتهي إلى محيط القطع المكافئ ويكون خطاً ترتيبه،

2 ب كليته: أي مربع الجذر المطلوب - 4 لآخر: الأخير - 5 المقابلة: المتقابلة / محاذة: 5-6 سمي ذلك الكعب: أي الجذر السمي للكعب الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور - 6 فيتبين: فتنين - 10 فيها: فيه - 11 وزدناه: وكان: غير واضحة الحروف - 18 م: م / فيخرج: فنخرج - 19 ينتهي: وينتهي

- ويكون مربعه مثل ضرب $\overline{ا ج}$ ، السهم، في $\overline{ب ج}$ القائم، فيكون مربعه أعظم من مربع $\overline{ب ج}$ ، فهو إنما ينتهي إلى محيط القطع المكافئ بعد مجاوزة نقطة هـ. ولأن القطع الزائد أبداً فيما بين خطي $\overline{ب د ج ب}$ ؛ فالعمود الخارج من نقطة $\overline{ج}$ إنما يلي محيط القطع المكافئ في داخل القطع الزائد، 5 فالقطعان يلتقيان بالضرورة، وليكن التقاؤهما على نقطة ح. ونخرج ط ح عموداً على $\overline{ب د ط}$ وح ز عموداً على $\overline{ا ج}$. فلأن ضرب $\overline{ا ز}$ ، السهم، في $\overline{ب ج}$ ، القائم، مثل مربع ز ح؛ فنسبة $\overline{ا ز}$ إلى ز ح كنسبة ز ح إلى $\overline{ب ج}$. ولأن ح ط بُعد نقطة ح؛ فضرب $\overline{ب ط}$ في ط ح مثل مربع $\overline{ب د أعني ب ج}$. فنسبة $\overline{ب ط}$ - أعني ز ح - إلى $\overline{ب ج}$ / كنسبة ل - ٦٤ - و $\overline{ب ج}$ إلى ط ح، أعني $\overline{ب ز}$. فخطوط $\overline{ا ز}$ $\overline{ب ج}$ $\overline{ب ز}$ متوالية 10 على النسبة. فربع $\overline{ب ز}$ ، أحد الطرفين، في $\overline{ا ز}$ ، الطرف الآخر، مثل مكعب $\overline{ب ج}$ المساوي للعدد. ولكن مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ا ز}$ مثل مجموع مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ب ز}$ ، وهو مكعب $\overline{ب ز}$ ، مع مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ا ب}$ وهو الأموال. فقد حصل $\overline{ب ز}$ الضلع الذي يكون مكعبه مع ضرب ماله في 15 عدد الأموال مثل العدد المفروض؛ وذلك ما أردنا بيانه.



2 مربع $\overline{ب ج}$: مربعه ب - 6 $\overline{ا ز}$: الألف مطبوعة

وأما استخراج المطلوب فيضع العدد على التخت، ويضع فوقه أصفار الكعب، ويضع عدد الأموال، فيكون للمسألة ثلاث صور:

الصورة الأولى:

أن تكون المرتبة السمية للكعب الأخير أرفع من آخر مراتب عدد الأموال، مثل قولنا: كعبٌ وثلاثون مالاً يعدل عدد ستة وثلاثين ألفاً ٥ ألف، ومائة وسبعة وستين ألفاً، وثلاثمائة وأحد وتسعين. فنعد من المرتبة السمية للكعب الأخير إلى آخر مراتب عدد الأموال، ونعد من المرتبة المقابلة للكعب الأخير في جهة الانحطاط بتلك العدة، فحيث ينتهي ننقل إليه آخر مراتب عدد الأموال، ونرّده إلى الثلث ونضع سائر المراتب على الترتيب، فيكون بهذه الصورة ٣١١٦٧٣٩١؛ لأن المرتبة السمية للكعب الأخير إنما هي المئات، وآخر مراتب عدد الأموال منحطٌ / عنها بمرتبة، والمرتبة ١٠ المقابلة للكعب الأخير إنما هي ألوفُ الألوف، فنقلنا آخر ثلث عدد الأموال إلى المرتبة المنحطة عنها بمرتبة، ونضع مطلوب الكعب - وهو الثلاثة - في الكعب الأخير، وننقص مكعبه من العدد من المرتبة التي تحاذيه ومرفوعاتها ١٥ ونضربه في ثلث عدد الأموال ونضع الحاصل في سطرٍ أوسط بين العدد وبين ثلث عدد الأموال، ونضربه في السطر الأوسط، وننقص ثلاثة أمثال كل ضربية من العدد، ونضع مربع المطلوب بجذائه في السطر الأوسط، ثم نضرب المطلوب في ثلث عدد الأموال، ونزيد الحاصل على الأوسط،

6 سبعة: تسعة / وستين: فاستين - 7 ونعد: وقعد - 8 نقل: ينقل - 9 ونضع: ويضع - 12 هي: هو / فنقلنا: فوق السطر ومطموس بعضها - 13 ونضع: ويضع - 14 وننقص: وينقص - 15 ونضربه: ونضربه / ونضع: ويضع - 16 ونضربه: ونضربه / وننقص: وينقص - 17 ونضع: ويضع - 18 نضرب: يضرب

ونقل المطلوب وثلاث عدد الأموال بمربتين، والسطر الأوسط بمربية،
 فيحصل بهذه الصورة: ١٤٦٧٩١ ، ثم نضع المطلوب الثاني، وهو اثنان،
 ونقص مكعبه من العدد، ونضربه في المطلوب \langle الأول \rangle وفي ثلث عدد
 الأموال، ونزيد المبلغ على الأوسط ونضربه في الأوسط، ونقص ثلاثة
 أمثال كل ضرب من العدد. ثم نزيد مربع المطلوب الثاني على السطر
 الأوسط، على المرتبة المحاذية له، ونضرب المطلوب الثاني في المطلوب
 الأول و / في ثلث عدد الأموال، ونزيد الحاصل على الأوسط، ونقل ل - ٦٥ - و
 الأعلى والأسفل بمربتين، والأوسط بمربية، فيحصل بهذه الصورة ٣٢٠
 ٣٣٧٣٩١ ، ثم نضع المطلوب الثالث، وهو الواحد، ونقص مكعبه من العدد، ونضربه
 10 في المطلوب الأول والثاني وفي ثلث عدد الأموال، ونزيد الحاصل على
 الأوسط، ونضربه في الأوسط، ونقص ثلاثة أمثال كل ضرب من العدد،
 ويحصل السطر الأعلى بهذه الصورة ٣٢١، وهو الجذر المطلوب.

الصورة الثانية:

أن يكون آخر مراتب عدد الأموال أرفع من المرتبة السمية للكعب
 15 الأخير: فنضع ثلث عدد الأموال على رسم وضع المقسوم عليه، ونعرف
 مرتبة مطلوب القسمة ونعدّ العدد بجذر، ولا جذر، إلى مرتبة مطلوب
 القسمة؛ فإن كان الجذر الأخير منقطعاً عن مكان مطلوب القسمة؛ فنحط
 آخر مراتب ثلث عدد الأموال بقدر انحطاطه، وإلا فتركها بحالها ونطلب
 الكعب السمي للجذر الأخير، فهناك مكان المطلوب الكعب.

١ ونقل: وينقل - 2 نضع: يضع - 3 ونقص: وينقص / ونضربه: ونضربه - 4 ونضربه:
 ونضربه / ونقص: وينقص - 6 المحاذية: المجاورة / ونضرب: ونضرب 7 ونقل: وينقل - 9 نضع:
 يضع / ونقص: وينقص / ونضربه: ونضربه - 11 ونضربه: ونضربه / ونقص: وينقص - 15 فنضع:
 فيضع - 16 القسمة: القسمة / ونعدّ: وبعد - 17 القسمة (الأولى والثانية): القسمة - 18 بقدر:
 يقدر / ونطلب: ويطلب

مثاله: مكعب وثلاثة آلاف أموالٍ يعدل عدداً بهذه الصورة

٣٤٢١٩٩١٦٦. فلأن آخر مراتب عدد الأموال في المرتبة الرابعة، والمرتبة السمية

للكعب الأخير / هي الثالثة، وهي أنزل من آخر عدد الأموال؛ وضعنا ل - ٦٥ - ط

ثلث عدد الأموال > على وضع المقسوم عليه، فكان مطلوب القسمة واقعاً

5 في مرتبة مئات الألوف؛ والجذور التي من الأحاد إلى مرتبته ثلاثة،

والكعب السمي للجذر الأخير منها هو الثالث، ومكان مطلوب القسمة

لا يقابله جذر؛ بل الجذر الأخير منحط عنه بمرتبة، فحططنا آخر مراتب

ثلث عدد الأموال < بمرتبة >، فحصل بهذه الصورة ٣٤٢١٩٩١٦٦. ثم نطلب

عدداً نضعه في الكعب الثالث، وننقص مكعبه مما تحته ومرفوعه. ونضربه

10 في ثلث عدد الأموال، ونزيد الحاصل على السطر الأوسط. ونضربه في

المبلغ وننقص ثلاثة أمثال كل ضربة من العدد، وهو الثلاثة. فنضعه مكان

الكعب الثالث، ويُعمل به العمل المذكور. ثم نضع مربعه في الأوسط

ونضربه في ثلث عدد الأموال ونزيد الحاصل على الأوسط وننقل الأعلى

والأسفل بمرتبتين، والأوسط بمرتبة؛ ونعمل العمل السابق إلى آخره.

15 الصورة الثالثة:

ألا يكون آخر مراتب عدد الأموال أرفع ولا أنزل من المرتبة السمية

للكعب الأخير. فننقل آخر ثلث عدد الأموال إلى المرتبة السمية للکعب

الأخير؛ ونعمل به العمل المذكور.

1 أموال: كذا والأصح مال - 2 ٣٤٢١٩٩١٦٦ - 4 القسمة: فوق السطر ومطلومة قليلاً - 5 والجذور: المقصود الجذور المقابلة للعدد التي عدناها في / مرتبته: مرتبة - 7 فحططنا: فخططنا - 8 نطلب: يطلب - 9 ونقص: وينقص - 11 ونقص: فنقصه / فنضعه: فيضعه - 13 ونزيد: ونزيد / ونقل: ونقل - 17 فنقل: فنقل - 18 المذكور: العمل المذكور لا ينطبق هنا دائماً كما سبق أن أشرنا إليه في مثال سابق

وإنما وجب العمل على الوجه المذكور؛ لأن / العدد مركب من ١ - ٦٦ - و المكعب الحاصل من ضرب المال في الجذر المطلوب، ومن المسطح الحاصل من ضرب المال في عدد الأموال، وآخر المكعب حاصل من ضرب مربع آخر الجذر المطلوب في آخره، وآخر المسطح حاصل من ضرب آخر المال، 5 وهو مربع آخر الجذر المطلوب في آخر عدد الأموال. فإن كان آخر الجذر المطلوب أرفع من آخر عدد الأموال، فآخر المكعب أرفع من آخر المسطح، ويكون آخر المكعب في أواخر العدد، ويكون مطلوب الكعب الذى نستخرج لآخر العدد؛ وهو آخر الجذر المطلوب، فيكون أرفع من آخر مراتب عدد الأموال.

10 وإن كان آخر عدد الأموال أرفع من آخر مراتب الجذر المطلوب، فآخر

المسطح أرفع من آخر المكعب، ويكون آخر المسطح في آخر العدد.

ولأن آخر المسطح حاصل من ضرب مربع آخر الجذر المطلوب في آخر

عدد الأموال، فيكون ضرب مربع آخر عدد الأموال في آخر عدد

الأموال - وهو «آخر» مكعبه - أرفع منه. فلو استخرج مطلوب كعبه

15 يكون الخارج آخر عدد الأموال. ولأن آخر المسطح أنزل من مكعبه؛ فلو

استخرج مطلوب الكعب لآخر المسطح يكون أنزل منه. فقد تبين أنه إذا

كان آخر عدد الأموال أرفع من آخر الجذر المطلوب يكون مطلوب كعبه

لآخر المسطح / أنزل من آخر عدد الأموال. فنعلم أن أحدهما - أعني آخر ١ - ٦٦ - ٦

عدد الأموال أو آخر الجذر المطلوب - لو كان أرفع من الآخر

20 «حصل» - لكون «آخر» الجذر المطلوب أرفع من آخر عدد الأموال -

خاصيتان: إحداهما أن يكون آخر المكعب واقعاً في آخر العدد، والآخرى

8 لآخر: أي في آخر - 14 أرفع منه: يعود الضمير على آخر المسطح - 16 لآخر: الآخر -

17 مطلوب كعبه: أي مطلوب الكعب الذي يستخرج - 18 لآخر: آخر

أن يكون مطلوب الكعب لآخر العدد، وهو آخر الجذر المطلوب، أرفع من آخر عدد الأموال؛ وحصل - لكون آخر مراتب عدد الأموال أرفع - خاصيتان: إحداهما أن يكون آخر المسطح واقعاً في آخر العدد، والأخرى أن يكون مطلوب الكعب الذى يستخرج لآخر المسطح أنزل من آخر عدد الأموال. وإذا تحقق هذا فيُستخرج مطلوب الكعب لآخر العدد؛ فإن كانت مرتبته أرفع من آخر عدد الأموال، فنعلم أن الواقع في آخر العدد هو آخر المكعب، وأن آخر الجذر المطلوب أرفع من آخر عدد الأموال. وإن كانت أنزل من آخر عدد الأموال فنعلم أن الموجود في آخر العدد هو آخر المسطح، وأن آخر عدد الأموال أرفع من آخر الضلع. لكن المطلوب الخارج في الصورة الأولى أرفع مرتبة من آخر عدد الأموال، فهو آخر الجذر المطلوب، ومكعبه موجود في آخر العدد. فينقص / مكعبه من تلك المرتبة، ١ - ٦٧ - ٥، ثم المرتبة السمية للكعب الأخير هي مرتبته وهي معلومة. ومعلوم أن آخر عدد الأموال من أي مرتبة هو، فانحطاط مرتبته عن المرتبة الحقيقية للمطلوب معلوم. فننقله إلى المرتبة المنحطة عن المرتبة التي وضعناه فيها بقدر انحطاطه ١٥ عن مرتبته الحقيقية، وسائر المراتب على الترتيب، لأننا نحتاج أن نضرب مال المطلوب في مراتب عدد الأموال، وننقصه من العدد. ومال المطلوب مضروب في المطلوب، ومنحط الضرب واقع في المرتبة التي وضعنا فيها المطلوب (ومرفوعاتها). فإذا ضربنا مال المطلوب في مراتب عدد الأموال يكون منحطات تلك الضربات واقعة في المراتب المنحطة عن هذه المرتبة ٢٠ بقدر انحطاط مراتبها الحقيقية عن المرتبة الحقيقية للمطلوب. فلهذا السبب

3 والأخرى: ولاخرى - 4 يستخرج: فيستخرج - 6 كانت مرتبته: كان مرتبه - 10 الأولى: الاول -
 12 مرتبته: مرتبه - 14 فنقله: فنقل - 15 مرتبته الحقيقية: أي مرتبة المطلوب / نحتاج: يحتاج -
 16 ونقصه: وينقصه

وضعناه على الوجه المذكور. ثم نحتاج أن نضرب مال المطلوب في كل واحدٍ من صور مراتب عدد الأموال، وننقص حاصل الضربات من العدد. فلو ضربنا المطلوب في كل واحدٍ من تلك الصور، ثم وضعنا حاصل الضربات مسطّحاً من تلك المراتب، ثم ضربنا المطلوب في مراتب المسطّح؛ يكون 5 الحاصلُ بعينه مثل ما لو ضرب مال المطلوب في كل واحد منها. فلو وضعنا

ثلاث صورٍ عدد الأموال في تلك المراتب وضربنا المطلوب / في صور ل - ٦٧ - ط
الثالث، ووضعناه مسطّحاً، ثم ضربنا المطلوب في هذا المسطّح، وأخذنا ثلاثة أمثال كلّ ضربة، يكون الحاصل أيضاً مثل ما لو ضرب مال المطلوب في عدد الأموال. فلهذا السبب عملنا على هذا الوجه ليتأدّى إلى مثل عمل 10 الكعب. ثم إذا ضربنا المطلوب في ثلاث عدد الأموال ووضعنا المسطّح في تلك المراتب، ثم ضربناه في المسطّح ونقصنا ثلاثة أمثال الضربات من العدد؛ وقد نقصنا مكعبه < من > العدد، فقد حصل ضرب مال المطلوب الأول فيها، ونقصناها من العدد؛ وماله بعض مال الجذر المطلوب، فإذا استخرجنا المطلوب الثاني، فقد علمنا من مال الجذر المطلوب بعضاً آخر 15 وهو مربع المطلوب الثاني، وضربته في المطلوب الأول مرتين؛ فنحتاج أن نضرب هذا البعض أيضاً في عدد الأموال وننقصه من العدد، فنحتاج أن نضرب المطلوب الثاني في المطلوب الأول مرتين < وفي عدد الأموال >، ونضرب المال في عدد الأموال، وننقص المبلغ من العدد. لكنّا لو ضربنا المطلوب < الأول > مرتين في عدد الأموال، ثم ضربنا الحاصل في المطلوب

1 وضعناه: الضمير يعود هنا على عدد الأموال / نحتاج: نضرب: يضرب - 2 وننقص: وينقص - 6 ثلاث صور: الصحيح هو «صور ثلاث» - 7 الثالث: قد تقرأ الثلاثة - 9 ليتأدّى: لتتأدّى - 12 وقد نقصنا: ونقصنا / مكعبه: مكعب، المقصود هنا مكعب العدد المطلوب - 15 فنحتاج: فنحتاج - 16 نضرب: يضرب / ونقصه: ونقصه / فنحتاج: فنحتاج - 17 نضرب: يضرب - 18 ونضرب: ونضرب / المال: قد تقرأ الحال: والمقصود مال المطلوب الثاني / وننقص: وينقص / العدد: العدد

الثاني، ونقصنا المبلغ من العدد؛ يكون مثل ذلك. وكذلك لو ضربنا ثلث عدد الأموال في المطلوب الأول مرتين، ثم ضربنا المطلوب الثاني في الحاصل، وأخذنا ثلاثة أمثال الضربات؛ يكون مثل ذلك. فلهذا / السبب إذا ضربنا المطلوب الأول في ثلث عدد الأموال ووضعناه ج - ٦٨ - و 5 سطحاً، فقبل النقل نضربه فيها كرة أخرى ونزيده على المسطح ليحصل ضرب المطلوب الأول في ثلث عدد الأموال مرتين، حتى إذا ضربنا فيها المطلوب الثاني يكون موافقاً لذلك. ونحتاج أيضاً أن نضرب مربع المطلوب الثاني في عدد الأموال، وننقص حاصل الضربات من العدد. فلو ضربناه في ثلث عدد الأموال، ووضعناه «مسطحاً» ثم ضربناه فيه؛ فثلاثة أمثاله 10 يكون مثل ذلك. فلذلك نضرب هذا المطلوب في ثلث عدد الأموال [ونزيده على الأموال]، وقبل نقل هذا المطلوب نضربه أيضاً كرة أخرى في صور الثلث، ونزيده على المال والمسطح بمثل ما قلناه في المطلوب الأول. وأعمال سائر المطالب على هذا القياس.

وأما الصورة الثانية فالمطلوب الذي يخرج أنزل من آخر عدد الأموال. 15 فالموجود في آخر العدد هو آخر المسطح؛ فيكون «مربع» المطلوب الأول الخارج من قسمة المسطح على عدد الأموال هو مال آخر الجذر المطلوب. وهو معلوم المرتبة، فيعلم منه مرتبة جذره وهو آخر الجذر المطلوب. فإذا علمنا أن آخر الجذر المطلوب من أي مرتبة هو، فنعلم أن مكعبه يكون واقعاً بجذء الكعب السمي / لمرتبه. ثم نحتاج أن نضرب ماله في عدد الأموال، ج - ٦٨ - و 20 وننقص حاصل الضرب من العدد، وننقص مكعبه من العدد. فإذا نقصنا

5 نضربه: يضربه / فيها: أي ثلث عدد الأموال / ونزيده: ونزيده - 7 ونحتاج: ونحتاج / نضرب: نضرب - 8 وننقص: وننقص - 10 نضرب: نضرب - 11 ونزيده: ونزيده / نضربه: نضربه - 12 ونزيده: ونزيده / والمسطح: المسطح - 15 هو: وهو - 19 نحتاج: نحتاج / نضرب: نضرب - 20 وننقص (الأولى والثانية): وننقص

مكعبه ووضعنا ثلث عدد الأموال وضربنا المطلوب فيه ووضعناه مسطحاً،
ثم ضربناه في المسطح ونقصنا ثلاثة أمثال الضرب، يكون الحاصلُ مثلُ
ذلك. فلهذا السبب يردّ عدد الأموال إلى الثلث. ولأن المرتبة الحقيقية التي
لصورة هذا المطلوب معلومة، وكذا المراتبُ الحقيقية لصور ثلث عدد
5 الأموال معلومة، فتكون الصورة التي مرتبتها الحقيقية هي مرتبة المطلوب من
مراتب ثلث عدد الأموال أيضاً معلومة. فتلك الصورة إن كانت واقعة مع
المطلوب في مرتبة؛ فنحطّ ضرب مال المطلوب في المطلوب، في تلك
المرتبة، وتلك الصورة والمطلوب من مرتبة واحدة، فيكون منحطّ ضرب
المطلوب في كل واحدٍ منهما واقعاً في مرتبة واحدة. فلا حاجة إلى حطّ
10 مراتب ثلث عدد الأموال وإن لم يكن تلك الصورة في مرتبة المطلوب؛ بل
ويتفق أن يكون في مرفوعه عند استخراج مطلوب القسمة؛ فنحطّ مرتبة
آخر ثلث عدد الأموال، وكذا سائر مراتبه، مرتبةً واحدة، ليحصل كل
صورة في المرتبة التي إذا ضرب مال المطلوب / فيها يكون منحطّ الضرب ل - ٦٩ - و
واقعاً في تلك المرتبة. وبقية البيان ما مرّ.

15 وأما الصورة الثالثة فآخِرُ الجذر المطلوب وآخِرُ عدد الأموال فيها من
مرتبة واحدة. إذ لو كانت إحداها أرفع لكان مطلوبُ الكعب أرفع من
آخر عدد الأموال أو أنزل. فعلمنا أنه من تلك المرتبة. فلنتقل المرتبة
الأخيرة من عدد الأموال إلى محاذة الكعب الأخير، وفيه المطلوب؛ لأنه
والمطلوب: كلاهما من مرتبة واحدة. ونردّ صور عدد الأموال إلى الثلث،
20 للعلة التي سبقت، ونستخرج مطلوباً نضربه في ثلث عدد الأموال ونضعه

3 يرد: يزد - 5 فكون: فيكون - 9 حطّ: خط - 12 الأموال: الجذور - 17 فانتقل: فليقل -
19 ونردّ: ويزد - 20 ونستخرج: ونضربه / نضربه: ونضعه: ويضعه

مسطحاً ونضربه في المسطح، وننقص ثلاثة أمثال الضربات (من العدد) وننقص مكعبه من المرتبة التي هو فيها. وبقيّة البيان ما مرّ.

المسألة الرابعة: عددٌ وأموال يعدل مكعباً.

- فليكن $\overline{أ ب}$ عددُ الأموال، وس $\overline{ف}$ هو العددُ المجهّم المذكور في السؤال، وقاعدته $\overline{س ع}$ ، وهو واحد سطحيّ، وارتفاعه $\overline{ع ف}$. فيكون $\overline{ع ف}$ بعدّة أحاد العدد المذكور في السؤال. فنستخرج فيما بين خطي $\overline{أ ب}$ $\overline{ع ف}$ وسطاً في النسبة، وليكن هو خط $\overline{ك}$. ونجعل نسبة الواحد الخطي - وهو $\overline{و ع ص}$ - إلى $\overline{ب ج}$ كنسبة $\overline{أ ب}$ إلى $\overline{ك}$ ، فنسبة مربع $\overline{ع ص}$ - وهو $\overline{س ع}$ - إلى مربع $\overline{ب ج}$ كنسبة مربع $\overline{أ ب}$ / $\overline{أ ب}$ إلى مربع $\overline{ك}$ ، وهي كنسبة $\overline{ل - ٦٩ - ظ}$ 10 خط $\overline{أ ب}$ إلى $\overline{ع ف}$. فنسبة مربع $\overline{س ع}$ إلى مربع $\overline{ب ج}$ كنسبة خط $\overline{أ ب}$ إلى $\overline{ع ف}$. فنضرب مربع $\overline{ع س}$ في خط $\overline{ف ع}$ - وهو العدد - مثل ضرب مربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{أ ب}$. فنضرب مربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{أ ب}$ مثلاً العدد؛ ونجعل $\overline{ب ج}$ عموداً على $\overline{أ ب}$ ، ونعمل قطعاً مكافئاً رأسه نقطة $\overline{ب}$ ، وسهمه $\overline{ب أ}$ ، وضلعه القائم مثل $\overline{أ ب}$. ونجعل خط $\overline{ل}$ وسطاً في النسبة 15 بين خطي $\overline{أ ب}$ $\overline{ب ج}$. فإن كان $\overline{أ ب}$ أعظم من $\overline{ب ج}$ فهو أعظم من $\overline{ل}$ ضرورةً. ونفصل $\overline{أ د}$ مثل $\overline{ل}$ ونعمل عليه مربعاً، وليكن هو مربع $\overline{أ هـ}$ ، فلأن ضرب $\overline{أ ب}$ في $\overline{ب ج}$ مثل مربع $\overline{ل}$ لكونه وسطاً في النسبة بينهما، فنضرب $\overline{أ ب}$ في $\overline{ب ج}$ مثل مربع $\overline{أ هـ}$. ونفرض على $\overline{ب ج}$ نقطة $\overline{ط}$ ، بحيث يكون $\overline{ب ط}$ (مثل $\overline{ب ج}$ أي) أقل من $\overline{أ د}$. فلأن خطي $\overline{أ ن}$


1 ونضربه / ونضربه / ونقص: والضربان: 2 ونقص: ونقص / فيها: في / مرّ: انظر التعليل على مثل هذه المسألة - 6 العدد المذكور في السؤال: العدد المسؤول عنه / فنستخرج: 7 ويجعل: ويجعل: 13 ويجعل: 14 ب: أ: ب م - 16 ونقص: ويفصل - 18 ونفرض: ويفرض - 19 بحث: فحيث / أ: د: أ هـ

أَب محيطان بزاوية قائمة، ونقطة ط مفروضة فيما بينهما، وهي أقرب إلى أ ب، فنعمل قطعاً زائداً يمرّ محيطه بنقطة ط، ويكون منتصف مجانبه نقطة آ ولا يقع في جهة نقطة ج - فظاهر أنه يوجد في القطع المكافئ خط ترتيب مثل ب ج، وليكن ذلك الخط (الذي) يخرج من نقطة ك أقرب 5 إلى القطع الزائد من نقطة ب؛ فالعمود الذي يخرج من نقطة ك إلى محيط


القطع المكافئ يلقى القطع الزائد / أولاً ثم ينتهي إلى المكافئ، ففي ذلك ج - و - د -
الموضع قد دخل في القطع الزائد وهو خارج عنه عند نقطة ب، لأن نقطة ب على خط لا يقع عليه، فالقطعان يتقاطعان، وليكن تقاطعهما على نقطة ز. فنخرج عمود ز ح يلقى نقطة ز على محيط القطع الزائد؛ فضرب آ ح في ح ز مثل مربع آ ه، وضرب آ ب في ب ج أيضاً مثل مربع آ ه لما مر؛ فضرب آ ح في ح ز مثل ضرب آ ب في ب ج. فنسبة آ ح إلى ب ج كنسبة آ ب إلى ز ح لتكافؤ الأضلاع. فنسبة مربع آ ح إلى مربع ب ج كنسبة مربع آ ب إلى مربع ح ز. ولأن ضرب آ ب في ب ح مثل مربع ز ح، فنسبة آ ب إلى ح ز كنسبة ح ز إلى ب ح. فنسبة مربع آ ب إلى مربع ح ز كنسبة آ ب إلى ب ح، فنسبة مربع آ ح إلى مربع ب ج كنسبة آ ب إلى ب ح. فضرب مربع آ ح في خط ب ح مثل ضرب مربع ب ج في خط آ ب، المساوي للعدد. فإذا جعلنا خط آ ح ضلعاً، فيكون مربعه مالا، ومربع آ ح في خط آ ب هو الأموال بالعدة المذكورة في السؤال. وبمجموع مربع آ ح في آ ب الأموال، ومربع آ ح في ب ح العدد، مساوٍ لمربع آ ح في آ ح وهو مكعب آ ح. فالعدد والأموال مثل

2 فتصل: فيعمل / يمر: تمر - 4 ل: في - 5 ل: في - 6 في: في - 9 فخرج: فيخرج / يلقى: بعد / على: عن - 12 لتكافؤ: ليكافئ - 17 ضلعا: ضلعاً

المكعب. فقد وجدنا خطأ يكون عدة أمواله / المذكورة مع العدد مثل ل - ٧٠ - ط
مكعبه.




وإن كان $\overline{اب}$ مثل $\overline{ب ج}$ فهو مثل $\overline{ل}$. فنعمل على $\overline{اب}$ مربعاً
ونفرض نقطة على خط ترتيب للقطع المكافئ؛ ونعمل قطعاً زائداً رأسه
s عند نقطة $\overline{ج}$ ومحيطه يمرّ بتلك النقطة ولا يقع عليه خطاً $\overline{اب}$ $\overline{ان}$ ؛ وبقيّة
البيان ما مرّ.



وإن كان $\overline{اب}$ أصغر من $\overline{ب ج}$ فهو أصغر من $\overline{ل}$ ، فنفصل $\overline{اش}$ مثل
 $\overline{ل}$ ، ونعمل عليه مربعاً؛ وبقيّة البيان ما مرّ؛ وذلك ما أردنا بيانه.

s ومحيطه: المقصود ونفرض محيطه يمرّ بتلك النقطة - 7 فنفصل: فيفصل



وأما استخراج المطلوب فنضع العدد على التخت ونضع فوقه أصفار الكعب ونضع عدد الأموال، فيكون للمسألة صوراً ثلاث:

الصورة الأولى:

أن يكون المرتبة السمية للكعب الأخير أرفع من آخر «مراتب» عدد الأموال، مثل قولنا: ثلاثون مالا، وعدد: تسعة وعشرون ألف ألف وتسعمائة ألف وأربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وأحد وثلاثون، يعدل مكعباً. فنعرف انحطاط آخر مراتب عدد الأموال عن المرتبة السمية للكعب الأخير، ونطلب المرتبة التي يكون انحطاطها عن مرتبة الكعب الأخير بذلك المقدار، فنقل آخر مراتب عدد الأموال إليها، فيكون بهذه الصورة

١٠ ٢٩٩٨٤٣١. لأن آخر مراتب عدد الأموال العشرات، والمرتبة السمية للكعب

الأخير المئات / وهي أرفع من آخر مراتب عدد الأموال بمرتبة، فنقلنا آخر ١ - ٧١ - و عدد الأموال إلى المرتبة المنحطة عن الكعب الأخير بمرتبة. ثم نضع مطلوب الكعب، وهو ثلاثة. ونضربه في عدد الأموال ونضعه في سطر أوسط بين عدد الأموال وبين العدد. ونضربه في الأوسط، ونزيد المبلغ على العدد،

١ فنضع: فيقع / التخت: البحث / ونضع: ويقع: 2 ونضع: ويقع: 7 انحطاط: انحطاط / عن: غير - 8 ونطلب: ويطلب / انحطاطها: انحطاطها - 9 فنقل: فينقل: 11 فنقلنا: قلنا - 12 نضع: يضع - 13 ونضربه: ونضربه / ونضعه: ونضعه - 14 ونضربه: ونضربه

- وَيُنْطَل السطر الأوسط. وَتُنْقَص مكعب المطلوب من العدد من المرتبة التي تحاذيه. وَنَضَع مربع (المطلوب) في السطر الأوسط، وَنَرَدَّ عدد الأموال إلى الثلث، فيكون بهذه الصورة ٥٦٨٤٩٣١ ؛ ثُمَّ نَضْرِب المطلوب في ثلث عدد الأموال، وَنَنْقُص ضعف المبلغ من مَرَّيْعِهِ، وَنَنْقُص ثلث عدد الأموال من المطلوب فيحصل بهذه الصورة: ٥٦٨٤٩٣١ ؛ ثُمَّ نَنْقُل السطر الأعلى بِمَرَّتَيْنِ، وَالأَسْفَلَ بِمَرَّةٍ، فيحصل مرتبة من ٥٦٨٤٩٣١ السطر الأعلى في مكان المطلوب الثاني، فنضع المطلوب الثاني فوقه، وهو اثنان، ونضربه في السطر الأعلى ونزيد المبلغ على الأسفل؛ ونضربه في الأسفل، وننقص ثلاثة أمثال كل ضربة من العدد، وننقص مكعب المطلوب أيضاً من العدد، فيحصل بهذه الصورة ٥٦٨٤٩٣١ ؛ ثُمَّ نَضْرِب / المطلوب الثاني في بقية المطلوب الأول، ١٠ - ٧١ - ظ ونزيد المبلغ على الأسفل، ونزيد مربع المطلوب الثاني على الأسفل أيضاً، ونزيد المطلوب الثاني على بقية المطلوب الأول، وننقل الأعلى بِمَرَّتَيْنِ، والأسفل بِمَرَّةٍ؛ ثُمَّ نَضَع المطلوب الثالث ونعمل به العمل المذكور، فيرتفع العدد ويحصل السطر الأعلى بهذه الصورة ٣١١ ، فتزيد عليه ثلث عدد الأموال، فيحصل بهذه الصورة ٣٢١ وهو الجذر المطلوب.

الصورة الثانية:

أن يكون آخر مراتب عدد الأموال أرفع من المرتبة السميّة للكعب الأخير، فيطلب الكعب السميّ لآخر مراتب عدد الأموال، ويُنْقَل آخرها إلى محاذة ذلك الكعب، ويُجْعَل العدد الذي نضعه في مرتبته مثل آخر

- ١ - ونطّل: / ونقص: وينقص - 2 ونضع: وينقص - 3 ونضرب: وينقص - 4 ونقص (الأول والثانية): وينقص - 5 في الأصل: ٥٦٨٤٩٣١ / ننقل: بنقل - 7 نضع: فيضع / ونضربه: وينقص - 8 ونضربه: وينقص / وننقص: وينقص - 9 وننقص: وينقص - 10 نضرب: ينقص - 11 ونزيد (الأول والثانية): ونزيد - 12 ونزيد: ونزيد - 13 نضع: ينقص - 14 فتزيد: فيزيد - 19 نضع: ينقص

عدد الأموال، مثل قولنا: ثلاثمائة واثنًا عشر مالا وعدد: تسعمائة ألفٍ وسبعةً وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وستون يعدل كعباً. فأخر مراتب عدد الأموال المئات، والكعب السمي له الكعبُ الثالث، فنضع قدام العدد أصفاراً ونضع فوقه أصفارَ الكعب، ويُنقل آخر مراتب عدد < الأموال > 5 إلى محاذة الكعب الثالث فيكون بهذه الصورة ٩٢٧٣٦٩ ، ونجعل المطلوب الذي نضعه في الكعب الثالث مثل آخر / < مراتب > عدد الأموال، وهو ٧٢ - ٧ - ٥، ثلاثه، ونضربه في مراتب عدد الأموال، ونزيد المبلغ على سطرٍ أوسط، ونضرب المطلوب في الأوسط، ونزيد المبلغ على العدد، ونبطل الأوسط. وننقص مكعب المطلوب من العدد، ونضع مربعه في الأوسط، ونزد عدد الأموال إلى الثلث، ونعمل العمل السابق إلى آخره، فيحصل السطر الأعلى بهذه الصورة ٢١٧، فتزيد عليه ثلث عدد الأموال، فيحصل بهذه الصورة ٣٢١ وهو الجذر المطلوب.

الصورة الثالثة:

أن يكون المرتبة السميّة للكعب الأخير هي آخر مراتب عدد الأموال، 15 فينقل آخر عدد الأموال إلى مقابلة الكعب الأخير، ونستخرج مطلوب الكعب، ونعمل العمل الذي ذكرناه فيما إذا كانت المرتبة السميّة للكعب الأخير أرفع؛ وذلك ما أردنا بيانه.

1 الأموال: ذلك أن آخر المكعب يأتي من عدد الأموال. فأخر المطلوب يأتي منها أيضاً - 3 فنضع: فيضع - 4 أصفاراً: أصفادا / ونضع: ويضع / فوقه: فوق / أصفار: أصفاد / عدد: العدد - 6 نضعه: يضعه - 7 ونزيد: ويزيد - 8 ونزيد: ويزيد / ونبطل: ونبطل - 9 وننقص: ونبقص / ونزد: ونزد - 11 فتزيد: فيزيد - 17 بيانه: انظر التطبيق على الحالات المماثلة، ولن نذكر بهذا بعد الآن

- وإنما عملنا كذلك؛ لأن المال ضرب في الجذر المطلوب، فحصل العدد مع الأموال، وضرب في عدد الأموال فحصل مبلغ الأموال. فالجذر المطلوب مركب من قسمين: أحدهما عدد الأموال، والآخر القسم الذي ضرب فيه المال حتى حصل العدد. ثم إن كان آخر مراتب الجذر المطلوب
- 5 في القسم الذي / ضرب فيه المال حتى حصل العدد، ومربع آخر الجذر د - ٧٢ - ط موجود في المال، والمال مضروب في القسم الذي فيه آخر الجذر، ومسطحها العدد، فيكون مكعب آخر الجذر المطلوب موجوداً في العدد، وهو آخر المكعب، فيكون آخر العدد مقابل مكعب آخر الجذر المطلوب. فلو استخرج مطلوب كعبه لخرج آخر الجذر المطلوب، ويكون أرفع من آخر
- 10 عدد الأموال. وإن كان آخر الجذر المطلوب في القسم الذي فيه عدد الأموال؛ فآخر المال يكون من مربع آخر عدد الأموال؛ و(مربع آخر الجذر المطلوب إذا ضرب في آخر عدد الأموال حصل مكعب آخر الجذر المطلوب، أعني مكعب آخر عدد الأموال. فإذا ضرب في آخر القسم الآخر من الجذر المطلوب؛ يكون الحاصل أنزل من مكعب آخر الجذر المطلوب، الذي هو آخر عدد الأموال.
- فقد تبين أن المرتبة السمية للكعب الأخير وآخر عدد الأموال إذا لم يكونا من مرتبة واحدة: فإذا استخرجنا مطلوب الكعب لآخر العدد، ووجدناه أرفع من آخر عدد الأموال - كما في الصورة الأولى - فنعلم أنه آخر الجذر المطلوب، ويكون مكعبه حاصلًا في تلك المرتبة وما بعدها. ثم
- 20 إنا / نحتاج أن نضرب جملة مال المطلوب في عدد الأموال، ونزيده على د - ٧٢ - و العدد، حتى نعمل عمل المكعب. فنحتاج أن نضرب مال المطلوب في عدد
- 1 الجذر: جذر / فحصل: فحصل - 9 نخرج: نخرج - 14 الجذر (الثانية): فوق السطر - 17 لآخر: الآخر - 18 فعل: فعل - 20 نحتاج: نحتاج / ونزيده: ونزيده - 21 فنحتاج: فنحتاج / نضرب: يضرب

الأموال، فننقل آخر مراتب عدد الأموال إلى المرتبة المنحطة عن المطلوب بقدر انحطاط مرتبته عن مرتبته الحقيقية. وكذا سائر المراتب على الترتيب. ثم لو ضرب المطلوب في عدد الأموال، ووضع الضرب مسطحاً ثم ضرب المطلوب في المسطح، ويزاد على العدد، يكون مثل ضرب مال المطلوب في عدد الأموال (مع العدد). فلذلك إذا استخرجنا المطلوب نضربه في عدد الأموال ونضعه مسطحاً، ونضربه في المسطح ونزيده على العدد؛ ليقوم مقام ضرب مال المطلوب في عدد الأموال، (نزيده على العدد وتنقص مكعب المطلوب من الحاصل). ثم إذا استخرجنا المطلوب الثاني نحتاج أن نضرب ماله وضعف ضربه في المطلوب الأول، في عدد الأموال ونزيد المبلغ على العدد، ثم نعمل عمل الكعب بأن نضرب المطلوب الثاني في مال المطلوب الأول وفي [ضعف] ضربه في المطلوب الأول، ثم ينقص ثلاثة أمثال الضربين. لكن ضرب المطلوب الثاني في الأول مرتين، ثم ضرب الحاصل في عدد / الأموال مثل ضرب المطلوب الأول في عدد الأموال (١٠ - ٧٣ - ٥) مرتين، ثم ضرب الحاصل في المطلوب الثاني. فإذا نقصنا ضعف ضرب المطلوب الأول في ثلث عدد الأموال من مال المطلوب الأول، ثم ضربنا المطلوب الثاني في بقية مال المطلوب الأول؛ كان الحاصل ناقصاً من ضرب المطلوب الثاني في مال المطلوب الأول بمقدار ضرب المطلوب الثاني في الأول مرتين ثم ضربه في ثلث عدد الأموال. وإذا أخذنا ثلاثة أمثاله كان ناقصاً من (ثلاثة أمثال) ضرب المطلوب الثاني في مال المطلوب الأول بمقدار ضرب المطلوب الثاني في الأول مرتين، ثم ضرب الحاصل في عدد الأموال؛ فإذا نقص ثلاثة أمثاله من العدد بقي في العدد زيادة بمقدار

١ فنقل: فنقل - 3 في: فوق السطر / الضرب: الضريان - 4 في: فوق السطر - 5 نضربه: يضربه - 6 ونضعه: ويضعه / ونزيده: ويزيد - 7 في: فوق السطر - 8 نحتاج: يحتاج - 9 نضرب: يضرب / ونزيد: ويزيد - 10 نضرب: يضرب - 12 الضربين: الضريان - 16 الأول: للأول - 18 ثم: فوق السطر

- ضرب المطلوب الثاني في الأول مرتين، ثم ضرب الحاصل في عدد الأموال. فلهذا نقصنا ضعف ضرب المطلوب الأول في ثلث عدد الأموال من ماله. وكذلك لو نقصنا ثلث عدد الأموال من المطلوب الأول ثم ضربنا المطلوب الثاني في البقية ووضعناه مسطحا، ثم ضربنا المطلوب الثاني في المسطح؛ كان الحاصل ناقصاً من ضرب / مال المطلوب الثاني في ج - v٤ - و
- المطلوب الأول بمقدار ضرب مال المطلوب الثاني في ثلث عدد الأموال. فإذا أخذنا ثلاثة أمثاله كان ناقصاً من ثلاثة أمثاله ضرب مال المطلوب الثاني في المطلوب الثاني في المطلوب الأول بمقدار ضرب مال المطلوب الثاني في عدد الأموال. فإذا نقصناه من العدد بقي فيه زيادة بمقدار ضرب مال المطلوب الثاني في عدد الأموال. فلهذا نقصنا ثلث عدد الأموال من المطلوب الأول. وبعد تمام العمل على المطلوب الثاني، يحصل في مجموع المطلوبين نقصاناً في الحقيقة بمقدار ثلث عدد الأموال، وفي المال الحاصل نقصان بمقدار ضرب كل واحد من المطلوبين في ثلث عدد الأموال مرتين. أما نقصان ضرب المطلوب الأول في الثلث مرتين فظاهر. وأما نقصان المطلوب الثاني - فلأننا ضربناه في المطلوب الأول الذي كان ناقصاً بمقدار ثلث عدد الأموال - فوقع في الحاصل نقصان بمقدار ضربه في ثلث عدد الأموال، وضربناه فيه كرة أخرى عند النقل، فوقع النقصان مرتين. ويستمر بقية العمل على هذا القانون. وبعد تمام العمل زدنا ثلث عدد الأموال على المستخرج؛ لأننا نقصناه من المطلوب / الأول بالفروض ج - v٤ - ظ
- المذكورة. 20

4 ووضعناه - ووضعتنا - 15 فلأنا؛ ولأنا - 18 ويستمر: ويشمر / هذا: هذه - 19 بالفروض:

الفرض

وأما الصورة الثانية، فلأن المطلوب الكعب المستخرج للعدد أنزل من آخر عدد الأموال، فيكون آخر الجذر المطلوب إنما هو «من» آخر عدد الأموال. ومعلوم أنه من أي مرتبة هو فيكون مكعبه واقعاً في المرتبة المقابلة للكعب السميّ لمرتبه. فيُنقل آخر عدد الأموال إلى تلك المرتبة، وسائر المراتب على الترتيب، وصار حكم آخر عدد الأموال كحكم المطلوب الأول المستخرج في الصورة الأولى، فعمل الأعمال المذكورة.

وقد يتفق بعد ضرب ثلث عدد الأموال في المطلوب - الذي هو «من» آخر عدد الأموال - امتناع نقصان ضعف الضرب من مال المطلوب؛ فيضرب المطلوب في جميع مراتب الثلث، ونضع ضعف هذه الضربات ومراتبها مسطحاً، وينقص منها مالُ المطلوب ويُجعل بقية المسطح مقامَ المال، ويُنقص ثلث عدد الأموال من المطلوب. فإذا ضربنا المطلوب الثاني في البقية، ونقصنا ثلاثة أمثال الضربات من العدد، أدى ذلك إلى المقصود؛ ولا يخفى عليك شبيهه.

وأما الصورة الثالثة فلا يخفى شيء زائد على ما في صورتين 15 المتقدمتين؛ وذلك / ما أردنا بيانه.

ل - ٧٥ - و

المسألة الخامسة: مكعب وأموال وجذور يعدل عدداً:

فليكن $\overline{أ ب}$ جذرَ عدد الجذور و $\overline{أ ج}$ عدد الأموال. وليكن مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{أ د}$ مثل العدد المذكور في السؤال. وطريقُ عمله ماسبقَ غير مرة. ونجعل

5 المراتب: مراتب - 6 الأولى: الأول / فعمل: فعمل - 9 ونفع: وضع - 12 ونقصنا: وينقص - 13 شبيه: شبيه - 17 $\overline{أ ج}$: آخر

ا ب عموداً د على ج د ، ونعمل على ج د نصف دائرة، ونخرج عمودي
 ب ه د ه . فسطح ا ب د ه قائم الزوايا، فإن لم يكن مربعاً فقطعة د
 أقرب إلى أحد خطي ا ب ب ه المحيطين بزاوية ا ب ه القائمة. فنعمل
 قطعاً زائداً لا يقع عليه خطاً ا ب ب ه ويقاربان محيط القطع أبداً، ويمر
 5 محيطه بنقطة د، ويكون منتصف مجانبه نقطة ب، وليكن هو قطع ز د.
 وإن كان د السطح مربعاً فنعمل القطع المذكور، رأسه عند نقطة د،
 وخطاً ا ب ب ه يقاربان محيطه أبداً. ولأننا نخرج د ه بالاستقامة إلى ي
 فخط ه ي يماس الدائرة. فإذا أخرجنا خطاً مستقيماً يقسم الزاوية التي بين
 محيط القطع وبين خط د ي فلا يقع فيما بين محيط الدائرة وبين خط د ي
 10 فيقع في الدائرة. وليكن هو خط د ع. فلأن قوس د ع فيما بين د ي
 د ع فقطعة - ع - في داخل القطع ونقطة ج خارجة عنه. فيكون القطع
 في داخل الدائرة. فإذا أخرجناه بغير نهاية يقطع الدائرة / على نقطة، ل - و - ظ
 وليكن على ك. فنخرج عمودي ك م ك ل. فضرب ك م في م ب مثل
 ضرب ا ب في ا د لأن كل واحد منها مساوٍ لمربع الخط الذي يصل بين
 15 منتصف المجانب وبين العمود الذي يقع من رأس القطع على الخط الذي
 لا يقع على القطع. فنسقط المشترك - وهو سطح ا ب ل ق - فيبقى
 سطح ا م ق ك مثل سطح ل ه د ق، فأضلاعها متكافئة في النسبة.
 فنسبة ك ق إلى ق د كنسبة ق ل إلى ا ق، أي كنسبة ا ب إلى
 ا ق. فنسبة مربع ك ق إلى مربع د ق كنسبة مربع ا ب إلى مربع ا ق.
 20 ولأن ك ق عمود على قطر الدائرة فضرب ج ق في ق د مثل مربع ك ق،

1 ونخرج: ونخرج - 3 بزاوية: يزاده - 4 ويقاربان: ويقاربان - 6 فنعمل: فيعمل - 7 يقاربان:
 يقاربان / نخرج: يخرج - 9 فلا: لا. كتبت فوق السطر - 11 ج: ا - 13 فنخرج: فيخرج - 15 القطع
 على: فوق السطر - 16 فنسقط: فنسقط / ا ب ل ق: ا ب ا ق

وطريق استخراج الجذر المطلوب أن نضع العدد على التخت، ونضع فوقه أصفار الكعب، فيكون للمسألة ثلاث صور:

الصورة الأولى:

- 5 أن يكون المرتبة السمية للكعب الأخير أرفع من آخر مراتب عدد الأموال، وأرفع من آخر مراتب جذر عدد الجذور أيضاً، مثل قولنا: مكعب مع أموال بهذه الصورة ١٢ وجذور بهذه الصورة ١٠٢ يعدل عدداً بهذه الصورة ٣٤٣٤٥٣٩٥؛ فنعدّ العدد أيضاً بجذر ولا جذر، ونعرف قدر انحطاط مرتبة آخر عدد الأموال عن المرتبة السمية للكعب الأخير، وننقل آخر مراتب عدد الأموال إلى المرتبة المنحطة عن الكعب الأخير بذلك 10 القدر؛ ونعرف قدر انحطاط آخر مراتب جذر عدد الجذور عن الجذر السمي للكعب الأخير، وننقل آخر مراتب عدد الجذور إلى المرتبة المنحطة عن الجذر السمي للكعب الأخير بذلك القدر؛ ثم نردّ عدد الأموال / وعدد الجذور إلى الثلث، فيكون بهذه الصورة $343:5395$ ، ثم نستخرج ج - ٧٦ - ط مطلوب الكعب - وهو ثلاثة - ونضعه في الكعب الأخير، وننقص مكعبه من العدد، ونضربه في ثلث عدد الأموال، ونزيد الحاصل على السطر الأوسط - وهو الذي فيه ثلث عدد الجذور - ونضربه في السطر الأوسط، وننقص ثلاثة أمثال كلّ ضربة من العدد، ونزيد مربع المطلوب على السطر الأوسط على المرتبة التي بجذائها، ونضربه في ثلث عدد الأموال ككرة أخرى، ونزيد الحاصل على الأوسط، فيكون بهذه الصورة:
- 1 نضع: يضع [ل] - 3 ناقص: [ل] - 7 فعدّ: فعدّ [ل] - 10-7 ونعرف قدر ... بذلك القدر: ناقصة [ل] - 11 وننقل: [ل] - 12 نرد: يردّ [ل] - 13 كتب ناسخ [ل] أعداد السطر الثاني - أي ٣٤ - في سطر بعده كمادته. ولم ينسخ السطر الثالث للعدد - أي ٤ - ولن نشير لهذا مرة أخرى - 14 وننقص: وينقص [ل] - 16 ثلث: ثلث ٣٤ [ل] - 17 ونزيد: ويزيد [ل] - 19 ونزيد: ويزيد [ل]

- ٣٢٤٧٩٥
٩٢٤٣٤، ثم تنقل الأعلى والأسفل بمرتبتين، والأوسط بمرتبة، ثم نضع
مطلوباً آخر - وهو اثنان - وننقص مكعبه من العدد، ونضربه في
المطلوب الأول، وفي ثلث عدد الأموال، ونزيد حاصل الضرب على
الأوسط، ونضربه في الأوسط، وننقص ثلاثة أمثال كلّ ضربة من العدد،
5 ثم نزيد مربعه على السطر الأوسط، ونضربه في المطلوب الأول وفي ثلث
عدد الأموال ونزيد الحاصل على السطر الأوسط، فيصير بهذه الصورة
٣٢
٣١٥٩٥٥
١٠٤٩٩٤، ثم تنقل الأعلى والأسفل بمرتبتين، والأوسط بمرتبة، ونضع
المطلوب / الثالث - وهو واحد - وننقص مكعبه من العدد، ونضربه في ج - ٧٧ - و
المطلوب الأول والثاني جميعاً وفي ثلث عدد الأموال، ونزيد المبلغ على
10 الأوسط ونضربه في الأوسط، وننقص ثلاثة أمثال كلّ ضربة من العدد،
فيرتفع العدد ويحصل السطر الأعلى بهذه الصورة ٣٢١.

الصورة الثانية

- أن يكون المرتبة السميّة للجزء الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور
أرفع من آخر مراتب عدد الأموال ومن المرتبة السميّة للكعب الأخير
15 أيضاً كما في قولنا: مكعب مع ستة أموال، وجذور عددها بهذه الصورة
٣..... يعدل عدداً بهذه الصورة ٩٩٦٦٩٤٤٠٧. فالجزء الأخير من الجذور
المقابلة لعدد الجذور إنما هو الجزء الرابع، والمرتبة السميّة له هي الألوف،
وسميّ الكعب الأخير إنما هو المئات، فالمرتبة السميّة للجزء الأخير من
الجذور المقابلة لعدد الجذور أرفع من آخر مراتب عدد الأموال ومن المرتبة

2 - وهو: هو ناقصة [ل] / وتنقص: وينقص [ل] / ونضربه: ويضربه [ل] ٩٢٤٣٤ - 3 - ونزيد: ويزيد [ل] - 4 - ونضربه: ويضربه [ل] / وتنقص: وينقص [ل] 5 - ونضربه: ويضربه [ل] / وفي: في [ل] - 6 - ونزيد: ويزيد [ل] 7 - لم يكتب ناسخ [ل] السطرين الثالث والرابع من العدد - 8 - وتنقص: وينقص [ل] - 9 - ونزيد: ويزيد [ل] 10 - وتنقص: وينقص [ل] - 17 - هي: هو [ب. ل]

السمية للكعب الأخير. فنضع عدد الجذور كالقسم عليه والعدد
كالقسم، ونعرف موضع مطلوب القسمة وهو في الثالث، ونطلب الكعب
السمي لمرتبه، وهو الكعب الثالث، فهناك مكان المطلوب. ثم نعرف قدر
انحطاط آخر مراتب عدد الأموال / أو ارتفاعه عن مرتبة مطلوب القسمة. ج - ص - ط
وينقل إلى المرتبة المنحلة أو المرفوعة عن الكعب الذي هو مكان المطلوب
بذلك القدر، ونعرف قدر انحطاط مرتبة آخر مراتب عدد الجذور عن مرتبة
الجذر السمي للكعب «الأخير» الذي هو مكان المطلوب، أو ارتفاعه
عنه؛ ونقل آخر مراتب عدد الجذور إلى المرتبة المنحلة عن المطلوب أو
المرفوعة عنه بذلك القدر. لكن آخر مراتب عدد الأموال في المثال وقع في
10 الآحاد وهي منحة عن مرتبة مطلوب القسمة بمرتين، / فنقلنا آخر عدد ب - ا - ط
الأموال إلى المرتبة المنحلة عن مرتبة الكعب الذي هو مكان المطلوب
بمرتين. والجذر السمي للكعب الذي هو مكان المطلوب إنما هو الجذر
الثالث، وهو في عشرات الألوف، وآخر مراتب عدد الجذور مرفوع عنه
بمرتين، لأنه في ألوف الألوف. فرفعنا آخر مراتب عدد الجذور عن مرتبة
15 الكعب الذي هو مكان المطلوب بمرتين، ثم نردّ عدد الأموال وعدد
الجذور إلى الثلث، فيحصل بهذه الصورة 9999999^{7-} ، فنستخرج مطلوب
الكعب وهو ثلاثة في المثال، ونضعه مكان الكعب الثالث وننقص مكعبه
من العدد ونضربه / في ثلث عدد الأموال، ونزيد المبلغ على السطر ج - هـ - و
الأوسط ونضربه في الأوسط، وننقص ثلاثة أمثال كل ضربة من العدد.
1 انفضح: [ج] / كالمقسم عليه والعدد: ناقصة [د] - 2 ونطلب: [د] ويطلب [د] - 4 أو
ارتفاعه: وارتفاعه [ب. د] - 5 وينقل: [د] / المنحلة: النقط [د] - 7 هو: فوق السطر
[د] - 8 الجذور: الأموال [ب. د] / المرتبة: ناقصة [د] - 10 فنقلنا: نقلنا [د]. مطموسة [ب] -
13 وهو: وهي [ب. د] - 14 عن: من [ب. د] - 15 نرد: يزيد [د] - 16 لم يكفب ناسخ لا
السطر الأول من الجدول. ولكنه كتب السطر الثاني من الجدول كجزء من السطر التالي من النص / فنستخرج
فنستخرج [د] - 17 وتنقص: ويتنقص [د] - 18 ونضربه: ونضربه 100000 [د] / ونزيد: ويزيد [د] -
19 نتنقص: ويتنقص [د]

وتتم العمل المذكور كما في الصورة الأولى، فيخرج الجذر المطلوب بهذه الصورة ٣٢١.

الصورة الثالثة:

أن يكون آخر مراتب عدد الأموال أرفع من المرتبة السمية للكعب
5 الأخير، ومن المرتبة السمية للجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور،
كما في قولنا: مكعب وثلاثون جذراً، وأموال عدتها بهذه الصورة ٣٠٠٠٠،
يعدل عدداً بهذه الصورة ٣١٢٤٣١٥٧٩١. فنضع عدد الأموال كالمقسوم عليه،
والعدد كالمقسوم، ونستخرج مطلوب القسمة، ونعرف مرتبته ونعد الجذور
من الآحاد إلى مرتبة مطلوب القسمة، ثم نعد الكعاب من الآحاد بتلك
10 العدة، فيكون هناك مكان المطلوب. ونحط آخر عدد الأموال أو نرفعه عن
مكان المطلوب بقدر انحطاط مرتبته عن المرتبة السمية للكعب الذي هو
مكان المطلوب، أو ارتفاعه عنه. ونحط آخر عدد الجذور عن الكعب الذي
هو مكان المطلوب أو نرفعه عنه بقدر انحطاط مرتبته عن مرتبة الجذر السمي
للكعب الذي هو مكان المطلوب / أو ارتفاعه عنه. فاستخرجنا مطلوب ل - ٧٨ - ظ
15 القسمة في المثال، وكان في مرتبة مئات الألوف؛ وعدد الجذور من مرتبة
الآحاد إلى مرتبته ثلاثة. فعدنا الكعاب بتلك العدة فاتت إلى الكعب
الثالث، فهناك مكان المطلوب. ولأن المرتبة السمية لهذا الكعب إنما هي
المئات، وآخر عدد الأموال في عشرات الألوف، فهي مرفوعة عنها بمرتبتين.
فرفعنا آخر عدد الأموال من الكعب الذي هو مكان المطلوب بمرتبتين،

1 وتنتم: وينتم [ل] - 3 ناقصة [ل] - 5 من: ناقصة [ل] - 6 وثلاثون: وعشرون [ل، ب] -
7 فنضع: فيضع [ل] - 8 والعدد: والعدد [ل] / ونستخرج: ويستخرج [ل] / مرتبته: مرتبه [ل] -
10 ونحط: ونحط [ل] / نرفعه: يرفعه [ل] - 13 نرفعه: رفعه [ل] - 16 فعدنا: بعدنا [ل] -
18 عدد: فرق السطر [ل]

فحصل آخر عدد الأموال في مئات ألوف الألوف. ولأن آخر عدد الجذور من مرتبة العشرات - وهي منحنطة عن الجذر السمي للكعب الذي هو مكان المطلوب بثلاث مراتب - نقلنا آخر عدد الجذور إلى المرتبة المنحنطة عن الكعب الذي هو مكان المطلوب بثلاث مراتب؛ ثم رددنا عدد الأموال والجذور إلى الثلث فحصل بهذه الصورة: ٣١٢٤٣١٥٧٩١ ، ونضع مطلوب الكعب - وهو ثلاثة في المثال - مكان الكعب الثالث، ونقص مكعبها من العدد ونضربه في ثلث عدد الأموال، ونزيد المبلغ على الأوسط فيكون بهذه الصورة ٣٠٩٧٣١٥٧٩١ ، ثم نضرب المطلوب في السطر ل - ٧٩ - ر، الأوسط، ونقص ثلاثة أمثال كل ضربة من العدد، ونزيد مربعه على العدد، ونضربه في الأسفل كربة أخرى، ونزيد المبلغ على الأوسط، ثم نقل الأعلى والأسفل بمرتبتين والأوسط بمرتبة ونعمل العمل السابق إلى آخره، فيخرج الجذر المطلوب بهذه الصورة ٣٢١.

وأما بيان جهة العمل: فلأن العدد مركب من ثلاثة أصناف وهي المكعب والمسطح الذي من ضرب الجذر المطلوب في عدد الجذور ونسميه المسطح الأول، ومن ضرب المال في عدد الأموال ونسميه المسطح الثاني؛ فهذه المسألة مركبة من المسألة الأولى والثالثة، واجتمع فيها خاصة كلتيهما، فإن كان آخر الجذر المطلوب أرفع من جذر آخر عدد الجذور ومن آخر عدد

١ في: فوق السطر [ل] - 3 نقلنا: نقلنا [ب. ل] - 4 رددنا: دورنا [ل] - 5 كالعادة كتب ناسخ ل السطرين الأخيرين من الجدول في سطور النص التالية / كتب ناسخ ب السطر الثاني تحت ٧٩ - 6 ونقص: وينقص [ل] - 7 ونضربه: ونضربه ١٠٠٠٠ [ل] / ونزيد: ونزيد [ل] - 8 انظر التعليق على الجدول السابق / نضرب: يضرب [ل] - 9 ونقص: وينقص [ل] / ونزيد: ونزيد [ل] - 10 العدد: العدد ٣٠٠٠٠١ - [ل] / ونضربه: ونضربه [ل] / ونزيد: ونزيد [ل] - 11 نقل: ينقل [ل] / بمرتبتين: بمرتبتين ١٠ [ل] - 14 المكعب: الكعب [ل] / ونسميه: وقسمته [ل] - 15 ونسميه: وقسمته [ل] - 16 الأولى: الأولى [ل] / الأولى والثالثة: أي من مسألتين: مكعب وجذور تعدل عدداً، ومكعب وأموال تعدل عدداً - 17 عدد: ناقصة [ل] / ومن: من [ل]

- الأموال، فيكون آخر المكعب أرفع من آخر كل واحدٍ من المسطحين، فيكون واقعاً في آخر العدد كما في الصورتين الأولين من المسألة الأولى والثالثة؛ وإن كان جذر آخر عدد الجذور أرفع من آخر الجذر المطلوب ومن آخر عدد الأموال فيكون آخر عدد الجذور، أرفع من آخر المال، وضربه في آخر الجذر المطلوب يكون أرفع من ضرب مال آخر الجذر المطلوب في آخر الجذر، وهو آخر المكعب، كما تبين في المسألة الأولى. فيكون / آخر ل - ٧٩ - ظ
- المسطح الأول أقرب إلى آخر العدد من آخر المكعب. ولأن جذر آخر عدد الجذور أرفع من آخر عدد الأموال فيكون نسبة هذا الجذر إلى آخر الجذر المطلوب أعظم من نسبة آخر عدد الأموال إلى آخر الجذر المطلوب، ونسبة مال هذا الجذر إلى مال آخر الجذر المطلوب أعظم من نسبة هذا الجذر إلى آخر الجذر المطلوب؛ لأنه إذا كان مقداراً أعظم من مقدار أصغر فإن نسبة مربع الأعظم إلى مربع الأصغر أعظم من نسبة الأعظم إلى الأصغر.
- لأن / المسطح الحاصل من ضرب الأعظم في الأصغر أعظم من مربع ب - ٢ - و الأصغر؛ فنسبة مربع الأعظم إلى مربع الأصغر أعظم من نسبه إلى هذا المسطح، وهي كنسبة الأعظم إلى الأصغر، فنسبة مربع الأعظم إلى مربع الأصغر أعظم من نسبة الأعظم إلى الأصغر، فنسبة مال (آخر) هذا الجذر إلى مال آخر الجذر المطلوب أعظم من نسبة آخر عدد الأموال إلى آخر الجذر المطلوب. فيكون ضرب آخر عدد الجذور في آخر الجذر المطلوب - وهو آخر المسطح الأول - أعظم من ضرب مال آخر الجذر المطلوب في آخر عدد الأموال، وهو آخر المسطح الثاني. فقد تبين في هذه الصورة أن آخر / المسطح الأول يكون في آخر العدد. ولأن آخر عدد ل - ٨٠ - و

4-2 العدد كما ... الأموال فيكون: ناقصة [ل] - 12 الأعظم: مكتوبة في كثير من الأحيان في ب، ل، للأعظم وهي طريقة بعض النساخ في كتابة أداة التعريف - 20 تبين: [ل]

الأموال معلوم، وكذا آخر عدد الجذور مع آخر جذره، فنعمل من ذلك أن مرتبة آخر جذره أرفع من آخر عدد الأموال. ولأن في هذه الصورة قد وقع آخر المسطح الأول في آخر العدد؛ فمطلوب كعبه يكون أقل من جذر آخر عدد الجذور. فإذا استخرجنا مطلوب الكعب يكون أنزل من جذر آخر عدد الجذور، ويكون مع ذلك جذر آخر عدد الجذور أرفع من آخر عدد الأموال. فنعمل أن آخر العدد إنما هو «من» المسطح الأول. ولأن «آخر» المسطح الأول حاصل من ضرب آخر عدد الجذور في آخر الجذر المطلوب؛ فإذا قسمناه على عدد الجذور فالمطلوب الأول يكون آخر الجذر المطلوب، ويكون مكعبه واقعاً في المرتبة السمية لهذا المطلوب، فتزيد ثلث عدد الجذور بحسب مكان ماله، وثلث عدد الأموال بحسب مكانه؛ وبقيّة البيان يرجع إلى ماتقدم.

وإن كان آخر عدد الأموال أرفع من جذر آخر عدد الجذور ومن آخر الجذر المطلوب، فلا يجب أن يكون آخر المسطح الثاني واقعاً في آخر العدد. فإن هذه الثلاثة إن كانت متناسبة: أعظمها آخر / عدد الأموال، وأصغرُها ل - ٨٠ - ظ ١٥ آخر الجذر المطلوب، وجذر آخر عدد الجذور متوسط؛ فيكون آخر العدد مركباً من آخر كلا المسطحين، لأنه حينئذ يكون نسبة مربع آخر الجذر المطلوب إلى مربع جذر آخر عدد الجذور كنسبة آخر الجذر المطلوب إلى آخر عدد الأموال، فضرِب مربع آخر الجذر المطلوب في آخر عدد الأموال يكون مثل ضرب مربع جذر آخر عدد الجذور في آخر الجذر المطلوب. وإن كانت متناسبة وأصغرُها آخر عدد الأموال، وأعظمُها آخر الجذر المطلوب؛

٤ يكون: ويكون [ب. ل] - ٩ فزيد: فزيد [ل] - ١٣ آخر العدد: المقصود آخر العدد وحده -

١٦ المسطحين: السطحي [ل] - ١٨ الجذر: جذر [ل] - ٢٠ وأصغرُها: أصغرُها [ل]

فيكون آخرُ المكعب وهو مكعبُ آخرِ الجذر المطلوب واقعاً في آخر العدد،
 وآخرُ كلا المسطحين في مرتبة واحدة. فإذا وجدنا آخر عدد الأموال أرفعَ
 من جذر آخر عدد الجذور؛ يكون مطلوب الكعب المستخرج أنزلَ من آخر
 عدد الأموال؛ وآخرُ الجذر المطلوب مجهول، فيكون آخر العدد مجهولاً.
 5 فلأن آخر المسطح الثاني إذا قُسم على عدد الأموال يكون المطلوب الأول
 هو مال آخرِ الجذر المطلوب أبداً، وإذا كان الواقعُ في آخر العدد إنما هو
 المسطح الأول، لكونه أزيدَ من آخر المسطح الثاني: / فإذا قُسم المسطح ج - ٨١ - د
 الأول على عدد الأموال يكون المطلوب الخارجُ أزيدَ مما إذا قسم عليه
 المسطح الثاني؛ فيكون المطلوب الخارج من القسمة أكثرَ من مال آخرِ الجذر
 10 المطلوب. ومعلوم أن هذا العدد الحاصل وآخره إذا اجتمع من مكعب آخر
 الجذر المطلوب، ومن ضربِه في عدد الجذور، ومن ضرب ماله في عدد
 الأموال: فإذا وُضع عددُ أكثرَ من آخر الجذر المطلوب فلا يحتمل هذا
 العددُ أن نعمل به العمل المذكور.

فإذا استمر العملُ المذكور على مطلوب الكعب، فيتعين أن آخر العدد
 15 إنما هو «من» المسطح الأول. فليُقسم على عدد الجذور، فيخرجُ المطلوب
 آخر الجذر المطلوب ويتمَّ العمل. وإذا قسمنا على عدد الأموال
 واستخرجنا المطلوب، وعملنا على القانون واستمر العمل المذكور، فنعلم أن
 آخر العدد قد كان آخر المسطح الثاني.

وأما إذا كان آخر المسطحين وآخرُ المكعب جميعاً واقعاً في آخر العدد -
 20 وذلك عندما يكون المرتبة السميّة للكعب الأخير وآخرُ عدد الأموال وجذرُ
 عددِ الجذور كلها من مرتبة واحدة - فسواء استخرجنا مطلوب الكعب أو

١ وهو: و [ل] - 3 يكون: ويكون [ب، ل] - 5 المسطح: السطح [ل] - 17 فعل: فيعلم [ل]

5 المسألة السادسة: عددٌ وجذورٌ وأموالٌ يعدل مكعباً.


فليكن أ ب جذر عدد الجذور وب د عدد الأموال. وليكن مربع
أ ب في ب ج مثل العدد كما سبق غير مرة. ونجعل ب د قائماً على أ ب
ونخرج ب ج على استقامة ب د، ونخرج عمودي أ ز ج ز، ونخرج أ ب
بالاستقامة، ونعمل سطح أ هـ مثل أ ج، ونعمل فيما بين خطي أ ك أ ن
10 المحيطين بزاوية ك أ ن القائمة قطعاً زائداً يمرّ محيطه بنقطة هـ ولا يقع عليه
خطاً أ ن أ ك، ويقاربان محيط القطع، ويكون منتصف مجانبه نقطة آ،
وليكن هو قطع ل هـ. ونعمل قطعاً آخر زائداً، رأسه عند نقطة د، ومجانبه
ج د، ونفصل د ع مثل ب ك، ونخرج عمود ع ف (على د ب). فلأن
ضرب د ع في ع ج مثل مربع ع ف، فع ف وسط في النسبة بين د ع
15 ع ج، فع ف أطول من ع د، أعني ب ك، وع ق مثل أ ب،

1 يكون: [ب، ل] - 2 تنقص: فيقص [ل] / ونحتنه: ونحتنه [ل] / نتمكن: نتمكن [ب، ل] - 3 ضربات: ضروبا [ل] / منفصلة: منفصل [ب، ل] - 5 المسألة السادسة: ناقصة [ل] - 7 كما: لا [ب، ل] / غير: عشر [ل] - 8 ونخرج (الأولى والثانية والثالثة): ونخرج [ل] / أَب : ب ا ر [ب، ل] - 9 ونعمل: ويعمل [ل] / سطح: المقصود هنا مربع / أَب : قد قرأَ التَّوْنُ بَاءَ مَهْمَلَةٍ فِي [ب، ل] - 10 يزاوية ك أَب : يزاويه [ب] / يزاويه [ب، ل] - 11 ويقاربان: يقاربان [ل] - 12 وبجانيه وبجانيته [ل] - 13 ونفصل: ويفصل [ل] / ك أَب : ب س [ب، ل] / مع ملاحظة أن ناسخ [ل] لا يَظْهَرُ فوق الحروف، ولن نشير لهذا مرة أخرى 13-15 فلأن ... مثل أَب : ناقصة [ب، ل] - 15 ب ك : ب س [ب]

- فخط $قَ فَ$ أطول من $اَ كَ$. ولأن خط $اَ نَ$ دائماً يقرب من محيط قطع $لَ هَ$ ، فنخرج من نقطة $قَ$ عموداً $عَ$ على $اَ نَ$ إلى محيط القطع $لَ هَ$ ويكون أصغر من $صَ هَ$ ، أعني $اَ كَ$ ، فيكون محيط قطع $لَ هَ$ في ذلك الموضع داخل قطع $فَ دَ$ ، وقد كان خارجاً عنه عند نقطة $لَ$. فالقطعان يتقاطعان، وليكن تقاطعها على نقطة $طَ /$ ، فنخرج $طَ يَ$ عموداً على $دَ عَ$ - ٨٢ - و فيكون عموداً على $اَ مَ$ أيضاً؛ فسطح $اَ طَ$ مثل $اَ هَ$ ، لأن كل واحد منها مثل $مَ /$ مربع الخط الذي يصل بين منتصف المُنْجَانِبِ وبين العمود الذي ب - ٢ - ظ يقع من رأس القطع على الخط الذي لا يقع على القطع. و $اَ هَ$ مثل $اَ جَ$ ، ف $اَ طَ$ مثل $اَ جَ$. فنجعل سطح $اَ يَ$ مشتركاً، فسطح $بَ طَ$ مثل $جَ مَ$. فأضلاعها متكافئة في النسبة. فنسبة $طَ يَ$ إلى $جَ يَ$ كنسبة $مَ يَ$ - أعني $اَ بَ$ - إلى $بَ يَ$. فنسبة مربع $طَ يَ$ إلى مربع $جَ يَ$ كنسبة مربع $اَ بَ$ إلى مربع $بَ يَ$. ولأن ضرب $جَ يَ$ في $يَ دَ$ مثل مربع $طَ يَ$ ، فنسبة $جَ يَ$ إلى $طَ يَ$ كنسبة $طَ يَ$ إلى $يَ دَ$. فنسبة مربع $طَ يَ$ إلى مربع $جَ يَ$ كنسبة خط $دَ يَ$ إلى $يَ جَ$. فنسبة مربع $اَ بَ$ إلى مربع $بَ يَ$ كنسبة خط $دَ يَ$ إلى $يَ جَ$. فضرب مربع $اَ بَ$ في $جَ يَ$ مثل ضرب مربع $بَ يَ$ في $دَ يَ$. فإذا جعلنا $بَ يَ$ جذراً يكون مربع $اَ بَ$ في $بَ يَ$ جذوراً بالعدد المذكورة في السؤال، ومربع $اَ بَ$ في $بَ جَ$ مثل العدد المذكور في السؤال، ومجموعها مساوٍ لمربع $اَ بَ$ في $يَ جَ$ المساوي لمربع $بَ يَ$ في $دَ يَ$ ، فمربع $بَ يَ$ - وهو المال - في

١ فخط $قَ فَ$ ناقصة [ل] / $قَ فَ$: $دَ قَ$ [ب] / $اَ كَ$: $اَ سَ$ [ب، ل] - 2 فخرج: فيخرج [ل] - 3 أصغر: ناقصة [ل] / $اَ كَ$: $اَ سَ$ [ب، ل] - 4 $قَ دَ$: قد تقرأ الفاء بـ [ب، ل] - 5 فخرج: فيخرج [ل] / $طَ يَ$: $طَ بَ$ [ل] - 8 و $اَ هَ$: $اَ هَ$ [ل] - 9 سطح: ناقصة [ل] - 14 $دَ يَ$: ناقصة في [ب] / وهناك علامة نقصان في مكانها، وأضافها الناسخ في المامش على ما يبدو وإن لم تخرج بوضوح في التصوير / $يَ جَ$: $بَ جَ$ [ب، ل] - 18 $اَ بَ$: $لَ$ [ب، ل] - 19 $دَ يَ$: $دَ$ [ب، ل] / فرجع: لمربع [ل]

ب د - وهو عدد الأموال - يكون مبلغ الأموال المذكورة في السؤال.
ومجموع / مربع ب ي المال في ي د وفي ب د ، وهي الجذور والعدد ل - ٨٢ - ظ
والأموال مثل مربع ب ي في ب ي ، وهو مكعب ب ي . فقد وجدنا
خط ب ي يكون مكعبه مثل مجموع أمواله وجذوره المذكورة والعدد
المذكور ، وذلك ما أردنا بيانه.



وأما استخراج المطلوب فنضع العدد على التخت ونضع فوقه أصفار الكعب. وللمسألة صور كثيرة يُعرف كيفية عملها من ثلاث صور:

الصورة الأولى:

أن يكون المرتبة السمية للكعب الأخير أرفع من آخر «مراتب» عدد
10 الأموال ومن المرتبة السمية للجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور.
مثل قولنا: ثلاثون مالاً وستائة جذر وعددُ هذه الصورة vaverrri يعدل

6 فنضع : فيضع [ل] / ونضع : ويضع [ل] - 8 ناقصة [ل]

مكعباً. فينقل آخر مراتب عدد الأموال إلى المرتبة المنحطة عن الكعب الأخير بقدر انحطاط مرتبته عن المرتبة السميّة للكعب الأخير، وينقل آخر عدد الجذور إلى المرتبة المنحطة عن الكعب الأخير بقدر انحطاط الجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور عن الجذر السميّ للكعب الأخير، ونردّ عدد الأموال والجذور إلى الثلث فيحصل بهذه الصورة $^{2979331}_{300}$ ، ثم

نضع / مطلوب الكعب - وهو ثلاثة - مكان الكعب الأخير، ونضربه ل - ٨٣ - و في ثلث عدد الأموال < ونزيد ثلث عدد الجذور > ونضع المبلغ في الأوسط، ونضربه في الأوسط ونزيد ثلاثة أمثال كل ضربة على العدد، وتنقص مكعب المطلوب من العدد، ونُبطل المسطح الحاصل من ضرب المطلوب في ثلث عدد الأموال، ونضع مربع المطلوب فيما بين العدد وثلث عدد الجذور، فيكون بهذه الصورة $^{5672331}_{200}$ ، ثم ننقص ثلث عدد الجذور من مربع الثلاثة ونُبطل السطر الذي فيه ثلث عدد الجذور، ثم نضرب المطلوب في ثلث عدد الأموال، وتنقص ضعف المبلغ من بقية مربع المطلوب، وتنقص ثلث عدد الأموال من المطلوب، ونُبطل السطر الذي فيه ثلث عدد الأموال، وننقل الأعلى بمرتبتين، والأسفل بمرتبة، فيصير بهذه الصورة $^{5672331}_{878}$ ، ثم نضع المطلوب الثاني فوق التسعة التي تحت مكان المطلوب الثاني، وهو اثنان، وتنقص مكعبه من العدد ونضربه في بقية

المطلوب الأول ونزيد المبلغ على الأسفل ونضربه في / الأسفل وتنقص ل - ٨٣ - ظ

2 مرتبه: [ل] - 5 ونردّ: [ل] ويزد [ل] - 6 كتب ناسخ [ل]. كمادته سطري الجدول الأخيرين في سطر النص / نضع: [ل] / ونضربه: ويضربه [ل] - 7 في: 300 [ل] - 8 ونضربه في الأوسط: في الماخش [ب] / ونزيد: ويزيد [ل] - 9 وتنقص: ويتنقص [ل] / ونبطل: ويتبطل [ل] - 10 المطلوب (الأول): كتب ناسخ ل 10 فوقها، وهي عشرة الجدول / ونضع: ويضع [ل] - 11 نفس التعليق للسطور الثلاثة الأخيرة من الجدول [ل] / تنقص: يتنقص [ل] - 12 ونبطل: ويتبطل [ل] / نضرب: نضرب 900 [ل] - 13 وتنقص: ويتنقص [ل] / من: 200 [ل] - 14 ونبطل: ويتبطل [ل] - 15 وننقل: وينقل [ل] / فيصير: كتب ناسخ ل العدد 10 - وهو آخر سطر من الجدول السابق - عليها - 16 الصورة: وضع ناسخ ب علامة نهاية الفقرة بعدها، ولم يكتب ناسخ ل إلا السطرين الأولين من الجدول / نضع: يضع [ل] / المطلوب: مطلوب [ل] - 17 وتنقص: وتنقص [ل] / العدد: العدد 878 [ل] / ونضربه: ويضربه [ل] - 18 ونزيد: ويزيد [ل] / ونضربه: ويتنقص [ل]

ثلاثة أمثال كل ضربة من العدد، ثم نضرب المطلوب الثاني في بقية المطلوب الأول كترّة أخرى، ونزيد المبلغ على الأسفل، ثم نزيد مربع المطلوب الثاني على الأسفل، ونزيد المطلوب الثاني على ماتحته من بقية المطلوب الأول؛ ليحصل في مكانه الواجب له، وننقل الأعلى بمرتبتين،
5 والأسفل بمرتبة، ثم نضع المطلوب الثالث - وهو الواحد - ونعمل به العمل السابق، فيخرج الأعلى بهذه الصورة ٣١١، فتزيد عليه ثلث عدد الأموال فيصير بهذه الصورة ٣٢١، وهو الجذر المطلوب.

الصورة الثانية:

أن يكون المرتبة السميّة للجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور
10 أرفع من المرتبة السميّة للكعب الأخير، ومن آخر مراتب عدد الأموال، كما في قولنا: تسعة وتسعون مائاً وجذور عددها بهذه الصورة / ٧٠٢٠٠ و عدد ب - ٣ - و بهذه الصورة ٣٤٠٩٠٢ يعدل مكعباً. فنطلب الكعب السميّ للجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور، فهناك مكان المطلوب. فإن كان آخر مراتب عدد الجذور في المرتبة المرفوعة / عن الجذر الأخير من الجذور ل - ٨٤ - و المقابلة لعدد الجذور فينقل آخر مراتب عدد الجذور إلى المرتبة المرفوعة عن مرتبة الكعب الذي هو مكان المطلوب بذلك القدر. وإن كان مقابلاً له فننقله إلى مقابلة الكعب الذي هو مكان المطلوب. ونعرف المرتبة السميّة للكعب الذي هو مكان المطلوب، ونعرف قدر انحطاط آخر مراتب عدد الأموال أو ارتفاعه، وننقله إلى المرتبة المنحطة أو المرفوعة عن مكان

1 نضرب: يضرب [ل] - 2 وتزيد: ويزيد [ل] / تزيد: يزيد [ل] - 3 وتزيد: ويزيد [ل] - 4 وتنقل: وينقل [ل] - 5 نضع: يضع [ل] - 6 فتزيد: فيزيد [ل] - 8 ناقصة [ل] - 9 لعدد: بعدد [ل] - 12 فنطلب: فيطلب [ل] - 13 آخر: ناقصة [ل] - 14 عن: من [ب، ل] - 17 فننقله: فينقله [ل] / هو: فوق السطر [ل] - 18 قدر: ناقصة [ل] - 19 وتنقله: وينقله [ل]

2 مقابلة: مقابلة [ل] - 3 فقلنا: فقلنا [ل] - 5 فقلنا: فقلنا [ل] - 6 هو: فوق السطر [ل] / نفس التلخيص على الجدول، انظر ماسبق / نطلب: نطلب [ل] - 7 وزيد: وزيد [ل] - 8 على: على ٧٠٢ - 9 نضع: نضع [ل] - 10 الكعب: الكعب ٩٩ [ل] / فستأنف: فستأنف [ل] - 11 ونضع: ونضع [ل] - 17 نفس التلخيص على الجدول / فنبطل: فنبطل [ل] - 18 نضع: نضع [ل] - 19 السطر: السطر ٩٩٩٠٠ [ل] / ونضع: ونضع [ل]

ونقص ثلث عدد الجذور من مربع المطلوب، ثم نبطل ثلث عدد الجذور / ونضع ثلث عدد الأموال مكان عدد الأموال على هذه الصورة د - ٨٥ - و
 $\frac{331.902}{666}$ ، ونضرب المطلوب في ثلث عدد الأموال، ونقص ضعف المبلغ من الأسطر الأوسط، ونقص ثلث عدد الأموال من المطلوب، ونبطل ثلث
 ٥ عدد الأموال، فيصير بهذه الصورة $\frac{2670.902}{468}$ ، ونقل الأعلى بمرتبتين والأسفل بمرتبة، ثم نضع المطلوب الثاني، وهو اثنان فوق الستة التي حصلت في مكانه، ونضربه في بقية المطلوب ونزيده على الأسفل ونضربه في الأسفل، ونقص ثلاثة أمثال كل ضربة من العدد، ونقص مكعبه من العدد أيضاً، ونضربه كربة أخرى في الأعلى ونزيد المبلغ على الأسفل،
 10 ونزيد مربعه على الأسفل، ونزيد المطلوب الثاني على المرتبة التي تحته من بقية المطلوب الأول، ليحصل في مكانه الواجب له، ونقل الأعلى بمرتبتين والأسفل بمرتبة ونتمم العمل إلى آخره. وبعد الفراغ من العمل نزيد ثلث عدد الأموال على السطر الأعلى فيصير بهذه الصورة ٣٢١ وهو الجذر المطلوب.

١٥ الصورة الثالثة :

أن يكون آخر مراتب عدد الأموال / أرفع من المرتبة السمية للكعب د - ٨٥ - ظ
 الأخير، ومن المرتبة السمية للجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور، كما في قولنا: ثلاثمائة ماله وستة آلاف جذر وعدد بهذه الصورة ٣٣٧٨٦١
 ١ ونقص: ونقص [ل] / نبطل ثلث ٩٩ [ل] - 2 وضع: ونقص [ل] - 3 انظر التعليق السابق على الجدول / ونضرب: ونضرب [ل] / ونقص: ونقص [ل] / المبلغ: المطلوب [ب]، [ل] - 4 ونقص: ونقص [ل] / ثلث: ثلث ٦٦٦ [ل] / ونبطل: ونبطل [ل] - 5 انظر التعليق السابق على الجدول، ولقد كتب ناسخ ب واحداً بدلاً من ثمانية في السطر الثالث من الجدول، ونقل ناسخ ل هذا الواحد. / ونقل: ونقل [ل] / الأعلى: ٣٣ الأعلى [ل] - 6 فوق: كتبها ناسخ ب معلقة وبصورة توحى بأنها بدون وهذا ما نقله ناسخ [ل] / التي: ٦٦١ التي [ل] - 7 ونضربه (الأولى والثانية): ونضربه [ل] - 8 ونقص (الأولى والثانية): ونقص [ل] - 9 ونضربه: ونضربه [ل] / ونزيد: ونزيد [ل] - 10 ونزيد (الأولى والثانية): ونزيد [ل] - 11 بقية المطلوب: محو [ب] / ونقل: ونقل [ل] - 12 ونتمم: ونتمم [ل] / نزيد: نزيد [ل] - 15 ناقصة [ل]

يعدل مكعباً. فيُطلب الكعب السميّ لآخر مراتب عدد الأموال، ويُنقل آخر مراتب عدد الأموال إليه، ونجعل آخر عدد الأموال مطلوباً، ونعرف الجذر السميّ لآخر مراتب عدد الأموال، ونعرف قدر انحطاط آخر مراتب عدد الجذور عن المرتبة التي تقابل ذلك الجذر، وننقل آخر مراتب عدد الجذور إلى المرتبة المنحطة عن الكعب السميّ لآخر مراتب عدد الأموال 5 بذلك القدر. لكن الكعب السميّ لآخر مراتب عدد الأموال في المثال إنما هو الكعب الثالث، فنقلنا آخر مراتب عدد الأموال إلى مقابلته؛ وآخر عدد الأموال في المرتبة الثالثة وهي المئات، والجذر السميّ له هو الجذر الثالث في عشرات الألوف، وآخر عدد الجذور في الألوف؛ فهي منحنة 10 عن هذا الجذر بمرتبة، فنقلنا آخر مراتب عدد الجذور إلى المرتبة المنحنة عن

الكعب السميّ لآخر مراتب عدد الأموال / بمرتبة، وجعلنا الثلاثة التي هي ب - 3 - ط < في > آخر مراتب / عدد الأموال مطلوباً، فحصل بهذه الصورة د - ٨٦ - و $\begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \\ 8 \\ 1 \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{smallmatrix}$ ، ثم نضرب المطلوب في عدد الأموال إلا في المرتبة الأخيرة، ونزيده على الأوسط؛ لكنّ المراتب التي قبل المرتبة الأخيرة في المثال خالية 15 من العدد، فبقي السطر الأوسط بحاله، ثم نضرب المطلوب في السطر الأوسط ونزيد المبلغ على العدد، ثم نردّ عدد الجذور والأموال إلى الثلث، ونضع مربع الثلاثة فيما بين العدد وثلث عدد الجذور، وتنقص منه ثلث عدد الجذور، ثم نضرب ثلث عدد الأموال في المطلوب، وتنقص ضعفه من بقية مربعه، وتنقص ثلث عدد الأموال من المطلوب، ونبتل ثلث

4 تقابل: تقابله [ب، ل] / ونقل: وينقل [ل] - 5 مراتب: محموة [ب] - 6 المال: الميال [ل] - 7 فنقلنا: ملنا [ب، ج]، يقلنا [ل] / مقابلته: مقابله [ل] - 10 فنقلنا: قد قرأنا فلنا [ب]. يقلنا [ل] - 13 انظر التطبيق السابق على الجدول / نضرب: يضرب [ل] - 14 المال: الميال [ل] - 15 من: عن [ل] / نضرب: يضرب [ل] - 16 ونزيد: ويزيد [ل] - 17 ونضع: ويضع [ل] / وتنقص: وينقص [ل] - 18 نضرب: يضرب [ل] / وتنقص: وينقص [ل] - 19 وتنقص: وينقص [ل] / ونبتل: ويبتل [ل]

عدد الجذور والأموال، وننقل السطر الأعلى بمرتبتين، والأسفل بمرتبة، ونعمل العمل السابق إلى آخره، فيحصل السطر الأعلى بهذه الصورة ٢٢١ فزيد عليه ثلث عدد الأموال، فيحصل الجذر المطلوب.

وأما بيان جهة العمل: فاعلم أن المكعب في هذه المسألة انقسم إلى 5 ثلاثة أقسام، أعني: العدد، والمسطح الأول، و«المسطح» الثاني. فيكون عدد الجذور بعض مال الجذر، وعدد الأموال بعض الجذر. والعدد

حاصل / من ضرب المال في بعض الجذر، والجذر انقسم إلى ثلاثة ل - ٨٦ - ظ أقسام: قسم هو عدد الأموال، وقسم يكون ضرب المال فيه مساوياً لضرب الجذر في عدد الجذور، وقسم يكون ضرب المال فيه مثل العدد. 10 فإن كان آخر الجذر في القسم الثالث، فلأن آخر الجذر في القسم الذي ضرب في المال حتى حصل العدد، ومربع آخر الجذر موجود في المال، فإذا ضرب آخر الجذر في المال فيحصل ضربه في مربعه، فمكعب آخر الجذر يكون موجوداً في العدد، وهو آخر المكعب، ويكون منحنطه مقابل الكعب الأخير المقابل للعدد. فإذا استخرج مطلوب الكعب في ذلك الموضع 15 فيخرج آخر الجذر المطلوب. وكذلك يكون أرفع من جذر آخر عدد الجذور، لأن هذا الجذر لو كان آخر الجذر المطلوب. وآخر عدد الجذور - وهو ماله - إذا ضرب في «آخر» الجذر المطلوب يحصل مكعب «آخر» الجذر المطلوب وهو من جذر آخر عدد الجذور؛ فأخر «مكعب» الجذر المطلوب في آخر المسطح الأول. وقد فرضنا أنه في آخر العدد؛ فإذا جمع 20 المسطح الأول مع العدد فيكون ضعف مكعب آخر الجذر المطلوب موجوداً

1 ونقل: وتنقل [ل] / السطر: في الهامش [ب] - 3 فزيد: فزيد [ل] - 6 مال الجذر: مال الجذور [ل] - 7 بعض الجذر: بعض الجذور [ل] - 9 يكون: كتب ناسخ ب يكون فيه، ثم عاد فحذف فيه - 13 منحنطه: منحنطه [ل] - 15 وكذلك: ولذلك [ب، ل]، ترجع هذا التصحيح لأن هذا بداية فقرة جديدة.

فيه، فيكون أعظم من مكعب الجذر المطلوب. / فإذا جُمع مع المسطح ل - ٨٧ - و الثاني يكون أعظم. لكن مجموع هذه الثلاثة مثل مكعب الجذر المطلوب، فيلزم الخلف.

فقد تبين أنه إذا كان مكعب آخر الجذر المطلوب موجوداً في آخر العدد: فإذا استخرج مطلوب الكعب يكون أرفع من عدد الأموال، ومن جذر عدد الجذور؛ وذلك المطلوب يكون آخر الجذر المطلوب. وإن كان آخر الجذر في القسم الذي هو عدد الأموال، فيكون مكعب آخر الجذر المطلوب في المسطح الثاني؛ لأن المال إذا ضرب في القسم الذي هو عدد الأموال - ومربع آخر الجذر المطلوب موجود في المال، وآخر الجذر المطلوب في عدد الأموال - فيحصل ضرب مربع آخر الجذر المطلوب في آخره. وإذا كان مكعب آخر الجذر المطلوب واقعاً في المسطح الثاني، وهو أرفع مراتب المكعب، فلا يكون واقعاً في آخر العدد، ولا في آخر المسطح الأول، ولا يكون آخر المسطح الأول مكعب آخر الجذر المطلوب. فآخر عدد الأموال يكون أرفع من جذر آخر عدد الجذور، ومن مطلوب الكعب الذي يُستخرج لآخر العدد. ولأن آخر العدد أنزل من آخر المكعب،

فمطلوب كعبه / يكون أنزل من آخر الجذر المطلوب. وإن كان آخر الجذر ل - ٨٧ - ظ في القسم الذي ضرب المال فيه حتى حصلت الجذور، فيكون آخر عدد الجذور مال آخر الجذر المطلوب. فإذا ضرب عدد الجذور في الجذر المطلوب وضرب مال آخر الجذر المطلوب في الجذر المطلوب، فيكون مكعب آخر العدد واقعاً في المسطح الأول، ويكون آخر العدد أنزل من

4 تبين: تبين [ل] - 5 ومن: وفي [ل] - 13 مكعب: مربع [ب. ل] - 15 ولأن: لأن [ب. ل] - 19 وضرب: ضرب [ب، ل] - 20 مكعب: أي أكبر مكعب يمكن أن يحتويه آخر العدد.

- آخر المسطح الأول. ومطلوبُ الكعب الذي يُستخرج لآخر العدد يكون أنزلَ من جذر آخر عدد الجذور. لأن المسطح الأول إذا استُخرج مطلوب كعبه [يكون أنزلَ من جذر آخر عدد الجذور؛ لأن المسطح الأول إذا استُخرج مطلوب كعبه] يكون هو آخر الجذر المطلوب؛ لأن آخر هذا المسطح حاصل من ضرب مالم آخر الجذر المطلوب في الجذر المطلوب. 5
- فمطلوب كعبه يكون آخر الجذر المطلوب، وجذر عدد الجذور يكون أرفع من عدد الأموال، إذ هو بعض الجذر المطلوب وليس فيه آخر الجذر المطلوب. فتبين من هذه التقديرات أنه إن كان مطلوب كعب (آخر) العدد أرفع من عدد الأموال ومن جذر آخر عدد الجذور؛ فمطلوب هذا الكعب هو آخر / الجذر المطلوب، كما في الصورة الأولى. وإن كان جذر ل - ٨٨ - و
- آخر عدد الجذور أرفع من مطلوب هذا الكعب ومن آخر عدد الأموال؛ فذلك الجذر هو آخر الجذر المطلوب، لأن آخر الجذر المطلوب إما في عدد الأموال، أو في مطلوب كعب آخر العدد بأن يكون مكعبه موجوداً في آخر العدد، أو في جذر عدد الجذور بأن يكون ماله موجوداً في آخر عدد الجذور؛ فأرفع هذه الثلاثة يكون آخر الجذر المطلوب، وفي الصورة الثانية أرفعها جذر عدد الجذور، وفي الثالثة أرفعها آخر عدد الأموال. وقد يتفق
- / أن يكون آخر الجذر المطلوب قد انقسم، ووقع أقسامه في كل واحد من ب - ٤ - و هذه الثلاثة أو في اثنين، فتبين بأن نضع الثلاثة في مرتبة واحدة بلا زيادة ارتفاع، أو يكون اثنان منها في مرتبة واحدة وواحد أنزل منها. ثم إذا تبين آخر الجذر المطلوب، وتعين مرتبته، فسائر الأعمال تتبين بما تقرر بيانه في 20

8 فبين: [ل] / التقديرات: لنقله ا ت [ب]، لنقله ا ب [ل]. هذه هي الكلمة التي يستعملها في مثل هذا الموضع. انظر ٩٤ [ظ]. مثلاً - 10 الصورة: الصورت [ل] - 12 آخر الجذر: آخر جذر [ل] - 15 هذه: هذا [ل] - 18 نضع: يضع [ل] - 19 اثنان: اثنين [ب]، ل [ل] / تبين: بين [ل] - 20 وتعين مرتبته: ويغير مرتبه [ل] / تقرر: يقرر [ل]


المسائل المتقدمة. فمن علم ذلك فلا يخفى عليه شيء من أعمال هذه المسألة. وذلك ما أردنا بيانه.

المسألة السابعة: مكعب وأموال يعدل جذوراً وعدداً:

- فليكن $\overline{أ ب}$ جذر عدد الجذور / و $\overline{أ ج}$ عدد الأموال، ونجعل عموداً $\overline{ل - ٨٨ - ط}$ 5 على $\overline{أ ب}$. وليكن مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{أ د}$ مثل العدد. فليكن أولاً $\overline{أ د}$ أصغر من $\overline{أ ج}$. فنخرج عمودي $\overline{ب ل}$ $\overline{د ل}$ ليحصل سطح $\overline{ب د}$ قائم الزوايا، ونخرج ضلعي زاوية $\overline{ب}$ بالاستقامة، ونعمل مربع $\overline{ب ي}$ مثل سطح $\overline{ب د}$ ، ونعمل قطعاً زائداً رأسه نقطة $\overline{ي}$ ولا يقع عليه خطاً $\overline{ب ط ب ه}$ ويُقاربان محيط القطع ويكون منتصف مجانبه نقطة $\overline{ب}$ ، وليكن هو قطع $\overline{ي ز}$ ، ونعمل على نقطة $\overline{د}$ قطعاً آخر زائداً مجانبه خط $\overline{د ج}$ ، ونخرج $\overline{د ج}$ 10 بالاستقامة، ونفصل $\overline{د م}$ مثل $\overline{أ ه}$. فخط الترتيب - الذي يخرج من نقطة $\overline{م}$ وهو $\overline{م ن}$ إلى محيط القطع الذي رأسه نقطة $\overline{د}$ - يكون أطول من $\overline{د م}$ لأن مربعه مثل ضرب $\overline{ج م}$ في $\overline{د م}$ ، فهو وسط في النسبة بينها، فهو أطول من $\overline{د م}$ أعني $\overline{أ ه}$. وم $\overline{ع}$ مثل $\overline{أ ب}$ $\overline{ف ع ن}$ أطول من $\overline{ب ه}$ فهو أطول من $\overline{ب ف}$ أعني $\overline{ص ي}$ ، و $\overline{ص ي}$ أطول من $\overline{ع ق}$ ، 15 ولأن خط $\overline{ب ط}$ أبداً يقارب محيط قطع $\overline{ي ز}$ ، ونقطة $\overline{ق}$ على محيط قطع $\overline{ي ق}$ ، فنقطة $\overline{ق}$ تقع داخل قطع $\overline{د}$. ونقطة $\overline{ن}$ على محيط قطع $\overline{د}$ ، فقطع $\overline{د}$ يقع في داخل قطع $\overline{ي ز}$ فيتقاطعان، وليكن تقاطعها على نقطة

3 المسألة السابعة: ناقصة [ل] / وعددا: كما شرحنا في المقدمة من قبل، فخطوطه وله منسوخة عن مخطوطة «ب». وإن أثبتنا في الصفحات السابقة كل الفروق بين المخطوطتين فلكي يتبين القاريء بنفسه مانعيه وما أفتنا البرهان عليه. واقتصاداً للجهد وللتكلفة ستوقف الآن عن إثبات الفروق كلها لكنني بأهمها فقط، أي بما ينقص «له» من كلمات وعبارات والأخطاء التي لا تدع مجالاً للشك في أن ناسخ «له» لم يكن أمامه إلا مخطوطة «ب»، أما الأخطاء الكتابية الأخرى والأخطاء النحوية وما إلى ذلك، فلقد أحصيتها ولكن لن نذكرها هنا بعد الآن - 14 ع ن: ع د [ب]، ع د [ل] - 16 يقارب: يقارن [ب، ل] - 17 د ونقطة: ي ق ونقطة [ب، ل] - 18 فيقاطع: فيقاطع [ب، ل]

ز. فنخرج عمودي / ز ح ز ك. فلأن مسطح ب ز مثل مربع ب ي ل - ٨٩ - و
أعني سطح ب د، فنجعل سطح ا ط مشتركاً، فسطح ا ز مثل د ط،
فأضلاعها متكافئة في النسبة. فنسبة ح ط أعني ا ب إلى ا ح كنسبة
ح ز إلى د ح. فنسبة مربع ا ب إلى مربع ا ح كنسبة مربع ح ز إلى
مربع د ح. ولأن ضرب د ح في ج ح مثل مربع ح ز، فح ز وسط
5 في النسبة بين خطي د ح ج ح، فنسبة مربع ح ز إلى مربع د ح كنسبة
خط ج ح إلى د ح. فنسبة مربع ا ب إلى مربع ا ح كنسبة خط ج ح
إلى د ح. فضرب مربع ا ب في د ح مثل ضرب مربع ا ح في ج ح.
فإذا جعلنا ا ح جذراً فيكون مربعه المال، ومربعه في ج ح هو مربعه في
10 ا ح، وهو مكعبه، وفي ا ج وهو الأموال، وهو مربع ا ب، وهو عدد
الجذور، في ا ح، وهو الجذور، وفي ا د وهو العدد. فالمكعب والأموال
بالعدة المذكورة في السؤال مثل العدد والجذور المذكورة في السؤال.



4 مربع ا ح: مربع ا ج [ب، ل] - 7 ا ح: ا ج [ب، ل] - 8 ج ح: د ح [ب، ل] -
10 وفي: في [ب، ل] / وهو الأموال: هو الأموال [ب، ل] / وهو مربع: ومربع [ب، ل] - 11 وهو
الجذور: هو الجذور [ب، ل] / وفي: في [ب، ل] / وهو: هو [ب، ل]

وأما استخراج المطلوب فنضع العدد على التخت، ونضع أصفار الكعب، فيكون للمسألة صور ثلاث:

الصورة الأولى

- أن يكون المرتبة السميّة للكعب الأخير أرفع من آخر مراتب عدد الأموال، والجذر السميّ للكعب الأخير أيضاً يكون أرفع من آخر مراتب عدد الجذور، كما في قولنا: مكعب وثلاثون مالاً يعدل ستين جذراً وعدداً بهذه الصورة $311481/31$. فالكعب الأخير هو الثالث، وسميّه المرتبة الثالثة، د - ٩٠ - و
- ومرتبة آخر عدد الأموال إنما هي العشرات، فالمرتبة السميّة للكعب الأخير أرفع منه. والجذر السميّ للكعب الأخير هو الجذر الثالث وهو أرفع من آخر عدد الجذور. ونعرف انحطاط آخر مراتب عدد الأموال عن المرتبة السميّة للكعب الأخير، وننقل آخر مراتب عدد الأموال إلى المرتبة المنحطة عن الكعب الأخير بذلك القدر. ونعرف انحطاط آخر مراتب عدد الجذور عن الجذر السميّ للكعب الأخير، وننقل آخر مراتب عدد الجذور إلى المرتبة المنحطة عن الكعب الأخير بذلك القدر. ثم نرد عدد الأموال والجذور إلى الثلث فيحصل بهذه الصورة $311481/31$ ، ونضع المطلوب الكعب مكان الكعب الثالث، وهو ثلاثة، ونضع ثلث مربعه في سطر أوسط بين العدد، وبين ثلث عدد الأموال، وننقص منه ثلث عدد الجذور، فيحصل بهذه الصورة $311481/31$ ، ونضرب المطلوب في ثلث عدد الأموال، ونزيد الحاصل على الأوسط ونضربه في الأوسط وننقص ثلاثة أمثال كلّ ضربة
- 20 من / العدد، ثم نزيد ثلثي مربع المطلوب على السطر الأوسط، ونضرب د - ٩٠ - ظ

3 ناقصة [ل] / في الصفحة السابقة هناك ثلاثة أشكال في [ب]. غير واضحة كل الوضوح - 17 العدد وبين: مطبوعة في [ل]، ويبدو أنها كتبت قبل الطمس وأعداد العدد وبين.

المطلوب في ثلث عدد الأموال، وتزيده على الأوسط، وننقل الأعلى والأسفل بمرتبتين والأوسط بمرتبة، ثم نضع المطلوب الثاني - وهو اثنان - وننقص مكعبه من العدد، ونضربه في المطلوب الأول وفي ثلث عدد الأموال، وتزيد المبلغ على الأوسط ونضربه في الأوسط وننقص ثلاثة أمثال كل ضربة من العدد، ثم تزيد مربع المطلوب الثاني على الأوسط ونضرب المطلوب الثاني في المطلوب الأول، وفي ثلث عدد الأموال كرتة أخرى. وتزيد المبلغ على الأوسط وننقل الأعلى والأسفل بمرتبتين، والأوسط بمرتبة. ثم نضع المطلوب الثالث - وهو الواحد - وننقص مكعبه من العدد ونضربه في المطلوب الأول والثاني وفي ثلث عدد الأموال، وتزيد المبلغ على الأوسط ونضربه في الأوسط وننقص ثلاثة أمثال كل ضربة من العدد، فيرتفع العدد، ويحصل السطر الأعلى بهذه الصورة ٣٢١.

الصورة الثانية

أن يكون آخر مراتب عدد الجذور أرفع من الجذر السمي للكعب الأخير، والمرتبة السميّة للجذر الأخير من الجذور المقابلة / لعدد الجذور ١ - ٩١ - ١٥ أرفع من آخر مراتب عدد الأموال، كما في قولنا: مكعب وثلاثة أموال يعدل جذوراً بهذه العدة ١٠٢٠٠٠ وعدداً بهذه الصورة ٦٤٣٢٨٤. فيطلب الكعب السميّ للجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور، وهو الكعب الثالث في المثال، وينقل من عدد الجذور المرتبة التي تقابل الجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور إلى مقابلة ذلك الكعب. ونعرف انحطاط آخر مراتب عدد الأموال عن المرتبة السميّة للجذر المذكور، وينقل

13 ناقصة [ل] - 21 كب تاسع ب بعد «المذكور» و«ينقل» ولكن الواو تشبه الماء، ونقرأ في [ل] «المذكورة ينقل»

آخر عدد الأموال إلى المرتبة المنحطة عن ذلك الكعب بذلك القدر،
 فيحصل بهذه الصورة $\begin{smallmatrix} 3 \\ 10 \\ 3 \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 8 \\ 4 \\ 3 \end{smallmatrix}$ ، ثم نستخرج المطلوب الجذر لعدد
 الجذور - وهو ثلاثة - ونضعه في الكعب الثالث ونضربه في عدد الجذور
 ونزيد المبلغ على العدد، ثم نرد عدد الجذور إلى الثلث وكذا عدد الأموال
 5 فيحصل بهذه الصورة $\begin{smallmatrix} 3 \\ 10 \\ 3 \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 8 \\ 4 \\ 3 \end{smallmatrix}$ ، ثم ننقص مكعب المطلوب من العدد،
 ونضربه في < ثلث > عدد الأموال ونضع المبلغ فيما بين العدد وثلث عدد
 الجذور / ونضرب فيه المطلوب، وننقص ثلاثة أمثال كل ضربة من ٩١ - ٩٠ - ٩
 العدد، ونضع مربع المطلوب في السطر الذي بين العدد وبين ثلث عدد
 الجذور، ثم نضرب المطلوب في ثلث عدد الأموال كرتة أخرى، ونزيد المبلغ
 10 على السطر الذي بين العدد وبين ثلث عدد الجذور، ثم ننقص ثلث عدد
 الجذور من السطر الذي فوقه، ونبطل ثلث عدد الجذور، فيحصل بهذه
 الصورة $\begin{smallmatrix} 3 \\ 10 \\ 3 \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 8 \\ 4 \\ 3 \end{smallmatrix}$ ، ثم ننقل المطلوب وثلث عدد الأموال بمرتبتين والسطر
 الأوسط بمرتبة واحدة، ثم نضع المطلوب الثاني - وهو الاثنان - ونعمل
 به العمل المذكور في الصورة الأولى إلى آخره.

15 الصورة الثالثة :

أن يكون آخر مراتب عدد الأموال / أرفع من المرتبة السمية للكعب ب - ٥ - ٥ - و
 الأخير، ومن المرتبة السمية للجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور،
 كما في قولنا: مكعب وثلاثة آلاف مالٍ يعدل ثلاثمائة جذر وعدداً بهذه
 الصورة 342102861 ، فنجعل عدد الأموال كالمقسوم عليه، والعدد
 20 كالمقسوم، ونستخرج مطلوب القسمة، ونعدّ الجذور من / الأحاد إلى ٩٢ - ٩١ - و

15 ناقصة [ل] - 16 أن يكون: في ب بعدها فراغ فيه فقط حرف الألف. وهذا مانجده في ل أيضا
 مما يؤكد مرة أخرى أن ناسخ ل لم يكن أمامه إلا نسخة ب.

- مرتبته، ونعرف الكعب السميّ للجذر الأخير، فهناك مكان المطلوب.
- وينقل آخر مراتب عدد الأموال إلى المرتبة المرفوعة عن مكان المطلوب،
- بقدر ارتفاع آخر مراتب عدد الأموال عن المرتبة السميّة للكعب الذي هو
- مكان المطلوب؛ وينقل آخر مراتب عدد الجذور إلى المرتبة المرفوعة أو
- 5 المنحطة عن مكان المطلوب، بقدر انحطاط مرتبته عن مرتبة الجذر السميّ
- للكعب الذي هو مكان المطلوب. ثم نردّ كلّ واحد من عدد الأموال
- وعدد الجذور إلى الثلث. فلأن آخر عدد الأموال في المثال في المرتبة الرابعة
- والكعب الأخير هو الكعب الثالث، وسميّه المرتبة الثالثة، والجذر الأخير من
- الجذور المقابلة لعدد الجذور إنما هو الجذر الثاني، والمرتبة السميّة إنما هي
- 10 المرتبة الثانية، وآخر عدد الأموال أرفع من كلّ واحدٍ منهما، فوضعنا عدد
- الأموال كالمقسوم عليه، والعدد كالمقسوم، على هذه الصورة
- $\begin{array}{r} ٣٤٢١٠٢٨٦١ \\ ٣٠٠٠ \end{array}$ ؛ والجذور التي من الآحاد إلى مرتبة مطلوب القسمة ثلاثة.
- فعددنا الكعاب بتلك العدة، فاتى إلى الكعب الثالث فهناك مكان
- المطلوب. ولأن آخر مراتب / عدد الأموال في المرتبة المرفوعة عن المرتبة ١ - ٩٢ - ظ
- 15 السميّة للكعب الذي هو مكان المطلوب بمرتبة - لأنه في الألوف،
- والسميّة في المئات - فنقلنا آخر مراتب عدد الأموال إلى المرتبة المرفوعة عن
- الكعب الذي هو مكان المطلوب بمرتبة، فحصل بهذه الصورة $\begin{array}{r} ٣٤٢١٠٢٨٦١ \\ ٣٠٠٠ \end{array}$ ،
- والجذر السميّ للكعب - الذي هو مكان المطلوب - الجذر الثالث، وآخر
- عدد الجذور منحطّ عنه بمرتبتين، فنقلنا آخر عدد الجذور إلى المرتبة المنحطّة
- 20 عن الكعب الذي هو مكان المطلوب بمرتبتين، فحصل بهذه الصورة
- $\begin{array}{r} ٣٤٢١٠٢٨٦١ \\ ٣٠٠٠ \end{array}$ ، ثم رددنا كلّ واحدٍ من عدد الجذور والأموال إلى الثلث،
- ونستخرج مطلوب الكعب - وهو ثلاثة في المثال - ونضعه مكان الكعب
- الثالث، ونضربه في ثلث عدد الجذور، ونزيد ثلاثة أمثال الضرب على

العدد، ثم نضربه في ثلث عدد الأموال - ونضع المبلغ فوق ثلث عدد الأموال - وفي المبلغ، وننقص ثلاثة أمثال كل ضربة من العدد، وننقص مكعبه من العدد أيضاً فيبقى بهذه الصورة $\frac{40192861}{3000}$ ، ثم نضع مربع

- المطلوب بجذائه فيما بين العدد وثلث عدد / الأموال ونضربه في ثلث عدد ل - ٩٣ - و
 5 الأموال كره أخرى ونزيد المبلغ على السطر الذي فوقه ثم ننقص ثلث عدد الجذور من السطر الذي بين العدد وبين ثلث عدد الأموال، ونبطل عدد الجذور، فيحصل بهذه الصورة $\frac{40192861}{2899}$ ، ثم ننقل الأعلى والأسفل بمرتبتين، والأوسط بمرتبة. ثم نضع المطلوب الثاني، وهو الاثنان، وننقص مكعبه من العدد ونضربه في الأعلى والأسفل، ونزيد المبلغ على الأوسط، ونضربه في الأوسط، وننقص ثلاثة أمثال كل ضربة من العدد. وهكذا إلى آخر العمل المذكور، فيحصل السطر الأعلى بهذه الصورة ٣٢١.

- وأما بيان جهة العمل، فلأن المكعب مع المسطح الثاني يعدل العدد مع المسطح الأول، فالمسطح الأول مع العدد عددٌ يعدل المكعب والأموال. فيرجع إلى مسألة: مكعب وأموال يعدل عدداً، والمعلوم بعض 15 هذا العدد وهو المذكور في السؤال. فإن كان آخر الجذر المطلوب أرفع من آخر عدد الأموال ومن جذر آخر عدد الجذور كان ماله أيضاً أرفع من آخر عدد الجذور. فلأن آخر المكعب حاصلٌ من ضرب مالٍ / آخر الجذر في ل - ٩٣ - ظ
 آخر الجذر وزيد في المكعب ضربُ المال في عدد الأموال، فيكون مكعب آخر الجذر في العدد المركب من المكعب ومن المسطح الثاني وضربُ الجذر 20 في آخر عدد الجذور أقل من مكعب آخر الجذر، فيكون من مرتبة أنزل من

2 الأموال: كتب ناسخ ب كلمة "ونضربه" ثم حذفها - 14 عدداً: عدد [ب، ل] - 15 وهو: أضافها في الغاشق مع الإشارة إلى موضعها [ب]، ناقصة [ل]

- المراتب التي وقع فيها مكعب آخر الجذر. فإذا نقص هذا الحاصل - وهو المسطح الأول - من العدد المركب من المكعب والمسطح الثاني فالذي يبقى من العدد يكون آخره آخر المكعب؛ ويكون مطلوب كعبه أرفع من آخر مراتب عدد الأموال ومن جذر آخر عدد الجذور أيضاً، لأن آخر الجذر إذا كان أرفع من آخر مراتب عدد الأموال، فيكون منقطعاً مال آخر الجذر أرفع من منقطع مال آخر عدد الأموال، فيكون منقطعاً مكعب آخر الجذر أرفع من منقطع مكعب آخر عدد الأموال. وأيضاً إن كان آخر الجذر أرفع من جذر آخر عدد الجذور يكون ماله أرفع من مال جذر آخر عدد الجذور، / ومكعبه أرفع من مكعب آخر جذر عدد الجذور، وهو الحاصل ب - ه - ه - ظ 10 من ضرب جذر عدد الجذور في عدد الجذور. فإذا كان مكعب آخر الجذر أرفع من كل واحد من مكعب / آخر عدد الأموال ومكعب آخر جذر ل - ٩٤ - و عدد الجذور: فإذا نقص منه المسطح الأول - وهو أنزل منه - فيكون الباقي من مكعب آخر الجذر - وهو آخر العدد المسؤول - أرفع من كل واحد من المكعبين المذكورين، ويكون مطلوب كعبه أرفع من مطلوب كعب كل واحد منهما، ومطلوبا كعبيهما آخر عدد الأموال وجذر آخر عدد الجذور. فإذا كان آخر الجذر أرفع من كل واحد منهما فمطلوب الكعب يكون أرفع من مرتبة كل واحد منهما. وإن كان آخر مراتب عدد الأموال أرفع من آخر الجذر ومن جذر آخر عدد الجذور؛ فلأن المكعب موجود في المجموع الذي هو المكعب مع ضرب المال في عدد الأموال. ومربع آخر الجذر موجود في المال، فيكون آخر المركب من المكعب والمسطح الثاني - وهو ضرب مربع آخر الجذر في آخر عدد الأموال - أعظم من مكعب آخر

13 الباقي: الثاني [ب، ل] - 15 ومطلوبا كعبيهما: ومطلوب كعبيها [ب، ل] - 18 الجذر: الجذور [ب، ل]

الجذر الذي هو أصغر من مكعب آخر عدد الأموال، فيكون مطلوب كعبه أنزل من آخر عدد الأموال. وإن كان جذر آخر عدد الجذور أرفع من آخر عدد الأموال ومن آخر الجذر، فيكون المسطح الأول أكبر من المكعب ويكون أكبر / من المسطح الثاني أيضاً؛ لأن عدد الأموال أقل من جذر ل - ٩٤ - ظ 5 عدد الجذور، ونسبة عدد الأموال إلى جذر عدد الجذور أصغر من نسبة جذر عدد الجذور إلى الجذر. فيكون ضرب الجذر في عدد الجذور أكثر من مال الجذر في عدد الأموال. فالمسطح الأول أعظم من المسطح الثاني. ولأن المكعب مع المسطح الثاني مثل العدد مع المسطح الأول، والمكعب أقل من المسطح الأول، فالمسطح الثاني أكبر من العدد، فالعدد أقل من المسطح الأول، ومطلوب كعب المسطح الأول أقل من جذر عدد الجذور. فمطلوب كعب العدد أقل منه.

وهذه الأشياء وإن كانت من خواص هذه التقديرات، لكن المطلوب الخارج في هذه المسألة: فلا يتعين أن يكون إما مطلوب الكعب للعدد، وإما أحد مطلوبي القسم في أحد المسطحين، بل في كل واحد من الصور 15 يُحتمل أن يكون أزيد من آخر الجذر، ويُحتمل أن يكون أنقص، فنحتاج في استخراجه إلى زيادة استقصاء. فإن كان أعظم من آخر الجذر فتمتنع التقصانات المذكورة في العمل، فتنقص منه واحداً وتمتنح إلى أن يحصل آخر الجذر. وإن كان أصغر من آخر الجذر فإذا ضربته / في عدد ل - ٩٥ - و الجذور وزدت المبلغ على العدد، فيحتمل مطلوباً أعظم من ذلك فرد العدد إلى حاله الأول وضع مطلوباً أعظم، وهكذا إلى أن يصير المطلوب آخر الجذر، ثم يسهل سائر المطالب. وذلك ما أردنا بيانه.

10 المسطح: بعد أن مُحي جزء من الخاء في [ب]. قد تقرأ «المسطرة». ولهذا كتبنا ناسخ [ل] «السطرة» -

13 فلا يتعين: لا معين [ل]، والمقصود أنه لا يجب أن يكون. أي ليس من اللازم - 16 كان: ناقصة

[ل] - 20 وهكذا: الواو فوق السطر [ب]، هكذا [ل]


فليكن $\overline{ا ب}$ جذر عدد الجذور، و $\overline{ا ج}$ عدد الأموال، وليكن مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ا د}$ مثل العدد، كما مر. وليكن أولاً $\overline{ا د}$ أصغر من $\overline{ا ج}$ ، ونخرج عمودي $\overline{د ه}$ ب $\overline{ه}$ ليحصل سطح $\overline{د ب}$ قائم الزوايا، ونعمل على $\overline{ج د}$ نصف دائرة، ونخرج ضلعي زاوية $\overline{ب}$ بالاستقامة، ونعمل فيها بين خطي $\overline{ب ل}$ ب $\overline{ص}$ قطعاً زائداً يمرّ محيطه بنقطة $\overline{د}$ ، ولا يقع عليه خطأ $\overline{ب ل}$ ب $\overline{ص}$ ويقاربان محيط القطع أبداً، ويكون منتصف مجانبه نقطة $\overline{ب}$. فأقول أولاً: إن هذا القطع لا بد أن يدخل في الدائرة، ويقطعها على نقطة أخرى \langle غير $\overline{د} \rangle$. ولأننا نجعل نسبة $\overline{ا د}$ إلى $\overline{د ه}$ كنسبة $\overline{د ه}$ إلى $\overline{ف ق}$ ، ونجعل نسبة جميع $\overline{ا د ف ق}$ إلى $\overline{ف ق}$ كنسبة $\overline{د ج}$ إلى $\overline{ج ع}$ ؛ فبالفصل: نسبة $\overline{ا د}$ إلى $\overline{ف ق}$ كنسبة $\overline{د ع}$ إلى $\overline{ع ج}$. ونخرج عمود $\overline{ع س}$ \langle على $\overline{ا ج} \rangle$. فضرب $\overline{د ع}$ في $\overline{ع ج}$ مثل مربع $\overline{ع س}$. فنسبة $\overline{د ع}$ إلى $\overline{ع س}$ كنسبة $\overline{ع س}$ إلى $\overline{ع ج}$. فنسبة $\overline{مربع د ع}$ إلى $\overline{مربع ع س}$ كنسبة $\overline{د ا}$ إلى $\overline{ا ف ق}$ ، وهي كنسبة مربع $\overline{د ا}$ إلى مربع $\overline{د ه}$ ؛ فنسبة مربع $\overline{د ع}$ إلى مربع $\overline{ع س}$ كنسبة مربع $\overline{د ا}$ إلى مربع $\overline{د ه}$. فنسبة $\overline{د ع}$ إلى $\overline{ع س}$ كنسبة $\overline{ا د}$ إلى $\overline{د ه}$ ، فنسبة $\overline{د ع}$ إلى $\overline{ا د}$ كنسبة $\overline{س ع}$ إلى $\overline{د ه}$. فنخرج $\overline{س ع}$ إلى $\overline{ي}$ فرع $\overline{ي}$ مثل $\overline{د ه}$. فنسبة $\overline{د ع}$ إلى $\overline{ا د}$ كنسبة $\overline{ع س}$ إلى $\overline{ع ي}$ ، ونسبة $\overline{ع س}$ إلى $\overline{ع ي}$ أصغر من نسبة $\overline{ع س}$ إلى $\overline{س ي}$ ، فنسبة $\overline{ع د}$ إلى $\overline{د ا}$ أصغر من نسبة $\overline{ع س}$ إلى $\overline{س ي}$. فبالتركيب نسبة $\overline{ع ا}$ إلى $\overline{ا د}$ أصغر من نسبة $\overline{ع ي}$ إلى

١ المسألة الثامنة: ناقصة [ل] - 3 كما: لا [ب، ل] - 5 ونعمل: محو [ب]. [إلا الواو، ناقصة
[ل] - 9 ولأنا: الواو فوق السطر على آخر حرف من الكلمة السابقة [ب]. ناقصة [ل] - 10 ا د ف ق:

- ي $\overline{س}$. فنُخرج عمودَ $\overline{س ن}$ على $\overline{ا ب}$ ، فنسب $\overline{ا ع}$ أعني $\overline{س ن}$ إلى $\overline{ا د}$
أصغر من نسبة $\overline{ع ي}$ - أعني $\overline{د ه}$ - إلى $\overline{ي س}$ ، فضرب $\overline{س ن}$ في
 $\overline{س ي}$ - وهو سطح $\overline{ب س}$ - أصغر من ضرب $\overline{ا د}$ في $\overline{د ه}$ وهو سطح
 $\overline{د ب}$. / ولأن القطع إذا أُخرج بغير نهاية؛ فخط $\overline{د ه}$ يقسمه عند نقطة ب - ٦ - ١٠
٥ $\overline{د}$ بقسمين: أحدهما مما يلي جانب خط $\overline{ا ص}$ ، والآخر: مما يلي جانب
نصف الدائرة، فالقسم الذي مما يلي نصف الدائرة يدخل في الدائرة وإلا
وقع فيما بين خط $\overline{د ه}$ المماس للدائرة وفيما بين قوس نصف الدائرة؛ فيصل
بين نقطتي $\overline{ب س}$ بخط مستقيم فيقطع خط القطع على نقطة، فنخرج من
تلك النقطة عمودين على خطي $\overline{ب ا}$ / $\overline{ب ه}$ اللذين لا يقعان على القطع، ل - ١١ - ١٠
١٠ فيحصل سطح قائم الزوايا في داخل سطح $\overline{س ن ب ي}$ ، ويكون أصغر
منه؛ ولأنه من ضرب بُعد تلك النقطة (عن $\overline{ب ل}$) في الخط الواصل بين
نهاية ذلك البُعد وبين (ب) منتصف المجانب، فيكون مساوياً لسطح
 $\overline{د ب}$ ؛ لأن كل واحدٍ منهما مساوٍ لمربع الخط الواصل بين منتصف المجانب
وبين العمود الخارج من رأس القطع إلى الخط الذي لا يقع عليه، فالأصغر
١٥ من سطح $\overline{ب س}$ مساوٍ لما هو أعظم منه؛ هذا خلف. فالقطع يدخل في
نصف الدائرة ويقرب أبداً من خط $\overline{ب ل}$ - فاستحال أن يمر بنقطة ج -
فيقطع الدائرة، وليكن تقاطعها على نقطة ز، فنخرج عمود ز ط ونخرجه
بالاستقامة إلى ك. فلأن كل واحد من سطحي $\overline{ا ه ب ز}$ مثل مربع الخط
الذي يصل بين منتصف المجانب وبين العمود الواقع من رأس القطع على
٢٠ الخط الذي لا يقع عليه؛ فسطح $\overline{ا ه ب ز}$ ، فيسقط $\overline{ب م}$ المشترك،
فيبقى سطح $\overline{ا م}$ مثل $\overline{م ك}$. فنجعل ط م مشتركاً، فسطح $\overline{د ك}$ مثل $\overline{ا ز}$.


6 فالقسم: تأكل موضع أول الكلمة [ب] - 7 وقع: لوقع [ب. ل] - 9 ب ا: تنتهي الصفحة
بعد ب وقبل ا [ل] - 17 ز ط: الزاي هنا خلافاً للعادة معجمة [ب]. ولقد نقلها ناسخ [ل]. أيضاً
معجمة.

فأضلاعها متكافئة في النسبة، فنسبة $\overline{ط ك}$ - أعني $\overline{أ ب}$ - إلى $\overline{أ ط}$ كنسبة $\overline{ط ز}$ إلى $\overline{د ط}$. فنسبة مربع $\overline{أ ب}$ إلى مربع $\overline{أ ط}$ كنسبة مربع $\overline{ط ز}$ إلى مربع $\overline{د ط}$. ولأن ضرب $\overline{ج ط}$ في $\overline{د ط}$ مثل مربع $\overline{ط ز}$ ، $ل - ٩٦ - ط$ فنسبة خط $\overline{ط ج}$ إلى $\overline{ط ز}$ كنسبة $\overline{ط ز}$ إلى $\overline{ط د}$ ؛ فنسبة مربع $\overline{ط ز}$ إلى مربع $\overline{ط د}$ كنسبة $\overline{ط ج}$ إلى $\overline{ط د}$. فنسبة مربع $\overline{أ ب}$ إلى مربع $\overline{أ ط}$ كنسبة $\overline{ط ج}$ إلى $\overline{ط د}$. فضرب مربع $\overline{أ ب}$ في خط $\overline{د ط}$ مثل ضرب مربع $\overline{أ ط}$ في $\overline{ج ط}$ ، فنجعل مكعب $\overline{أ ط}$ مشتركاً، فيكون مربع $\overline{أ ط}$ في $\overline{ج ط}$ مثل مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ط د}$ مع مربع $\overline{أ ط}$ في $\overline{أ ط}$. ونزيد على كلا الجانبين مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{أ د}$ ، فيصير أحد الجانبين $\overline{أ ط}$ في $\overline{أ ج}$ ، مع مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{أ د}$ ، والجانب الآخر مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{أ ط}$ مع مكعب $\overline{أ ط}$ ؛ فإذا جعلنا $\overline{أ ط}$ جذراً يكون مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{أ ط}$ هو الجذور، ومربع $\overline{أ ط}$ في $\overline{أ ج}$ هو الأموال. فالأموال والعدد في جانب والجذور مع مكعب $\overline{أ ط}$ في جانب آخر، فالأموال والعدد مثل المكعب والجذور.



4 إلى $\overline{ط ز}$: إلى $\overline{ط د}$ [ب. ل] - 54 - فنسبة مربع $\overline{ط د}$: ناقصة [ل] - 7 مكعب: مربع [ب. ل] - 8 - في $\overline{ط د}$: كتب ناسخ [ل]. بعدها مع مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ط د}$ وهو تكرر لما قبله بعد أن كتب كلمة مع - 12 $\overline{أ ج}$: ج [ب، ل] - 13-12 والجذور... في جانب: ناقصة [ل]


وليكن \overline{AD} مثل \overline{AJ} فأقول: إن \overline{AJ} هو المطلوب؛ لأننا إذا جعلناه جذراً فيكون ضربه في مربع \overline{AB} هو الجذور، وقد كان مثل العدد، فالجذور تساوي العدد، ومربع \overline{AJ} - وهو المال - في \overline{AJ} هو المكعب، وهو الأموال أيضاً؛ فالعدد والأموال تساوي المكعب والجذور.



- 5 وليكن \overline{AD} أعظم من \overline{AJ} ، فنخرج عمودي \overline{DH} \overline{BH} ليحصل سطح \overline{B} \overline{D} قائم الزوايا، ونعمل على \overline{J} \overline{D} نصف دائرة، ونعمل / فيما بين \overline{J} - \overline{D} وخطي \overline{B} \overline{V} \overline{B} \overline{L} قطعاً زائداً على الوجه المذكور، ويمرّ بحيطه بنقطة \overline{D} . ونبين كما بينا أنه يدخل في الدائرة ويقطعها على نقطة أخرى، وليكن على \overline{Z} . فنخرج عمود \overline{Z} \overline{P} ، ونخرجه إلى \overline{K} ، فيكون سطح \overline{D} \overline{K} مثل \overline{AZ} بمثل 10 ما مرّ، فأضلاعها متكافئة في النسبة. فنسبة \overline{AP} إلى \overline{PK} - أعني \overline{AB} - كنسبة \overline{PD} إلى \overline{PZ} ، ونسبة مربع \overline{AP} إلى مربع \overline{AB} كنسبة مربع \overline{PD} إلى مربع \overline{PZ} أعني «نسبة» خط \overline{PD} إلى \overline{PZ} . فنسبة مربع « \overline{AP} إلى مربع» \overline{AB} كنسبة \overline{PD} إلى \overline{PZ} . فضرب مربع \overline{AP} في خط \overline{PD} مثل ضرب مربع \overline{AB} في \overline{PD} . فلأن مكعب \overline{AP} مع 15 مربع \overline{AB} في \overline{AD} - وهو العدد - يعادل مربع \overline{AB} في \overline{AD} مع مكعب

$$\begin{aligned} 5 \text{ د هـ : ج هـ } [\text{ب، ل}] - 6 \text{ ب د : ج ب } [\text{ب، ل}] / \text{ج د : ج } [\text{ب، ل}] - 7 \text{ د : ج } [\text{ب، ل}] \\ 9 \text{ د ك : ج ك } [\text{ب، ل}] - 11 \text{ ط ز : ط ج } [\text{ب، ل}] - 12 \text{ ط د : ط ز } [\text{ب، ل}] / \\ \text{ط ز : ط ج } [\text{ب، ل}] - 14 \text{ ن : ن } [\text{ب، ل}] \end{aligned}$$

$\overline{ا ط}$ ؛ فتنقص من مكعب $\overline{ا ط}$ مربع $\overline{ا ط}$ في $\overline{ط ج}$ ، وننقص من مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ا د}$ مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ط د}$ ؛ يبقى في أحد الجانبين مربع $\overline{ا ط}$ في $\overline{ا ج}$ مع مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ا د}$ ، وفي الجانب الآخر مكعب $\overline{ا ط}$ مع مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ا ط}$ ، فهما معادلان لتعادل المتقوسين؛ فإذا جعلنا $\overline{ا ط}$ جذراً،
 5 فمربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ا ط}$ هو الجذور، ومربع $\overline{ا ط}$ في $\overline{ا ج}$ هو الأموال؛
 فالمكعب مع الجذور مثل الأموال مع العدد؛ وذلك ما أردنا بيانه.



وأما استخراج المطلوب / فنضع العدد على التخت، ونضع فوقه أصفار ١ - ٩٧ - ظ
 الكعب، فيكون / للمسألة صور ثلاث:

ب - ٦ - ظ

الصورة الأولى:

10 أن يكون المرتبة السميّة للكعب الأخير أرفع من آخر مراتب عدد
 الأموال ومن المرتبة السميّة للجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور،
 مثل قولنا: مكعب وثلاثمائة جذر يعدل ثلاثين مالاً وعدداً بهذه الصورة
 ٣٠٠٨١٢٣١؛ فنستخرج مطلوب الكعب الأخير وننقل آخر مراتب عدد
 الأموال إلى المرتبة المنحطة عن المطلوب بقدر انحطاط مرتبته عن المرتبة

9 ناقصة [ل] - 12 مكعب: كعب [ب. ل]

ونضع المطلوب الثالث وهو الواحد، ونعمل به العمل المذكور إلى آخره. وإذا فرغنا من العمل نزيد ثلث عدد الأموال على السطر الأعلى، فيحصل السطر الأعلى بهذه الصورة ٣٢١، وهو الجذر المطلوب.

الصورة الثانية:

- 5 أن يكون المرتبة السمية للجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور أرفع من < المرتبة السمية > للكعب الأخير ومن آخر مراتب عدد الأموال، كما في قولنا: مكعب < وجذور > بهذه العدة ٣..... يعدل ثلاثين مالا وعدداً بهذه الصورة ٩٩٢٩٨٤٩٣١، فنجعل عدد الجذور كالمقسوم عليه، والعدد كالمقسوم، ونستخرج مكان مطلوب القسمة، ونعرف الكعب السمي مرتبة هذا المطلوب. فهناك مكان المطلوب. ونقل مرتبة الجذر 10 الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور إلى المرتبة المرفوعة عن الكعب الذي هو مكان المطلوب بقدر ارتفاع الجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور عن مرتبة الجذر السمي للكعب الذي هو مكان المطلوب؛ ونقل آخر مراتب عدد الأموال إلى المرتبة المرفوعة أو المنحطة عن الكعب الذي 15 هو مكان المطلوب بقدر / ارتفاع آخر مراتب عدد الأموال عن المرتبة ٩٩ - ٩ - ٩ هو مكان السمية للكعب الذي هو مكان المطلوب، أو انحطاطه عنه. لكن مكان المطلوب القسمة في المثال هو المئات، والكعب السمي إنما هو الكعب الثالث، فهناك مكان المطلوب، ومرتبة الجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور مرفوعة عن الكعب الذي هو مكان المطلوب بمرتبتين؛ فكان 20 آخر مراتب عدد الجذور هو المرتبة الأخيرة من العدد، وآخر < مراتب >

3-2 فيحصل السطر: فيحصل للسطر [ب، ل] - 4 ناقصة [ل] - 7 مكعب: كعب [ب، ل] /
(وجذور): في [ب]، هناك مكان لكلمة محمودة، ناقصة [ل] - 20 الأخيرة: الأخير [ب، ل]

عدد الأموال منقطاً عن المرتبة السمية للكعب الذي هو مكان المطلوب بمرتبة، فنقلنا آخر عدد الأموال إلى المرتبة المنقطه عن الكعب الذي هو مكان المطلوب بمرتبة، فحصل بهذه الصورة ٩٩٢٩٨٤٩٣١ ، ثم نرد كل واحد من عدد الجذور والأموال إلى الثلث، ونطلب عدداً نضربه في آخر ثلث 5 عدد الجذور، وننقص ثلاثة أمثال الضرب من العدد وهو الثلاثة، فنضعه في الكعب الثالث، ونضربه في ثلث عدد الأموال، ونضع المبلغ في سطر فوقه، ونضربه في المبلغ، ونزيد ثلاثة أمثال الضرب على العدد، ونبطل مضروب المطلوب في ثلث عدد الأموال؛ ثم ننقص مكعب المطلوب / من ٩٩ - ٩٩ - ٥ العدد، ونضربه في ثلث عدد الجذور، وننقص ثلاثة أمثال كل ضربة من 10 العدد، فيحصل بهذه الصورة ٩٩٢٩٨٤٩٣١ ؛ ثم نضع مربع المطلوب بجذائه في السطر الذي فيه عدد الجذور / ونضرب المطلوب في ثلث عدد الأموال، ب - ٧ - و، وننقص ضعف المبلغ من مربع المطلوب، وننقص ثلث عدد الأموال من المطلوب، ونبطل ثلث عدد الأموال، فيحصل بهذه الصورة ٩٩٢٩٨٤٩٣١ ؛ ثم نقل الأعلى بمرتبتين والأسفل بمرتبة، ونعمل العمل السابق إلى آخره. وإذا 15 فرغنا من العمل نزيد ثلث عدد الأموال على السطر الأعلى، فيحصل بهذه الصورة ٣٢١، وهو الجذر المطلوب.

الصورة الثالثة:

أن يكون آخر مراتب عدد الأموال أرفع من المرتبة السمية للكعب الأخير، ومن المرتبة السمية للجذر الأخير من الجذور المقابلة لعدد الجذور، 20 كما في قولنا: مكعب وثلاثمائة جذر يعدل ثلاثمائة وأحدًا وعشرين مالاً وعدداً بهذه الصورة ٩٩٣٠٠؛ فنطلب الكعب السمي لآخر مراتب عدد

10 نسخ الجدول في ب هكذا ٩٩٢٩٨٤٩٣١ - 17 ناقصة [ل] - 20 مكعب: كعب [ب، ل] /
عشرون: [ب، ل]

- الأموال، فيكون هناك مكان المطلوب. فنقل آخر مراتب عدد الأموال / إلى تلك المرتبة، ونقل آخر مراتب عدد الجذور إلى المرتبة المنحطة عن $ل - ١٠٠ - ر$ مكان المطلوب بقدر انحطاطه عن مرتبة الجذر السميّ للكعب الذي هو مكان المطلوب. لكنّ الكعب السميّ لآخر مراتب عدد الأموال في المثال 5 إنما هو الكعب الثالث. فنقلنا إليه آخر مراتب عدد الأموال. وآخر مراتب عدد الجذور منحنّة عن مرتبة الجذر السميّ للكعب - الذي هو مكان المطلوب - بمرتبتين. فنقلنا آخر مراتب عدد الجذور إلى المرتبة المنحطة عن الكعب - الذي هو مكان المطلوب - بمرتبتين، فصار بهذه الصورة ٠٠٩٦٣٠٠ ؛ ٣٢١ ؛ ثم نجعل آخر مراتب عدد الأموال مطلوباً، وهو ثلاثة في المثال، 10 ونضعه في الكعب الثالث، ونضربه في مراتب عدد الأموال ونضع المبلغ في سطرٍ أوسط بين العدد وبين عدد الأموال، ونضربه في الحاصل ونزيد المبلغ على العدد؛ ثم نبطل السطر الذي بين العدد وبين عدد الأموال؛ ثم نردّ كل واحد من عدد الأموال والجذور إلى الثلث ونضع ثلث عدد الجذور فيما بين العدد وبين ثلث عدد الأموال على هذه الصورة ٢٨٩٨٦٣٠٠ ، ونقص 15 مكعب المطلوب من / العدد، ونضربه في ثلث عدد الجذور، ونقص $ل - ١٠٠ - ط$ ثلاثة أمثال الضرب من العدد، ونضع مربعه بخدائه في السطر الذي فيه عدد الجذور، ثم نضرب المطلوب في ثلث عدد الأموال، ونقص ضعف المبلغ من مربع المطلوب، ونقص ثلث عدد الأموال من المطلوب ونبطل السطر الذي فيه ثلث عدد الأموال، فيحصل بهذه الصورة ١٨٩٦٣٠٠ ؛ ٢٥٩٠٠ ؛ ثم 20 نقل الأعلى بمرتبتين، والأسفل بمرتبة، ونعمل العمل السابق إلى آخره. وإذا فرغنا من العمل نزيد ثلث عدد الأموال على السطر الأعلى، فيحصل السطر الأعلى بهذه الصورة ٣٢١ ، وهو الجذر المطلوب.

وأما بيان جهة العمل : فالمكعب مع المسطح الأول يعادل العدد مع المسطح الثاني. فالمسطح الثاني مع العدد عددٌ يعدل مكعباً وجذوراً. والكلام في هذه المسألة مثل الذي مرّ في المسألة التي قبلها، ولا يتعيّن آخر الجذر المطلوب في أول الأمر إلّا بمثل ما تبين في تلك المسألة، ولا يختص 5 أعمالها بشيء إلّا وقد تضمن بيانها المسائلُ المتقدمة ؛ وذلك ما أردنا بيانه.

فهذه هي المسائل التي يجتمع فيها الكعب مع / العدد، ولا يقع فيها ل - ١٠١ - و المستحيل.

المعادلات

⟨II⟩

﴿ معادلات الدرجة الثالثة التي يقع فيها المستحيل ﴾

وأما المسائل التي يقع فيها المستحيل فخمسة مسائل:
المسألة الأولى: مكعبٌ وعددٌ يعدل أموالاً.

5 فليكن $\overline{أ ب}$ عددُ الأموال. فلأن المال إذا ضرب في الجذر المطلوب حصل المكعب فقط: فإذا ضرب في عدد الأموال حصل المكعب مع العدد. فيجب أن يكون عدد الأموال أعظم من الجذر المطلوب، فيكون مربعه - وهو المال - في $\overline{أ ب}$ - وهو عدد الأموال - مجسماً قاعدته مربع $\overline{ب ج}$ ، وارتفاعه مثل $\overline{أ ب}$ ، يساوي مكعب $\overline{ب ج}$ مع العدد. فإذا فصل منه المكعب - وهو ضرب مربع $\overline{ب ج}$ في خط $\overline{ب ج}$ - يكون الباقي من هذا المجسم، وهو مربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{أ ج}$ ، مثل العدد. فمن ضرورة هذه المسألة أن ينقسم خط $\overline{أ ب}$ - وهو عدد الأموال - بقسمين يكون مربع أحدهما في الآخر مثل العدد، حتى لو امتنعت القسمة على هذا الوجه تكون المسألة مستحيلة.

8 مربعه: أضاف ناسخ [ل]. بعدها «المطلوب» فأصبحت «مربعه المطلوب» وهذا خطأ. وهي في [ب]. محمودة بعض الشيء، ولكن يمكن التعرف على بداية كلمة مربع وعلى «هو مال» وما تبقى من مكان لا يكتفي لكلمة «المطلوب». فيبدو أن ناسخ [ل]. أضاف هذه الكلمة دون اضطراب. والضمير في مربعه يعود على الجذر المطلوب / مجسماً: مجسم [ب. ل]

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

ثم نقول: إذا كان a ج ثلث a ب - الذي هو عدد الأموال - وقسم a ب عند نقطة d على خط a ج، وعند نقطة h على خط b ج، كيف اتفقت هاتان النقطتان، فإن مربع b ج في a ج أعظم من كل واحد من مربع b د في a ، ومن مربع b ه في a ، حتى يلزم من ذلك أنه $a - 101 - \text{ظ}$ لو كان العدد أكثر من مربع b ج، الثلثين، في a ج، الثالث، فلا يمكن أن ينقسم عدد الأموال - وهو a ب - إلى قسمين على وجه يكون فيه مربع أحدهما في الآخر مثل العدد، فيكون المسألة مستحيلة. وإذا كان مساوياً له أو أقل / تكون ممكنة.

ب - 7 - ظ

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

ولنبين أولاً أن مجسم مربع b ج في a ج - ونسميه المجسم الأول - أعظم من مجسم مربع b د في a ، ونسميه المجسم الثاني. 10 فلأن المجسم الأول ينقسم إلى مربع b ج في a د وإلى مربع b ج في a ج، والمجسم الثاني ينقسم إلى مربع b ج في a د وإلى مجسم قاعدته العلم الذي هو فضل مربع b د على مربع b ج، وارتفاعه a د، ونسميه علم d ج، فإذا ألقينا مربع b ج في a المشترك يبقى من المجسم الأول مربع b ج في d ج، ومن المجسم الثاني علم d ج في a د. فلأن علم d ج حاصل من ضرب d ب b ج في d ج وب b ج ضعف a ج، فربع b ج ضعف ضرب b ج في a ج، وضعف ضرب b ج في a ج مثل ضعف b ج في a د وفي d ج، وضرب جميع d ب b ج في a د هو ضعف b ج في a د مع d ج في a د. فإذا ألقينا ضعف b ج في a د

14 ألقينا: القنا (ب، ل)

المشترك، يبقى من أحدهما ضعف $\overline{ب ج}$ في $\overline{د ج}$ ، ومن الآخر ضرب $\overline{د ج}$ في $\overline{ا د}$. وب $\overline{ج}$ / أعظم من $\overline{ا ج}$ ، فهو أعظم من $\overline{ا د}$ ، فضعف $\overline{ب ج}$ $\overline{د ج}$ - ١٠٢ - و
في $\overline{د ج}$ أعظم من $\overline{د ج}$ في $\overline{ا د}$. فإذا زدنا على ضعف $\overline{ب ج}$ في $\overline{د ج}$ ،
الأعظم، ضعف $\overline{ب ج}$ في $\overline{ا د}$ ؛ حصل ضعف $\overline{ب ج}$ في $\overline{ا ج}$ ، و(إذا)
5 زدناه بعينه على $\overline{د ج}$ في $\overline{ا د}$ ، الأصغر، حصل $\overline{د ب ب ج}$ في $\overline{ا د}$ ؛
فيكون ضعف ضرب $\overline{ب ج}$ في $\overline{ا ج}$ - أعني مربع $\overline{ب ج}$ - أعظم من
ضرب $\overline{د ب ب ج}$ في $\overline{ا د}$. فنسبة $\overline{د ب ب ج}$ إلى $\overline{ب ج أصغر}$ من نسبة
 $\overline{ب ج}$ إلى $\overline{ا د}$. فإذا جعلنا نسبة $\overline{د ج}$ إلى $\overline{ب ج}$ مشتركة، فتصير النسبة
المؤلفة من نسبة $\overline{د ج}$ إلى $\overline{ب ج}$ ، ومن نسبة $\overline{د ب ب ج}$ إلى $\overline{ب ج أصغر}$
10 من النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{د ج}$ إلى $\overline{ب ج}$ ، ومن نسبة $\overline{ب ج}$ إلى $\overline{ا د}$.
لكن النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{د ج}$ إلى $\overline{ب ج}$ ، ومن نسبة $\overline{د ب ب ج}$ إلى
 $\overline{ب ج}$ ، هي نسبة العلم إلى مربع $\overline{ب ج}$ ، والنسبة المؤلفة من نسبة $\overline{د ج}$ إلى
 $\overline{ب ج}$ ، ومن $\overline{ب ج}$ إلى $\overline{ا د}$ هي نسبة $\overline{د ج}$ إلى $\overline{ا د}$. فنسبة علم $\overline{د ج}$ إلى
مربع $\overline{ب ج أصغر}$ من نسبة $\overline{د ج}$ إلى $\overline{ا د}$. فـضرب علم $\overline{د ج}$ في $\overline{ا د أصغر}$
15 من ضرب مربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{د ج}$. فإذا جعلنا (ضرب) مربع $\overline{ب ج}$ (في
 $\overline{ا د}$ مشتركاً، فيصير ضرب مربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{ا ج}$ أعظم من ضرب مربع
 $\overline{ب د}$ في $\overline{ا د}$.

$$\frac{ا}{ب} = \frac{د}{ج}$$

وأقول أيضاً: إنه أعظم من ضرب مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$. فلأن المجسم
الأول ينقسم إلى مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ج}$ وإلى ضرب $\overline{ج ب ه}$ في $\overline{ه ج}$ -

2 وب $\overline{ج}$: كتب ناسخ [ب]، الباء مثل الميم، وهكذا نقلها ناسخ [ل] / $\overline{ا د}$: $\overline{د ج}$ [ب]، [ل] /
ضعف: ضعف [ب]، [ل] - 3 $\overline{د ج}$ (الأولى): $\overline{ا د}$ [ب]، [ل] / زدنا: أزدنا [ل]، مما يدل على استعمال فعل
وأزاده في لغة هذه الفترة / $\overline{د ج}$: $\overline{ا د}$ [ب]، [ل] - 4 $\overline{ا د}$: $\overline{د ج}$ [ب]، [ل]


أعني العلم - ثم في $\overline{اج}$ ، والمجسم الثاني - أعني / مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ - $\overline{ج ه}$ - $\overline{د ه}$ - $\overline{ه ه}$ ينقسم إلى ضرب مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ج ه}$ وإلى ضرب مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ج}$ ، فإذا ألقينا مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ج}$ المشترك، يبقى من المجسم الأول العلم المذكور في $\overline{ا ج}$ ، ومن المجسم الثاني مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ج ه}$. فلأن نقصان مربع $\overline{ب ه}$ عن مربع $\overline{ب ج}$ ، المساوي لضعف $\overline{ب ج}$ في $\overline{ا ج}$ ، هو ضرب $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب ه}$ في $\overline{ج ه}$ العلم، ونقصان ضرب $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ج}$ عن ضعف $\overline{ب ج}$ في $\overline{ا ج}$: إنما هو ضرب $\overline{ج ه}$ في $\overline{ا ج}$ ؛ لكن ضرب $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ج}$ أعظم من ضرب $\overline{ا ج}$ في $\overline{ج ه}$ لأن $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب ه}$ أعظم من $\overline{ا ج}$ ؛ فنقصان مربع $\overline{ب ه}$ عن مربع $\overline{ب ج}$ أكثر من نقصان [مربع] ضرب $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ج}$ عن مربع $\overline{ب ج}$. فربع $\overline{ب ه}$ أصغر من ضرب $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ج}$. فنسبة $\overline{ب ج}$ إلى $\overline{ب ه}$ إلى $\overline{ب ه}$ أعظم من نسبة $\overline{ب ه}$ إلى $\overline{ا ج}$ ؛ فنجعل نسبة $\overline{ج ه}$ إلى $\overline{ه ب}$ مشتركة، فيكون النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ج ه}$ إلى $\overline{ه ب}$ ومن نسبة $\overline{ب ج}$ إلى $\overline{ب ه}$ أعظم من النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ج ه}$ إلى $\overline{ه ب}$ ومن نسبة $\overline{ه ب}$ إلى $\overline{ا ج}$. لكن النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ج ه}$ إلى $\overline{ه ب}$ ، ومن نسبة $\overline{ب ج}$ إلى $\overline{ب ه}$ هي نسبة العلم إلى مربع $\overline{ه ب}$ ؛ والنسبة المؤلفة / من نسبة $\overline{ج ه}$ إلى $\overline{ه ب}$ ، ومن نسبة $\overline{ب ج}$ إلى $\overline{ب ه}$ هي نسبة $\overline{ه ب}$ إلى $\overline{ا ج}$ هي نسبة العلم إلى مربع $\overline{ه ب}$ أعظم من نسبة $\overline{ج ه}$ إلى $\overline{ه ب}$ في $\overline{ا ج}$. فحضر العلم في $\overline{ا ج}$ أعظم من ضرب مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ج ه}$. فإذا جعلنا مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ج}$ مشتركاً، كان ضرب مربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{ا ج}$ أعظم من مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$. فقد تبين أن مربع $\overline{ب ج}$ ، الثلاثين، في $\overline{ا ج}$ ، الثلث، أعظم مجسم يمكن أن يحصل من ضرب مربع أحد قسمي $\overline{ا ب}$ في القسم الآخر.

والآخر ضعف $\overline{ب ج}$ في $\overline{ج ه}$ ثم في $\overline{ج ه}$ ، أعني ضرب ضعف $\overline{ب ج}$ في مربع $\overline{ج ه}$. فالجسم الأول يساوي ضرب مربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{أ ه}$ ، وضرب ضعف $\overline{ب ج}$ في $\overline{ج ه}$ ثم في $\overline{أ ه}$ ، وضرب ضعف $\overline{ب ج}$ في مربع $\overline{ج ه}$. وهذا القسم الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: مربع $\overline{ج ه}$ في $\overline{أ ب}$ ،

5 ومربع $\overline{ج ه}$ في $\overline{أ ه}$ ، ومربع $\overline{ج ه}$ / في $\overline{ج ه}$ ، وهو مكعب $\overline{ج ه}$. فصار ل - 104 - و

المجسم الأول خمسة أقسام: أحدها مربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{أ ه}$ ، والثاني ضعف $\overline{ب ج}$ في $\overline{ج ه}$ ثم في $\overline{أ ه}$ ، والثالث مربع $\overline{ج ه}$ في $\overline{أ ب}$ ، والرابع مربع $\overline{ج ه}$ في $\overline{أ ه}$ ، والخامس مكعب $\overline{ج ه}$. لكن مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{أ ه}$ يساوي ضرب ضعف $\overline{ب ج}$ في $\overline{ج ه}$ ثم في $\overline{أ ه}$ ، ومربع $\overline{ج ه}$ في $\overline{أ ه}$ ، ومربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{أ ه}$. 10

أحدهما مربع $\overline{ج ه}$ في $\overline{أ ب}$ ، أعني مربع $\overline{أ د}$ في $\overline{أ ب}$ ، والثاني مكعب $\overline{ج ه}$ ، أعني مكعب $\overline{أ د}$. فمربع $\overline{أ د}$ في $\overline{د ب}$ مع مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{أ ه}$ مثل الجسم الأول. ولأن مكعب $\overline{أ د}$ مع ضرب مربعه في $\overline{أ ب}$ مساوٍ لعدد ك، وهو فضل الجسم الأول على العدد المسؤول؛ فمربع $\overline{أ د}$ في $\overline{د ب}$ مع العدد المسؤول مساوٍ للجسم الأول. فمربع $\overline{أ د}$ في $\overline{د ب}$ مع العدد المسؤول مثل مربع $\overline{أ د}$ في $\overline{د ب}$ ، مع مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{أ ه}$. فإذا ألقينا مربع $\overline{أ د}$ في $\overline{د ب}$ ، يبقى مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{أ ه}$ مثل العدد المسؤول، ف $\overline{ب ه}$ مطلوبنا في هذه المسألة، وهو أعظم من ثلثي $\overline{أ ب}$.



د ا ج ب

7 ثم في $\overline{أ ه}$: ناقصة [ل] - 10-9 ومربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{أ ه}$: ناقصة [ل] - 10 الجسم [ب] -
12 $\overline{ب ه}$ في $\overline{أ ه}$: $\overline{أ ه}$ في $\overline{ب ج}$ [ب، ل] - 14 المسؤول: المقصود هنا وإلى آخر النص العدد الذي هو موضع السؤال، ولن نشير لهذا مرة أخرى - 17 $\overline{ب ه}$ في $\overline{أ ه}$: $\overline{أ ه}$ في $\overline{ب ه}$ [ب، ل]

وأما المطلوب الآخر: فلأن $\overline{اه}$ $\overline{ب ه}$ كل واحد منهما حاصل معلوم،
 $\overline{وب ه}$ أعظم من $\overline{اه}$ ، فيفصل $\overline{ب ز}$ / مثل $\overline{اه}$. فلأن $\overline{ب ز}$ معلوم؛ ل - ١٠٤ - ط
 فنجعله عدد الجذور، وسطح $\overline{ب ه}$ في $\overline{اه}$ معلوم نجعله عدداً. ونستخرج
 المطلوب على مسألة: مال وجذور بعدة $\overline{ب ز}$ يعدل عدداً هو ضرب $\overline{ب ه}$
 5 في $\overline{اه}$. وليكن المطلوب - الذي نُخرج - خط $\overline{ط ز}$. فلأن ضرب
 $\overline{ب ه}$ في $\overline{اه}$ مثل ضرب $\overline{ط ز}$ في $\overline{ط ب}$ ؛ فنسبة $\overline{ب ه}$ إلى $\overline{ط ب}$ كنسبة
 $\overline{ط ز}$ إلى $\overline{اه}$ ، أعني $\overline{ز ب}$ ، فبالتركيب: نسبة $\overline{ب ه}$ إلى $\overline{ط ب}$ إلى $\overline{ط ب}$
 كنسبة $\overline{ط ز}$ إلى $\overline{ز ب}$ ، أعني $\overline{ط ب}$ إلى $\overline{اه}$. فنجعل نسبة $\overline{ط ب}$
 إلى $\overline{ط ب}$ مشتركة، فيكون النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ط ب}$ إلى $\overline{ط ب}$ ومن
 10 نسبة $\overline{ب ه}$ إلى $\overline{ط ب}$ إلى $\overline{ط ب}$ كالنسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ط ب}$ إلى $\overline{ط ب}$ ،
 ومن نسبة $\overline{ط ب}$ إلى $\overline{اه}$. لكن المؤلفة الأولى هي نسبة ضرب $\overline{ط ب}$ في
 $\overline{ب ه}$ إلى $\overline{ط ب}$ - وهو العلم - إلى مربع $\overline{ط ب}$ ، والمؤلفة الثانية هي نسبة
 $\overline{ط ب}$ إلى $\overline{اه}$. فنسبة العلم إلى مربع $\overline{ط ب}$ كنسبة $\overline{ط ب}$ إلى $\overline{اه}$.
 فبالتركيب: نسبة العلم مع مربع $\overline{ط ب}$ - أعني مربع $\overline{ب ه}$ - إلى مربع
 15 $\overline{ب ه}$ كنسبة $\overline{ط ب}$ إلى $\overline{اه}$. فضرب مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{اه}$ مثل ضرب مربع
 $\overline{ط ب}$ في $\overline{اه}$. لكن مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{اه}$ مثل العدد، فمربع $\overline{ط ب}$ في ل - ١٠٥ - و
 $\overline{ط ب}$ مثل العدد. فخط $\overline{ط ب}$ هو المطلوب الآخر. ونقطة $\overline{ط}$ لاتقع مثل
 نقطة $\overline{ه}$ وإلا كان ضرب $\overline{اه}$ في $\overline{ب ه}$ مثل ضربه في $\overline{ز ه}$ ف $\overline{ز ه}$ مثل
 $\overline{ز ب}$ أعني $\overline{اه}$ ، ف $\overline{ب ه}$ ثلثا $\overline{اب}$ ، و $\overline{اه}$ ثلثه، وقد كان $\overline{اج}$ ثلث
 20 $\overline{اب}$ ، هذا خلف. ولاتقع على موضع الثلثين، وإلا كان ضرب مربع

3 سطح: يعني مربع $\overline{ب ه}$ - 18 وإلا كان: [ل] / $\overline{اه}$ في $\overline{ب ه}$: $\overline{اب}$ في $\overline{ه ز}$
 (ب، ل] / $\overline{ه ز}$: $\overline{ز ب}$ (ب، ل] / $\overline{ه ز}$: فهو (ب، ل] - 20 وإلا كان: [ل] / $\overline{اه}$ في $\overline{ب ه}$: $\overline{اب}$ في $\overline{ه ز}$

ب ط في ا ط مثل المحسّم الأول وهو محال. ف ط ب أصغر من المطلوب الأعظم، وليس هو ثلثي ا ب، فهو أصغر من الثلثين.

$$\frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{10}$$

ثم المطلوب الأعظم في هذه المسألة يخرج من مسألة: مكعب وأموال يعدل عدداً. وليكن ا ب عدد الأموال، وب ج ثلثي ا ب، فربع ب ج في 5 ا ج هو المحسّم الأول ونُسَمِّيه العدد الأعظم. وليكن مربع ب ط في ا ط مثل العدد المسؤول الذي هو أقل من العدد الأعظم. وقد تبين أن الذي يخصّ المحسّم الأول هو مربع ب ج في ط ج، والذي يخصّ المحسّم الثاني هو العَلَم الحاصل من ضرب ط ج في ط ب ب ج ثم في ا ط. فلأن ا ب عدد معلوم، وب ج - ثلثاه - عدد معلوم، وا ج - 10 ثلثه - عدد معلوم، فينقص العدد المسؤول من المحسّم الأول، فيبقى عدد التفاوت معلوماً، وهو فضل المحسّم الأول على المحسّم الثاني، أعني فضل ما يخصّ المحسّم الأول على ما يخصّ المحسّم الثاني، وهو فضل مربع ب ج في ج ط / على عَلَم ط ج في ط ب ب ج، ثم في ا ط. فليكن ط ج ل - ١٠٥ - ط شيئاً؛ فضرب مربع ب ج في ط ج أشياء بعدة عدد مربع ثلثي عدد 15 الأموال، وهو أشياء بعدة أربعة أتساع مربع عدد الأموال، وهو الذي يخصّ المحسّم الأول. ولأن أحد ضلعي العَلَم - وهو ط ج - شيء، فضله الآخر وهو ط ب ب ج ضعف ثلثي عدد الأموال وشيء، وهو مثلُ وثلث عدد الأموال، وشيء. لكن ضرب الشيء في مثل وثلث عدد الأموال يكون أشياء بعدة مثل وثلث عدد الأموال؛ وضرب الشيء في

3 من: ناقصة [ل] - 5 في: من [ب، ل] - 8 ضرب ط ج: ضرب هـ [ب، ل] - 17 فضله: وضله [ب، ل]

الشيء مال، ومجموعهما العلم. فإذا ضربناه في $\overline{ا ط}$ - وهو ثلث عدد الأموال إلا شيئاً - يصير أشياء عدتها أربعة أتساع مربع عدد الأموال، إلا أموالاً بعدة عدد الأموال وإلا كعباً، وهو ما يخص المحسم الثاني. فالذي يخص المحسم الثاني: إذا زيد عليه عدد التفاوت يصير مساوياً لما

5 يخص المحسم / الأول. فيكون: أشياء عددها أربعة أتساع مربع عدد ب - 8 - ط

الأموال يعدل أشياء عددها أربعة أتساع مربع عدد الأموال مع عدد التفاوت، إلا أموالاً عدتها عدد الأموال إلا كعباً. فإذا جبرنا المستثنى منه

بزيادة المستثنى عليه، وزدنا مثله / على الجانب الآخر، وقابلنا أحدهما ل - 106 - و

بالآخر، وألقينا المشترك يصير أموالاً عدتها عدد الأموال، ومكعباً يعدل

10 التفاوت. فقد تبين أن مربع $\overline{ط ج}$ إذا ضرب في $\overline{ا ب}$ - وهو عدد

الأموال - وأضيف إلى ذلك مكعب $\overline{ط ج}$ ، يكون المبلغ مساوياً لعدد

التفاوت. فإذا جعلنا عدد الأموال كما هو بعينه عدد أموال، وجعلنا عدد

التفاوت عدداً، واستخرجنا المطلوب بمسألة مكعب وأموال يعدل عدداً،

يخرج لنا $\overline{ط ج}$ الشيء، فتزيده على ثلثي عدد الأموال، فيحصل المطلوب

15 الأعظم.

ا ط ج ب

مثاله: مكعب وعدد بهذه الصورة ١٤٨٣٧٩٠٤ يعدل أربعاً وخمسة وستين مالا. فلأن ثلث عدد الأموال مائة وخمسة وخمسون، وثلثاه ثلاثمائة وعشرة، ومربع الثلاثين ستة وتسعون ألفاً ومائة، ومضروب هذا المربع في الثلث بهذه الصورة ١٤٨٩٥٥٠٠ وهو العدد الأعظم، نقصنا منه

3 كتب ناسخ [ب]، واو هو إله كأنها وفي، وهذا ما نقله ناسخ [ل] - 7 - إلا كعباً: وإلا كعباً [ب، ل] / منه: ناقصة [ل] - 8 - بزيادة المستثنى: في هامش [ل]

العدد المسؤول، فيبقى بهذه الصورة ٥٧٥٩٦، فهذا العدد يعدل مكعباً وأربعمئة وخمسة وستين مالا. فنضع العدد على التخت ونستخرج المطلوب بالطريق الذي مرّ في مسألة: مكعب وأموال يعدل / عدداً، فيخرج أحد ١ - ١٠٦ - ظ
عشر فتزيده على ثلثي عدد الأموال، فيحصل بهذه الصورة ٢٢١، وهو
5 الجواب الأعظم.

وأما الأصغر فنقول أولاً: إن كلَّ خطٍّ يُقسم بقسمين، فإنَّ ضربَ أحدِ القسمين في الآخر وضربَ الحاصل في جميع الخطِّ مساوٍ لضرب مربع كلِّ واحد من القسمين في القسم الآخر.

فليكن جـ ب مقسوماً على د، فأقول: إن ضربَ جـ د في د ب، ثمَّ المبلغ في جـ ب مساوٍ لضرب مربع جـ د في د ب، مع ضرب مربع د ب في د جـ. لأن جـ د في د ب ثمَّ في جـ ب مساوٍ لضرب جـ ب في جـ د ثمَّ في د ب، وإذا ضربَ جـ ب في جـ د، ثمَّ في د ب حصل ضربُ كلِّ واحدٍ من قسمي المسطح في د ب، وأحدُ قسميه مربعُ جـ د وقسمه الآخر مسطحُ جـ د في د ب. لكن مسطحَ جـ د في د ب إذا ضربَ في 15 د ب يكون مساوياً لضربَ مربع ب د في جـ د. وقد كان أحدُ قسمي المسطح الكبير مربعَ جـ د، وقد حصل ضربه في د ب؛ فقد انحَلَّ مسطحُ جـ ب [في جـ د] في ب د إلى مربع جـ د في د ب وإلى مربع ب د في جـ د.

$$\begin{array}{c} \text{ج} \quad \text{د} \\ \hline \text{ب} \end{array}$$

وأقول أيضاً: إن أ ب إذا كان مقسوماً على جـ، وجـ ب ثلاثاه، وأ جـ 20 ثلثه، ثمَّ قسم على نقطة د التي هي على خطِّ ب جـ الثلثين؛ / فربيع جـ ب ١ - ١٠٧ - و

١ فيني: فني [ب، ل] - 3 عددا: ناقصة [ل]

في $\overline{ا ج}$ - وهو المجسم الأول - مساوٍ لمربع $\overline{ب د}$ في $\overline{د ا}$ ، وهو المجسم الثاني، مع مربع $\overline{ج د}$ في $\overline{ا ج}$ ، وفي $\overline{د ب}$ وهو المجسم الثالث.

لأن المجسم الأول ينقسم إلى أربعة أقسام، لانقسام مربع $\overline{ج ب}$ إلى مربع $\overline{ب د}$ ، ومربع $\overline{ج د}$ ، وضرب $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ مرتين؛ والمجسم الثاني ينقسم إلى قسمين، وهما: ضرب مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ا ج}$ ، وضرب $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ ؛


والمجسم الثالث قسمان، هما: مربع $\overline{ج د}$ في $\overline{ا ج}$ ، ومربع $\overline{ج د}$ في $\overline{د ب}$ - لكن مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ا ج}$ مشترك بين المجسم الأول والثاني، ومربع $\overline{ج د}$ في $\overline{ا ج}$ مشترك بين المجسم الأول والثالث؛ فالذي يخص المجسم الأول ضرب ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ ثم في $\overline{ا ج}$ ، وذلك مثل ضعف $\overline{ا ج}$ في $\overline{ج د}$ ثم في $\overline{د ب}$. لكن ضعف $\overline{ا ج}$ هو $\overline{ج ب}$ ؛ فالذي يخص

المجسم الأول ضرب $\overline{ج ب}$ في $\overline{ج د}$ ثم في $\overline{د ب}$ ، وهو مثل ضرب $\overline{ج د}$ في $\overline{د ب}$ ثم في $\overline{ج ب}$. والذي يخص المجسم الثاني هو مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ ؛ والذي يخص المجسم الثالث هو مربع $\overline{ج د}$ في $\overline{د ب}$. وقد تبين أن مربع كل واحد من القسمين إذا ضرب في الآخر يكون مجموعهما مساوياً لضرب أحد القسمين في الآخر، ثم ضرب المبلغ في جملة الخط. فما يخص المجسم

الأول مساوٍ لما يخص / مجموع المجسمين؛ فالمجموع الأول مساوٍ لمجموع $\overline{ا ج} - \overline{ب د} - \overline{ج د}$ المجسمين. فقد تبين أنا إذا نقصنا من المجسم الأول أحد المجسمين يكون الباقي مثل المجسم الآخر. فإذا كان المجسم الثاني مثل نصف المجسم الأول؛ فيكون المجسم الثالث مثل نصفه أيضاً، ويكون كلا المجسمين متساويين، $\overline{ب د}$ فيكون $\overline{ج د}$ مثل $\overline{ج د}$ ، فيكون كل واحدٍ منها ثلث $\overline{ا ب}$. وإن كان المجسم الثاني أعظم من نصف المجسم الأول، فيكون $\overline{ب د}$ أعظم من نصف $\overline{ب ج}$ ، فيكون أعظم من $\overline{ج د}$ ، فيكون $\overline{ب د}$ أكبر من ثلث

11 في $\overline{ج د}$: ناقصة [ل] - 16 لجموعي: مظموس بعضها [ب]، لجموعين [ل]

أ ب. وإن كان المجسم الثاني أقل من نصف المجسم الأول، فيكون ب د أقل من ثلث أ ب، لما مرّ آنفاً.



فأقول أيضاً: إن عدد الأموال - وهو أ ب - إذا قسم على ج وب ج ثلثاه وأ ج ثلثه، وب د هو المطلوب الأصغر الذي مربعه في أ د مثل العدد؛ فإن مكعب ج د مع عدد التفاوت بين المجسم الأول والعدد المسؤول يعدل ضرب مربع ج د في أ ب. لأن المجسم الثاني - وهو مربع

ب د في د أ - إذا جمع مع / فضل المجسم الأول على العدد المسؤول ب - ٩ - و يصير مساوياً للمجسم الأول. وقد بينّا أن مربع ج د إذا ضرب في د ب وفي ج أ - وهو المجسم الثالث - وجمع مع المجسم الثاني يصير مساوياً

10 للمجسم الأول. وقد علمنا / أن عدد التفاوت بين المجسم الأول وبين ل - ١٠٨ - و العدد المسؤول مساوٍ للمجسم الثالث. فنجعل ج د شيئاً، ومربعه مالاً. فجمع أ ج د ب عددُ الأموال إلّا شيئاً. ف ضرب مربعه فيه أموالٌ بعدة الأموال المسؤولة إلّا كعباً يعدل عدد التفاوت. فبعد الجبر يصير أموالاً بعدة الأموال المسؤولة، يعدل عدد التفاوت وكعباً. فكعب ج د مع عدد 15 التفاوت بين المجسم الأول والعدد المسؤول يعدل ضرب مربع ج د في أ ب.



وأقول أيضاً: إن مكعب ب د مع العدد المسؤول يعدل ضرب مربع ب د في أ ب عدد الأموال، لأن مربع ب د في أ ب يعدل ضرب

12 شيئاً: شئ [ب، ل] - 13 كعباً: كعب [ب، ل] / يعدل: فوق السطر [ب]

مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ب د}$ ، وهو مكعب $\overline{ب د}$ مع ضرب مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ا د}$ الذي هو مثل العدد.

وإذا عرفت هذا فنقول: العدد المسؤول [عنه] إن لم يكن أكبر من نصف العدد الأعظم فنضعه على التخت ونضع عدد الأموال على وضع المقسوم عليه. 5

مثاله: مكعبٌ وعدد بهذه الصورة $\overline{٦٦١٥٢٣٢٢}$ يعدل تسعمائة وثلاثة وستين مالا. فالعدد الأعظم بهذه الصورة $\overline{١٣٢٣٠٤٦٤٤}$ والعدد الذي في المسألة ليس أكبر من نصفه، فنضعه على التخت ونضع عدد الأموال على

رسم وضع المقسوم عليه، فيكون / بهذه الصورة $\overline{٦٦١٥٢٣٢٢}$ ، ونعرف مكان ل - ١٠٨ - ط 10

مطلوب القسمة، ونعدّ الجذور من الآحاد إلى مرتبته، ونعدّ الكعاب من

الآحاد بتلك العدة، فالكعب الذي انتهى إليه هو مكان المطلوب. ونعرف

المرتبة السميّة له وننظر إلى آخر مراتب عدد الأموال. فإن كانت منحلة عن

المرتبة السميّة له فننقله إلى المرتبة المنحلة عن مكان المطلوب بقدر انحطاطه

عن المرتبة السميّة له، وإن كانت أرفع فننقله إلى المرتبة المرفوعة عنه بقدر

ارتفاعه عن المرتبة السميّة له، وإن كانت مساوية فننقله إلى مرتبة المطلوب 15

كما في المثال؛ فإنّ مكان مطلوب القسمة هو عشرات الألوف، ومن

الآحاد إلى مرتبته ثلاثة جذور، فعددنا من مرتبة الآحاد ثلاثة كعاب،

فهناك مكان المطلوب. والمرتبة السميّة للكعب الثالث هي المئات، وآخر

مراتب عدد الأموال المئات أيضا. فوضعنا آخر عدد الأموال مقابل

الكعب الثالث، ثم نطلب أكثر عدد نقصه من آخر عدد الأموال ونضربه 20

9 رسم: مد ناسخ [ب] حرف الراء فقله ناسخ [ل]، ألفاً وكب واسم - 14 وإن كانت: وإن كان [ب، ل] - 15 كانت مساوية: كان مساويا [ب، ل] - 18 هي: هو [ب، ل] - 20 أكثر: أي أقل عدد يكون مربعه أكبر من آخر أعداد حاصل قسمة العدد المسؤول على عدد الأموال

- في الباقي من عدد الأموال، ونضع المبلغ في سطرٍ أوسط، ثم نضربه في الأوسط ونقصه من العدد، وذلك هو الثلاثة، فوضعناها مكان الصفر الثالث ونقصناه من آخر عدد الأموال / وضربناه في بقية عدد الأموال ل - ١٠٩ - و وضعنا المبلغ في سطرٍ أوسط، يحصل بهذه الصورة $\begin{smallmatrix} 66102322 \\ 1989 \end{smallmatrix}$ ، وضربناه ٥ > في الأوسط ونقصنا الحاصل من العدد > فحصل بهذه الصورة $\begin{smallmatrix} 66102322 \\ 1989 \end{smallmatrix}$ ، ثم ننقص المطلوب من آخر عدد الأموال كَرَّةً أخرى، ونضربه في الباقي، ونزيد المبلغ على الأوسط، وننقص المطلوب كَرَّةً ثالثة من آخر عدد الأموال. ونقل المطلوب وبقية عدد الأموال بمرتبتين، والأوسط بمرتبة، ونضع المطلوب الثاني، وهو اثنان في المثال، ونقصه من آخر بقية عدد الأموال، ونضربه في الباقي، ونزيد المبلغ على الأوسط ونضربه في الأوسط ونقص المبلغ من العدد، ثم ننقص المطلوب الثاني من آخر بقية عدد الأموال كَرَّةً أخرى، ونضربه في الباقي ونزيد المبلغ على الأوسط، وننقص المطلوب الثاني من آخر عدد الأموال كَرَّةً ثالثة، ونقل المطلوب الثاني وبقية عدد الأموال بمرتبتين، والأوسط بمرتبة، ونضع المطلوب الثالث وهو الواحد، ونعمل به العمل المذكور، فيرفع العدد ويحصل السطر الأعلى بهذه الصورة ٣٢١ / وهو الجذر المطلوب.
- ل - ١٠٩ - ظ
- وقد ظهر من هذا المثال أن العدد المسؤول إن كان مثل نصف العدد الأعظم كان الجذر المطلوب ثلث عدد الأموال، لأن العدد المسؤول في المثال كان مساوياً لنصف العدد الأعظم، وقد خرج الجذر المطلوب ثلث 20 عدد الأموال.

1 الباقي: الثاني [ب، ل] - 4 وضربناه: وضربنا [ب، ل] - 6 الباقي: الثاني [ب، ل]

وإن كان أكثر فيُنقص العدد المسؤول من العدد الأعظم، فما بقي فهو عدد التفاوت، فنضعه على التخت ونعمل به العمل المذكور، فما خرج ننقصه من ثلثي عدد الأموال، فما بقي فهو الجذر المطلوب.

وأما بيان جهة العمل فيما إذا كان المسؤول أقل من نصف العدد الأعظم، فهو أننا إذا وضعنا العدد، وهو مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ا د}$ ، ووضعنا عدد الأموال وهو $\overline{ا ب}$ ، فلو كان $\overline{ا د}$ معلوماً، وقسمنا العدد على $\overline{ا د}$ كان الخارج من القسمة هو مربع $\overline{ب د}$. لكن المعلوم $\overline{ا ب}$ لا $\overline{ا د}$. فإذا استخرجنا المطلوب القسمة على $\overline{ا ب}$ فقد يكون أقل من قسمته على $\overline{ا د}$ ، وقد يكون موافقاً بحيث لا يقع فيه تفاوت، بل التفاوت إنما يقع في سائر

10 / المطالب؛ فيكون المطلوب الأول بهذه القسمة هو الحقيقي أو قريب منه ب - ٩ - ظ

وأقل منه، فهو من مرتبة آخر مربع $\overline{ب د}$ بالتقريب. و«مربع» المطلوب إنما هو من ضرب آخر جذر مربع $\overline{ب د}$ في نفسه، فالمرتبة السمية لجذره

/ تكون مرتبة آخر $\overline{ب د}$ بالتقريب، ومكعبه يقع في مرتبة الكعب السمي ل - ١١٠ - و

لتلك المرتبة. وليكن المطلوب الذي يخرج لنا وهو الذي أمكن نقصانه من 15 عدد الأموال، ثم ضربته في باقي عدد الأموال، ونقصانه من العدد، هو

$\overline{ب هـ}$ ، فيكون مكعبه في المرتبة التي وضعناه فيها، أعني مقابل الكعب السمي له. فعلى الشرط الذي نقلنا «به» صور عدد الأموال يكون الصورة التي تقع في مرتبة هذا المطلوب، أعني مقابل هذا الكعب، إنما هي من مرتبته الحقيقية؛ وضرب مربع هذا المطلوب في كل واحد من صور

4 العدد: كان عليه أن يقول «كان العدد المسؤول ليس بأكبر من نصف العدد الأعظم» - 8 استخرجنا: استحسنا [ل] - 10 بهذه: [ب، ل] - 11 وأقل: أو أقل [ب، ل] / فهو: المقصود مربع المطلوب الأول - 19 هي: هو [ب، ل]

عدد الأموال يكون واقعاً في كلّ واحدة من المراتب التي حصلت فيها الصور بالانتقال، حتى لو ضرب مربعه في كلّ واحد من الصور ونقص من العدد الحاصل في مراتبها، يكون النقصان بحسب الواجب. وإذا نقصنا هذا المطلوب من الصورة التي في مرتبته يكون هذا النقصان بحسب الواجب. ولأننا إذا نقصنا المطلوب وهو $\overline{ب ه}$ من $\overline{ا ب}$ ، وهو عدد الأموال، بقي $\overline{ا ه}$ ؛ ونريد أن نضرب مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ وننقص المبلغ من العدد، لأن العدد حاصل من ضرب مربع المطلوب الحقيقي، أعني $\overline{ب د}$ ، في فضل عدد الأموال عليه، أعني / في $\overline{ا د}$. لكن $\overline{ب د}$ $\overline{ا د}$ - 110 - ظ مجهولان، و $\overline{ب ه}$ $\overline{ا ه}$ صاراً معلومين. فإذا ضربنا $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، ثم ضربنا $\overline{ب ه}$ في الحاصل، فكأننا ضربنا مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$. فلذلك نضرب $\overline{ب ه}$ المطلوب في الصور الباقية من عدد الأموال، وهي $\overline{ا ه}$ ، ونضعها مسطّحاً، ثم نضرب المطلوب في المسطّح، وننقص المبلغ من العدد ليحصل مضروب مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، ونقصانه من العدد. فإذا ضربنا مربع $\overline{ب ه}$ ، وهو بعض مربع $\overline{ب د}$ ، في $\overline{ا د}$ ، ونقصناه، كان ذلك 15 النقصان من جملة الواجب حتى يُضرب الباقي من مربع $\overline{ب د}$ وفي $\overline{ا د}$ أيضاً. لكن $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ هو على خلاف الواجب، فلو حصل لنا $\overline{د ه}$ فحتاج أن نضربه في $\overline{ب ه}$ ونزيده على العدد حتى يعود إلى الواجب، وننقص $\overline{د ه}$ من $\overline{ا ه}$ الباقي، حتى يبقى $\overline{ا د}$. فنضرب $\overline{د ه}$ في $\overline{ب ه}$ مرتين ونزيد عليه مربع $\overline{د ه}$ ، ونضرب الجميع في $\overline{ا د}$ لأنه الباقي من مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ا د}$ ، وننقصه من العدد. وليكن المطلوب الثاني هو $\overline{د ه}$. فلأن المسطّح الحاصل لنا هو من ضرب $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، وهو مركب من ضرب $\overline{د ه}$ في

1 واقفاً: واقفه [ب، ل] - 2 ونقص: ونقص [ب، ل] - 11 الصور: الصورة [ل] - 15 من (الثانية): في [ب، ل] / وفي: في [ب، ل]

ب هـ، ومن ا د في ب هـ، فإذا نقصنا ب هـ من ا هـ كَرَّةً أخرى، ثم ضربنا ب هـ في الباقي، ونقصنا ب هـ من ا هـ كَرَّةً ثالثة، ثم نقصنا هـ د من الباقي، ثم ضربنا د هـ في الباقي، يكون حاصل هذا الضرب هو د - ا - ١١١ - و ضرب د هـ في ا د، و ا د في ب هـ و د هـ في ب هـ بنقصان مربع ب هـ، وضرب د هـ في ب هـ مرتين؛ لأن ا هـ قد نقص منه ب هـ مرتين. 5 فإذا زيد على المسطح يصير حاصل المسطح هو ضرب د هـ في ب هـ مرتين، وضرب ا د في ب هـ مرتين، وضرب د هـ في ا د، منقوصاً من هذه الخمسة مربع ب هـ، وضرب د هـ في ب هـ مرتين. لكن ضرب د هـ في ب هـ مرتين، الذي في الزيادة، يذهب بمثله الذي في النقصان؛ فيكون 10 حاصل هذا المسطح ضرب ب هـ في ا د مرتين، [وضرب د هـ في ا د مرتين]، وضرب د هـ في ا د بنقصان مربع ب هـ. فإذا ضرب د هـ في هذا المسطح يكون الحاصل من جهة ضربه في مسطح د هـ في ا د هو مربع د هـ في ا د، ومن جهة ضربه في مسطح ب هـ في ا د مرتين يكون مساوياً لضرب د هـ في ب هـ مرتين، ثم ضرب الحاصل في ا د؛ وهذا 15 المبلغ الذي يحصل يكون مساوياً للعلم الباقي من مربع د ب في ا د منقوصاً منه مضروب مربع ب هـ في د هـ لأجل نقصان مربع ب هـ. فإذا نقصناه من العدد - وكأنا ضربنا مربع ب هـ في د هـ وزدنا المبلغ / على د - ١١١ - ظ العدد، ثم ضربنا العلم الباقي من مربع د ب في ا د، ونقصناه من العدد - يكون موافقاً لما كان ينبغي أن يعمل.


ا د هـ ب هـ

20 ولنفرض أن المطلوب الثاني لم يكن د هـ تمامه، بل كان هـ ط، فتبين من هذا البيان أننا إذا عملنا على الطريق المذكور، فكأنا ضربنا مربع ب هـ في هـ ط، وزدنا المبلغ على العدد، وضربنا مربع هـ ط في ا ط،

وضربنا $\overline{ه ط}$ في $\overline{ه ب}$ مرتين، وضربنا المبلغ في $\overline{ا ط}$ ، ونقصنا المبلغ من العدد، فيصير الحاصل من العمل الذي عملنا على المطلوبين، كأننا ضربنا مربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{ا ط}$ ، ونقصنا المبلغ من العدد. ويصير المسطح الحاصل بعد النقل الأخير هو ضرب $\overline{د ط}$ في $\overline{ط ب}$ مرتين، وضرب $\overline{ا د}$ في $\overline{ط ب}$ 5 مرتين منقوصاً منه مربع $\overline{ب ط}$ ؛ ويصير الباقي من عدد الأموال هو $\overline{ا ط}$ منقوصاً منه مثلاً $\overline{ط ب}$ ، ونبين العمل على سائر المطالب بالبيان المذكور. وأما إذا كان العدد المسؤول أكثر من نصف العدد الأعظم، ومكعب $\overline{ب د}$ مع العدد المسؤول، الذي هو مثل المجسم الثاني، يعدل ضرب مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ا ب}$ لما مرّ، فإن جعلنا العدد المسؤول عدداً، وجعلنا $\overline{ا ب}$ عدد 10 الأموال، واستخرجنا المطلوب الأصغر بمسألة مكعب وعدد يعدل أموالاً،

يخرج لنا $\overline{د ج}$ ومكعب $\overline{ج د}$ مع عدد التفاوت بين المجسم الأول /- والعـدد ب - ١٠ - و
ل - ١١٢ - و
المسؤول يعدل ضرب مربع $\overline{ج د}$ في $\overline{ا ب}$ لما مرّ. فإن جعلنا عدد التفاوت بين العدد الأعظم والعدد المسؤول عدداً وعدد الأموال بعينه $\overline{ا ب}$ ، واستخرجنا المطلوب الأصغر، يخرج لنا $\overline{ج د}$ ، لكن يجب أن نستعمل عدد 15 التفاوت، لأن الطريق الذي استعملناه في استخراج المطلوب يجب فيه ألا يكون المطلوب أكثر من ثلث عدد الأموال، ليتمكن نقصانه من عدد الأموال ثلاث مرّات. فإذا كان العدد المسؤول أكثر من نصف العدد الأعظم - وقد بينّا أن $\overline{ب د}$ المطلوب يكون أكثر من ثلث $\overline{ا ب}$ - فلا يمكن نقصانه من $\overline{ا ب}$ ثلاث مرّات، فلذلك نجعل عدد التفاوت عدداً 20 ليصير مطلوبنا الذي نستخرجه $\overline{ج د}$ ، الذي هو أقلّ من ثلث عدد الأموال، فيمكن نقصانه من عدد الأموال ثلاث مرّات. وإذا استخرجنا $\overline{ج د}$ نقصه من $\overline{ج ب}$ ليقى المطلوب. وذلك ما أردنا بيانه.

4 الأخير: الآخر [ب. ل] - 10 واستخرجنا: واستحصنا [ل] / بمسألة: كتبنا ناسخ [ب]، كأنها بطله، ومكعباً نقلها ناسخ [ل] - 11 $\overline{د ج}$: $\overline{د ب}$ [ب. ل]




المسألة الثانية: مكعب وعدد يعدل جذوراً.

- فلأن الجذر المطلوب إذا ضرب في المال حصل المكعب فقط، وإذا ضرب في عدد الجذور حصل المكعب والعدد، فعدد الجذور أعظم من المال. وليكن مربع $\overline{ا ج}$ مساوياً لمربع عدد الجذور / وضلعه $\overline{ا ب}$. فلأن $ل - ١١٢ - ظ$
- 5 المربع أعظم من مال الجذر المطلوب؛ فجذره وهو $\overline{ا ب}$ أعظم من الجذر المطلوب، وينفصل الجذر المطلوب من $\overline{ا ب}$ على مثال $\overline{ا ه}$. ويفصل من مربع $\overline{ا ج}$ مربع $\overline{ا ه}$ ، وهو مربع $\overline{ا ز}$ ؛ فلأن $\overline{ا ه}$ هو الجذر المطلوب، ومربع $\overline{ا ج}$ عدد الجذور؛ ف ضرب $\overline{ا ه}$ الجذر في مربع $\overline{ا ج} -$ وهو مبلغ الجذور المعادل للمكعب والعدد - هو مجسم قاعدته مربع $\overline{ا ج}$ وارتفاعه $\overline{ا ه}$ الجذر. وإذا فصل من هذا المجسم ضرب مربع $\overline{ا ه}$ في $\overline{ا ه}$ الجذر - وهو مكعب $\overline{ا ه} -$ يبقى مجسم قاعدته علم $\overline{ج ز}$ وارتفاعه $\overline{ا ه}$ الجذر، مساوياً للعدد، ونسميه العلم المجسم، فمن ضرورة إمكان هذه المسألة أن يوجد علم مجسم يعادل العدد المذكور في السؤال وقاعدته تفضل من المربع المساوي لعدد الجذور بعد حذف مربع الجذر المطلوب. ولتطلب أعظم
- 15 العلم المجسم الذي يمكن أن يوجد في هذه المسألة حتى لو كان العدد المسؤول أعظم منه لم يمكن أن يوجد العلم المجسم على الشرط المذكور، فتستحيل المسألة. فنعمل مربعاً مساوياً لثلث مربع $\overline{ا ب}$ وليكن مربع $\overline{ا ز}$ ، وضلعه $\overline{ا ه}$ ، فأقول: / إن العلم المجسم - الذي يكون من ضرب $ل - ١١٣ - و$

1 المسألة الثانية: ناقصة [ل] - 2 حصل: كتب ناسخ [ب]، بعدد كلمة «الطلب» ثم حذفها -
 4 لمربع: لسطح [ب، ل] - 8 وهو: هو [ب، ل] - 13 تفضل: سفصل [ب]، يفصل [ل] -
 18 وضلعه: في الهامش [ب]، ناقصة [ل]

العلم المسطح الباقي، وهو علم ج ز في ضلع $\overline{ا ه}$ ، ونسميه المجسم الأول - أعظم العلم المجسم الذي يمكن أن يوجد هاهنا.




فليكن $\overline{ا ط}$ أعظم من $\overline{ا ه}$ ومربعه $\overline{ا ي}$. فأقول: إن المجسم الأول أعظم من المجسم الحاصل من ضرب علم ج ي في $\overline{ا ط}$ ونسميه المجسم الثاني.⁵

لأن المجسم الأول ينقسم إلى ضرب علم ج ي في $\overline{ا ه}$ ، وإلى ضرب علم ي ز في $\overline{ا ه}$ ، والمجسم الثاني ينقسم إلى ضرب علم ج ي في $\overline{ا ه}$ ، وإلى ضرب علم ج ي في $\overline{ه ط}$ ، فإذا ألقينا ضرب علم ج ي في $\overline{ا ه}$ بقي من المجسم الأول ضرب علم ي ز في $\overline{ا ه}$ ، ومن المجسم الثاني ضرب علم ج ي في $\overline{ه ط}$.¹⁰ ولأن مربع $\overline{ا ز}$ ثلث مربع $\overline{ا ج}$ ، فعلم ج ز ضعف مربع $\overline{ا ز}$ ؛ والعلم $\langle \overline{ج ز} \rangle$ من ضرب $\overline{ا ا ه}$ في $\overline{ب ه}$ ؛ وضعف مربع $\overline{ا ه}$ من ضرب ضعف $\overline{ا ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، ف ضرب ضعف $\overline{ا ه}$ في $\overline{ا ه}$ مثل ضرب $\overline{ب ا ه}$ في $\overline{ب ه}$. ولأن ضرب $\overline{ط ا ا ه}$ (في $\overline{ا ه}$) مثل ضرب $\overline{ط ه}$ مع ضعف $\overline{ا ه}$ في $\overline{ا ه}$ ؛ فهو أعظم من ضعف مربع $\overline{ا ه}$ ، وضرب

1 وهو: هو [ب، ل] - 2 أعظم ... يمكن: كذا، والصواب: «أعظم الأعلام الجسمة التي يمكن ...»
أو «أعظم علم مجسم يمكن ...» - 3 $\overline{ا ط}$: $\overline{ا ه}$ [ب، ل] - 14 وضرب: مكانها متآكل في [ب]


- ب $\overline{ا ا ط}$ في $\overline{ب ط}$ ، أعني علم $\overline{ج ي}$ ، أصغر من ضعف مربع $\overline{ا ه}$ ؛
 لكونه أصغر من علم $\overline{ج ز}$ المساوي لضعف مربع $\overline{ا ه}$. ف ضرب $\overline{ب ا ا ط}$
 في $\overline{ب ط}$ أصغر من ضرب $\overline{ا ا ه}$ (في $\overline{ا ه}$)؛ فنسبة $\overline{ب ا ا ط}$ إلى
 $\overline{ا ط ا ه}$ أصغر من نسبة $\overline{ا ه}$ إلى $\overline{ب ط}$. فإذا جعلنا نسبة $\overline{ب ط}$ / إلى $\overline{ا ط ا ه}$ - ١١٣ - ط
 5 $\overline{ط ه}$ مشتركة، فيكون النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ب ا ا ط}$ إلى $\overline{ا ط ا ه}$
 [في $\overline{ا ط ا}$] ومن نسبة $\overline{ب ط}$ إلى $\overline{ط ه}$ ، وهي نسبة علم $\overline{ج ي}$ إلى علم
 $\overline{ي ز}$ ، أصغر من النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ا ه}$ إلى $\overline{ب ط}$ ، ومن نسبة
 $\overline{ب ط}$ إلى $\overline{ا ط ه}$ ، وهي نسبة $\overline{ا ه}$ إلى $\overline{ط ه}$. فنسبة علم $\overline{ج ي}$ إلى $\overline{علم}$
 $\overline{ي ز}$ أصغر من نسبة $\overline{ا ه}$ إلى $\overline{ط ه}$. ف ضرب علم $\overline{ج ي}$ في $\overline{ط ه}$ أصغر
 10 من ضرب علم $\overline{ي ز}$ في $\overline{ا ه}$. فإذا جمع علم $\overline{ج ي}$ في $\overline{ا ه}$ مع كل واحد
 منهما، حصل من مجموع ضرب علم $\overline{ج ي}$ في $\overline{ا ه}$ مع ضرب علم $\overline{ج ي}$ في
 $\overline{ط ه}$ الأصغر علم $\overline{ج ي}$ في $\overline{ا ط}$ وهو المجسم الثاني، وحصل من
 (مجموع) ضرب علم $\overline{ج ي}$ في $\overline{ا ه}$ ، مع ضرب علم $\overline{ي ز}$ في $\overline{ا ه}$
 الأعظم، ضرب علم $\overline{ج ز}$ في $\overline{ا ه}$ وهو المجسم الأول. فالجسم الأول
 15 أعظم من الثاني.



10 علم (الثاني): ناقصة [ل] - 12-11 في $\overline{ط ه}$ الأصغر... $\overline{ج ي}$: أعادها ناسخ [ب]، ثم تنبه
 فحذفها.

ولیکن أيضاً $\overline{ا ط}$ أصغر من $\overline{ا ه}$ ، فأقول: إن ضرب علم $\overline{ج ز}$ في $\overline{ا ه}$ ، وهو المجسم الأول، أعظم من ضرب علم $\overline{ج ي}$ / في $\overline{ا ط}$ ، وهو ب - ١٠ - ط المجسم الثاني.

لأن ضرب $\overline{ب ا ا ه}$ في $\overline{ب ه}$ ، علم $\overline{ج ز}$ ، أعني ضعف مربع $\overline{ا ه}$ ، وضرب $\overline{ا ا ط}$ في $\overline{ا ط}$ مثل ضعف مربع $\overline{ا ط}$ مع ضرب $\overline{ه ط}$ في $\overline{ط ا}$ ، فهو أقل من ضعف مربع $\overline{ا ه}$ ، ف ضرب $\overline{ب ا ا ه}$ في $\overline{ب ه}$ أعظم من ضرب $\overline{ا ا ط}$ في $\overline{ا ط}$. فنسبة $\overline{ب ا ا ه}$ إلى $\overline{ا ا ط}$ أعظم من نسبة $\overline{ا ط}$ إلى $\overline{ب ه}$. فإذا جعلنا نسبة $\overline{ب ه}$ إلى $\overline{ه ط}$ مشتركة، يكون النسبة المؤلفة / من نسبة $\overline{ب ا ا ه}$ إلى $\overline{ا ا ط}$ ومن ل - ١١٤ - و ١٠ نسبة $\overline{ب ه}$ إلى $\overline{ه ط}$ - وهي نسبة علم $\overline{ج ز}$ إلى علم $\overline{ي ز}$ - أعظم من النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ا ط}$ إلى $\overline{ب ه}$ ، ومن نسبة $\overline{ب ه}$ إلى $\overline{ه ط}$ وهي نسبة $\overline{ا ط}$ إلى $\overline{ط ه}$. فنسبة علم $\overline{ج ز}$ إلى $\overline{ي ز}$ أعظم من نسبة $\overline{ا ط}$ إلى $\overline{ط ه}$. ف ضرب علم $\overline{ج ز}$ في $\overline{ه ط}$ أعظم من ضرب علم $\overline{ي ز}$ في $\overline{ا ط}$. فإذا جعلنا ضرب علم $\overline{ج ز}$ في $\overline{ا ط}$ مشتركاً، يكون مجموع علم $\overline{ج ز}$ في $\overline{ه ط}$ ، وهو الأعظم، مع ضرب علم $\overline{ج ز}$ في $\overline{ا ط}$ ، أعني المجسم الأول، أعظم من مجموع ضرب علم $\overline{ي ز}$ في $\overline{ا ط}$ ، وهو الأصغر، مع علم $\overline{ج ز}$ في $\overline{ا ط}$ المشترك، وكلاهما مثل علم $\overline{ج ي}$ في $\overline{ا ط}$ ، وهو المجسم الثاني؛ فالجسم الأول أعظم من الجسم الثاني.



5 ضرب: ناقصة [ل] - 9 نسبة: كتبت في التقيية [ل]، وسها النسخ عن كتابها في أول الصفحة التالية - 11 $\overline{ا ط}$: $\overline{ا ه}$ [ب، ل] - 15 $\overline{ا ط}$: $\overline{ا ه}$ [ب، ل]

فقد تبين أن المجسم الأول هو أعظم علم مجسم يمكن أن يوجد في هذه المسألة.

فإن كان العدد أكثر منه فلا يمكن أن يوجد علم مجسم يساوي العدد، فالمسألة مستحيلة. فقد تبين أنه إذا ضرب ثلثا عدد الجذور - وهو علم ج ز - في جذر ثلثه وهو $\overline{ا ه}$: فإن كان الحاصل أقل من العدد فالمسألة

مستحيلة، وإن كان مساوياً له فيكون الجذر المطلوب هو $\overline{ا ه}$ ، وهو جذر ثلث عدد الجذور، لأنه إذا جعل جذراً وضرب في مربع $\overline{ا ج}$ حصل

/ مبلغ الجذور المذكورة في السؤال، وهو مجسم قاعدته مربع $\overline{ا ج}$ ، ل - ١١٤ - ظ وارتفاعه $\overline{ا ه}$. فإذا نقص من هذا المجسم مكعب $\overline{ا ه}$ ، يبقى العلم المجسم المعادل للعدد المسؤول، ولا يكون للمسألة إلا مطلوب واحد، أعني الذي يكون العدد المسؤول فيه معادلاً للمجسم الأول. لأننا لو فرضنا جذراً آخر، يلزم أن يكون العلم المجسم مثل العدد، فيكون مثل المجسم الأول، وقد تبين استحالته. وإن كان العدد المسؤول عنه أقل من المجسم الأول، فيكون للمسألة مطلوبان: أحدهما أصغر من $\overline{ا ه}$ والآخر أعظم منه.

١٥ أما الأصغر: فليكن مربع $\overline{ا ج}$ عدد الجذور، و $\overline{ا ب}$ جذره، ومربع $\overline{ا ز}$ ثلث مربع $\overline{ا ج}$. وليكن $\overline{ط}$ العدد المسؤول، فالمجسم الأول - وهو ضرب علم ج ز في $\overline{ا ه}$ - أعظم من $\overline{ط}$ ، وليكن مساوياً لعددي $\overline{ط ك}$ ، ولنجعل $\overline{ا ح}$ ضعف $\overline{ا ه}$. ف $\overline{ح}$ ثلاثة أمثال $\overline{ا ه}$. ونجعل $\overline{ه ح}$ عدد الأموال، و $\overline{ك}$ عدداً، وتركب سؤالاً على مسألة: مكعب وعدد ٢٠ يعدل أموالاً. وليكن المطلوب - الذي يخرج - خط $\overline{ه ل}$ ، ويُفصل $\overline{ه ي}$ مثل $\overline{ه ل}$ ، يكون مربع $\overline{ه ل}$ في $\overline{ي ح}$ مثل عدد $\overline{ك}$. فأقول: إن $\overline{ه ل}$ لا بد أن يكون أصغر من $\overline{ا ه}$ ، وإن $\overline{ا ي}$ هو مطلوبنا في المسألة.

أما أن $\bar{هـ} \bar{ل}$ لابد أن يكون أصغر من $\bar{ا هـ}$: فلأن مربع $\bar{ا هـ}$ ثلث مربع $\bar{ا ج}$ ، فعلم $\bar{ج ز}$ ثلثاه، فيكون ضعف مربع $\bar{ا هـ}$. فعلم $\bar{ج ز}$ في $\bar{ا هـ} - \bar{ل} - ١١٥ - \bar{و}$ وهو الجسم الأول - ضعف مكعب $\bar{ا هـ}$. فلأن $\bar{ا ح}$ ضعف $\bar{ا هـ}$ ، فربع $\bar{ا هـ}$ في $\bar{ا ح}$ ضعف مكعب $\bar{ا هـ}$ ، فهو مثل الجسم الأول. ولأن ضرب $\bar{ب هـ}$ في $\bar{ا هـ}$ مرتين مع مربع $\bar{ب هـ} -$ وهو علم $\bar{ج ز}$ - ضعف مربع $\bar{ا هـ}$ ، فيكون $\bar{ب هـ}$ أصغر من $\bar{ا هـ}$ ، فيفصل $\bar{ا م}$ مثل $\bar{ب هـ}$ ، فربع $\bar{ا م}$ مع ضرب $\bar{ا م}$ في ضعف $\bar{ا هـ}$ ، مثل ضعف مربع $\bar{ا هـ}$ ، وضرب $\bar{هـ م}$ في ضعف $\bar{ا هـ}$ مع ضرب $\bar{ا م}$ في ضعف $\bar{ا هـ}$ مثل ضعف مربع $\bar{ا هـ}$. فربع $\bar{ا م}$ مع ضرب $\bar{ا م}$ في ضعف $\bar{ا هـ}$ مثل ضرب $\bar{هـ م}$ في ضعف $\bar{ا هـ}$ ، و $\bar{ا م}$ في ضعف $\bar{ا هـ}$ ، فنسقط ضرب $\bar{ا م}$ في ضعف $\bar{ا هـ}$ يبقى مربع $\bar{ا م}$ مثل ضرب $\bar{هـ م}$ في ضعف $\bar{ا هـ}$. فنسبة $\bar{هـ م}$ إلى $\bar{ا م}$ كنسبة $\bar{ا م}$ إلى ضعف $\bar{ا هـ}$ ، أعني $\bar{ا ح}$. فيجعل $\bar{ح س}$ مثل $\bar{ا م}$ ، و $\bar{س ع}$ مثل $\bar{هـ م}$ ، فيكون $\bar{هـ ع}$ مثل $\bar{ا ح}$. فنسبة $\bar{س ع}$ إلى $\bar{س ح}$ كنسبة $\bar{س ح}$ إلى $\bar{ع هـ}$. فيجعل نسبة $\bar{ع ح}$ إلى $\bar{ح س}$ مشتركة، فيكون النسبة المؤلفة من نسبة $\bar{ع ح}$ إلى $\bar{ح س}$ ، ومن نسبة $\bar{س ع}$ إلى $\bar{س ح}$ كالنسبة المؤلفة من نسبة $\bar{ع ح}$ إلى $\bar{ح س}$ ، ومن نسبة $\bar{س ح}$ إلى $\bar{ع هـ}$. لكن المؤلفة الأولى هي نسبة ضرب $\bar{ع ح}$ إلى $\bar{ح س}$ في $\bar{س ع}$ ، العلم، إلى مربع $\bar{ح س}$ ؛ والمؤلفة الثانية هي كنسبة $\bar{ع ح}$ إلى $\bar{س ع}$ / إلى $\bar{ع هـ}$. فنسبة العلم إلى مربع $\bar{ل} - ١١٥ - \bar{ظ}$ $\bar{ح س}$ كنسبة $\bar{ع ح}$ إلى $\bar{ع هـ}$. ف ضرب العلم في $\bar{ع هـ}$ مثل ضرب مربع $\bar{ح س}$ في $\bar{ع ح}$ س. فيجعل مربع $\bar{ح س}$ في $\bar{ع هـ}$ مشتركاً، فيصير ضرب العلم ومربع $\bar{ح س}$ في $\bar{ع هـ}$ ، أعني مربع $\bar{ع ح}$ في $\bar{ع هـ}$ ، مثل ضرب


١ لابد أن: لابد وأن [ل] - ١٢ $\bar{هـ م}$: $\bar{هـ ي}$ [ب، ل] - ١٤ إلى $\bar{ح س}$: ناقصة [ل] -
 ١٧ الأولى: الأولى [ب، ل] / مربع: تأكلت الورقة في هذا الموضع [ب]

مربع $\overline{ح س}$ في $\overline{ع ح س}$ وفي $\overline{ع ه}$ ، أعني ضرب مربع $\overline{ه ب}$ في $\overline{ب ح}$. لكن $\overline{ح ع}$ مثل $\overline{ا ه}$ ، و $\overline{ه}$ مثل $\overline{ا ح}$ ، ف ضرب مربع $\overline{ح ع}$ في $\overline{ه ع}$ مثل ضرب مربع $\overline{ا ه}$ في $\overline{ا ح}$ وهو ضعف مكعب $\overline{ا ه}$. ف ضرب مربع $\overline{ه ب}$ في $\overline{ب ح}$ ضعف مكعب $\overline{ا ه}$ ، فيكون مساوياً للمكعب الأول، فيكون أعظم من عدد $\overline{ك}$. لكن مربع $\overline{ه ل}$ في $\overline{ي ح}$ مثل عدد $\overline{ك}$ ، ف $\overline{ه ل}$ أصغر من $\overline{ه ب}$ فيكون أصغر من $\overline{ا ه}$ ، لما تبين أن $\overline{ب ه}$ أصغر من $\overline{ا ه}$ ؛ ويفصل $\overline{ه ي}$ / مثل $\overline{ه ل}$ ، فخط $\overline{ا ي}$ هو مطلوبنا في هذه ب - ١١ - و المسألة.

لأن المجسم الأول ينقسم إلى قسمين: أحدهما علم $\overline{ج ز}$ في $\overline{ا ي}$ ، والثاني علم $\overline{ج ز}$ في $\overline{ه ي}$ ، لكن علم $\overline{ج ز}$ هو ضعف مربع $\overline{ا ه}$ ، فيكون القسم الثاني هو ضعف مربع $\overline{ا ه}$ في $\overline{ه ي}$ ، وهو ينقسم إلى ضعف علم $\overline{ز د}$ في $\overline{ه ي}$ ، وإلى ضعف مربع $\overline{ا ي}$ في $\overline{ه ي}$. فالجسم الأول انقسم إلى ثلاثة أقسام. ولأن علم $\overline{ز د}$ هو من ضرب $\overline{ه ي}$ في $\overline{ا ه}$ ومن ضرب $\overline{ه ي}$ / في $\overline{ا ه}$ - ١١ - و $\overline{ا ي}$ ، فضعف هذا العلم هو ضعف ضرب $\overline{ه ي}$ في $\overline{ا ه}$ ، و ضعف ضرب $\overline{ه ي}$ في $\overline{ا ي}$. فإذا ضرب ضعف هذا العلم في $\overline{ه ي}$ ، يكون المبلغ مساوياً لضرب مربع $\overline{ه ي}$ في ضعف $\overline{ا ه}$ ، وضرب مربع $\overline{ه ي}$ في ضعف $\overline{ا ي}$ ؛ فصار المجسم الأول مساوياً لخمس أقسام: الأول علم $\overline{ج ز}$ في $\overline{ا ي}$ ، والثاني ضعف مربع $\overline{ا ي}$ في $\overline{ه ي}$ ، والثالث ضرب مربع $\overline{ه ي}$ في ضعف $\overline{ا ه}$ ، والرابع ضرب مربع $\overline{ه ي}$ في $\overline{ا ي}$ ، والخامس مثل الرابع 20 كرة أخرى. فإذا ركبنا الثاني، وهو ضرب ضعف مربع $\overline{ا ي}$ في $\overline{ه ي}$ مع الرابع وهو مربع $\overline{ه ي}$ في $\overline{ا ي}$ ، يحصل من ذلك علم $\overline{ز د}$ في $\overline{ا ي}$ ،

5 ي ح : ح [ب]، ل [ل] - 11 الثاني هو: تأكل موضعها في [ب] - 13 ز د : محوة [ب]، ه د [ل] - 14 وضع: مكررة [ب]

ونجعل القسم الثاني؛ ويبقى الثالث وهو مربع $\overline{هـ ي}$ في ضعف $\overline{ا هـ}$ ، أعني $\overline{ا ح}$ ، والخامس (وهو) مربع $\overline{هـ ي}$ في $\overline{ا ي}$. ومجموع الثالث والخامس مثل مربع $\overline{هـ ي}$ في $\overline{ي ح}$. فنجعل هذا المجموع ثالثاً، فيحصل: أقسام المجسم الأول ضرب علم $\overline{ج ز}$ في $\overline{ا ي}$ ، وضرب علم $\overline{ج د}$ في $\overline{ا ي}$. 5
مربع $\overline{هـ ي}$ في $\overline{ي ح}$. لكن مجموع الأول والثاني هو علم $\overline{ج د}$ في $\overline{ا ي}$. فقد تبين أن المجسم الأول مساوٍ لعلم $\overline{ج د}$ في $\overline{ا ي}$ ، ومربع $\overline{هـ ي}$ في $\overline{ي ح}$. وقد كان المجسم الأول مساوياً لعددي $\overline{ط ك}$. فعلم $\overline{ج د}$ / في $\overline{ا ي}$ ، ل - ١١٦ - ط
ومربع $\overline{هـ ي}$ في $\overline{ي ح}$ مثل عددي $\overline{ط ك}$. ومربع $\overline{هـ ي}$ في $\overline{ي ح}$ مثل عدد $\overline{ك}$ ، فيكون علم $\overline{ج د}$ في $\overline{ا ي}$ مثل عدد $\overline{ط}$. فإذا جعلنا $\overline{ا ي}$ جذراً وضربناه 10
في مربع $\overline{ا ج}$ ، حصل الجذور بالعدّة المسؤولة، وهو مساوٍ لمجسم قاعدته مربع $\overline{ا د}$ وارتفاعه $\overline{ا ي}$ ، وهو مكعب $\overline{ا ي}$ ، ولجسم آخر قاعدته علم $\overline{ج د}$ ، وارتفاعه $\overline{ا ي}$ (أعني العدد)، فقد تبين أنه مساوٍ للمكعب والعدد.



١ في ضعف: وضعت [ب، ل] - 4 $\overline{ا ي}$ (الأول): $\overline{ا ر}$ [ب، ل] - 5 هو: وهو [ب، ل] -
10 قاعدته: ناقصة [ل] - 12 فقد: وقد [ب، ل]


وأما المطلوب الأعظم: فليكن العددُ المسؤولُ عددَ طَ، وليكن علم جَ ز في ا هـ، وهو الجسمُ الأول، أعظم من طَ. وليكن فضله عليه عدد لك. فيكون مجموع عددي طَ لك الجسمين مثل الجسم الأول. وليكن خط ا ح ضعف ا هـ، فخطُ هـ ح ثلاثة أمثال ا هـ، فنجعل عليه مسألة 5 مُكعب وأموال بعدة هـ ح يعدل عدد لك؛ وليكن الضلع الذي يخرج بتلك المسألة هو خطُ هـ ي، حتى يكون ضرب مربع هـ ي في ي ح مساوياً لعدد لك. ونبين - كما بينا - أن هـ ي أصغر من ب هـ. فأقول: إن ا ي هو المطلوب في هذه المسألة، حتى يكون ضرب علم جَ م في ا ي معادلاً لعدد طَ.

- 10 لأن الجسم الأول - وهو علم جَ ز في ا هـ - ينقسم إلى ضرب علم جَ م في ا هـ، وإلى علم مَ ز في ا هـ، لكن علم مَ ز هو ضرب هـ ي في ا هـ مرتين ومربع هـ ي، فعلم مَ ز في ا هـ ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي ضرب ي هـ في ا هـ مرتين ثم في ا هـ، وهو ضرب هـ ي في مربع ا هـ، وضربه فيه مرة أخرى /، ومربع ي هـ في ا هـ. فالجسم الأول د - 117 - و
- 15 انقسم إلى أربعة أقسام: أولها علم جَ م في ا هـ، وثانيها وثالثها ضرب ي هـ في مربع ا هـ مرتين، ورابعها مربع ي هـ في ا هـ. لكن علم جَ ز مثل مربع ا هـ مرتين. ف ضرب ي هـ في علم جَ ز مثل القسم الثاني والثالث، وعلم جَ ز في ي هـ ينقسم إلى قسمين: أحدهما علم جَ م في ي هـ، والآخر علم مَ ز في ي هـ. فالجسم الأول أربعة أقسام: أولها علم جَ م في ا هـ،

5-3 مثل الجسم ... عدد لك: مثبت في الهامش مصححاً [ل] - 12-13 هي ... ا هـ: كورها ناسخ [ل]
 بزيادة دوره قبلها - 15 انقسم: النص متآكل في هذا الموضع [ب] - 19 مَ ز: هـ ز [ب، ل]

- والثاني علم ج م في ي هـ، والثالث علم م ز في ي هـ، والرابع مربع ي هـ في ا هـ. ولأن علم م ز هو ضرب ي هـ في ا هـ مرتين ومربع ي هـ: أما ضرب ي هـ في ا هـ مرتين ثم في ي هـ (فهو) مساو لضعف ضرب ا هـ في مربع ي هـ، وأما ضرب مربع ي هـ في ي هـ فهو مكعب ي هـ، فقد
- 5 انقسم القسم الثالث إلى ثلاثة أقسام، وهي مربع ي هـ في ا هـ مرتين ومكعب ي هـ؛ فقد صار جميع أقسام المجسم الأول ستة. وإذا ركبنا القسم الأول مع الثاني وهما ضرب (علم ج م في ا هـ وفي ي هـ، حصل ضرب (علم ج م في ا ي. وإذا ركبنا الأقسام الباقية - وهي ضرب مربع ي هـ في ا هـ ثلاث مرات ومكعب ي هـ - حصل ضرب مربع
- 10 ي هـ / في ي ح، لأن هـ ح ثلاثة أمثال ا هـ. فيكون المجسم الأول ل - 117 - ظ مساوياً لمجموع ضرب علم ج م في ا ي، ولضرب مربع ي هـ في ي ح. وقد كان المجسم الأول مساوياً لعددي ط ك، فيكون ضرب علم ج م في ا ي وضرب مربع هـ ي في ي ح مساوياً لعددي ط ك. لكن مربع ي هـ في ي ح مساو لعددي ك، فيبقى ضرب علم ج م في ا ي معادلاً
- 15 / لعدد ط. فإذا جعلنا ا ي ضلعاً ونضربه في مربع ا ج، حصل منه ب - 11 - ظ مجسم قاعدته عدد الجذور وارتفاعه ا ي، وهو مبلغ الجذور المسؤولة؛ وهذا الجسم الثاني - وهو مبلغ الجذور - مساو لمجسم قاعدته مربع ا ي وارتفاعه ا ي، وهو مكعب ا ي، والمجسم آخر قاعدته علم ج م، وارتفاعه ا ي، وقد تبين أنه مثل عدد ط المسؤول. فكعب ا ي مع عدد
- 20 ط مساو لضربه في عدد الجذور.

4 في ي هـ: مثبت في الهامش مصححاً [ب]. نائضة [ل] / فهو: هو [ب، ل]



وطريق استخراج المطلوبين - أعني الأعظم والأصغر - باستخراج

التفاوت بين المطلوب وبين جذرٍ ثلثِ عدد الجذور.

أما استخراج التفاوت بين المطلوب الأعظم وبين جذرٍ ثلثِ عدد

الجذور: فليكن مربع $ا ج$ عددَ الجذور / و $ا هـ$ جذرُ ثلثه، و $ا ي$ هو $ا - ١١٨ - و$

المطلوب الأعظم. فلأن الذي يخصّ الجسم الأول هو علم $م ز$ في $ا هـ$ ،

والذي يخصّ الجسم الثاني هو ضرب علم $ج م$ في $ي هـ$ ، وفضلّ الجسم

الأول على الجسم الثاني - الذي هو مثل العدد - فضلّ ما يخصّ الجسم الأول

على ما يخصّ الجسم الثاني، فعدد التفاوت بين الجسم الأول والعدد

المسؤول، إذا جُمع مع الجسم الثاني الذي هو مثل العدد المسؤول، يصير

10 معادلاً للجسم الأول. فإذا جُمع ما يخصّ الجسم الثاني يصير معادلاً لما

يخصّ الجسم الأول. فيجعل $هـ ي$ شيئاً، فالعلم الداخل، وهو من ضرب

$ي ا ا هـ$ - أعني ضعف $ا هـ$ ، وشيئاً - في $ي هـ$ ، الشيء، يكون

أشياء بعدة ضعف $ا هـ$ ومالاً. فإذا ضرب في $ا هـ$ ليحصل خاصّة الجسم

الأول، فيصير أشياء بعدة ضعف مربع $ا هـ$ ، وأموالاً بعدة $ا هـ$. وأما


15 خاصّة الجسم الثاني، فلأن العلم الخارج من ضرب $ب ا ا ي$ - وهو

2 جذر: فوق السطر [ب] - 3 الأعظم: فوق السطر [ب] - 6-8 الجسم الأول ... ما يخص: ناقصة

[ل] - 13 ضعف: محموة لتأكل موضعها [ب]

مجموع عددي $\overline{ب آ آ ه}$ وشيء - في $\overline{ب ي}$ وهو $\overline{ب ه}$ إلا شيئاً. فضرِب $\overline{ب آ آ ه}$ في $\overline{ب ه}$ ثلثا عدد الجذور، وضرِب $\overline{ب آ آ ه}$ في $\overline{ب ه}$ إلا شيئاً: إلا أشياء بعدة $\overline{ب آ آ ه}$ أعني إلا أشياء بعدة $\overline{ب ه}$ وضعف $\overline{آ ه}$ ، وضرِب الشيء في $\overline{ب ه}$ أشياء بعدة $\overline{ب ه}$ ، وضرِب الشيء في $\overline{ب ه}$ إلا شيئاً إلا مالا،

- 5 فيكون / مجموع ثلثي عدد الجذور إلا أشياء بعدة ضعف $\overline{آ ه}$ إلا مالا. ل - ١١٨ - ط
 فنضربه في $\overline{ه ي}$ ، الشيء، ليحصل خاصةً المحسَم الثاني، فيكون أشياء بعدة ثلثي عدد الجذور إلا أموالاً بعدة ضعف $\overline{آ ه}$ إلا كعباً، وهو مع عدد التفاوت يعدل خاصةً المحسَم الأول، وهو أشياء بعدة ثلثي عدد الجذور وأموالاً بعدة $\overline{آ ه}$. فتزيد المستثنى على الجانبين، فيكون أشياء بعدة ثلثي عدد الجذور وعدد التفاوت تعدل أشياء بعدة ثلثي عدد الجذور وأموالاً بعدة ثلاثة أمثال $\overline{آ ه}$ وكعباً. فنسقط أشياء بعدة ثلثي عدد الجذور من الجانبين، يبقى عدد التفاوت مُعادلاً لكعب وأموالٍ بعدة ثلاثة أمثال $\overline{آ ه}$. فتجعل عدد التفاوت عدداً وثلاثة أمثال جذر ثلث عدد الجذور عدداً الأموال، ونستخرج المطلوب على مسألة: مكعب وأموال يعدل عدداً،
 15 فيخرج فضل المطلوب الأعظم على < جذر > ثلث عدد الجذور، فتزيده عليه فيحصل المطلوب.




- 1 ضرب: بضرب [ب، ل] - 2 شيئاً: شيء [ب، ل] - 4 شيئاً إلا مالا: شيء [ب، ل] -
 5 إلا مالا: ولا مالا [ب، ل] - 7 $\overline{آ ه}$ إلا: $\overline{آ ه}$ ولا [ب، ل] - 13 ثلث: ثلثي [ب، ل] -
 14 عدداً: تأكل موضع هذه الكلمة وموضع آخر حرف من الكلمة السابقة [ب]

- وأما استخراج التفاوت بين المطلوب الأصغر وبين جذر ثلث عدد الجذور: فليكن مربع $\overline{ا ج}$ مثل عدد الجذور، و $\overline{ا ز}$ مثل ثلثه، و $\overline{ا ي}$ المطلوب الأصغر. فلأن خاصّة المجسم الأول / هو ضرب علم $\overline{ج ز}$ في $\overline{ل - ١١٩ - و}$ $\overline{ي هـ}$ ، وخاصّة المجسم الثاني هو ضرب علم $\overline{م ز}$ في $\overline{ا ي}$ ، وفضل المجسم الأول على المجسم الثاني هو فضل خاصّة المجسم الأول على خاصّة المجسم الثاني، فعدد التفاوت بين المجسم الأول والعدد المسؤول إذا زيد على خاصّة المجسم الثاني يصير معادلاً لخاصّة المجسم الأول. فنجعل $\overline{هـ ي}$ شيئاً، فخاصّة المجسم الأول هو ضرب ثلثي عدد الجذور في الشيء، فيكون أشياء بعدّة ثلثي عدد الجذور. وخاصّة المجسم الثاني هو علم $\overline{م ز}$ في $\overline{ا ي}$ ، وهو من ضرب $\overline{ا ي ا هـ}$ - وهو ضعف $\overline{ا هـ}$ إلا شيئاً - في $\overline{ي هـ}$ الشيء ثم المبلغ في $\overline{ا ي}$ ، وهو $\overline{ا هـ}$ إلا شيئاً، وهو مساوٍ لضرب ضعف $\overline{ا هـ}$ إلا شيئاً في $\overline{ا هـ}$ إلا شيئاً ثم المبلغ في $\overline{ي هـ}$ الشيء. وضرب ضعف $\overline{ا هـ}$ في $\overline{ا هـ}$ ثلثا عدد الجذور، وإلا شيئاً في $\overline{ا هـ}$: إلا أشياء بعدّة $\overline{ا هـ}$ ، وضعف $\overline{ا هـ}$ في $\overline{ا هـ}$ شيئاً: إلا أشياء بعدّة ضعف $\overline{ا هـ}$ ، وإلا شيئاً في $\overline{ا هـ}$ 15 شيئاً: مال؛ فالمبلغ مال وثلثا عدد الجذور إلا أشياء بعدّة / ثلاثة أمثال $\overline{ب - ١٢ - و}$ $\overline{ا هـ}$. فنضربه في الشيء فيحصل كعب وأشياء بعدّة ثلثي عدد الجذور إلا أموالاً بعدّة ثلاثة أمثال $\overline{ا هـ}$ ، وهو مع عدد التفاوت يعدل أشياء بعدّة ثلثي عدد الجذور. / فتزيد المستثنى على الجانبين فيصير كعباً وأشياء بعدّة ثلثي $\overline{ل - ١١٩ - ط}$ عدد الجذور مع عدد التفاوت يعدل أشياء بعدّة ثلثي عدد الجذور وأموالاً بعدّة ثلاثة أمثال $\overline{ا هـ}$. فنسقط الأشياء المشتركة من الجانبين فيبقى: كعب مع عدد التفاوت يعدل \langle أموالاً بعدّة \rangle ثلاثة أمثال $\overline{ا هـ}$. فإذا جعلنا عدد

2 $\overline{ا ز}$: $\overline{ا م}$ [ب، ل] - 3 $\overline{ج ز}$: $\overline{ج م}$ [ب، ل] - 7 خاصة: هي الجزء الأول من الكلمة [ب] - 10 شيئاً: شيء [ب، ل] - 11 شيئاً: شيء [ب، ل] - 12 شيئاً (الأول والثانية): شيء [ب، ل] - 13 شيئاً: شيء [ب، ل] - 14 شيئاً (الأول والثانية): شيء [ب، ل] - 15 شيئاً: شيء [ب، ل] - 17 أموالاً: أموال [ب، ل]

التفاوت بين المجسّم الأول المعلوم وبين العدد المسؤول عدداً وثلاثة أمثال جذرٍ ثلث عدد الجذور عدد الأموال، واستخرجنا المطلوب بمسألة: مكعبٌ وعدد يعدل أموالاً؛ فيخرج لنا $\sqrt[3]{h}$ الشيء، فننقصه من جذر ثلث عدد الجذور، فما بقي فهو المطلوب الأصغر.



- 5 فحاصل الكلام في هذه المسألة أن نأخذ ثلث عدد الجذور ونستخرج جذره ونضربه في ثلثي عدد الجذور، فما حصل فهو العدد الأعظم. فإن كان العدد المذكور في المسألة أكثر من العدد الأعظم فالمسألة مستحيلة. كما إذا قيل: مكعب وعدد بهذه الصورة 75748722 يعدل جذوراً عددها بهذه الصورة 309123 ؛ فكان ثلث عدد الجذور 103041 وجذر الثلث / بهذه ل - ١٢٠ - و
- 10 الصورة 321 ، مضروبة في الثلثين بهذه الصورة 66152322 وهو العدد الأعظم. والعدد المذكور في السؤال أكثر منه، فالمسألة مستحيلة. وإن كان مثل العدد الأعظم فالجذر المطلوب هو < جذر > ثلث عدد الجذور، وإن كان أقلّ منه فله جوابان: أحدهما أن ينقص العدد المسؤول من العدد الأعظم فيكون: مكعب مع أموال عددها ثلاثة أمثال جذرٍ ثلث عدد

2 عدد الأموال: وعدد الأموال [ب. ل] - 3 جذر: كتبها ناسخ [ب]. كما لو كانت مدرو، وهكذا نقلها ناسخ [ل]

- الجنذور يعدل العدد الباقي، ونخرج الجنذر من مسألة: مكعب وأموال
 يعدل عدداً، وتزيده على جذر ثلث عدد الجنذور فما حصل فهو الجنذر
 المطلوب. مثاله: مكعب مع عدد بهذه الصورة ١٢٩٥٧٧٢٢ يعدل جنذوراً
 عددها بهذه الصورة ١٤٦٥٢٣ ، ثلث عدد الجنذور بهذه الصورة ٤٨٨٤١ ،
 5 جذر هذا الثلث بهذه الصورة ٢٢١ مضروبة في ثلثي عدد الجنذور بهذه
 الصورة ٢١٥٨٧٧٢٢ وهو العدد الأعظم؛ الفضل بينه وبين العدد المسؤول
 بهذه الصورة ٧٦٣٠٠٠٠ ثلاثة أمثال جذر ثلث عدد الجنذور بهذه الصورة
 / ٦٦٣ ؛ فكعب مع أموال عددها بهذه الصورة ٦٦٣ يعدل عدداً بهذه ج - ١٢٠ - ط
 الصورة ٧٦٣٠٠٠٠ ، فيستخرج الجنذر بطريق تلك المسألة، فيكون مائة،
 10 تزيدها على جذر ثلث عدد الجنذور، فيكون بهذه الصورة ٣٢١ وهو الجنذر
 المطلوب. وأما الجواب الآخر فينقص العدد المذكور في المسألة من العدد
 الأعظم، فيكون: مكعب مع العدد الباقي يعدل أموالاً عددها ثلاثة أمثال
 جذر ثلث عدد الجنذور، فيستخرج الجنذر بمسألة: مكعب وعدد يعدل
 أموالاً، فما خرج ننقصه من جذر ثلث عدد الجنذور، فما حصل فهو
 15 الجنذر المطلوب. مثاله: مكعب وعدد بهذه الصورة
 ١٣٧٦٠٦٩٢٢ يعدل جنذوراً عددها بهذه الصورة ٥٣١٧٢٣ ، ثلث عدد الجنذور
 بهذه الصورة ١٧٧٢٤١ ، جذر هذا الثلث بهذه الصورة ٤٢١ مضروب هذا
 الجنذر في ثلثي عدد الجنذور بهذه الصورة ١٤٩٢٣٦٩٢٢ وهو العدد الأعظم؛
 الفضل بينه وبين العدد المذكور في المسألة بهذه الصورة ١١٦٣٠٠٠٠ / ثلاثة ل - ١٢١ - و
 20 أمثال جذر ثلث عدد الجنذور بهذه الصورة ١٢٦٣ ، فيكون مكعباً مع عدد
 بهذه الصورة ١١٦٣٠٠٠٠ يعدل أموالاً بهذه الصورة ١٢٦٣ ، فنستخرج الجنذر

12 أمثال: عي أولاً لتأكل المخطوطة [ب] - ١٣٧٦٠٦٩٢٢ : ١٣٥٦٩٢٢ [ب، ل] - 20 بهذه
 الصورة: أثبت ناسخ [ب] «بهذه في الماشع مع بيان موضعها / ١٢٦٣ : ١٢٦١ [ب، ل] -

الواحد بمسألة: مكعب وعدد يعدل أموالاً، فيكون مائة، ننقصها من جذر
ثلاث عدد الجذور، فيبقى ٣٧١ وهو الجذر المطلوب؛ وذلك ما أردنا بيانه.


المسألة الثالثة: مكعب وعدد وأموال يعدل جذوراً.

- فليكن مربع $\overline{ا د}$ عدد الجذور و $\overline{ب ج}$ عدد الأموال. فلأن الجذر
5 المطلوب إذا ضرب في مربعه حصل المكعب فقط، وإذا ضرب في عدد
الجذور - وهو مربع $\overline{ا د}$ - حصل مبلغ الجذور، وهو مجسم قاعدته مربع
 $\overline{ا د}$ وارتفاعه بمقدار الجذر المطلوب؛ فيكون أكثر من المكعب المذكور
بمقدار العدد المذكور في السؤال مع ضرب مال الجذر المطلوب / في $\overline{ب ج}$ - ١٢ - ظ
الذي هو عدد الأموال، فيكون $\overline{ا ب}$ أعظم من الجذر المطلوب، وينفصل
10 منه الجذر المطلوب على مثال $\overline{ب ه}$. فرب $\overline{ا د}$ إذا ضرب في $\overline{ب ه}$ حصل
مبلغ الجذور المساوي للمكعب والأموال والعدد، والذي «هو» مجسم
ينقسم إلى قسمين لانقسام قاعدته إلى مربع $\overline{ب ز}$ وإلى العلم. وأحد قسمي
ذلك المجسم / هو ضرب مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ب ه}$ ، وهو مكعب $\overline{ب ه}$ ، ل - ١٣ - ظ
فيبقى ضرب العلم في $\overline{ب ه}$ مساوياً للعدد المسؤول مع مبلغ الأموال، أعني
15 ضرب مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ب ج}$ الذي هو عدد الأموال. فلو كان العدد
المسؤول إلى حد لا يمكن أن يقسم $\overline{ا ب}$ قسمة يكون «معها» ضرب أحد
القسمين في العلم الباقي من عدد الجذور مساوياً للعدد، مع مربع ذلك
القسم في عدد الأموال، كانت المسألة مستحيلة. فليكن $\overline{ب ج}$ ثلثي عدد
الأموال، ونجعل ثلاث عدد الجذور عدداً، وهو ثلاث مربع $\overline{ا د}$ ، ونخط
20 $\overline{ب ح}$ عدد جذور، ونعمل سؤالاً على مسألة: مال وجذور يعدل عدداً


3 المسألة الثالثة: ناقصة [ل] - 11 والذي: محو لتآكل المخطوطة [ب]، الذي [ل] - 13 في $\overline{ب ه}$:
محو [ب]، في ١١ [ل]

بعدة ثلث مربع $\overline{ا د}$ ، وليكن المطلوب الذي يخرج هو خط $\overline{ب ه}$ ، ونعمل مربع $\overline{ب ز}$. فأقول: إن $\overline{ب ه}$ إذا ضرب في علم $\overline{ط ز}$ حتى حصل المجسم الأول، ثم نقص من المجسم الأول ضرب مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ب ج}$ الذي هو < عدد > الأموال حتى بقي العدد، فلا يمكن أن ينقسم $\overline{ا ب}$ على نقطة أخرى بحيث إذا جعل أحد قسميه جذراً، وضرب في مربع $\overline{ا د}$ ، ونقص مكعبه من المجسم الحاصل، ثم ضرب مربعه في عدد الأموال، ونقص من الباقي، يبقى العدد مثل الباقي من المجسم الأول أو أكثر بل يبقى أقل منه؛ حتى لو كان / العدد المسؤول أكثر من العدد الباقي من المجسم الأول كانت $د - ١٢٢ - و$

المسألة مستحيلة.



10 وليكن نقطة $\overline{ي}$ فيما بين نقطتي $\overline{ا ه}$ ، ونضرب $\overline{ب ي}$ في علم $\overline{ط ك}$ ليحصل المجسم الثاني، ونضرب < مربع > $\overline{ب ك}$ في $\overline{ب ج}$ الذي هو عدد الأموال حتى يحصل مبلغ الأموال ونقصه من المجسم الثاني ليبقى العدد. فأقول: إن هذا العدد يكون أقل من العدد الذي بقي من المجسم الأول.



7 مثل: مع (ب، ل)

لأن الجسم الأول ينقسم إلى ضرب كل واحد من العلمين في $\overline{ب ه}$ والجسم الثاني ينقسم إلى ضرب العلم الخارج في $\overline{ب ه}$ وفي $\overline{ي ه}$ ، فضرِب العلم الخارج في $\overline{ب ه}$ مشترك؛ فيخص الجسم الأول ضرب العلم الداخل في $\overline{ب ه}$ ويخص الجسم الثاني ضرب العلم الخارج في $\overline{ي ه}$. ولأننا نقص 5 من الجسم الأول ضرب مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ب ج}$ ، حتى يبق العدد، ومن الجسم الثاني ضرب مربع $\overline{ك ب}$ في $\overline{ب ج}$ لبقى العدد، والذي ننقصه من الجسم الثاني أكثر مما ننقصه من الجسم الأول بمقدار ضرب العلم الداخل في $\overline{ب ج}$ ، فلأننا لو نقصنا من كل واحد من الجسمين مقدارين متساويين لكان الفضل بين البقيتين مثل الفضل بين الجسمين، الذي هو الفضل


10 / بين الخاصتين. فإذا نقصنا من أحد الجسمين المقدار الذي كنا نقص منه ل - ١٢٢ - ظ

حال ما كان المنقوصان متساويين، ونفصل من الآخر أقل من ذلك المقدار، فيقدر الزيادة التي تكون في أحد المنقوصين تلزم الزيادة في البقية الأخرى على ما لو كان المنقوصان متساويين. والذي ننقصه من الجسم الثاني أكثر مما ننقصه من الجسم الأول بمقدار العلم الداخل في $\overline{ب ج}$ ، 15 فيكون البقية التي تبقى من الجسم الأول تفضل البقية الأخرى بهذا المقدار؛ فيكون التفاوت بين البقيتين - بعد نقصان الأموال من الجسمين - هو التفاضل بين خاصة الجسم الثاني وبين المجموع الحاصل من خاصة الجسم الأول، مع العلم الداخل في $\overline{ب ج}$ ، وهو العلم الداخل في $\overline{ه ج}$. فالتفاوت بين العددين الباقيين هو التفاوت بين خاصة الجسم 20 الثاني وبين ضرب العلم الداخل في $\overline{ه ج}$. فلو كان العلم الداخل في $\overline{ه ج}$ أكثر من خاصة الجسم الثاني لكان العدد الباقي من الجسم الأول أكثر من

- العدد الباقي من المجسم الثاني. لكن العلم الداخل في $\overline{هـ ج}$ أكثر؛ لأن ثلاثة مربعات $\overline{هـ ب}$ مع ضرب $\overline{هـ ب}$ في ثلاثة أمثال $\overline{ب ح}$ مثل مربع $\overline{ا د}$ ، و $\overline{ب ح}$ ثلثا $\overline{ب ج}$ ، يكون ثلاثة أمثاله مثلي $\overline{ب ج}$ ؛ فثلاثة مربعات $\overline{ب هـ}$ / مع ضرب $\overline{ب هـ}$ في مثلي $\overline{ب ج}$ تساوي مربع $\overline{ا د}$. فنسقط مربع $\overline{ب ز}$ ل - ١٢٣ - و
- المشترك من الجانبين، يبقى في أحد الجانبين علم $\overline{ط ز}$ ، وفي الجانب الآخر 5 مربع $\overline{ب ز}$ مرتين، مع ضرب $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ب ج}$ مرتين، وبمجموعهما ضرب ضعف $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ب ج}$. فضرب ضعف $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ب ج}$ يساوي علم $\overline{ط ز}$ ، وهو ضرب $\overline{ا ب}$ $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ا هـ}$. فنسبة $\overline{ا ب}$ $\overline{ب هـ}$ إلى ضعف $\overline{ب هـ}$ كنسبة $\overline{هـ ج}$ إلى $\overline{ا هـ}$ ؛ ولأن علم $\overline{ط ك}$ أصغر من علم $\overline{ط ز}$ ، فضرب $\overline{ا ب}$ $\overline{ب ي}$ في $\overline{ا ي}$ - وهو علم $\overline{ط ك}$ - أصغر من ضرب ضعف $\overline{ب هـ}$ في 10 $\overline{هـ ج}$ ؛ فنسبة $\overline{ا ب}$ $\overline{ب ي}$ إلى ضعف $\overline{ب هـ}$ أصغر من نسبة $\overline{هـ ج}$ / إلى ب - ١٣ - و
- $\overline{ا ي}$ ، ونسبة $\overline{ا ب}$ $\overline{ب ي}$ إلى ضعف $\overline{ب هـ}$ أعظم من نسبة $\overline{ا ب}$ $\overline{ب ي}$ إلى $\overline{ب هـ}$ $\overline{ب ي}$. فنسبة $\overline{ا ب}$ $\overline{ب ي}$ إلى $\overline{ب هـ}$ $\overline{ب ي}$ أصغر بكثير من نسبة $\overline{هـ ج}$ إلى $\overline{ا ي}$. فنجعل نسبة $\overline{ا ي}$ إلى $\overline{هـ ي}$ مشتركة، فالنسبة 15 المؤلفة من نسبة $\overline{ا ب}$ $\overline{ب ي}$ إلى $\overline{ب ي}$ $\overline{ب هـ}$ ، ومن نسبة $\overline{ا ي}$ إلى $\overline{هـ ي}$ ، وهي نسبة علم $\overline{ط ك}$ إلى علم $\overline{ك ز}$ ، أصغر من النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{هـ ج}$ إلى $\overline{ا ي}$ ، ومن نسبة $\overline{ا ي}$ إلى $\overline{هـ ي}$ وهي نسبة $\overline{هـ ج}$ إلى $\overline{هـ ي}$. فضرب علم $\overline{ط ك}$ في $\overline{ي هـ}$ أصغر من ضرب علم $\overline{ك ز}$ في $\overline{هـ ج}$. فيكون بقية المجسم الأول - وهو العدد - أكثر / من بقية المجسم الثاني. ل - ١٢٣ - ط
- وأيضاً: فليكن نقطة م فيما بين نقطتي $\overline{ب هـ}$ ، فيكون المجسم الثاني 20 وهو علم $\overline{ط ن}$ في $\overline{ب م}$ ، فإذا نقص منه الأموال، وهو مربع $\overline{ب ن}$ في

١ ثلاثة: ثلث [ب، ل] - 3 ب ح: ب ج [ب، ل] / ثلاثة: ثلث [ب، ل] - 14 ا ي (الأول): م ي [ب، ل] - 21 وهو (الأول): هو [ب، ل]

بـ $\overline{ج}$ يكون البقية هو العدد. فأقول: إن هذه البقية أيضاً أقل من البقية التي تبقى من الجسم الأول.



لأن الجسم الأول ينقسم إلى ضرب علم ط ز في ب م، وفي هـ م. والجسم الثاني ينقسم إلى ضرب العلم الداخل والخارج في ب م، فيكون 5 خاصة الجسم الأول هو ضرب العلم الخارج في هـ م، وخاصة الجسم الثاني هو ضرب العلم الداخل في م ب. وإنما ينقص من الجسم الأول مربع ب ز في ب ج ليبقى العدد، وينقص من الجسم الثاني مربع ب ن في ب ج ليبقى العدد؛ وذلك نقصان أكثر من هذا النقصان بمقدار العلم الداخل في ب ج، وبقدر ذلك تزيد في هذا الجانب كما ذكرنا؛ فيبلغ 10 خاصة الجسم الثاني ضرب العلم الداخل في ب م مع ضربه في ب ج أعني ضرب العلم الداخل في هـ م، وتكون خاصة الجسم الأول من ضرب العلم الخارج في هـ م، فيكون البقية < فضل الجسم الأول > عن الأخير. كذلك لأن نسبة ا ب ب هـ إلى ضعف ب هـ كنسبة ج هـ إلى ا هـ على ما تقدم، ونسبة ا ب ب هـ / إلى هـ ب ب م أعظم من نسبة ل - ١٢٤ - و 15 ا ب ب هـ إلى ضعف ب هـ، ونسبة ج م إلى ا هـ أصغر من نسبة ج هـ إلى ا هـ، فنسبة ا ب ب هـ إلى هـ ب ب م أعظم من نسبة ج م إلى

12 الأول: بعدها كلمة أو كلمتان مطموستان قد تكونان «أكثر من». وفي هذه الحال تكون الجملة «فيكون البقية الأولى أكثر من الآخرة [ب]»، ولهذا آثرنا التصحيح

أ هـ. فنجعل نسبة $\overline{ا هـ}$ إلى $\overline{م هـ}$ مشتركة، فتصير النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ا ب ب هـ}$ إلى $\overline{ب ب م هـ}$ ومن نسبة $\overline{ا هـ}$ إلى $\overline{م هـ}$ - وهي نسبة علم $\overline{ط ز}$ إلى علم $\overline{ز ن}$ - أعظم من النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ج م}$ إلى $\overline{ا هـ}$ ، ومن نسبة $\overline{ا هـ}$ إلى $\overline{م هـ}$ ، وهي نسبة $\overline{ج م}$ إلى $\overline{م هـ}$. فنسبة علم $\overline{ط ز}$ إلى $\overline{علم ز ن}$ أعظم من نسبة $\overline{ج م}$ إلى $\overline{م هـ}$. فضرب علم $\overline{ط ز}$ في $\overline{م هـ}$ أعظم من ضرب علم $\overline{ز ن}$ في $\overline{ج م}$. فبقية المجسم الأول أعظم من بقية المجسم الثاني.

فقد تبين أن أعظم عدد يمكن في هذه المسألة مع فرض عدد الجذور إنما هو البقية المذكورة، وطريق استخراج $\overline{ب هـ}$ إنما يكون بمسألة: مال وجذور يعدل عدداً، بأن نجعله شيئاً. فلأن نسبة $\overline{ا ب ب هـ}$ إلى ضعف $\overline{ب هـ}$ كنسبة $\overline{هـ ج}$ إلى $\overline{ا هـ}$ ، فضرب $\overline{ا ب ب هـ}$ في $\overline{ا هـ}$ - وهو العلم - مثل ضعف $\overline{ب هـ}$ في $\overline{هـ ج}$ ، ولأن $\overline{ا ب ب هـ}$ جذر عدد الجذور وشيء و $\overline{ا هـ}$ جذر عدد الجذور إلا شيئاً، فضرب أحدهما في الآخر يكون عدد الجذور إلا مالاً؛ وضعف $\overline{ب هـ}$ ، وهو شيئان، في $\overline{ج هـ}$ ، عدد الأموال 15 وشيء، يكون مالان وأشياء بعدة ضعف عدد الأموال، وهو معادل لعدد الجذور إلا مالاً. فثلاثة أموال وأشياء بعدة ضعف عدد الأموال تعدل عدد الجذور؛ فالمال الواحد مع أشياء بعدة ثلثي عدد الأموال يعدل ثلث عدد الجذور. فإذا استخرجنا المطلوب بمسألة: مال وجذور يعدل عدداً، يخرج

$\overline{ب هـ}$ ، وهو المطلوب / الأول فينقص مربعه من مربع «جذر» عدد $ل - ١٢٤ - ظ$ 20 الجذور ليبقى العلم، ويضرب $\overline{ب هـ}$ في العلم ليحصل المجسم الأول، ثم يضرب مربع $\overline{ب هـ}$ في عدد الأموال وينقص المبلغ من المجسم الأول،

2-1 نسبة $\overline{ا ب ب هـ}$ إلى $\overline{ا هـ}$ - 5-4 إلى علم: ناقصة [ل] - 13-9 إنما هو البقية ... و $\overline{ا هـ}$ جذر: ناقصة

[ل] - 13 شيئاً: شيء [ب، ل] - 21 المبلغ: محمودة [ب]

ليبقى العدد الأعظم. فإن كان العدد المسؤول أكثر من العدد الأعظم فالمسألة مستحيلة، وإن كان مساوياً له فهي ممكنة، ولها مطلوب واحد وهو المطلوب الأول، وهو خط $\overline{ب هـ}$ ، وإن كان أقل منه فلها جوابان: أحدهما أعظم من $\overline{ب هـ}$ والآخر أصغر منه.


5 أما الأعظم: فنخرج $\overline{ب ج}$ عدد الأموال بالاستقامة، ونجعل $\overline{ج ع}$ ضعف $\overline{هـ ب}$. فلأن $\overline{هـ ب}$ معلوم، وب $\overline{ج ع}$ عدد الأموال (معلوم) و $\overline{ج ع}$ معلوم، فخط $\overline{هـ ع}$ معلوم، فنجعله عدد أموال، ونجعل فضل البقية العظمى على العدد المسؤول - وهو عدد التفاوت - عدداً، ونعمل سؤالاً على مسألة: مكعب وأموال بعدة $\overline{هـ ع}$ يعدل عدد التفاوت؛ وليكن 10 المطلوب الذي يخرج خط $\overline{هـ ي}$ ، حتى يكون مربعه في $\overline{ي هـ}$ ، وهو مكعبه، وفي $\overline{هـ ع}$ ، وهو عدد الأموال، يعدل عدد التفاوت؛ فيكون $\overline{هـ ي}$ أصغر من $\overline{ا هـ}$ يمثل ما مرّ في المسألة المتقدمة. فأقول: إن $\overline{ب ي}$ هو مطلوبنا في هذه المسألة.

لأن ضرب علم $\overline{ك ز}$ في $\overline{ج هـ}$ ينقسم إلى ضرب $\overline{ي هـ}$ في ضعف 15 $\overline{ب هـ}$ ، ثم في $\overline{ج هـ}$ ، وإلى ضرب مربع $\overline{ي هـ}$ في $\overline{ج هـ}$ ، والقسم الأول مساوٍ لضعف $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ج هـ}$ ، ثم في $\overline{ي هـ}$ ، فيكون علم $\overline{ك ز}$ في $\overline{ج هـ}$ مثل مربع $\overline{ي هـ}$ في $\overline{ج هـ}$ ، و (هو) مثل ضعف $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ج هـ}$ / ثم في $\overline{ي هـ}$. 1 - 120 - و لكن ضعف $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ج هـ}$ هو علم $\overline{ط ز}$. فعلم $\overline{ك ز}$ في $\overline{ج هـ}$ مثل مربع $\overline{ي هـ}$ في $\overline{ج هـ}$ ، مع مضروب علم $\overline{ط ز}$ في $\overline{ي هـ}$ ، وهو ينقسم إلى علم 20 $\overline{ط ك}$ في $\overline{ي هـ}$ وإلى علم $\overline{ك ز}$ في $\overline{ي هـ}$. / فعلم $\overline{ك ز}$ في $\overline{ج هـ}$ يساوي مربع $\overline{ب هـ}$ - 13 - ظ $\overline{ي هـ}$ في $\overline{ج هـ}$ ، وعلم $\overline{ط ك}$ في $\overline{ي هـ}$ ، وعلم $\overline{ك ز}$ في $\overline{ي هـ}$ ؛ لكن علم

11-9 وليكن المطلوب ... عدد التفاوت: ناقصة [ل] - 21 لكن علم ... في $\overline{ي هـ}$: ناقصة [ل]

$\overline{\text{ك ز في ي ه}}$ مثل $\overline{\text{مربع ي ه}}$ في ضعف $\overline{\text{ه ب}}$ ، أعني في $\overline{\text{ج ع}}$ ، ومثل
 $\overline{\text{مكعب ي ه}}$. فعلم $\overline{\text{ك ز في ه ج}}$ مثل $\overline{\text{مربع ي ه}}$ في $\overline{\text{ه ج}}$ ومربع $\overline{\text{ي ه}}$
في $\overline{\text{ج ع}}$ ومكعب $\overline{\text{ي ه}}$ ؛ وهذه الثلاثة هي $\overline{\text{مربع ي ه}}$ في $\overline{\text{ي ع}}$ ؛ والقسم
الرابع علم $\overline{\text{ط ك في ي ه}}$ ؛ فعلم $\overline{\text{ك ز في ه ج}}$ مثل $\overline{\text{مربع ي ه}}$ في $\overline{\text{ي ع}}$
5 مع علم $\overline{\text{ط ك في ي ه}}$. فإذا نقصنا من كلا الجانبين علم $\overline{\text{ك ز في ب ج}}$ ،
فبقي من أحدهما $\langle \text{علم} \rangle$ $\overline{\text{ك ز في ب ه}}$ ومن الآخر علم $\overline{\text{ط ك في ي ه}}$ مع
مربع $\overline{\text{ي ه}}$ في $\overline{\text{ي ع}}$ منقوصاً منها علم $\overline{\text{ك ز في ب ج}}$ ؛ والجانبان
متساويان؛ فإذا زدنا على كلا الجانبين علم $\overline{\text{ط ك في ب ه}}$ ، يصير أحدهما
علم $\overline{\text{ط ز في ه ب}}$ والآخر علم $\overline{\text{ط ك في ي ب}}$ مع مربع $\overline{\text{ي ه}}$ في $\overline{\text{ي ع}}$
10 بنقصان علم $\overline{\text{ك ز في ب ج}}$ ، مع بقاء تساوي الجانبين. فإذا نقصنا من
كليهما مربع $\overline{\text{ه ب}}$ في $\overline{\text{ب ج}}$ يبقى أحدهما علم $\overline{\text{ط ز في ه ب}}$ منقوصاً منه
مربع $\overline{\text{ه ب}}$ في $\overline{\text{ب ج}}$ ، وهي بقية ضلع $\overline{\text{ه ب}}$ ، مساوياً للجانب الآخر
/ وهو علم $\overline{\text{ط ك في ب ي}}$ مع مربع $\overline{\text{ي ه}}$ في $\overline{\text{ي ع}}$ بنقصان مربع $\overline{\text{ك ب}}$ ل - ١٢٥ - ط
في $\overline{\text{ب ج}}$ ، وهو بقية ضلع $\overline{\text{ب ي}}$ في $\langle \text{ي ع} \rangle$ مع مربع $\overline{\text{ي ه}}$ في $\overline{\text{ي ع}}$.
15 وقد كان العدد المسؤول مع مربع $\overline{\text{ه ي}}$ في $\overline{\text{ي ع}}$ مثل بقية ضلع $\overline{\text{ه ب}}$
أيضاً. فبقية ضلع $\overline{\text{ب ي}}$ مع مربع $\overline{\text{ي ه}}$ في $\overline{\text{ي ع}}$ مثل العدد المسؤول مع
مربع $\overline{\text{ي ه}}$ في $\overline{\text{ي ع}}$. فإذا ألقينا مربع $\overline{\text{ي ه}}$ في $\overline{\text{ي ع}}$ المشترك، يبقى بقية
ضلع $\overline{\text{ب ي}}$ مثل العدد المسؤول. فإذا جعلنا خط $\overline{\text{ب ي}}$ جذراً وضربناه في
مربع $\overline{\text{أ ب}}$ ، وهو عدد الجذور، حصل مبلغ الجذور، وهو مجسم قاعدته
20 مربع $\overline{\text{أ د}}$ وارتفاعه $\overline{\text{ب ي}}$ ، الجذر؛ فإذا نقصنا منه مربع $\overline{\text{ب ي}}$ ، وهو
المال، في $\overline{\text{ب ج}}$ ، وهو عدد الأموال، مع مكعب $\overline{\text{ي ب}}$ تبقى البقية معادلة
للعدد المسؤول. فيكون الجذور مساوية للمكعب والأموال والعدد.

١ في ضعف: وفي ضعف [ب، ل] - 5 كلا: كل [ب، ل] - 17 فإذا ألقينا ... ي ع: ناقصة [ل]




وأما المطلوب الأصغر من $\overline{ب هـ}$ ، فنجعل $\overline{ج ع}$ ضعف $\overline{ب هـ}$ ، ونجعل $\overline{هـ ع}$ عدد الأموال، ونجعل عدد التفاوت، وهو فضل بقية ضلع $\overline{ب هـ}$ على العدد المسؤول، عدداً، ونعمل سؤالاً على مسألة: مكعب وعدد يعدل أموالاً. وليكن المطلوب الذي يخرج $\overline{هـ م}$ حتى يكون مربعه في $\overline{هـ ع}$ مثل $\overline{ل - ١٢٦ - و}$ مكعبه مع عدد التفاوت؛ فيكون مربع $\overline{هـ م}$ في $\overline{م ع}$ مثل عدد التفاوت، ويكون $\overline{هـ م}$ أصغر من $\overline{ب هـ}$ بمثل ما مرّ في المسألة المتقدمة فأقول: إن $\overline{ب م}$ هو مطلوبنا في هذه المسألة.

فلأن علم $\overline{ط ز}$ مثل ضعف $\overline{ب هـ}$ في $\overline{هـ ج}$ ، فيكون ضعف $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ج هـ}$ ثم في $\overline{هـ م}$ مثل علم $\overline{ط ز}$ في $\overline{هـ م}$. لكن ضعف $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ج هـ}$ ثم في $\overline{هـ م}$ مثل ضعف $\overline{ب هـ}$ في $\overline{هـ م}$ ثم في $\overline{هـ ج}$ ، وهو مثل علم $\overline{ز س}$ في $\overline{هـ ج}$ ومربع $\overline{هـ م}$ في $\overline{هـ ج}$. أما علم $\overline{ز س}$ في $\overline{هـ ج}$ ففساؤُ لعلم $\overline{ز س}$ في $\overline{هـ م}$ مع علم $\overline{ز س}$ في $\overline{م ج}$. فقد صار علم $\overline{ط ز}$ في $\overline{هـ م}$ مساوياً لجمع علم $\overline{ز س}$ في $\overline{هـ م}$ مع علم $\overline{ز س}$ في $\overline{م ج}$ ومربع $\overline{هـ م}$ في $\overline{ب م}$. أما علم $\overline{ز س}$ في $\overline{هـ م}$ (فهو) مثل مربع $\overline{هـ م}$ في $\overline{هـ ب}$ ومربع $\overline{هـ م}$ في $\overline{ب م}$. أما مربع $\overline{هـ م}$ في $\overline{هـ ج}$ (فهو) مثل مربع $\overline{هـ م}$ في $\overline{هـ ب}$ ومربع $\overline{هـ م}$ في $\overline{ب ج}$. فقد صار جميع الأقسام المساوية لعلم $\overline{ط ز}$ في $\overline{هـ م}$ هي مربع $\overline{هـ م}$ في $\overline{ب هـ}$ مرتين؛ أعني مربع $\overline{هـ م}$ في $\overline{ج ع}$ ؛ ومربع $\overline{هـ م}$ في $\overline{ب م}$ وفي $\overline{ب ج}$ وعلم $\overline{ز س}$ في

3 وعدد: ناقصة [ل] - 5 مع: في [ب، ل] - 12-13 $\overline{ز س}$ في $\overline{هـ م}$: $\overline{ز س}$ في $\overline{هـ م}$ [ب، ل] - 14-13 $\overline{ز س}$ في $\overline{هـ م}$: $\overline{ز س}$ في $\overline{هـ م}$ [ب، ل] - 15 $\overline{هـ ج}$: $\overline{ب ج}$ [ب، ل] / $\overline{هـ م}$ (الثانية): $\overline{هـ ب}$ [ب، ل] - 16 $\overline{ب هـ}$: $\overline{ب م}$ [ب، ل]

م ج. والأقسام الثلاثة الأول مثل مربع هـ م في م ع. فقد تبين أن علم
 ط ز / في هـ م مثل علم ز س في م ج مع مربع هـ م في م ع. فإذا ل - ١٢٦ - ط
 نقصنا من كلا الجانبين علم ز س في م ج، يبقى من أحد الجانبين علم
 ط ز في هـ م بنقصان علم ز س في م ج مساوياً للجانب الآخر، وهو علم
 ز س في م ب مع «مربع» هـ م في م ع. فإذا زدنا على كلا الجانبين علم
 ط ز في م ب حصلت المساواة، ويصير في أحدهما علم ط ز في هـ ب
 بنقصان علم ز س في م ج، وفي الجانب الآخر علم ط س في م ب مع
 مربع هـ م في م ع. فإذا نقصنا من الجانبين مربع ب م في م ج، حصل
 في أحدهما علم ط ز في هـ ب بنقصان مربع ز ب في م ج، وهي بقية
 10 ضلع هـ ب، مساوياً للجانب الآخر، وهو علم ط س في م ب مع مربع
 هـ م في م ع بنقصان مربع ب م في م ج، وهي بقية ضلع ب م مع
 مربع هـ م في م ع. وقد كانت بقية ضلع هـ ب مثل العدد مع مربع هـ م
 في م ع. فيكون بقية ضلع ب م مع مربع هـ م في م ع مثل العدد
 المسؤول مع مربع هـ م في م ع؛ فنسقط المشترك، فيبقى العدد المسؤول
 15 مثل بقية ضلع ب م. فإذا جعلنا ب م جذراً وضربناه في مربع أ د، وهو
 عدد الجذور، حصل مبلغ الجذور؛ وينقسم إلى مكعب ب م وإلى علم
 ط س في م ب. فإذا نقصنا منه مربع / ب م في م ج وهو مبلغ
 الأموال مع مكعب م ب، تبقى البقية معادلة للعدد المسؤول؛ فيكون مبلغ
 الجذور معادلةً للمكعب والأموال / والعدد.



2 مربع هـ م: محو [ب] - 19 والأموال: مثبتة في الهامش في التحقية، ولكن الناسخ نسي نقلها
 للصفحة التالية [ب]


وطريق استخراج كل واحد من المطلوبين، أعني الأعظم والأصغر، باستخراج التفاوت بينه وبين المطلوب الأول.

وأما استخراج التفاوت بين الأعظم وبين المطلوب الأول فيؤدي إلى مسألة: مكعب وأموال يعدل عدداً. لأننا بينا أن التفاوت بين العدد الباقي من المَجَسَّم الأول وبين العدد الباقي من المَجَسَّم الثاني، بعد نقصان الأموال 5 من المَجَسَّمين، هو التفاوت بين خاصة المَجَسَّم الثاني وبين العلم الداخل في $\overline{هـ ج}$. فيكون عدد التفاوت مساوياً لفضل العلم الداخل في $\overline{هـ ج}$ على خاصة المَجَسَّم الثاني، وهو ضرب العلم الخارج في $\overline{ي هـ}$. فنجعل $\overline{ي هـ}$ شيئاً، فالعلم الداخل من ضرب $\overline{ي ب}$ $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ي هـ}$ ، وهو ضعف $\overline{ب هـ}$ 10 وشيء، في الشيء؛ فيكون أشياء بعدة ضعف $\overline{ب هـ}$ ومالاً. وإذا ضربناه في $\overline{هـ ج}$ ، يحصل أشياء بعدة < ضعف > ضرب $\overline{ب هـ}$ في $\overline{هـ ج}$ ، وأموالٌ بعدة $\overline{هـ ج}$.

وأما جانب المَجَسَّم الثاني، فلأن العلم الخارج من ضرب $\overline{أ ب}$ $\overline{ب ي}$ في $\overline{أ ي}$ ، أعني جذر عدد الجذور مع $\overline{ب هـ}$ وشيء / في $\overline{أ ي}$ وهو $\overline{أ هـ}$ إلا $\overline{ل - ١٢٧ - ظ}$ شيئاً، فيصير العلم الخارج عدداً بمقدار ضرب $\overline{أ ب}$ $\overline{ب هـ}$ في $\overline{أ هـ}$ إلا أشياء بعدة ضعف $\overline{ب هـ}$ وإلا مالاً. فإذا ضربناه في $\overline{ي هـ}$ الشيء، يصير أشياء بعدة ضرب $\overline{أ ب}$ $\overline{ب هـ}$ في $\overline{أ هـ}$ إلا أموالاً بعدة ضعف $\overline{ب هـ}$ ، وإلا كعباً. فهذه خاصة المَجَسَّم الثاني، وهو مع عدد التفاوت بين المسؤول والأعظم يصير معادلاً لما في جانب المَجَسَّم الأول، وهو أشياء بعدة ضعف ضرب 20 $\overline{ب هـ}$ في $\overline{هـ ج}$ ، وأموالٌ بعدة $\overline{هـ ج}$. فبقدر زيادة المستثنى على الجانبين يصير جانب المَجَسَّم الأول أشياء بعدة ضعف ضرب $\overline{ب هـ}$ في $\overline{هـ ج}$ وأموالاً

3 وأما: الواو محوكة لتأكل المخطوطة [ب] - 6 من المَجَسَّمين: «من»، محوكة، وكذلك بعض حروف «المَجَسَّمين» [ب] - 10 ومالاً: مالاً [ب، ل] - 15 شيئاً: شيء [ب، ل]

- العلم الداخل في $\overline{ب ج}$ ؛ فيكون عدد التفاوت مساوياً لفضل خاصة المجسم الأول على ضرب العلم الداخل في $\overline{ب ج}$. فيجعل $\overline{ه م}$ شيئاً، فالذي في جانب المجسم الأول يكون أشياء بعدة العلم الخارج ؛ وأما في جانب المجسم الثاني فالعلم الداخل من ضرب $\overline{ه ب}$ $\overline{ب م}$ - وهو ضعف $\overline{ب ه}$ 5 إلا شيئاً - في $\overline{ه م}$ الشيء، يكون أشياء بعدة ضعف $\overline{ب ه}$ إلا مالا. وإذا ضربناه في $\overline{م ج}$ وهو $\overline{ه ج}$ إلا شيئاً، يصير أشياء بعدة ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ه ج}$ ومكعباً إلا أموالاً بعدة ضعف $\overline{ب ه}$ وبعدة $\overline{ه ج}$ ، أعني بعدة ثلاثة أمثال $\overline{ب ه}$ ، وبعدة $\overline{ب ج}$ ، وهو مع عدد التفاوت يعدل أشياء بعدة العلم الخارج في $\overline{ه م}$. فتزيد المستثنى على الجانبين ونلقي الأشياء بالأشياء لكونها 10 متساوية لما مر، فيحصل في أحد الجانبين أموال / بعدة ثلاثة أمثال $\overline{ب ه}$ - 128 - ط المطلوب الأول مع عدد الأموال المسؤولة، وفي الجانب الآخر عدد التفاوت ومكعب. فقد تأدّى إلى مسألة: مكعب وعدد يعدل أموالاً، فيستخرج المطلوب بتلك المسألة، فيخرج لنا $\overline{ه م}$ ، فإذا نقصناه من $\overline{ب ه}$ ، المطلوب الأول، يبقى $\overline{ب م}$ ، وهو الجواب الأصغر.



1 $\overline{ب ج}$: $\overline{م ج}$: $\overline{م ج}$ [ب، ج] - 5 شيئاً : شيء [ب، ج] / بعدة : محوة [ب] - 6 شيئاً : شيء [ب، ج] - 7 وبعدة : محوة [ب]

مثال المسألة فيما إذا كان الجذر الخارج هو المطلوب الأول: مكعب وثلاثون مالا وعدد بهذه الصورة ٦٩٢٤٣٥٥٢ يعدل جذوراً عددها بهذه الصورة ٣٢٨٣٨٣.

فناخذ ثلث عدد الجذور فيكون بهذه الصورة ١٠٩٤٦١، ونجعلها عدداً 5 ونأخذ ثلثي عدد الأموال، وهو عشرون، ونجعلها جذوراً، فيكون مال وعشرون جذراً يعدل عدداً بهذه الصورة ١٠٩٤٦١، ونستخرج المطلوب على مسألة: مال وجذور يعدل عدداً، فيخرج الجذر بهذه الصورة ٣٢١، وهو المطلوب الأول. فنجعله مربعاً فيكون بهذه الصورة ١٠٣٠٤١، فننقصه من عدد الجذور وذلك ممكن أبداً، فيبقى عدد بهذه الصورة ٢٢٥٣٤٢، فنضربه

10 في المطلوب / الأول، فيحصل الجسم الأعظم بهذه الصورة ٧٢٣٣٤٧٨٢ / ، ج - ١٢٩ - و
ب - ١٤ - ظ
فنضرب مربع المطلوب الأول في عدد الأموال - وهو ثلاثون - فيحصل بهذه الصورة ٣٠٩١٢٣٠، فننقصه من الجسم الأعظم فيبقى بهذه الصورة ٦٩٢٤٣٥٥٢، وهو مساوٍ للعدد المسؤول. فالجواب هو المطلوب الأول بهذه الصورة ٣٢١؛ وإذا زدنا على العدد المذكور قدراً ما، وتركنا عدد الجذور 15 والأموال بحالها، كان السؤال مستحيلاً.

مثالها فيما إذا كان الجذر المطلوب هو المطلوب الأعظم: مكعب وستون مالا وعدد بهذه الصورة ٥٧١٢٧٠٨٦ يعدل جذوراً عددها بهذه الصورة ٣٠٠٢٦٧.

فناخذ ثلث عدد الجذور ونضعه عدداً وثلاثي عدد الأموال جذوراً، 20 ونستخرج المطلوب على مسألة: مال وجذور يعدل عدداً، فيخرج الجذر بهذه الصورة ٢٩٧، وهو المطلوب الأول، فنقص مربعه من عدد الجذور،

6-5 مال وعشرون: مالا وعشرين [ب، ل]، وهذا أيضاً جائز على تقدير - ٥٧١٢٧٠٨٦ 17
٥٧١٢٠٨٦ [ب، ل] - 19 عدداً: كتب ناسخ [ب] كلمة بعدها ثم حذفها.

ونضرب الباقي في المطلوب الأول، فيحصل الجسّم الأعظم، ونضرب مربع المطلوب الأول في عدد الأموال، وننقص المبلغ من الجسّم الأعظم فيبقى العدد / الأعظم بهذه الصورة ٥٧٦٨٨٦٨٦ ، وهو أكثر من العدد $١٢٩ - ٥$ المسؤول؛ فالسؤال ممكن. فنأخذ ثلاثة أمثال المطلوب الأول ونزيد عليه ٥ عدد الأموال، فيحصل بهذه الصورة ٩٥١ ، وننقص العدد المسؤول من العدد الأعظم فيبقى بهذه الصورة ٥٦١٦٠٠ ، فنجعله عدداً. ونقول: كعب وأموال عدتها بهذه الصورة ٩٥١ يعدل عدداً بهذه الصورة ٥٦١٦٠٠ ، فنستخرج المطلوب على مسألة: مكعب وأموال يعدل عدداً، فيخرج ٢٤ ، فتزيده على المطلوب الأول، فيحصل الجذر المطلوب بهذه الصورة ٣٢١ وهو الجواب الأعظم. ١٠

مثالها فيما إذا كان الجذر المطلوب هو المطلوب الأصغر: كعب وستون مالاً وعدد بهذه الصورة ٨٨٦٥١٨٥٤ يعدل جذوراً عددها بهذه الصورة ٣٩٨٤٧٥ .

فنستخرج المطلوب الأول فيكون بهذه الصورة ٣٤٥ ، ونأخذ ثلاثة ١٥ أمثاله، ونزيد عليه عدد الأموال فيحصل بهذه الصورة ١٠٩٥ ونجعله أموالاً، ونستخرج العدد الأعظم وننقص منه العدد المسؤول، ونجعل الباقي عدداً ونقول: مكعب مع العدد الباقي يعدل أموالاً بالعدّة المذكورة، ونستخرج المطلوب / على مسألة: مكعب وعدد يعدل أموالاً، فيخرج $١٣٠ - ١٠$ المطلوب ٢٤ فننقصه من المطلوب الأول فيبقى بهذه الصورة ٣٢١ ، وهو الجواب الأصغر؛ وذلك ما أردنا بيانه. ٢٠

٧ ٥٦١٦٠٠ : ٥٦١٦١٠٠ [ب. ل] - ١٤ الأول: يقصد هنا جذر المادة المشقة كما في القسم الأول:
 $x^2 + 40x = 132525$

المسألة الرابعة: مكعب وجذور وعدد يعدل أموالاً.

فليكن $\overline{ا ب}$ عدد الأموال و $\overline{ب ج}$ جذر عدد الجذور. فأقول: إن كان جذر عدد الجذور - وهو $\overline{ب ج}$ - مثل نصف عدد الأموال - وهو $\overline{ا ب}$ - أو أعظم منه، فالمسألة مستحيلة.


5 لأن مربع الجذر المطلوب إذا ضرب في $\overline{ا ب}$ - الذي هو عدد الأموال - حصل المكعب والجذور والعدد؛ وإذا ضرب في الجذر المطلوب حصل المكعب فقط. فيكون عدد الأموال - وهو $\overline{ا ب}$ - أعظم من الجذر المطلوب، وينفصل منه المطلوب على مثال $\overline{ب د}$ ، فيكون مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ا ب}$ مثل مكعب $\overline{ب د}$ ، وضرب $\overline{ب د}$ في مربع $\overline{ب ج}$ - وهو الجذور - والعدد. ومربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ا ب}$ ينقسم إلى مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ب د}$ - وهو المكعب - وإلى مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ا د}$ وهو الجسم المساوي لمبلغ الجذور والعدد. فيجب أن يكون هذا الجسم أعظم من مربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب د}$ ، وهو مبلغ الجذور، بمقدار العدد. ومتى كان $\overline{ب ج}$ مثل نصف

عدد الأموال أو أعظم / يلزم ألا يكون الجسم المذكور أعظم من مبلغ $\overline{ا ب}$ - 130 - ط الجذور، فيلزم استحالة المسألة. ولأن $\overline{ب ج}$ ليس بأصغر من نصف $\overline{ا ب}$ ؛ فحيث نعمل على $\overline{ا ب}$ نصف دائرة مركزها نقطة $\overline{ز}$ وقطرها $\overline{ا ب}$ ، ونخرج $\overline{ه ز}$ عموداً على $\overline{ا ب}$ ، فهو نصف $\overline{ا ب}$ ، والجذر المطلوب: إما مثل نصف $\overline{ا ب}$ - أعني $\overline{ب ز}$ - أو أصغر منه أو أعظم.

فإن فرضنا الجذر المطلوب مثل $\overline{ب ز}$ ، يلزم أن يكون الجسم المذكور 20 المعادل لمبلغ الجذور والعدد هو مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ا ز}$ ، وهو مكعب نصف $\overline{ا ب}$ ؛ ومربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب ز}$ ليس بأصغر من مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ه ز}$. فيكون

مربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب ز}$ - وهو مبلغ الجذور - ليس بأصغر من المجسم المذكور.

وأيضاً: إن فرضنا الجذر المطلوب أصغر من نصف $\overline{ا ب}$ ؛ وهو $\overline{ب ح}$ ، ونُخرج عمود $\overline{ح ط}$ ؛ فلأن ضرب $\overline{ب ح}$ في $\overline{ا ح}$ مثلُ مربع $\overline{ح ط}$ ، فنسبة $\overline{ب ح}$ إلى $\overline{ا ح}$ كنسبة $\overline{ح ط}$ إلى $\overline{ا ح}$. فنسبة مربع $\overline{ب ح}$ إلى مربع $\overline{ح ط}$ كنسبة $\overline{ب ح}$ إلى $\overline{ا ح}$. فضرب مربع $\overline{ب ح}$ في $\overline{ا ح}$ مثلُ ضرب مربع $\overline{ح ط}$ في $\overline{ب ح}$. ولأن مربع $\overline{ح ط}$ أصغر من مربع $\overline{ب ز}$ ، ومربع $\overline{ب ج}$ ليس بأصغر من مربع $\overline{ب ز}$ ؛ فمربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب ح}$ ، وهو مبلغ الجذور، أعظم من مربع $\overline{ح ط}$ / في $\overline{ب ح}$ ، فيكون مبلغ الجذور أعظم $\overline{ا ب}$ - ١٣١ - و ١٠ من الجسم المذكور.



وأيضاً: إن فرضنا الجذر المطلوب أعظم من $\overline{ب ز}$ وهو $\overline{ب ي}$ ، ونُخرج عمود $\overline{ي ك}$ ، فلأن نسبة مربع $\overline{ب ي}$ إلى مربع $\overline{ي ك}$ كنسبة $\overline{ب ي}$ إلى $\overline{ا ي}$ لِمَا مَرَّ آنفاً، فمربع $\overline{ب ي}$ في $\overline{ا ي}$ مثلُ مربع $\overline{ي ك}$ في $\overline{ب ي}$. ولأن مربع $\overline{ي ك}$ أصغر من مربع $\overline{ب ز}$ ومربع $\overline{ب ج}$ ليس بأصغر من مربع $\overline{ب ز}$ ، $\overline{ب ي}$ - ١٤ - و ١٥ فمربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب ي}$ - وهو مبلغ الجذور - أعظم من مربع $\overline{ي ك}$ في $\overline{ب ي}$ ، وهو الجسم المذكور.

5 كنسبة $\overline{ح ط}$: ناقصة [ل] - 14 من (الأول): كررها ناسخ [ل]

فقد تبين أن $\overline{ب ج}$ - الذي هو جذر عدد الجذور - إن كان مثلاً نصف عدد الأموال أو أعظم منه كانت المسألة مستحيلة. فمن ضرورة صحة هذه المسألة أن يكون $\overline{ب ج}$ أصغر من نصف $\overline{أ ب}$.

ثم إن فرضنا $\overline{ب ج}$ أصغر من نصف $\overline{أ ب}$ ؛ فالمسألة يقع فيها استحالة من جهة أخرى. وليكن $\overline{ب د}$ ثلثي $\overline{أ ب}$ ، فنقسم $\overline{ب د}$ قسمة يكون ضرب أحد القسمين في الآخر مثلاً ثلث مربع $\overline{ب ج}$ ، وذلك إننا يتأتى بأن نجعل $\overline{ب د}$ عدد الجذور، وثلث مربع $\overline{ب ج}$ عدداً، ونعمل سؤالاً على مسألة: مال وعدد يعدل جذوراً. وليكن المطلوب الذي يخرج بتلك المسألة خط $\overline{ب هـ}$ ، حتى يكون مربعه مع عدد ثلث مربع $\overline{ب ج}$ يعدل ضرب $\overline{ب هـ}$

10 / في $\overline{ب د}$. ف ضرب $\overline{ب هـ}$ في $\overline{د هـ}$ مثل ثلث مربع $\overline{ب ج}$. وبعد أن ل - ١٣١ - ظ

فرضت $\overline{ب ج}$ أصغر من نصف $\overline{أ ب}$ فلا يُعرض في استخراج المطلوب بطريقة مسألة: مال وعدد يعدل جذوراً؛ للاستحالة التي تقع في تلك

المسألة. ولأننا ننصف $\overline{أ ب}$ على $\overline{ز د}$ ثلث $\overline{ب ز}$ ، ف ضرب $\overline{ب ز}$ في $\overline{ب ز}$ ثلث مربع $\overline{ب ز}$ ، فيكون أعظم من ثلث مربع $\overline{ب ج}$ لأن $\overline{ب ج}$

15 أصغر من $\overline{ب ز}$. فيكون ضرب $\overline{ب هـ}$ في $\overline{د هـ}$ أصغر من ضرب $\overline{ب ز}$ في $\overline{د ز}$. ولأننا ننصف $\overline{ب د}$ على نقطة $\overline{ح}$ ، فلأن ضرب $\overline{ب ز}$ في $\overline{د ز}$ مع

مربع $\overline{ز ح}$ مثل ضرب $\overline{ب هـ}$ في $\overline{د هـ}$ مع مربع $\overline{هـ ح}$ ؛ لكون كل واحد منهما مساوياً لمربع نصف خط $\overline{ب د}$ ، وضرب $\overline{ب ز}$ في $\overline{د ز}$ أعظم من

ضرب $\overline{ب هـ}$ في $\overline{د هـ}$ ، فرب $\overline{ز ح}$ أصغر من مربع $\overline{هـ ح}$. فنقطة $\overline{هـ}$ أبعد من نقطة التنصيف، من نقطة $\overline{ز}$ منها، فيكون $\overline{ب هـ}$ أعظم من $\overline{ب ز}$

20 و $\overline{د هـ}$ أصغر من $\overline{د ز}$. ف $\overline{ب هـ}$ أعظم من نصف $\overline{أ ب}$.

5 فنقسم: [ب، ل] - 11 يعرض: كذا، ولعله يقصد ويُعترض: [ب، ل] - 14 لأن $\overline{ب ج}$: ناقصة [ل] - 16 $\overline{د ز}$: $\overline{د ب}$ [ب، ل]

فأقول: إن مربع $\overline{ب ه}$ إذا ضرب في $\overline{ا ه}$ حتى حصل المجسم المذكور، وضرب مربع $\overline{ب ج}$ - وهو عدد الجذور - في $\overline{ب ه}$ حتى حصل مبلغ الجذور، ثم نقص مبلغ الجذور من المجسم المذكور، فإن كان العدد أكثر من البقية فالمسألة مستحيلة.

$$\overline{ا} \quad \overline{ب} \quad \overline{ج} \quad \overline{د} \quad \overline{ه}$$

- 5 لأن من ضرورة المطلوب الذي يوجد / في هذه المسألة أن يكون ل - ١٣٢ - و بعض $\overline{ا ب}$ - وهو عدد الأموال - وأن يكون ضرب مربعه في القسم الآخر - وهو المجسم المذكور - مثل مبلغ الجذور والعدد، أو إذا ضرب في عدد الجذور ونقص من المجسم المذكور تكون البقية مساوية للعدد. وكل خط يُفرض أعظم من $\overline{ب ه}$ أو أصغر منه فإن البقية التي توجد أبداً تكون أقل من البقية التي توجد مع خط $\overline{ب ه}$. فلو كان العدد المسؤول أكثر من البقية التي توجد مع خط $\overline{ب ه}$ ، تكون المسألة مستحيلة.

وبيان أن كل خط يُفرض أعظم من $\overline{ب ه}$ أو أصغر منه فإن البقية التي توجد معه تكون أقل من البقية التي توجد مع $\overline{ب ه}$: فليكن أولاً $\overline{ب ط}$ أعظم من $\overline{ب ه}$ فأقول: إن البقية التي مع $\overline{ب ط}$ أقل من البقية التي مع $\overline{ب ه}$.

ولیکن $\overline{ه ك}$ عموداً على $\overline{ا ب}$ ومساوياً لـ $\overline{ب ج}$ ونصل $\overline{ب ك}$. فلأن المجسم الأول - وهو مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ - ينقسم إلى مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ط}$ وإلى مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ط ه}$ ، والمجسم الثاني - وهو مربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{ا ط}$ - ينقسم إلى مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ط}$ ، وإلى علم $\overline{م ن}$ في $\overline{ا ط}$ ،

7 أو: و [ب، ل] - 13 فإن البقية: كذا، وهو خير المبتدأ «بيان»، والصواب هو «أنه» [ب، ل] -
15 التي: ناقصة [ل] - 20 $\overline{ا ط}$ (الأول): $\overline{ا ه}$ [ب، ل]

فيخصّ المجسم الأول مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ط ه}$ ، ويخصّ المجسم الثاني علم
 $\overline{م ن}$ في $\overline{ا ط}$. ويُقص من المجسم الأول مربع $\overline{ك ه}$ في $\overline{ب ه}$ ومن المجسم
 / الثاني مربع $\overline{ك ه}$ في $\overline{ط ب}$ وهو مربع $\overline{ك ه}$ في $\overline{ب ه}$ وفي $\overline{ط ه}$. فإذا $\overline{ل - ١٣٢ - ط}$
 نقصنا من كل واحد من المجسمين مربع $\overline{ك ه}$ في $\overline{ط ب}$ ، يكون الفضل
 5 بين القسمين «الباقين» كالفضل بين المجسمين وبين الخاصتين. وإذا
 نقصنا من المجسم الثاني مربع $\overline{ك ه}$ في $\overline{ط ب}$ ومن المجسم الأول مربع
 $\overline{ك ه}$ في $\overline{ب ه}$ ، فبقدر الزيادة التي نقصنا من المجسم الثاني - وهو مربع
 $\overline{ك ه}$ في $\overline{ط ه}$ - يقتضي الزيادة في بقية الجسم الأول؛ فلو لم تنقص وزدنا
 على الجسم الأول يكون كذلك خاصة الجسم الأول وهي مربع $\overline{ب ه}$ في
 10 $\overline{ط ه}$ ، ونزيد عليها مربع $\overline{ك ه}$ في $\overline{ط ه}$ ، يصير المجموع مربع $\overline{ب ك}$ في
 $\overline{ط ه}$. فيكون التفاضل بين العددين الباقيين من المجسمين كالتفاضل بين
 العلم في $\overline{ا ط}$ - وهو خاصة الجسم الثاني - وبين مربع $\overline{ب ك}$ في $\overline{ط ه}$ ،
 وهو المركب من خاصة المجسم الأول مع الزيادة المذكورة. فلو كان خاصة
 الجسم الأول مع هذه الزيادة أكثر من خاصة الجسم الثاني لكان العدد
 15 الباقي من الجسم الأول أكثر من العدد الباقي من المجسم الثاني. والأمر بهذه
 المثابة لأن ضرب $\overline{د ب}$ في $\overline{ب ه}$ مثل ثلث «مربع $\overline{ب ج}$ » ومربع $\overline{ب ه}$.
 فيكون ضرب ثلاثة أمثال $\overline{د ب}$ في $\overline{ب ه}$ مثل مربع $\overline{ب ج}$ وثلاثة مربعات
 $\overline{ب ه}$. ولأن $\overline{د ب}$ ثلثا $\overline{ا ب}$ / فثلاثة أمثاله ضعف $\overline{ا ب}$. فضعف $\overline{ا ب}$ - $\overline{ل - ١٣٣ - و}$
 في $\overline{ب ه}$ مثل ثلاثة مربعات $\overline{ب ه}$ مع مربع $\overline{ب ج}$. وضرب ضعف $\overline{ا ب}$
 20 في $\overline{ب ه}$ مثل $\overline{ا ه}$ في $\overline{ب ه}$ مرتين، مع مربع $\overline{ب ه}$ مرتين. فثلاثة مربعات
 $\overline{ب ه}$ مع مربع $\overline{ب ج}$ مثل مربع $\overline{ب ه}$ مرتين، وضرب $\overline{ا ه}$ في $\overline{ب ه}$

9 وهي: هو [ب، ل] - 12 $\overline{ا ط}$: $\overline{ط ه}$ [ل، ب] - 16 ومربع : مربع [ب، ل]


- مرتين. فإذا ألقينا من كل واحد من الجانبين مربع $\overline{ب ه}$ مرتين، يبقى في أحد الجانبين ضرب $\overline{ا ه}$ في $\overline{ب ه}$ مرتين، مساوياً لما في الجانب الآخر، وهو مربع $\overline{ب ه}$ مع مربع $\overline{ب ج}$. ومربع $\overline{ب ك}$ مثل مجموع مربع $\overline{ب ه}$ مع مربع $\overline{ك ه}$ ، أعني مربع $\overline{ب ج}$ ؛ فربع $\overline{ب ك}$ مثل ضرب $\overline{ا ه}$ في $\overline{ب ه}$ 5 مرتين، فهو مثل ضرب ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$. ولأن ضرب ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ينقسم إلى ضرب ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ط}$ وإلى ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ه ط}$ ؛ وضرب مجموع $\overline{ط ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ط}$ ينقسم إلى ضرب / ضعف $\overline{ب ه}$ - 10 - $\overline{ط ب ه}$ في $\overline{ا ط}$ وإلى $\overline{ط ه}$ في $\overline{ا ط}$ ، فإذا ألقينا ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ المشترك، يبقى في أحد الجانبين ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ه ط}$ ، وفي الجانب الآخر 10 ضرب $\overline{ط ه}$ في $\overline{ا ط}$. ولأن $\overline{ب ه}$ أعظم من نصف $\overline{ا ب}$ ، فيكون أعظم من $\overline{ا ه}$ ، فضعف $\overline{ب ه}$ يكون أعظم من $\overline{ا ط}$ بكثير. فضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ط ه}$ أعظم من $\overline{ا ط}$ في $\overline{ط ه}$. فإذا زدنا على كل واحد منها ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ط}$ ، يكون ضعف $\overline{ب ه}$ في جميع $\overline{ا ه}$ المساوي / لمربع $\overline{ب ك}$ - 13 - $\overline{ط ب ه}$ من جميع $\overline{ط ب ب ه}$ في $\overline{ا ط}$. فربع $\overline{ب ك}$ أعظم من ضرب جميع $\overline{ط ب ب ه}$ في $\overline{ا ط}$. فنسبة جميع $\overline{ط ب ب ه}$ إلى $\overline{ب ك}$ أصغر 15 من نسبة $\overline{ب ك}$ إلى $\overline{ا ط}$. فإذا جعلنا نسبة $\overline{ط ه}$ إلى $\overline{ب ك}$ مشتركة، تكون النسبة المولفة من نسبة $\overline{ط ه}$ إلى $\overline{ب ك}$ ومن نسبة $\overline{ط ب ب ه}$ إلى $\overline{ب ك}$ ، وهي نسبة العلم إلى مربع $\overline{ب ك}$ ، أصغر من النسبة المولفة من نسبة $\overline{ط ه}$ إلى $\overline{ب ك}$ ، ومن نسبة $\overline{ب ك}$ إلى $\overline{ا ط}$ ، وهي نسبة $\overline{ط ه}$ إلى $\overline{ا ط}$. 20 فنسبة العلم إلى مربع $\overline{ب ك}$ أصغر من نسبة $\overline{ط ه}$ إلى $\overline{ا ط}$. ف ضرب العلم في $\overline{ا ط}$ أصغر من ضرب مربع $\overline{ب ك}$ في $\overline{ط ه}$. فالذي في جانب بقية

2 الجانب: جانب [ب، ل] - 6 في $\overline{ا ط}$ و: أثبتنا ناسخ [ل] في الهامش - 18 $\overline{ب ك}$: $\overline{ك ب}$ ، [ل]

المجسم الثاني، فتزيد تلك الزيادة على خاصة المجسم الثاني؛ فيكون الفضل بين البقيتين - وهما العددان - كالفضل بين العلم في $\overline{ا ه}$ ، وهو خاصة المجسم الأول، وبين ضرب مربعي $\overline{ب ط ه}$ ك $\overline{ك في ط ه}$. فلو كان العلم في $\overline{ا ه}$ زائداً على مجموع مربعي $\overline{ب ط ه}$ ك $\overline{ك في ط ه}$ ، لكان البقية الأولى أكثر من البقية الثانية. والأمر كذلك لأن ضرب مجموع المربعين في $\overline{ط ه}$ هو مربع $\overline{ب ص}$ في $\overline{ط ه}$ ؛ ولأن مربع $\overline{ك ب}$ - المساوي لضرب ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ - مساوٍ لمربعي $\overline{ك ه ب ه}$ ، ومربع $\overline{ب ص}$ مساوٍ لمربعي $\overline{ص ط ب ط}$ ، ومربع $\overline{ص ط}$ مثل مربع $\overline{ك ه}$ ، فيكون فضل مربع $\overline{ك ب}$ على مربع $\overline{ص ب}$ إنما هو فضل مربع $\overline{ب ه}$ على مربع $\overline{ب ط}$ ، وهو ضرب $\overline{ه ب ب ط}$ في $\overline{ط ه}$ ، العلم. ونقصان ضرب $\overline{ه ب ب ط}$ في $\overline{ا ه}$ عن ضرب ضعف $\overline{ه ب}$ في $\overline{ا ه}$ المساوي لمربع $\overline{ك ب}$ ، إنما هو ضرب $\overline{ط ه}$ / في $\overline{ا ه}$. لكن خط $\overline{ا ه}$ أصغر من $\overline{ه ب ب ط}$ بكثير، فيكون $\overline{ا ه}$ في $\overline{ا ه}$ - $\overline{ط ه}$ أصغر من $\overline{ه ب ب ط}$ في $\overline{ط ه}$ ، فنقصان ضرب $\overline{ه ب ب ط}$ في $\overline{ا ه}$ عن مربع $\overline{ك ب}$ أصغر من نقصان مربع $\overline{ص ب}$ عن مربع $\overline{ك ب}$.
 15 ف ضرب $\overline{ه ب ب ط}$ في $\overline{ا ه}$ أعظم من مربع $\overline{ص ب}$. فنسبة $\overline{ه ب ب ط}$ إلى $\overline{ص ب}$ أعظم من نسبة $\overline{ص ب}$ إلى $\overline{ا ه}$. فنجعل نسبة $\overline{ه ب ط}$ إلى $\overline{ص ب}$ مشتركة، فيكون النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ه ب ط}$ إلى $\overline{ص ب}$ ، ومن نسبة $\overline{ه ب ب ط}$ إلى $\overline{ص ب}$ ، وهي نسبة علم $\overline{ه ب ب ط}$ في $\overline{ط ه}$ إلى مربع $\overline{ص ب}$ ، أعظم من النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ه ب ط}$ إلى $\overline{ص ب}$ ، ومن نسبة $\overline{ص ب}$ إلى $\overline{ا ه}$ ، وهي نسبة $\overline{ه ب ط}$ إلى $\overline{ا ه}$. ف ضرب العلم في $\overline{ا ه}$ أعظم من ضرب مربع $\overline{ص ب}$ في $\overline{ط ه}$. فالبقية التي تبقى من المجسم

4 الأولى: الأول [ب، ل] - 5 ضرب: بدل [ب، ل] - 8 فيكون: ناقصة [ل] - 10 العلم: كتبها ناسخ [ب] تحت السطر كأنه أضافها بعد أن نسبها / عن: أعني [ب، ل] - 11 $\overline{ط ه}$: كررها ناسخ [ل] - 13 $\overline{ه ب}$ (الثانية): ب ه [ل]

الأول أكثر ممّا يبق من المجهّم الثاني. فقد تبين أن البقية التي تكون مع ضلع $\overline{ب ه}$ أعظم البقايا.



وطريق استخراج $\overline{ب ه}$ إنما يكون بمسألة: مال وعدد يعدل جذوراً. فيجعل $\overline{ب ه}$ شيئاً، فضعفه شيان، ويكون $\overline{ا ه}$ عدد الأموال إلا شيئاً،

5 وضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ يكون أشياء - بعدة ضعف عدد الأموال - إلا

مالين يعدل مربع $\overline{ب ك}$ ، وهو مثل مربع $\overline{ه ك}$ مع مربع $\overline{ب ه}$ وهو عدد

الجذور / ومال. فأشياء بعدة ضعف $\overline{ا ب}$ إلا مالين تعدل عدد الجذور - ١٣٥ - و

ومالاً. فبعد الجبر والزيادة يكون أشياء بعدة ضعف $\overline{ا ب}$ / تعدل عدد $\overline{ب ه}$ - ١٦ - و

الجذور وثلاثة أموال. فأشياء بعدة ثلثي $\overline{ا ب}$ تعدل ثلث عدد الجذور

10 ومالاً، فيستخرج المطلوب بتلك المسألة، فيخرج $\overline{ب ه}$ المطلوب الأول.

وإن شئنا جعلنا ثلث عدد الجذور عدداً، وثلثي عدد الأموال عدد الجذور

وعملنا سؤالاً على مسألة: مال وعدد يعدل جذوراً. واستخرجنا المطلوب

على قانون تلك المسألة، فيخرج لنا أيضاً $\overline{ب ه}$ المطلوب الأول. ثم إذا

1 مع: من [ل] - 4 شيئا (الثانية): شيء [ب، ل] - 7 [لا: ناقصة [ل] - 11 وثلثي عدد: كرر

ناسخ [ل] كلمة وعدده - 12 وعدد: ناقصة [ل]

ضربنا مربعه في $\overline{ا ه}$ يحصل المحسّم الأول، وإذا ضربناه في مربع $\overline{ه ك}$ ونقصناه من المحسّم الأول يبقى العدد الأعظم. فإن كان العدد المسؤول أعظم من العدد الأعظم فالمسألة مستحيلة، وإن كان مساوياً له فلها مطلوب واحد وهو خط $\overline{ب ه}$. وإن كان أقل منه فأقول: إنه يوجد لها 5 مطلوبان، أحدهما أعظم من $\overline{ب ه}$ ، والآخر أصغر منه.


أما المطلوب الأعظم: فنُخرج $\overline{ب ه}$ على استقامته ونفصل $\overline{ب م}$ مثل $\overline{ب ه}$ ، ونجعل $\overline{م ع}$ مثل $\overline{ا ه}$. فلأن $\overline{ب ه}$ أعظم من نصف $\overline{ا ب}$ فهو أعظم من $\overline{ا ه}$. فيكون $\overline{ب م}$ أيضاً أعظم / من $\overline{ا ه}$ وقد حصل $\overline{ه ع}$ ١ - ١٣٥ - ط معلوماً، فنجعله عدد الأموال، وفضل العدد الأعظم على العدد المسؤول 10 عدداً، ونعمل سؤالاً أعلى مسألة: مكعب وأموال بعدة $\overline{ه ع}$ يعدل عدد الفضل المذكور. وليكن المطلوب الذي يخرج هو خط $\overline{ز ه}$ حتى يكون مربع $\overline{ز ه}$ في $\overline{ز ه}$ وأمواله بعدة $\overline{ه ع}$ مثل الفضل المذكور. فأقول: إن خط $\overline{ب ز}$ هو مطلوبنا في هذه المسألة.

فلأن مربع $\overline{ب ك}$ مثل ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، وهذا المسطح في $\overline{ز ه}$ 15 ينقسم إلى ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ز ه}$ ثم في $\overline{ز ه}$ ، وضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ز}$ ثم في $\overline{ز ه}$ ، وهو مثل ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ز ه}$ ثم في $\overline{ا ز}$ ، فربيع $\overline{ب ك}$ في $\overline{ز ه}$ مثل ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ز ه}$ ثم في $\overline{ز ه}$ ، وضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ز ه}$ ثم في $\overline{ا ز}$. لكن ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ز ه}$ ثم في $\overline{ز ه}$ مثل مربع $\overline{ز ه}$ في $\overline{م ه}$ ، وضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ز ه}$ ثم في $\overline{ا ز}$ مثل [مربع] $\overline{م ه}$ في $\overline{ز ه}$ ثم في $\overline{ا ز}$. وأيضاً العلم الذي 20 هو فضل مربع $\overline{ب ز}$ على مربع $\overline{ب ه}$ إنما هو من ضرب ضعف $\overline{ب ه}$ - أعني $\overline{م ه}$ - في $\overline{ز ه}$ ، ومربع $\overline{ز ه}$. فضرروب العلم في $\overline{ا ز}$ يكون مثل $\overline{م ه}$ في $\overline{ز ه}$ ثم في $\overline{ا ز}$ مع مربع $\overline{ز ه}$ في $\overline{ا ز}$. فإذا ألقينا مضروب $\overline{م ه}$ في $\overline{ز ه}$ ثم في $\overline{ا ز}$ من كلا الجانبين، أعني من مربع $\overline{ب ك}$ في $\overline{ز ه}$ ومن

مضروب / العلم في $\bar{از}$ ، يبقى في الجانب الأول مربع $\bar{زه}$ في $\bar{م}$ هـ. وفي ل - ١٣٦ - و
 الجانب الآخر مربع $\bar{زه}$ في $\bar{از}$. فيكون فضل مربع $\bar{ك}$ ب في $\bar{زه}$ على
 مضروب العلم في $\bar{از}$ إنما هو فضل مربع $\bar{زه}$ المضروب في $\bar{م}$ هـ على مربع
 $\bar{زه}$ المضروب في $\bar{از}$. وإذا زدنا على بقيتي الجانبين أعني على مربع $\bar{زه}$
 5 في $\bar{م}$ هـ وعلى مربع $\bar{زه}$ في $\bar{از}$ مربع $\bar{زه}$ في $\bar{زه}$ ، فيصير أحدهما مربع
 $\bar{زه}$ في $\bar{م}$ ز والآخر مربع $\bar{زه}$ في $\bar{اه}$ ؛ ويكون فضل مربع $\bar{زه}$ في $\bar{م}$ ز
 على مربع $\bar{زه}$ في $\bar{اه}$ ، هو فضل مربع $\bar{ب}$ ك المضروب في $\bar{زه}$ على العلم
 المضروب في $\bar{از}$ ، لكن مربع $\bar{زه}$ في $\bar{م}$ ز مساو لمربع $\bar{زه}$ في $\bar{زع}$ ولمربع
 $\bar{زه}$ في $\bar{ع}$ م. لكن $\bar{م}$ ع مثل $\bar{اه}$. فإذا نقصنا مربع $\bar{زه}$ في $\bar{م}$ ع -
 10 أعني في $\bar{اه}$ - من مربع $\bar{زه}$ في $\bar{م}$ ز، يبقى مربع $\bar{زه}$ في $\bar{زع}$. ففضل
 مربع $\bar{زه}$ في $\bar{م}$ ز على مربع $\bar{زه}$ في $\bar{اه}$ - وهو فضل مربع $\bar{ب}$ ك في
 $\bar{زه}$ على العلم المضروب في $\bar{از}$ - هو مربع $\bar{زه}$ في $\bar{زع}$. فلأن مربع
 $\bar{ب}$ ك المضروب في $\bar{زه}$ مثل العلم في $\bar{از}$ مع مربع $\bar{زه}$ في $\bar{زع}$ ، فإذا
 نقصنا من كلا الجانبين مربع $\bar{ك}$ هـ في $\bar{زه}$ ، يبقى في أحدهما مربع $\bar{ب}$ هـ في
 15 $\bar{زه}$ معادلاً لما في الجانب الآخر، وهو العلم في $\bar{از}$ مع مربع $\bar{زه}$ في $\bar{زع}$
 بنقصان مربع $\bar{ك}$ هـ في $\bar{زه}$. / فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع $\bar{ب}$ هـ في ل - ١٣٦ - ظ
 $\bar{از}$ ، يصير في جانب العلم مربع $\bar{ب}$ ز في $\bar{از}$ مع مربع $\bar{زه}$ في $\bar{زع}$
 بنقصان مربع $\bar{ك}$ هـ في $\bar{زه}$ معادلاً لما في الجانب الآخر، وهو مربع $\bar{ب}$ هـ
 في $\bar{اه}$. فإذا نقصنا من كلا الجانبين مربع $\bar{ك}$ هـ في $\bar{ب}$ هـ، يصير في أحد
 20 الجانبين مربع $\bar{ب}$ ز في $\bar{از}$ مع مربع $\bar{زه}$ في $\bar{زع}$ بنقصان مربع $\bar{ك}$ هـ في
 $\bar{ب}$ ز مساوياً لما في الجانب الآخر وهو مربع $\bar{ب}$ هـ في $\bar{اه}$ بنقصان مربع

5 $\bar{از}$: $\bar{اب}$ [ب، ل] - 5 في ... مربع $\bar{زه}$: ناقصة [ل] - 15 لا في: لال [ب، ل]

ك هـ في هـ ب، وهي بقية ضلع ب هـ. فيكون فضلُ بقية ضلع ب هـ على بقية ضلع ب ز هو مربع ز هـ في ز ع بعينه. فيكون بقية ضلع ب ز مساوية للعدد المسؤول. فإذا جعلنا ب ز ضلعاً فيكون مربعه المال، وضربُ مربعه في ا ب هو الأموال المطلوبة؛ فينقسم الأموال إلى مربع ب ز في ب ز، وهو المكعب، وإلى مربع ب ز في ا ز المجسم. فإذا نقصنا منه مربع ك هـ، وهو عدد الجذور، في ب ز وهو الجذر المطلوب، تبقى البقية معادلةٌ للعدد. فالأموال معادلةٌ للمكعب والجذور والعدد.



وأما المطلوب الأصغر: فيجعل هـ ع بعينه عدد الأموال، ونجعل فضل بقية هـ ب على / العدد المسؤول عدداً، ونعمل سؤالاً على مسألة: د - ١٣٧ - و 10 مكعب وهذا العدد يعدل أموالاً بعدة هـ ع. وليكن المطلوب الذي يخرج خطاً هـ ط، فيكون مربعه في هـ ع، الأموال، معادلاً لمكعبه مع عدد الفضل. فإذا نقصنا منه / مكعبه، وهو مربع هـ ط في هـ ط، يبقى مربع ب - ١٦ - ط هـ ط في ط ع معادلاً للعدد المذكور، وهو فضل بقية ضلع ب هـ على


3 مساوية: مساوياً [ب]، متساوياً [د] - 4 فينقسم: وسطها مطموس [ب] - 7 والجذور: والجذر [ب، د]

العدد المسؤول. وليكن $\overline{ط ص}$ مثل $\overline{ه ك}$ ، وهو مثل $\overline{ب ج}$ أعني جذر عدد الجذور. فلأن مربع $\overline{ب ك}$ مثل ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، أعني $\overline{م ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، فضرب $\overline{م ه}$ في $\overline{ا ه}$ ثم في $\overline{ه ط}$ مثل مربع $\overline{ب ك}$ في $\overline{ه ط}$. والعلم الذي هو فضل مربع $\overline{ه ب}$ على «مربع» $\overline{ط ب}$ ، هو مثل ضرب $\overline{م ط}$ في $\overline{ط ه}$. فيكون ضرب العلم في $\overline{ا ه}$ ناقصاً عن ضرب $\overline{م ه}$ في $\overline{ط ه}$ ثم في $\overline{ا ه}$ بمقدار ضرب مربع $\overline{ط ه}$ في $\overline{ا ه}$ ؛ فينقص عن ضرب مربع $\overline{ب ك}$ في $\overline{ه ط}$ بمربع $\overline{ط ه}$ في $\overline{ا ه}$. ولأن مربع $\overline{ب ص}$ ينقص عن مربع $\overline{ب ك}$ بمقدار العلم المذكور، وهو ضرب $\overline{ه ط}$ في $\overline{ط م}$ ، فيكون نقصان مربع $\overline{ب ص}$ في $\overline{ه ط}$ عن مربع $\overline{ب ك}$ في $\overline{ه ط}$ بمقدار $\overline{ه ط}$ في $\overline{ط م}$ ثم في $\overline{ه ط}$ ، وهو مربع $\overline{ه ط}$ في $\overline{ط م}$. فنقصان مضروب مربع $\overline{ب ص}$ في $\overline{ط ه}$ عن مضروب مربع $\overline{ب ك}$ في $\overline{ه ط}$ إنما هو مربع $\overline{ط ه}$ في $\overline{ط م}$. وقد كان نقصان مضروب العلم في $\overline{ا ه}$ عنه / إنما هو مربع $\overline{ه ط}$ في $\overline{ل - ١٣٧ - ط}$ $\overline{ا ه}$ ، أعني في $\overline{م ع}$. فإذا نقصنا مربع $\overline{ه ط}$ في $\overline{م ع}$ - وهو نقصان العلم في $\overline{ا ه}$ عن مضروب مربع $\overline{ب ك}$ في $\overline{ه ط}$ - عن مربع $\overline{ه ط}$ في $\overline{م ط}$ - وهو نقصان مربع $\overline{ص ب}$ في $\overline{ط ه}$ عن مربع $\overline{ب ك}$ في $\overline{ه ط}$ ؛ يبقى مربع $\overline{ه ط}$ في $\overline{ط ع}$ زيادة النقصان في مربع $\overline{ص ب}$ في $\overline{ه ط}$ ؛ فيكون هو بعينه زيادة مضروب العلم في $\overline{ا ه}$ على مضروب مربع $\overline{ص ب}$ في $\overline{ه ط}$. فيكون مضروب مربع $\overline{ص ب}$ في $\overline{ه ط}$ مع مربع $\overline{ه ط}$ في $\overline{ط ع}$ مثل العلم في $\overline{ا ه}$. فإذا نقصنا من كلا الجانبين مربع $\overline{ص ط}$ في $\overline{ه ط}$ ، يبقى في أحد الجانبين مضروب العلم في $\overline{ا ه}$ بنقصان مربع $\overline{ص ط}$ في $\overline{ه ط}$ ، وفي الجانب الآخر مربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{ط ه}$ مع مربع $\overline{ه ط}$ في

3 $\overline{ه ط}$ مثل: محوة إلا اللام [ب] / والعلم: العلم [ب، ل] - 9 $\overline{ب ص}$: ص [ل] - 16 زيادة: بقى الحرفان الأخيران فقط [ب] - 18 $\overline{ه ط}$: محوة [ب]، $\overline{ه ل}$ / فيكون ... $\overline{ه ط}$: كورها ناسخ [ل]

ط ع ، والجانبان متعادلان. فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{ا ه}$ ، يحصل في أحد الجانبين مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ بنقصان مربع $\overline{ص ط}$ في $\overline{ط ه}$ ، والجانب الآخر مربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{ا ط}$ ، مع مربع $\overline{ه ط}$ في $\overline{ط ع}$. فإذا نقصنا من كلا الجانبين مربع $\overline{ص ط}$ في $\overline{ب ط}$ ، فيصير في أحد الجانبين مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ بنقصان مربع $\overline{ص ط}$ في $\overline{ب ه}$ ، وفي الجانب الآخر مربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{ا ط}$ مع مربع $\overline{ه ط}$ في $\overline{ط ع}$ ، بنقصان مربع $\overline{ص ط}$ في $\overline{ب ط}$ ، والجانبان متعادلان. فإذا جعلنا خط $\overline{ب ه}$ جذراً لـ ١٣٨ - و فيكون بقيته إنما هي مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، بنقصان مربع $\overline{ص ط}$ - الذي هو عدد الجذور - في $\overline{ب ه}$ الجذر. وإذا جعلنا $\overline{ط ب}$ جذراً فيكون بقيته ١٠ إنما هي مربع $\overline{ط ب}$ في $\overline{ا ط}$ ، بنقصان مربع $\overline{ص ط}$ - وهو عدد الجذور - في $\overline{ط ب}$ الجذر. فيلزم أن يكون في أحد الجانبين المتعادلين بقية ضلع $\overline{ب ه}$ وفي الجانب الآخر بقية ضلع $\overline{ط ب}$ مع مربع $\overline{ه ط}$ في $\overline{ط ع}$. ففضل بقية ضلع $\langle \overline{ب ه}$ على بقية ضلع $\rangle \overline{ب ط}$ إنما هو مربع $\overline{ه ط}$ في $\overline{ط ع}$. وقد كان فضل بقية ضلع $\overline{ب ه}$ على العدد المسؤول إنما هو مربع $\overline{ه ط}$ في $\overline{ط ع}$ بعينه، فيكون بقية ضلع $\overline{ب ط}$ مثل العدد المسؤول. ١٥ فيكون $\overline{ب ط}$ هو الجذر المطلوب؛ لأننا إذا جعلنا $\overline{ب ط}$ جذراً، يكون مربعه هو المال، ومربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{ا ب}$ هو الأموال؛ ولأنه ينقسم إلى مربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{ب ط}$ ، وهو المكعب، وإلى مربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{ا ط}$ وهو المحسّم الثاني، فإذا نقصنا منه مربع $\overline{ص ط}$ في $\overline{ط ب}$ وهو الجذور، فيبقى البقية ٢٠ التي تبين أنها مساوية للعدد المسؤول، فقد انقسمت الأموال إلى المكعب والجذور والعدد.

١ متعادلان: معادلان [ب، ل] - ١٥ - $\overline{ب ط}$: $\overline{ر ط}$ [ب، ل] - ١٧ هو (الأولى): كتبها ناسخ [ب] كأنها هـ وهـ وهكذا رسمها ناسخ [ل]



واعلم أن المطلوبات الممكنة في هذه المسألة لها نهاية / في العظم ١٣٨ - ط والصغر.

فليكن $\bar{ا} \bar{ب}$ عددُ الأموال، ونعمل عليه نصف دائرة على مركز $\bar{ف}$ ،
 $\bar{و} \bar{ب}$ د ثلثي $\bar{ا} \bar{ب}$. $\bar{و} \bar{ب}$ ه هو الضلع الذي لأعظم عددٍ يمكن. وقد تبين
أن ضلع $\bar{ب} \bar{ه}$ أبداً يكون أعظم من $\bar{ب} \bar{ف}$ وأصغر من $\bar{ب} \bar{د}$. فنقطة $\bar{ه}$
أبداً تكون واقعة فيما بين نقطتي $\bar{د} \bar{ف}$ وهو المنتصف وموضع الثلث؛ وقد
تبين أن $\bar{ب} \bar{ج}$ ، وهو جذر عدد الجذور، يكون أصغر من نصف $\bar{ا} \bar{ب}$.
فليكن كل واحدٍ من عمودي $\bar{س} \bar{ق} \bar{ك} \bar{م}$ مثل $\bar{ب} \bar{ج}$ ؛ فلأنه قد تبين أن
مربع $\bar{ك} \bar{م}$ في $\bar{ب} \bar{ك}$ مثل مربع $\bar{ب} \bar{ك}$ في $\bar{ك} \bar{ا}$ ، فإن فرض $\bar{ب} \bar{ك}$ جذراً
فيكون المجسم المذكور - المعادل للجذور والعدد - هو مربع $\bar{ب} \bar{ك}$ في
 $\bar{ا} \bar{ك}$ ؛ ومربع $\bar{ك} \bar{م}$ - الذي هو عدد الجذور - في $\bar{ب} \bar{ك}$ الجذر مساوياً
لهذا المجسم، فالجذور مساوية للمجسم الذي يجب أن يساوي مجموع
الجذور والعدد؛ هذا خلف. فلا يجوز أن يكون $\bar{ب} \bar{ك}$ جذراً.


وكذلك لو قدرنا \bar{b} أصغر من \bar{b}^* ، وأخرجنا عمود \bar{c} ، فلا
 15 يجوز أن يكون \bar{b} جذراً، لأن الجسّم المعادل للجذور والعدد إنما هو
 مربع \bar{b} في \bar{a} ، وهو مساوٍ لمربع \bar{c} في \bar{b} ؛ ومربع \bar{c} أصغر
 من مربع \bar{b}^* ، فمربع \bar{b} في \bar{a} يكون أصغر من مربع \bar{b}^* ، وهو

3 نصف: محمودة [ب] - 4 هو: وهو [ب، ل] - 5 فقطلة: محمودة [ب] - 7 الجذور: الأموال [ب، ل] - 10 هو: وهو [ب، ل] - 11 في ب ك الجذر: ناقصة / مساوياً: مساو [ب، ل] - 12 فالجذور مساوية: فالجذر مساو [ب، ل] - 15 ل ب: ل ن [ب، ل] - 16 ل ن (الثانية): ل ر [ب، ل]

فقد تبين أن جميع المطالب الممكنة في هذه المسألة إنما هي أعظم من $\overline{ب ك}$ وأصغر من $\overline{ا ك}$. فجميع الأضلاع المطلوبة: أحد طرفيها نقطة $\overline{ب}$ وطرفها الآخر $\overline{فا}$ بين نقطتي $\overline{ك س}$. ثم نقول: إن $\overline{ب ز}$ الذي استخرجناه يكون أبداً أصغر من $\overline{ب س}$ وكذا $\overline{ب ط}$ يقع أعظم من $\overline{ب ك}$ حتى لا يلزم الاستحالة من هذه الجهة.

- 5 أما الأول: فلأنه قد تبين أن فضل بقية ضلع $\overline{ب هـ}$ على العدد المسؤول قد كان مساوياً لمضروب مربع $\overline{ز هـ}$ في $\overline{ز ع}$ ، وبمجموعهما أعني العدد المسؤول مع التفاوت بين المسؤول < وبين > الأعظم مثل بقية ضلع $\overline{ب هـ}$. فبقية ضلع $\overline{ب هـ}$ أعظم من مربع $\overline{ز هـ}$ في $\overline{ز ع}$. وقد تبين أن مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ا ز}$ - المجسم - مع مربع $\overline{ز هـ}$ في $\overline{ز ع}$ منقوصاً منها مضروب < مربع > $\overline{ب ج}$ - وهو عدد الجذور، أعني مربع $\overline{س ق}$ العمود - في $\overline{ب ز}$ - الجذر - مساوياً لبقية ضلع $\overline{ب هـ}$. فإذا كان مربع $\overline{ز هـ}$ في $\overline{ز ع}$ وحده أقل من بقية ضلع $\overline{ب هـ}$: فإذا زيد عليه مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ا ز}$ - المجسم -، ونقص منه مربع $\overline{س ق}$ - العمود - / في $\overline{ب ز}$ الضلع، ل - ١٤٠ - و 15 فيبقى مساوياً لبقية ضلع $\overline{ب هـ}$ ؛ فيكون الذي زيد عليه، وهو مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ا ز}$ المجسم، يكون أكثر من الذي ينقص منه وهو مربع $\overline{س ق}$ - العمود - في $\overline{ب ز}$. وقد تبين أن مربع $\overline{س ق}$ في $\overline{ب ز}$ أصغر من مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ا ز}$. فلو كان $\overline{ب ز}$ مثل $\overline{ب س}$ أو أعظم منه، لكان مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ا ز}$ مساوياً لمربع $\overline{س ق}$ - العمود - في $\overline{ب ز}$ أو أصغر منه. 20 فقد تبين أن $\overline{ب ز}$ يكون أصغر من $\overline{ب س}$.

4 $\overline{ب ط}$: محوطة [ب]، $\overline{ط ا}$ [ا] - 10 $\overline{ز هـ}$: ناقصة [ل] - 14 العمود: رسم ناسخ وبه فوقها علامة ليان إضافة في المامش، وفيه قرأ ما يبدو أنه وبه أو منه. فالكلمة غير واضحة ولا عمل لها. ولهذا لم يرمها ناسخ وله أي اهتمام. / $\overline{ب ز}$: م [ب]، ل - 15 $\overline{ب هـ}$: الماء ناقصة [ل] - 17 أن مربع: ناقصة [ل] - 19 أصغر: أعظم [ب]، ل



وأما الثاني: فلأن مربع $\overline{هـ ط}$ في $\overline{ط ع}$ أصغر من بقية ضلع $\overline{ب هـ}$ ، وإذا زيد عليه مربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{أ ط}$ - المجسم - ونقص منه مربع $\overline{م ك}$ في $\overline{ب ط}$ ، يكون الباقي مساوياً لبقية ضلع $\overline{ب هـ}$. فالذي زيد عليه قد كان أكثر مما نقص منه. فمربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{أ ط}$ - المجسم - أعظم من مربع $\overline{م ك}$ في $\overline{ب ط}$. فلو كان $\overline{ب ط}$ مثل $\overline{ب ك}$ أو أصغر لكان مربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{أ ط}$ مثل مربع $\overline{م ك}$ في $\overline{ب ط}$ أو أصغر، ف $\overline{ب ط}$ أعظم من $\overline{ب ك}$.


واعلم أن طريق معرفة كل واحدٍ من المطلوبين، أعني الأعظم والأصغر: باستخراج التفاوت بينه وبين المطلوب الأول وهو $\overline{ب هـ}$.

- 10 أما الأول: فلأن العدد الأعظم هو من ضرب مربع $\overline{ب هـ}$ في $\overline{أ هـ}$ منقوصاً منه $\overline{ب هـ}$ في مربع $\overline{هـ ك}$ / - الذي خرج عموداً على $\overline{أ ب}$ مساوياً ل - ١٤٠ - $\overline{ط}$ لجذر عدد الجذور -، والعدد المسؤول من ضرب مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{أ ز}$ منقوصاً منه ضرب مربع $\overline{ك هـ}$ في $\overline{ب ز}$ ، فخاصةً المجسم الأول هو مربع $\overline{ب هـ}$ في $\overline{هـ ز}$ ، وخاصةً المجسم الثاني هو ضرب $\overline{ز ب}$ في $\overline{ب هـ}$ في $\overline{هـ ز}$ ، ثم في $\overline{أ ز}$ ، وهو العلم في $\overline{أ ز}$. والذي ينقص من المجسم الثاني أكثر مما تنقصه من المجسم الأول. فإذا زدنا تلك الزيادة على خاصةً المجسم الأول، يكون

3 $\overline{ب ط}$: $\overline{أ ط}$ [ب، ل] - 6 في $\overline{أ ط}$: فوق السطر [ل]

التفاوت بين الحاصل وبين خاصة المجسم الثاني هو التفاوت بين بقيتي
المجسمين، وهما العددان، أعني العدد الأعظم والمسؤول، والتفاوت بينهما
معلوم. فيكون ضرب $\overline{ب ه}$ $\overline{ز}$ (في $\overline{ب ه}$)، ثم في $\overline{ا ز}$ ، وهو العلم في
 $\overline{ا ز}$ خاصة المجسم الثاني مع عدد التفاوت بين العدد الأعظم والمسؤول
5 مثل خاصة المجسم الأول مع الزيادة المذكورة، وبمجموعها (مربع $\overline{ب ك}$
في $\overline{ه ز}$. ولأن $\overline{ب ه}$ - وهو المطلوب الأول - معلوم؛ فربعه معلوم،
ومربع $\overline{ك ه}$ وهو عدد الجذور معلوم. فربيع $\overline{ك ب}$ عدد معلوم. فنجعل $\overline{ه ز}$
شيئاً؛ فيكون في جانب / المجسم الأول أشياء بعدة مربع $\overline{ك ب}$ ، فهو $\overline{ب - ١٧ - ظ}$
مضروب مربع $\overline{ك ب}$ في $\overline{ه ز}$ الشيء. أما خاصة المجسم الثاني، فالعلم هو
10 $\overline{ز ب ب ه}$ - وهو ضعف عدد $\overline{ب ه}$ وشيء - في $\overline{ه ز}$ الشيء، لـ $\overline{١٤١ - و}$
فيكون أشياء بعدة ضعف $\overline{ب ه}$ ومالاً. وإذا ضربناه في $\overline{ا ز}$ وهو عدد $\overline{ا ه}$
إلا شيئاً، يصير أشياء بعدة ضعف سطح $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ إلا أموالاً بعدة
ضعف $\overline{ب ه}$ إلا $\overline{ا ه}$ وإلا كعباً، وهي خاصة المجسم الثاني، ومع عدد
التفاوت، يعدل أشياء بعدة مربع $\overline{ك ب}$. فإذا جبرنا وقابلنا وألقينا الأشياء
15 من الجانبين لتساويها ضرورة - لأن ضرب ضعف $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ مثل
مربع $\overline{ك ب}$ - فيصير أموالاً بعدة ضعف $\overline{ب ه}$ بنقصان $\overline{ا ه}$ ، وكعباً،
يعدل عدد التفاوت؛ فينقص $\overline{ا ه}$ من ضعف $\overline{ب ه}$ ، فيكون الباقي عدد
الأموال. فيستخرج المطلوب على مسألة: مكعب وأموال يعدل عدداً،
فيخرج $\overline{ه ز}$ الشيء فتزيده على $\overline{ب ه}$ فيحصل $\overline{ب ز}$ وهو الجواب الأعظم.

3 $\overline{ب ز}$: رسم ناسخ «ب» فوقها العلامة المعروفة التي ترمز إلى إضافة عبارة ناقصة في الهامش، ولكن نسي
إضافة ما أراد الإشارة إليه، ولعله ما أثبتناه - $\overline{ا ه}$: ناقصة [ل] - 12 شيئاً: شيء [ب، ل] -
15 لأن: أن [ب، ل]



وأما الثاني: فلأن المجسم الثاني هو من ضرب مربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{ا ط}$. فإذا نقص منه الجذور وهي من ضرب مربع $\overline{ك هـ}$ في $\overline{ب ط}$ ، يبقى العدد المسؤول. فتبين من البيان المذكور أن فضل العدد الأعظم، الذي هو بقية المجسم الأول، على العدد المسؤول هو فضل خاصة المجسم الأول، وهو علم $\overline{هـ ب}$ $\overline{ب ط}$ في $\overline{هـ ط}$ مضروباً في $\overline{ا هـ}$ ، على المركب من خاصة المجسم الثاني، مع ضرب عدد الجذور في $\overline{هـ ط}$ ، وهو مربع $\overline{ب ص}$ / في ل - ١٤١ - ط $\overline{هـ ط}$ ، لأن $\overline{ط ص}$ مثل $\overline{هـ ك}$. فمربع $\overline{ب ص}$ في $\overline{هـ ط}$ مع عدد التفاوت يكون مساوياً لخاصة المجسم الأول. فنجعل $\overline{هـ ط}$ شيئاً، فالعلم من ضعف $\overline{ب هـ}$ إلا شيئاً في الشيء. فيكون أشياء بعدة ضعف $\overline{هـ ب}$ إلا مالا، ومضروبها في $\overline{ا هـ}$ يصير أشياء بعدة مسطح ضعف $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ا هـ}$ إلا أموالاً ١٠ بعدة $\overline{ا هـ}$ ، وهو خاصة المجسم الأول. أما الذي في خاصة المجسم الثاني: أما مربع $\overline{ب ط}$ وهو عدد $\overline{ب هـ}$ إلا شيئاً في مثله، فيكون عدداً مثل مربع $\overline{ب هـ}$ ومالاً إلا أشياء بعدة ضعف $\overline{ب هـ}$ ، ومربع $\overline{ص ط}$ - أعني مربع $\overline{هـ ك}$ ، وهو مثل مربع $\overline{ب ك}$ > إلا مربع $\overline{ب هـ}$ -، فمربع $\overline{ب ط}$ مع مربع

12 شيئاً: شيء [ب، ل]

الأول. فننقصه من عدد الأموال، ونضرب الباقي في مربع المطلوب الأول، فما حصل فهو المحسّم. ثم نضرب المطلوب الأول في عدد الجذور، وننقص المبلغ من المحسّم، فما بقي فهو العدد الأعظم. فإن كان العدد المسؤول أكثر من العدد الأعظم، فالسؤال مستحيل؛ وإن كان مساوياً له 5 فهو ممكن وله جواب واحد، وهو المطلوب الأول؛ وإن كان أقل منه فهو ممكن، وله جوابان: أحدهما أعظم من المطلوب الأول، والآخر أصغر منه. فننقص العدد المسؤول من العدد الأعظم، ونجعل الباقي عدداً، وننقص المطلوب الأول من عدد الأموال، وننقص الباقي / من ضعف ل - ١٤٢ - ظ

المطلوب الأول، ونجعل الباقي عدد أموال. فإن استخرجنا المطلوب على 10 مسألة: مكعب وأموال يعدل عدداً، فتزيد المطلوب الذي يخرج على المطلوب الأول، فما حصل فهو الجواب الأعظم. وإن استخرجنا المطلوب على مسألة: كعب وعدد يعدل أموالاً، فننقص المطلوب الذي يخرج من المطلوب الأول، فما بقي فهو الجواب الأصغر. وذلك ما أردنا بيانه.

المسألة الخامسة: مكعب وعدد يعدل أموالاً وجذوراً.


15 فعدد الأموال إما أن يكون مثل « جذر » عدد الجذور، أو أعظم منه، أو أصغر منه.

أما القسم الأول: فإن كان العدد المسؤول أكثر من مكعب عدد الأموال، فالسؤال مستحيل. وليكن $\overline{أ ب}$ جذر عدد الجذور و $\overline{ز ج}$ عدد الأموال وهو مثل $\overline{أ ب}$. فالجذر المطلوب إذا ضرب في مربع $\overline{أ ب}$ حصل 20 مبلغ الجذور، وإذا ضرب مربعه في $\overline{ز ج}$ وزيد عليه، كان المجموع مساوياً

2 فما: كتب ناسخ [ب] الفاء في الكلمة فبدت كأنها ميم. ورسم ناسخ [ل] وهاء - 3 فإن: محمودة [ب] - 13 الجواب: محمودة [ب] - 14 المسألة الخامسة: ناقصة [ل] - 18 ز ج: ر ج [ب، ل] - 20 مربعه في: في مربع [ب، ل]

للمكعب مع العدد المسؤول. فأقول: / إن أعظم عدد يزداد على مكعب ب - ١٨ - و
المطلوب حتى يصير معادلاً للأموال والجذور إنما هو مكعب $\overline{اب}$ ، حتى لو
كان العدد المسؤول أكثر من مكعبه يكون السؤال مستحيلاً.


وبيان ذلك: أن أيّ ضلع / يُفرض أعظم أو أصغر من $\overline{اب}$ ، ل - ١٤٣ - و
5 ويُضرب مربّعه في $\overline{زج}$ ، ثم يُضرب في مربع $\overline{اب}$ ، ويزاد عليه، فالعدد
الذي يمكن أن يجمع مع مكعبه حتى يصير مساوياً لمجموع الأموال والجذور
يكون أقلّ من مكعب $\overline{اب}$.



ولیکن $\overline{ب د}$ ضلعاً أعظم من $\overline{اب}$ ، فيكون مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{اب}$
الأموال المطلوبة؛ لأن $\overline{اب}$ مثل $\overline{زج}$ ، ومربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ب د}$ هو
10 المكعب، فيكون فضل المكعب على الأموال هو مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{اد}$ ؛
فيجب أن يكون فضل الجذور على العدد أيضاً مثله، حتى إذا نقصنا من
الجذور مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{اد}$ يكون الباقي مثل العدد؛ لكن الجذور هي مربع
 $\overline{اب}$ في $\overline{ب د}$. فإذا نقصنا منه مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{اد}$ ، يبقى مكعب $\overline{اب}$ ؛
وإذا نقصنا من الجذور مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{اد}$ ، يكون الباقي - وهو العدد -
15 أقل من مكعب $\overline{اب}$ بمقدار علم $\overline{ب د}$ في $\overline{اد}$ في $\overline{اد}$ (مضروباً في $\overline{اد}$).
فالعدد الذي يجب أن يكون مع $\overline{ب د}$ حتى تصح المسألة أقلّ من مكعب
 $\overline{اب}$.


ولیکن $\overline{ب هـ}$ ضلعاً أصغر من $\overline{اب}$ ، فيكون الأموال هي مربع $\overline{ب هـ}$
في $\overline{اب}$ ، وفضله على المكعب هو مربع $\overline{ب هـ}$ في $\overline{اهـ}$ ، فيكون فضل

العدد على الجذور أيضاً مثل مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، حتى لو زدنا على الجذور مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ صار معادلاً / للعدد. لكن الجذور هي مربع $\overline{ا ب}$ في $ل - ١٤٣ - ظ$ $\overline{ب ه}$. فهي تنقص عن مكعب $\overline{ا ب}$ بمربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ا ه}$ ، وتنقص عن العدد بضرب مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$. فيلزم أن يكون العدد أقل من مكعب $\overline{ا ب}$ بمقدار علم $\overline{ا ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، مضروباً في $\overline{ا ه}$. فالعدد الذي يجب أن يكون مع ضلع $\overline{ب ه}$ حتى تصح المسألة أقل من مكعب $\overline{ا ب}$.



فقد تبين أن أعظم عدد يمكن في هذا القسم من هذه المسألة إنما هو مكعب $\overline{ا ب}$. فإن كان العدد المسؤول أعظم من مكعب $\overline{ا ب}$ ، فتكون المسألة مستحيلة؛ وإن كان مثل مكعب $\overline{ا ب}$ فهي مُمكنة ولها المطلوب 10 واحد، وهو خط $\overline{ا ب}$ الذي هو مثل عدد الأموال؛ وإن كان أقل منه فلها مطلوبان: أحدهما أعظم من $\overline{ا ب}$ ، والآخر أصغر منه.

أما المطلوب الأعظم: فنجعل $\overline{ب ك}$ مثل $\overline{ا ب}$ ، ونجعل $\overline{ا ك}$ عدد أموال، ونجعل فضل مكعب $\overline{ا ب}$ ، وهو العدد الأعظم، على العدد المسؤول عدداً، ونعمل سؤالاً على: مكعب وأموال يعدل عدداً. وليكن 15 المطلوب الذي يخرج هو $\overline{ا د}$. فأقول: إن $\overline{د ب}$ هو مطلوبنا في هذه المسألة.



3 عن مكعب: من مكعب [ب، ل]

لأن مربع $\overline{د آ}$ في $\overline{د ك}$ هو مثل ضرب $\overline{د ب}$ $\overline{ب آ}$ في $\overline{آ د}$ ، مضروباً في $\overline{آ د}$ ، وهو علم $\overline{ط م}$ مضروباً في $\overline{آ د}$ ، فع العدد المسؤول / يعادل $\overline{د - ١٤٤ - ر}$ مكعب $\overline{آ ب}$. فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع $\overline{آ ب}$ في $\overline{آ د}$ ، يصير في أحد الجانبين مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{آ د}$ مع العدد المسؤول، وفي الجانب الآخر 5 مربع $\overline{آ ب}$ في $\overline{ب د}$ ، والجانبان متعادلان. فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{آ ب}$ ، يصير في أحد الجانبين مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ب د}$ ، وهو مكعب $\overline{ب د}$ ، مع العدد المسؤول، وفي الجانب الآخر مربع $\overline{آ ب}$ في $\overline{ب د}$ مع مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{آ ب}$. فالحدد المسؤول مع مكعب $\overline{ب د}$ مثل مربع $\overline{آ ب}$ في $\overline{ب د}$ مع مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{آ ب}$. فإذا جعلنا $\overline{ب د}$ جذراً، فيكون ضرب 10 مربع $\overline{آ ب}$ في $\overline{ب د}$ جذوراً، وضرب مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{آ ب}$ أموالاً؛ فالجذور والأموال مثل المكعب والعدد.


وأقول أيضاً: إن هذا المطلوب له نهاية في العظم.

لأنه قد تبين أن فضل مكعب $\overline{آ ب}$ على العدد المسؤول هو مربع $\overline{آ د}$ في $\overline{د ك}$ ، فيكون مربع $\overline{آ د}$ في $\overline{د ك}$ أصغر من مكعب $\overline{آ ب}$ ضرورة، 15 فيكون $\overline{د آ}$ أصغر من $\overline{آ ب}$ ؛ لأنه لو كان مساوياً له أو أعظم منه، لكان مربع $\overline{د آ}$ - وهو مساوٍ لمربع $\overline{آ ب}$ - أو أعظم منه - في $\overline{د ك}$ وهو ثلاثة أمثال $\overline{آ ب}$ أو أعظم منه، [أو] أصغر من مكعب $\overline{آ ب}$ ، هذا خلف. فـ $\overline{د آ}$ أصغر من $\overline{آ ب}$ ؛ وهذا المطلوب مركب من $\overline{د آ}$ ومن $\overline{آ ب}$ ، فهو لا يبلغ ضعف $\overline{آ ب}$ ، فله نهاية في العظم ضرورة.

20 / وأما المطلوب الأصغر: فنجعل فضل مكعب $\overline{آ ب}$ على العدد $\overline{د - ١٤٤ - ظ}$ المسؤول عدداً $\overline{وا ك}$ عدد الأموال، ونعمل سؤالاً على مسألة: مكعب

9 مع مربع ... $\overline{آ ب}$ ناقصة [د] - 10 $\overline{آ ب}$: $\overline{آ ز}$ [ب]، [ل] / جذوراً: محوة [ب]، جذراً [ل] -
13 $\overline{آ ب}$: $\overline{آ ز}$ [ب]، [ل] - 19 يبلغ: أولها مطموس [ب]، بلغ [ل]

وعدد يعدل أموالاً. وليكن المطلوب الذي يخرج هو خط $\overline{ا ه}$ حتى يكون مربع $\overline{ا ه}$ في $\overline{ه ك}$ مثل عدد الفضل؛ فأقول: إن $\overline{ه ب}$ هو المطلوبنا في هذه المسألة.



لأن مكعب $\overline{ا ب}$ ينقسم إلى مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ه}$ ، وإلى مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ا ه}$ ، والقسم الثاني ينقسم إلى مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، وإلى علم $\overline{ط م}$ في $\overline{ا ه}$. لكن العلم في $\overline{ا ه}$ من ضرب $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، ثم في $\overline{ا ه}$ ، وهو مثل مربع $\overline{ا ه}$ في $\overline{ه ك}$. فمكعب $\overline{ا ب}$ مثل مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ه}$ مع مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ومربع $\overline{ا ه}$ في $\overline{ه ك}$. لكن مكعب $\overline{ا ب}$ أيضاً مثل العدد مع مربع $\overline{ا ه}$ في $\overline{ه ك}$. فإذا ألقينا مربع $\overline{ا ه}$ في $\overline{ه ك}$ المشترك، يبقى العدد مساوياً لمربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ه}$ مع مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$. فإذا جعلنا $\overline{ب ه}$ جذراً، يكون مكعبه مع العدد مثل مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ب ه}$ ومربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، ومربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ه}$ ؛ وبمجموع القسمين الأولين مثل مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ب}$. فالمكعب مع العدد مثل مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ب}$ ، وهو الأموال، $\overline{ب} - ١٨ - \overline{ط}$ مع مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ه}$ وهو الجذور. / فالأموال مع الجذور مثل المكعب $\overline{ب ه} - ١٤٥ - \overline{ر}$ والعدد.

وهذا المطلوب للبيان: < له > نهاية في الصغر.

9 فإذا ألقينا ... $\overline{ه ك}$: ناقصة [ل] - 14 مربع: ناقصة [ل] - 16 للبيان: مطموسة [ب]، لبيان [ل]

لأن $\overline{ب ه}$ بأي مقدار يُفرض، يكون الأموال، وهي مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ب}$ ، أعظم من مكعب $\overline{ب ه}$ بمقدار مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ؛ فالعدد أعظم من الجنور، - وهي $\overline{ب ه}$ في مربع $\overline{ا ب}$ - بمقدار مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$. فإذا زدنا مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ على مضروب $\overline{ب ه}$ في مربع $\overline{ا ب}$ ، وجعلناه 5 عدداً، فيصح منه المسألة، ويكون الجذر المطلوب هو $\overline{ب ه}$ في أي حد يكون من الصغر.

أما استخراج كل واحد من المطلوبين، أعني الأعظم والأصغر، (فيكون) باستخراج التفاوت بينه وبين $\overline{ا ب}$ الذي هو مثل عدد الأموال. أما الأعظم: فقد تبين أن فضل العدد الأعظم، وهو مكعب $\overline{ا ب}$ ، 10 على العدد الذي يكون مع ضلع $\overline{ب د}$ ، هو ضرب $\overline{ب د}$ في $\overline{ا د}$ ، مضروباً في $\overline{ا د}$ ؛ وهو العلم في $\overline{ا د}$. فيجعل $\overline{ا د}$ شيئاً، فالعلم من ضرب ضعف $\overline{ب ا}$ وشيء في الشيء، فيكون أشياء بعدة ضعف $\overline{ا ب}$ ومالاً، ومضروبه في $\overline{ا د}$ الشيء يكون أموالاً بعدة ضعف $\overline{ا ب}$ ، وكعباً، يعدل عدد التفاوت. فيستخرج المطلوب بتلك المسألة، فيخرج لنا $\overline{ا د}$ الشيء، 15 فتزيده على $\overline{ا ب}$ الذي هو مثل عدد الأموال، / فيحصل $\overline{ب د}$.

ل - ١٤٥ - ظ

د ا ب

وأما الأصغر: فقد تبين أن فضل العدد الأعظم على العدد الذي مع ضلع $\overline{ب ه}$ ، هو ضرب $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ مضروباً في $\overline{ا ه}$. فنجعل $\overline{ا ه}$ شيئاً، فيكون $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، وهو ضعف $\overline{ا ب}$ إلا شيئاً، في $\overline{ا ه}$ الشيء، يكون أشياء بعدة ضعف $\overline{ا ب}$ إلا مالاً، ومضروبها في $\overline{ا ه}$ الشيء، يكون أموالاً بعدة ضعف $\overline{ا ب}$ إلا كعباً يعدل عدد التفاوت. 20

5. $\overline{ب ه}$: فوق السطر [ل] - 10 هو ضرب: كررنا ناسخ [ل] / $\overline{ب ا}$: ناقصة [ل] - 18 $\overline{ا ه}$ (الأول): محمودة [ب] - 19 $\overline{ا ب}$: $\overline{ا ه}$ [ب، ل]

فتزيد الكعب على الجانبيين. فكعب وعدد التفاوت يعدل أموالاً بعدة ضعف $\overline{اب}$. فيستخرج المطلوب بتلك المسألة، فيخرج $\overline{اه}$ الشيء، فنقصه من عدد الأموال، فما بقي فهو المطلوب الأصغر.

—————
ل

فحاصل الكلام في هذا القسم أن نضرب عدد الأموال في مثله،
 5 [ونضرب المبلغ في مثله] ونضرب المبلغ في عدد الأموال فما حصل فهو العدد الأعظم. فإن كان العدد المسؤول أكثر من العدد الأعظم فالمسألة مستحيلة؛ وإن كان مساوياً له فهي ممكنة ولها جواب واحد، وهو عدد الأموال؛ وإن كان أقل منه فهي أيضاً ممكنة ولها جوابان: أحدهما أعظم من عدد الأموال، والآخر أصغر منه. فنقص العدد المسؤول من العدد الأعظم، ونجعل الباقي عدداً، ونجعل ضعف عدد الأموال المسؤولة عدداً
 10 أموال. / فإن استخرجنا المطلوب على مسألة: مكعب وأموال يعدل $\overline{د}$ - ١٤٦ - و عدداً، فتزيد المطلوب - الذي يخرج - على عدد الأموال المسؤولة، فما حصل فهو الجواب الأعظم. وإن استخرجنا المطلوب على مسألة: مكعب وعدد يعدل أموالاً، فالمطلوب الذي يخرج ننقصه من عدد الأموال
 15 المسؤولة، فما بقي فهو الجواب الأصغر.

وأما القسم الثاني - وهو أن يكون عدد الأموال أعظم من جذر عدد الجذور - فليكن $\overline{اب}$ جذر عدد الجذور، و $\overline{بج}$ عدد الأموال، ونجعل ثلث مربع $\overline{اب}$ الذي هو عدد الجذور عدداً، وثلاثي $\overline{بج}$ عدداً جذوراً، ونعمل سؤالاً على مسألة: جذور وعدد يعدل مالاً. وليكن
 20 المطلوب الذي يخرج: $\overline{ب د}$ ، فيكون أعظم من $\overline{اب}$ وأصغر من $\overline{بج}$. لأن $\overline{ب د}$ ينقسم إلى قسمين: أحدهما مثل ثلاثي عدد الأموال، والآخر هو

- الذي يكون مضروب $\overline{ب}$ د فيه مثل $\overline{ث}$ مربع $\overline{ا}$ ب، أعني. مثل ضرب $\overline{ا}$ ب في $\overline{ث}$ ، وهو $\overline{ث}$ مربع $\overline{ا}$ ب، فلا يجوز أن يكون $\overline{ب}$ د مثل $\overline{ا}$ ب وإلا كان مربع $\overline{ا}$ ب هو المال، وضرب $\overline{ا}$ ب في $\overline{ث}$ ، مع ضرب $\overline{ب}$ د في $\overline{ث}$ $\overline{ب}$ ج، أعني $\overline{ا}$ ب في $\overline{ث}$ $\overline{ب}$ ج، يعادل المال. لكن ضرب $\overline{ا}$ ب في $\overline{ث}$ / $\overline{ا}$ ب و $\overline{ا}$ ب في $\overline{ث}$ $\overline{ب}$ ج مثل مربع $\overline{ا}$ ب المال، فيكون ضرب $\overline{ب}$ د - ١٤٦ - ظ
- $\overline{ا}$ ب في $\overline{ث}$ $\overline{ا}$ ب مثل ضرب $\overline{ا}$ ب في $\overline{ث}$ $\overline{ب}$ ج؛ هذا خلف.
- ولا يجوز أن يكون أصغر منه؛ إذ لو كان أصغر منه وضرب $\overline{ب}$ د في أحد قسميه، \langle لكان \rangle مثل ضرب $\overline{ا}$ ب في $\overline{ث}$ ؛ فيكون $\overline{ث}$ $\overline{ا}$ ب أصغر من ذلك القسم، وقسمه الآخر مثل $\overline{ث}$ $\overline{ب}$ ج وهو أعظم من $\overline{ث}$ $\overline{ا}$ ب،
- ١٠ ف $\overline{ب}$ د أعظم من $\overline{ا}$ ب وقد كان أصغر منه؛ هذا خلف.
- وأما أنه أصغر من $\overline{ب}$ ج، فلأن أحد قسميه مثل $\overline{ث}$ $\overline{ب}$ ج، وقسمه الآخر إذا ضرب فيه يكون مثل مضروب $\overline{ا}$ ب في $\overline{ث}$. لكن $\overline{ب}$ ج أعظم من $\overline{ا}$ ب. فثلث $\overline{ا}$ ب أعظم من قسمه الآخر، فثلث $\overline{ب}$ ج أعظم من قسمه الآخر بكثير. فأحد قسمي $\overline{ب}$ د مثل $\overline{ث}$ $\overline{ب}$ ج، وقسمه الآخر أصغر من $\overline{ث}$ ، فيكون $\overline{ب}$ د أصغر من $\overline{ب}$ ج. فتبين أن $\overline{ب}$ د أعظم من $\overline{ا}$ ب وأصغر من $\overline{ب}$ ج.

ج د ا ب

فلأن مربع $\overline{ب}$ د - وهو المال - يعدل ضرب $\overline{ب}$ د في $\overline{ث}$ $\overline{ب}$ ج، وهو الجذور، مع $\overline{ث}$ مربع $\overline{ا}$ ب، فضرب $\overline{ب}$ د في $\overline{ث}$ $\overline{ب}$ ج ثلاث مرات - أعني في مثلي $\overline{ب}$ ج - مع مربع $\overline{ا}$ ب، يعدل ثلاث مربعات

2 $\overline{ب}$ د: $\overline{ب}$ ج [ب، ل] - 3 كان: لكان [ب، ل] - 4 $\overline{ب}$ ج (الثانية): $\overline{ا}$ ب [ب، ل] - 5 $\overline{ب}$ ج: $\overline{ا}$ ب [ب، ل] - 6 مثل ضرب: محوة [ب] - 8 $\overline{ا}$ ب: الألف محوة [ب] / أصغر: الألف محوة [ب] - 10 كان: أي فرض أصغر منه.

ب د. فإذا ألقينا من كلا الجانبين ضعف مربع ب د، يبقى ضعف ب د في د ج، مع عدد الجذور، وهو مربع ا ب، مساوياً / لمربع ب د. د - ١٤٧ - و
 فإذا ألقينا من الجانبين أيضاً مربع ا ب، يبقى ضعف ب د في د ج مثل مربع ب د بنقصان مربع ا ب، وهو العلم الحاصل من ضرب د ب ا
 5 في د ا. فنضرب د ب ا في د ا مثل ضعف د ب في د ج. فنجعل ب د جذراً مطلوباً، فيكون الأموال هي مربع د ب في ب ج، والمكعب
 «وهو» مربع د ب في د ب، وفضل الأموال على المكعب، وهو مربع ب د في د ج. فيجب أن يكون فضل العدد على الجذور مثل ذلك. حتى
 يكون العدد مع المكعب معادلاً / للأموال والجذور، فيكون العدد مثل ب - ١٩ - و
 10 ضرب ب د في مربع ا ب، وهو الجذور، مع مربع ب د في د ج.
 فأقول: إن هذا العدد هو أكثر عدد يمكن أن يؤخذ مع فرض هذه
 الأموال والجذور، حتى لو كان العدد المسؤول أكثر منه، فتستحيل
 المسألة؛ وأي ضلع يفرض أعظم أو أصغر من ب د يكون العدد - الذي
 يجتمع مع مكعبه حتى تصح المسألة - أقل من هذا العدد.

$$\frac{b}{d} = \frac{a}{c} = \frac{a^2}{b^2}$$

15 فنفرض ب ه ضلعاً أعظم من ب د وأصغر من ج ب، فيكون
 الأموال مربع ب ه في ب ج والجذور ب ه في مربع ا ب، والمكعب هو
 مربع ب ه في ب ه. فيكون الأموال / أكثر من المكعب بمقدار ضرب ل - ١٤٧ - ظ
 مربع ب ه في ج ه. فيجب أن يكون العدد أكثر من الجذور بهذا
 المقدار. فالعدد مساوٍ لمبلغ الجذور، وهو ب ه في مربع ا ب، مع ضرب
 20 مربع ب ه في ج ه، وهو أقل من العدد الأول؛ لأن العدد الأول هو

$$5 \text{ ب ا : د ا [ب، ج]}$$

مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ ، مع ضرب $\overline{ب د}$ في مربع $\overline{ا ب}$. لكن مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ ينقسم إلى مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج ه}$ وفي $\overline{د ه}$ ، فيكون العدد الأعظم مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج ه}$ ، وفي $\overline{د ه}$ ، وضرب $\overline{ب د}$ في مربع $\overline{ا ب}$. وأيضاً: مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ج ه}$ من العدد الثاني ينقسم إلى مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج ه}$ ، وإلى $\overline{ه ب ب د}$ في $\overline{د ه}$ ، وهو العلم، في $\overline{ج ه}$ ، فمع $\overline{ه ب}$ في مربع $\overline{ا ب}$ ، وهو الجذور، هو العدد الثاني. و $\overline{ه ب}$ في مربع $\overline{ا ب}$ ينقسم إلى $\overline{ه د}$ في مربع $\overline{ا ب}$ وإلى $\overline{ب د}$ فيه. فالعدد الثاني ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي: مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج ه}$ ، والعلم في $\overline{ج ه}$ ، و $\overline{ه د}$ في مربع $\overline{ا ب}$ و $\overline{د ب}$ في مربع $\overline{ا ب}$. والعدد الأول «ينقسم» إلى ثلاثة أقسام، ويتركبان في قسمين، وهما: مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{ج ه}$ ، و $\overline{ب د}$ [مع] (في مربع) $\overline{ا ب}$. فإذا ألقيناها من الجانبين تبقى خاصة العدد الأول مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{د ه}$ / وخاصة العدد الثاني هو العلم في $\overline{ج ه}$ ومربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{د ه}$ - ١٤٨ - و $\overline{ه د}$. فإذا ألقينا مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ه د}$ من كل واحد من الجانبين، تكون خاصة العدد الثاني $\overline{ه ب ب د}$ في $\overline{د ه}$ ، وهو العلم في $\overline{ج ه}$ ، وخاصة العدد الأول هو $\overline{د ب ا ب}$ في $\overline{د ا}$ ، وهو العلم في $\overline{د ه}$. ولأن ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{ج د}$ ينقسم إلى ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{د ه}$ وفي $\overline{ج ه}$ ، وضرب $\overline{ب ه}$ $\overline{د ب}$ في $\overline{ج ه}$ ، ينقسم إلى ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{ج ه}$ ، وإلى $\overline{د ه}$ في $\overline{ج ه}$ ؛ فإذا ألقينا ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{ج ه}$ المشترك؛ يبقى ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{د ه}$ من أحد الجانبين أعظم من $\overline{د ه}$ في $\overline{ج ه}$ الباقي من الجانب الآخر، لأن 20 ضعف $\overline{د ب}$ أعظم من $\overline{ج ه}$ ، لأن أحد قسيمي $\overline{ب د}$ مثل $\overline{ث لثي ب ج}$ ، ف $\overline{ب د}$ أعظم من $\overline{ج ه}$ ، فضعه أعظم من $\overline{ج ه}$. فيجعل ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج ه}$ مشتركاً، فيحصل في أحد الجانبين ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ ، وفي

2 وفي: في [ب، ل] / الأعظم: لعلها الأول - 3 وفي $\overline{د ه}$: ناقصة [ل] - 9 و $\overline{د ب}$: محو [ب] -

16 $\overline{ب ه}$: $\overline{ه د}$ [ب، ل]

الجانب الآخر ضربُ $\overline{هـ ب د}$ في $\overline{ج هـ}$. فضعفُ $\overline{د ب}$ في $\overline{ج د}$ أعظم من ضرب $\overline{هـ ب د}$ في $\overline{ج هـ}$. لكنَّ ضعفُ $\overline{د ب}$ في $\overline{ج د}$ مثلُ $\overline{د ب ب}$ في $\overline{ا د}$ ، لما تبين قبل ذلك، فهذا أيضاً أعظم منه. فنسبة $\overline{د ب ب}$ إلى $\overline{هـ ب د}$ أعظم من نسبة $\overline{ج هـ}$ إلى $\overline{ا د}$. فتجعل نسبة $\overline{ا د}$ إلى $\overline{د هـ}$ مشتركة، فيكون النسبةُ المؤلفة من نسبة $\overline{د ب ب}$ إلى $\overline{هـ ب د}$ 5

/ $\overline{ب د}$ ، ومن نسبة $\overline{ا د}$ إلى $\overline{د هـ}$ - وهي نسبة علم $\overline{د ب ب}$ في $\overline{ا د}$ - إلى علم $\overline{هـ ب د}$ في $\overline{د هـ}$ - أعظم من النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ج هـ}$ إلى $\overline{ا د}$ ، ومن نسبة $\overline{ا د}$ إلى $\overline{د هـ}$ ، وهي نسبة $\overline{ج هـ}$ إلى $\overline{د هـ}$. ف ضربُ علم $\overline{د ب ب}$ في $\overline{ا د}$ مضروباً في $\overline{د هـ}$ أعظم من علم $\overline{هـ ب د}$ في $\overline{د هـ}$ 10 مضروباً في $\overline{ج هـ}$. فخاصة العدد الأول أكثر من خاصة العدد الثاني. فالعدد الأول أكثر من العدد الثاني.

وأيضاً لو فرضنا الضلع مثل $\overline{ب ج}$ ، فيكون مربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب ج}$ هو الأموال، وهو المكعب أيضاً. فالأموال مثل المكعب، فالجذور مثل العدد، وهو $\overline{ب ج}$ في مربع $\overline{ا ب}$. لكن العدد الأول مثل $\overline{د ب}$ في مربع $\overline{ا ب}$ مع 15 مربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{د ج}$. فإذا ألقينا $\overline{د ب}$ في مربع $\overline{ا ب}$ من الجانبين، يبقى من العدد الأول مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{د ج}$ ، ومن العدد الثاني مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ج د}$. لكنَّ مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{د ج}$ أعظم من مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ج د}$ بمقدار ضرب علم $\overline{د ب ب}$ في $\overline{ا د}$ مضروباً في $\overline{د ج}$. فخاصة العدد الأول أكثر من خاصة العدد الثاني. فالعدد الأول أكثر من العدد الثاني.

ج د ا ب

3 فهذا: قد تقرأ فهل أو فهي [ب]، وكذلك قد تقرأ «فين» [ل] - 4 ج هـ: ج د [ب. ل] - 9 ب ب د [ب، ل] - 12 فرضنا: محو [ب] - 18 ب ا: ا [ل]

وأيضاً: لو فرضنا الضلعَ أعظمَ من عدد الأموال مثل $\overline{ب س}$ ،
 / فيكون الأموال مربع $\overline{ب س}$ في $\overline{ج ب}$ ، والجذور $\overline{ب س}$ في مربع $\overline{ل - ١٤٩ - و}$
 $\overline{ا ب}$ ، والمكعب مربع $\overline{س ب}$ في $\overline{س ب}$. فالمكعب أعظم من الأموال
 بمقدار مربع $\overline{س ب}$ في $\overline{س ج}$. فإذا نقصنا من الجذور - وهي $\overline{ب س}$ في
 5 مربع $\overline{ا ب}$ - بمقدار ضرب مربع $\overline{ب س}$ في $\overline{س ج}$ ، فالباقي - وهو
 العدد - أقل مما لو نقص منه مضروب مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{س ج}$. لكن إذا
 نقص منه هذا يبقى مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، وقد تبين أنه أقل من العدد
 الأول. فإذا نقص منه مربع $\overline{س ب}$ في $\overline{س ج}$ يكون الباقي - وهو العدد
 الذي مع ضلع $\overline{ب س}$ - أقل من العدد الأول بكثير. فقد تبين أن أي
 10 ضلع يفرض أعظم من $\overline{ب د}$: فالعدد الذي يوجد معه أقل من العدد
 الأول.

$\overline{س \quad ج \quad د \quad ا \quad ب}$

وأيضاً: فليفرض الضلع أصغر من $\overline{ب د}$ وأعظم من $\overline{ا ب}$ وهو $\overline{ب م}$.
 فيكون الأموال مربع $\overline{ب م}$ في $\overline{ب ج}$ ، والمكعب مربع $\overline{ب م}$ في $\overline{ب م}$ ،
 فيكون فضل الأموال على المكعب هو مربع $\overline{ب م}$ في $\overline{ج م}$. فيكون فضل
 15 العدد على الجذور - وهي مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب م}$ - مثل ذلك. فيكون
 العدد مساوياً لمجموع مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب م}$ - وهو / الجذور - مع مربع $\overline{ب - ١٩ - ظ}$
 $\overline{ب م}$ في $\overline{ج م}$. فأقول: إن العدد الأول أعظم منه.
 لأن ضرب $\overline{د ب}$ في $\overline{ب م}$ في $\overline{ج د}$ ينقص عن ضرب ضعف $\overline{د ب}$ في
 $\overline{ج د}$ / بمقدار ضرب $\overline{د م}$ في $\overline{ج د}$ ، وضرب $\overline{م ب}$ في $\overline{ا ب}$ في $\overline{م ا}$ ينقص $\overline{ل - ١٤٩ - ظ}$

4 وهي: وهو [ب، ل] - 6 مضروب مربع $\overline{ا ب}$ في: محوة [ب] - 12 $\overline{ب د}$: محوة، وكذلك أول
 الكلمة التالية [ب] - 18 عن: من [ب، ل]

عن ضرب $\overline{د ب}$ $\overline{ب آ}$ في $\overline{د أ}$ بمقدار $\overline{د ب}$ $\overline{ب م}$ في $\overline{د م}$ ، وهذا التقصان أكثر من التقصان الأول، أعني من $\overline{ج د}$ في $\overline{د م}$ ، لأن $\overline{د ب}$ أعظم من $\overline{ج د}$ لما تبين؛ فـ $\overline{د ب}$ $\overline{ب م}$ أعظم من $\overline{ج د}$ ، فـ ضرب $\overline{د ب}$ $\overline{ب م}$ في $\overline{د م}$ أعظم من ضرب $\overline{ج د}$ في $\overline{د م}$ ، وضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ مثل $\overline{د ب}$ $\overline{ب آ}$ في $\overline{د أ}$ ، فـ $\overline{د ب}$ $\overline{ب م}$ في $\overline{ج د}$ أعظم من $\overline{ب ب}$ $\overline{ب آ}$ في $\overline{أ م}$.

فنسبة $\overline{م ب}$ $\overline{ب آ}$ إلى $\overline{د ب}$ $\overline{ب م}$ أصغر من نسبة $\overline{ج د}$ إلى $\overline{أ م}$. فإذا جعلنا نسبة $\overline{أ م}$ إلى $\overline{م د}$ مشتركة، فيكون النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{م ب}$ $\overline{ب آ}$ إلى $\overline{د ب}$ $\overline{ب م}$ ، ومن نسبة $\overline{أ م}$ إلى $\overline{د م}$ ، وهي نسبة $\overline{م ب}$ $\overline{ب آ}$ في $\overline{أ م}$ إلى $\overline{علم د ب}$ $\overline{ب م}$ في $\overline{د م}$ ، أصغر من النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ج د}$ إلى $\overline{أ م}$ ، ومن نسبة $\overline{أ م}$ إلى $\overline{د م}$ ، وهي نسبة $\overline{ج د}$ إلى $\overline{د م}$. فنسبة $\overline{علم م ب}$ $\overline{ب آ}$ في $\overline{أ م}$ إلى $\overline{علم د ب}$ $\overline{ب م}$ في $\overline{د م}$ ، أصغر من نسبة $\overline{ج د}$ إلى $\overline{د م}$. فـ $\overline{علم م ب}$ $\overline{ب آ}$ في $\overline{أ م}$ مضروباً في $\overline{د م}$ أصغر من $\overline{علم د ب}$ $\overline{ب م}$ في $\overline{د م}$ مضروباً في $\overline{ج د}$. فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع $\overline{ب م}$ في $\overline{ج د}$ يحصل في الجانب الأعظم مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ ، وفي الأصغر $\overline{علم م ب}$ $\overline{ب آ}$ في $\overline{أ م}$ مضروباً في $\overline{د م}$ مع / مربع $\overline{ب م}$ في $\overline{ج د}$. فإذا زدنا على

15 $\overline{ب آ}$ في $\overline{أ م}$ مضروباً في $\overline{د م}$ مع / مربع $\overline{ب م}$ في $\overline{ج د}$. فإذا زدنا على ل - ١٥٠ - و

كلا الجانبين مربع $\overline{ب آ}$ في $\overline{د م}$ يصير < في > الجانب الأعظم مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ مع مربع $\overline{ب آ}$ في $\overline{د م}$ ، وفي الأصغر مربع $\overline{ب م}$ في $\overline{د م}$ ، مع مربع $\overline{ب م}$ في $\overline{ج د}$ ، وبمجموعهما مربع $\overline{ب م}$ في $\overline{ج م}$. فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع $\overline{ب آ}$ في $\overline{ب م}$ ، يصير الجانب الأعظم مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ مع مربع $\overline{ب آ}$ في $\overline{ب د}$ ، وهو العدد الأعظم، والجانب الأصغر مربع $\overline{ب م}$ في $\overline{ج م}$ مع مربع $\overline{ب آ}$ في $\overline{ب م}$ ، وهو العدد الذي مع ضلع $\overline{ب م}$ ؛ فالعدد الأول أعظم منه.

12 م: ب: د ب (ب، ل) - 18-15 - فإذا زدنا ... في ج د: مكررة [ل] - 20 في ب د: ل ب د [ب، ل]

$$\overline{\text{ج د ا ب}}$$

وأيضاً: لو فرضنا الضلع مثل $\overline{\text{ا ب}}$ ، فيكون المكعب مثل $\overline{\text{ا ب}}$ مربعه وهو الجذور. فالمكعب مثل الجذور، فالعدد مثل الأموال، وهو مربع $\overline{\text{ا ب}}$ في $\overline{\text{ب ج}}$. والعدد الأول قد تبين أنه مثل مربع $\overline{\text{ا ب}}$ في $\overline{\text{د ب}}$ ، ومربع $\overline{\text{د ب}}$ في $\overline{\text{ج ب}}$ ؛ وبمجموعها أكثر من مربع $\overline{\text{ا ب}}$ في $\overline{\text{ب ج}}$ بمقدار 5 ضرب علم $\overline{\text{د ب}}$ $\overline{\text{ا ب}}$ في $\overline{\text{ا د}}$ مضروباً في $\overline{\text{ج د}}$ لئلا تبين قبل ذلك. فالعدد الأول / أعظم من العدد الثاني.

ل - ١٥٠ - ظ

$$\overline{\text{ج د ا ب}}$$

وأيضاً: لو فرضنا الضلع أقل من $\overline{\text{ا ب}}$ مثل $\overline{\text{ب ه}}$ ، فيكون الجذور - وهي ضرب $\overline{\text{ب ه}}$ في مربع $\overline{\text{ا ب}}$ - أكثر من المكعب بمقدار ضرب $\overline{\text{ب ه}}$ في علم $\overline{\text{ا ب}}$ $\overline{\text{ب ه}}$ في $\overline{\text{ا ه}}$. فيكون العدد أكثر من الأموال بمثل ذلك. 10 فإذا جمع مع الأموال - أعني مربع $\overline{\text{ب ه}}$ في $\overline{\text{ب ج}}$ - يكون مثل العدد الذي مع ضلع $\overline{\text{ب ه}}$. والعدد الأول مثل مربع $\overline{\text{ا ب}}$ في $\overline{\text{ب د}}$ ، ومربع $\overline{\text{ب د}}$ في $\overline{\text{د ج}}$ ، وهو أكثر من جميع مربع $\overline{\text{ا ب}}$ في جميع $\overline{\text{ب ج}}$ لئلا مر. لكن مربع $\overline{\text{ب ه}}$ في جميع $\overline{\text{ب ج}}$ بعض مربع $\overline{\text{ا ب}}$ في جميع $\overline{\text{ب ج}}$ ، والعلم في $\overline{\text{ب ه}}$ ، وهو بعضه الآخر، هو في بعض $\overline{\text{ب ج}}$. فالكل أقل من 15 مربع $\overline{\text{ا ب}}$ في جميع $\overline{\text{ب ج}}$ ، فهو أقل من العدد الأول ضرورة.

$$\overline{\text{ج د ا ب}}$$

8 وهي: وهو [ب، ل]

قد تبيّن أن أيّ ضلع يفرض أصغر من $\overline{ب د}$ ، فالعدد الذي يوجد معه حتى تصح المسألة يكون أقلّ من العدد الأول، وهو مربع $\overline{ا ب}$ المعلوم في $\overline{ب د}$ المعلوم مع مربع $\overline{ب د}$ المعلوم في $\overline{ج د}$ المعلوم. فيكون العدد الأول معلوماً. فإن كان العدد المسؤول أعظم منه، فالمسألة مستحيلة؛ وإن كان مساوياً له فهي ممكنة ولها جواب واحد وهو المطلوب الأول وهو $\overline{ب د}$ ؛
 5 وإن كان أقلّ منه فهي ممكنة / ولها مطلوبان: أحدهما أعظم من $\overline{ب د}$ ، $\overline{د ل}$ - 101 - و
 والآخر أصغر منه.

أما المطلوب الأعظم: فالعدد المسؤول إن كان أكثر من مربع $\overline{ب ا}$ في $\overline{ج ب}$ ، فللمسألة مطلوب أعظم من $\overline{ب د}$ وأقلّ من $\overline{ج ب}$.
 10 لأننا نخرج $\overline{د ب}$ على الاستقامة، ونجعل $\overline{ب ي}$ مثل $\overline{د ب}$ ونفصل منه $\overline{م ي}$ مثل $\overline{ج د}$ ، ونجعل عدد التفاوت بين العدد الأعظم والعدد المسؤول عدداً و $\overline{د م}$ عدد أموال، ونستخرج المطلوب على مسألة: مكعب وأموال يعدل عدداً، فالمطلوب الذي يخرج بتلك المسألة يكون أصغر من $\overline{د ج}$ ؛ لأن العدد المسؤول أعظم من مربع $\overline{ب ا}$ في $\overline{ب ج}$ ، ففضل العدد الأعظم على
 15 مربع $\overline{ب ا}$ في $\overline{ب ج}$ أكثر من فضله على العدد المسؤول. لكن العدد الأعظم هو مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{د ج}$ مع مربع $\overline{ب ا}$ في $\overline{ب د}$ ، وهو يشارك مربع $\overline{ب ا}$ في $\overline{ب ج}$ بمربع $\overline{ب ا}$ في $\overline{ب د}$. فإذا ألقيناه من الجانبين بقي في الأعظم مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ ، وفي الجانب الأصغر مربع $\overline{ب ا}$ في $\overline{ج د}$ ، والفضل بينهما علم $\overline{د ب}$ في $\overline{ا د}$ ثم في $\overline{ج د}$. وعلم $\overline{د ب}$ في $\overline{ا د}$
 20 مثل ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{ج د}$ ل $\overline{ا م}$. فالعدد الأعظم أكثر من مربع $\overline{ب ا}$ في $\overline{ج ب}$ بضرب ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ مضروباً في $\overline{ج د}$. فضرب $\overline{د ي}$ في

12 و $\overline{د م}$ عدد: ناقصة [ل] - 14-15 فضل ... $\overline{ب ج}$: أثبتنا في الهامش مصححاً للنص [ب]، ناقصة

[ل] - 15 مربع: بع [ب]

ج د مضروباً في ج د، أعني مربع ج د / في د ي، أعني مربع ج د في ل - ١٥١ - ظ
 ج م، أعني مكعب ج د مع ضرب مربع ج د في د م؛ وفضل العدد
 الأعظم على العدد المسؤول (هو) بمكعب المطلوب الذي يخرج بتلك
 المسألة مع ضرب مربعه في د م. فالمطلوب الذي يخرج بتلك المسألة أقل
 ٥ من ج د، وليكن د ع. فأقول: إن ب ع / هو الضلع المطلوب في هذه ب - ٢٠ - و
 المسألة.

ج د ع ا ب م ي

لأن ضرب د ب ب ا في د ا وهو العلم مثل ضعف د ب، أعني
 ي د، في ج د لما مر، فالعلم في د ع مثل ي د في ج د ثم في د ع،
 لكن ي د في ج د ثم في د ع مثل ي د في د ع ثم في ج ع مع مربع
 ١٥ د ع في ج ع (مضروباً في ع م) لكون مربع د ع في ج م ينقسم إلى
 مربع د ع في ع م، وإلى مربع د ع في ج ع. لكن ضرب ي د في
 د ع ثم في ج ع مع مربع د ع في ج ع هو مثل ضرب ي ع في ع د ثم
 في ج ع. فضرب العلم في د ع مثل مربع د ع في ع م، مع ضرب ي ع
 في ع د ثم في ج ع. لكن ي ع في ع د ثم في ج ع هو ضرب ع ب
 ١٥ ب د في د ع، وهو العلم، مضروباً في ج ع. فالعلم الأول في د ع مثل
 العلم الثاني في ج ع مع مربع د ع في ع م. فإذا زدنا على كلا الجانبين ل - ١٥٢ - و
 مربع ب ا في ب ع، يصير في أحد الجانبين مربع ب د في د ع مع مربع
 ب ا في ب د، وفي الجانب الآخر العلم الثاني في ج ع مع مربع ع د في

١ أعني (الثانية): كذا، والأفضل أن تكون مساوياً له وهذا ما بينه - 3 بتلك: تلك (ب، ل) -
 5 المطلوب: المطلوب الذي [ل]، ومن البين أن اسم الموصول لا محل له هنا. - 7 لأن ضرب: محمودة
 [ب] - 10 لكون: لكن [ب، ل]

ع م ، ومع مربع ب آ في ب ع ، مع تعادل الجانبين. فإذا زدنا على كليهما مربع ب د في ج ع ، يصير في أحدهما مربع ب د في ج د مع مربع ب آ في ب د ، وهو العدد الأعظم ، وفي الآخر مربع ب ع في ج ع ، مع ضرب مربع ب آ في ب ع ، ومع مربع ع د في ع م . لكن مربع ب ع في ج ع ، مع مربع ب آ في ب ع ، هو العدد الذي يكون مع ضلع ب ع . ففضل العدد الأعظم على العدد الذي يكون مع ضلع ب ع هو مثل مربع ع د في ع م . وقد كان فضل العدد الأعظم على العدد المسؤول هو مربع ع د في ع م . فالعدد المسؤول مثل العدد الذي يكون مع ضلع ب ع . فالضلع المطلوب هو ب ع .

10 وإن كان العدد المسؤول مثل مربع ب آ في ب ج ، كان للمسألة مطلوبٌ مثل ب ج ، وهو عدد الأموال ، لأن العدد المسؤول إذا كان مثل

مربع آ ب - وهو عدد الجذور - في ج ب / ، وهو عدد الأموال ، كان د - ١٥٢ - ط
المطلوب عدد الأموال وهو ج ب . لأننا إذا جعلنا ج ب ضلعاً ، فيكون ج ب في مربع آ ب إنما هو الجذور ، وهو مثل العدد ، ويكون المكعب هو مربع ج ب في ج ب ، وهو بعينه الأموال . فالجذور مثل العدد ، والأموال مثل المكعب ، فالجذور والأموال مثل المكعب والعدد . من هذا تبين أن آ ب حيثنذ يكون مطلوباً أصغر من ب د ، لأننا إذا جعلنا آ ب ضلعاً ، فيكون مربع آ ب في آ ب هو المكعب ، وهو الجذور ، ومربع آ ب في ج ب هو الأموال وهو العدد ، فالجذور مع الأموال مثل المكعب 20 والعدد.

ج ع د ا ب ي

وإن كان العدد المسؤول أقل من مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، فللمسألة المطلوب أعظم من $\overline{ج ب}$. لأننا نجعل عدد التفاوت بين العدد الأعظم والمسؤول عدداً، ودَم عدد الأموال، ونعمل سؤالاً على مسألة: مكعب وأموال يعدل عدداً. فالمطلوب الذي يخرج بتلك المسألة يكون أعظم من $\overline{ج د}$ ، لأن فضل العدد الأعظم على العدد المسؤول أكثر من فضله على مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ج ب}$ ؛ لكن فضله على مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ج ب}$ هو مكعب $\overline{ج د}$ ، مع ضرب مربع $\overline{ج د}$ في دَم لما مرَّ؛ وفضله على العدد المسؤول مكعب المطلوب / الخارج بتلك المسألة مع ضرب مربعه في دَم. ل - ١٥٣ - و

المطلوب الذي يخرج بتلك المسألة أعظم من $\overline{ج د}$ ، وليكن دَط. فأقول:

١٠ إن $\overline{ب ط}$ هو المطلوب في هذه المسألة.


لأن مربع $\overline{ب أ}$ في $\overline{ب د}$ ، مع مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج ب}$ جذور وأموال لضع $\overline{ب د}$ ؛ وفضل هذا المجموع على مكعب $\overline{ب د}$ إنما هو العدد الأعظم، فيجعل هذا المجموع في جانب، ومكعب $\overline{ب د}$ في جانب. فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع $\overline{أ ب}$ في دَط، يصير في جانب المكعب $\overline{ب د}$ في دَم ومربع $\overline{ب أ}$ في دَط، وفي الجانب الآخر مربع $\overline{ب أ}$ في $\overline{ب ط}$ مع مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج ب}$ ؛ وفضل الجانب الآخر على جانب المكعب يكون على حاله، وهو العدد الأعظم. فإذا زدنا على كلا الجانبين علم $\overline{ط ب د}$ في دَط المضروب في $\overline{ج ب}$ ، يحصل في جانب المكعب: $\langle \text{العَلَم} \rangle$ المضروب في $\overline{ج ب}$ مع مربع $\overline{ب أ}$ في دَط ومع مكعب $\overline{ب د}$ ، وفي الجانب الآخر: مربع $\overline{ب أ}$ في $\overline{ب ط}$ ومربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج ب}$ ؛ وفضل هذا الجانب على جانب المكعب إنما هو العدد الأعظم. فإذا جعلنا $\overline{ب ط}$ ضلعاً، يكون ما في هذا الجانب الأموال والجذور. / ففضل الأموال ل - ١٥٣ - ط

١٣ المجموع في: المجموع من [ب، ل] - ١٥ $\overline{ب أ}$ في دَط: محورة [ب]

والجنذور على ما في جانب مكعب $\overline{ب د}$ إنما هو العدد الأعظم. فإذا زدنا على ما في جانب مكعب $\overline{ب د}$ مقداراً ما، يصير فضل الأموال والجنذور على ما يحصل في ذلك الجانب أنقص ممّا كان. وهو العدد الأعظم، بمقدار هذا الزيد. فلتزد على جانب مكعب $\overline{ب د}$ علّم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ا}$ في $\overline{ا د}$ ، 5 مضروباً في $\overline{ط د}$ مع علم $\overline{ط ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{ط د}$ مضروباً في $\overline{ط ج}$ ، فيصير في هذا الجانب مكعب $\overline{ب د}$ ومربع $\overline{ب ا}$ في $\overline{ط د}$ ، وعلم $\overline{ط ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{ط د}$ مضروباً في $\overline{ج ب}$ ، وعلم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ا}$ في $\overline{ا د}$ مضروباً في $\overline{ط د}$ ، وعلم $\overline{ط ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{ط د}$ مضروباً في $\overline{ط ج}$. وهذه الجملة تُساوي مكعب $\overline{ب ط}$. ففضل الأموال والجنذور على مكعب $\overline{ب ط}$ أقلّ من العدد الأعظم 10 بمقدار العلمين الزيّدين، وهما علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ا}$ في $\overline{ا د}$ المضروب في $\overline{ط د}$ ، وعلم $\overline{ط ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{ط د}$ المضروب في $\overline{ج ط}$. لكنّ فضل الأموال والجنذور على مكعب $\overline{ب ط}$ إنما هو العدد الذي يكون مع ضلع $\overline{ب ط}$. / فالعدد الذي يكون مع ضلع $\overline{ب ط}$ لتصح المسألة أقلّ من $\overline{ب - ٢٠ - ط}$ العدد الأعظم بمقدار العلمين الزيّدين. فيكون العدد الذي / مع ضلع $\overline{ب ط}$ 15 $\overline{ب ط}$ مع هذين العلمين مثل العدد الأعظم.. ولأنّ علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ا}$ في $\overline{ا د}$ مثل ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ ، فمضروب هذا العلم في $\overline{ط د}$ مثل ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ مضروباً في $\overline{ط د}$. لكنّ علم $\overline{ط ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{ط د}$ المضروب في $\overline{ج ط}$ ينقسم إلى قسمين: القسم الأول منه مثل $\overline{ج ط}$ في ضعف $\overline{ب د}$ مضروباً في $\overline{ط د}$ ، والقسم الآخر هو مربع $\overline{ط د}$ في $\overline{ج ط}$. فقد حصل 20 جميع أقسام العلمين المذكورين، إنّما هو ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ مضروباً في $\overline{ط د}$ ، وضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج ط}$ مضروباً في $\overline{ط د}$ ، ومربع $\overline{ط د}$ في

5 $\overline{ط د}$ مع علم: محو [ب] - 15 $\overline{ب ط}$: الطاء محو [ب]، ب ج [ل] - 18 القسم: والقسم
[ب، ل] - 21 وضعف... $\overline{ط د}$: ناقصة [ل]


ج ط . لكن مجموع القسمين الأولين من هذه الثلاثة هو ضعف ب د في ط د ثم في ط د ، وهو ضعف ب د في مربع ط د ، أعني ي د في مربع ط د ، أعني ج م في مربع ط د . فإذا جمعنا معهما القسم الثالث ، وهو مربع ط د في ط ج ، يحصل مربع ط د في ط م . ففضل العدد الأعظم 5 على العدد الذي يكون مع ضلع ب ط حتى تصح المسألة إنما هو مربع ط د في ط م . وقد كان فضل العدد الأعظم أيضاً على العدد المسؤول إنما هو مربع ط د في ط م . فالعدد الذي مع ضلع ب ط إنما هو القدر المشترك . فيكون ب ط هو الضلع المطلوب .



- وأقول أيضاً : / إن المطلوب الأعظم له نهاية في العِظم . ل - ١٥٤ - ط
- 10 أنا نجعل مربع ب آ ، وهو عدد الجذور ، عدداً ، وجب ، وهو عدد الأموال ، عدد جذور ونعمل سؤالاً على مسألة : مال يعدل جذوراً وعدداً . وليكن المطلوب الذي يخرج بتلك المسألة هو ب ط ، حتى يكون ماله يعدل ضربه في ج ب ، وهو الجذور ، مع مربع ا ب وهو العدد . فأقول : إن أي ضلع يُفرض يكون أقل من ب ط .
- 15 لأن مربع ب ط يعادله مربع ب آ ، وضرب ط ب في ج ب ، فإذا ضربنا كلا الجانبين في ط ب يبقى المعادلة ، ويصير في أحدهما مكعب ط ب ، وفي الآخر مربع ب آ في ب ط ، مع مربع ب ط في ج ب ، وهما متساويان . فإذا فرضنا ب ط ضلعاً ، فيكون مربع ب ط في ب ج هو الأموال ، ومربع ب آ في ب ط هو الجذور . فالجذور والأموال معادلة 20 للمكعب . وقد كان يجب أن تكون معادلة للمكعب والعدد حتى تصح


4 ط ج : ط د [ب ، ل] - 13 الجذور : الجذر [ب ، ل] - 14 يكون : فيكون [ب ، ل]

المسألة؛ فلا يكون $\overline{ب ط}$ ضلعاً البتّة. فأَيّ ضلع يُفرض يكون أقلّ من $\overline{ب ط}$.



وأقول أيضاً: إن أيّ خط يفرض أصغر من $\overline{ب ط}$ يصلح أن يكون مطلوباً.

- 5 فليفرض $\overline{ب ع}$ أصغر من $\overline{ب ط}$. فلأن فضل مكعب $\overline{ب ط}$ على مكعب $\overline{ب ع}$ إنما / هو مربع $\overline{ع ب}$ في $\overline{ط ع}$ مع علم $\overline{ط ب}$ $\overline{ب ع}$ في $\overline{د - ١٥٥ - د}$ $\overline{ط ع}$ مضروباً في $\overline{ط ب}$ ، وهو بعينه فضل أموال وجذور $\overline{ب ط}$ على مكعب $\overline{ب ع}$. وفضل أموال وجذور $\overline{ب ط}$ على أموال وجذور $\overline{ب ع}$ إنما هو مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ط ع}$ مع العلم المذكور في $\overline{ب ج}$. وهذا الفضل أقلّ من 10 الفضل الأول بكثير، فمكعب $\overline{ب ع}$ أصغر من أمواله وجذوره. فإذا جُعل فضلُ أمواله وجذوره على مكعبه عدداً؛ فيصحّ منه المسألة، ويكون مكعب $\overline{ب ع}$ مع ذلك العدد مساوياً لأمواله وجذوره.



وأما المطلوب الأصغر: فنجعل عدد التفاوت بين العدد الأعظم والعدد المسؤول عدداً، ودَم عددُ أموالٍ، ونعمل سؤالاً على مسألة: مكعب 15 وعدد يعدلُ أموالاً. فالمطلوب الذي يخرج بتلك المسألة إن كان أقلّ من $\overline{د ا}$ مثل $\overline{د ه}$ فأقول: إن $\overline{ب ه}$ هو المطلوب في هذه المسألة.

لأن ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ مثل $\overline{د ب}$ $\overline{ب ا}$ في $\overline{د ا}$ لِمَا مرّ، فضرب ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ مضروباً في $\overline{د ه}$ مثل $\overline{د ب}$ $\overline{ب ا}$ في $\overline{د ا}$ ، وهو

3 يصلح: فيصلح [ب، ل] - 8 وجذور (الثانية): ناقصة [ل] - 18 $\overline{د ا}$ $\overline{د ه}$: [ب، ل]

العلم، مضروباً في د هـ. لكن العلم ينقسم إلى علمين: أحدهما هـ ب ا في آ هـ، والآخر د ب هـ في د هـ. فيكون ضعف ب د في ج د مضروباً في د هـ مثل ضرب / كل واحد من العلمين في د هـ. لكن علم ل - ١٥٥ - ظ

د ب هـ في د هـ، ثم في د هـ، هو مربع د هـ في ب هـ وفي د ب، أعني ٥

ب د في د هـ ثم في ج د؛ وضعف ب د في د هـ أعظم من ضرب د ب هـ في د هـ، وهو العلم، بمقدار مربع د هـ. فضعف هذا العلم في ج د أنقص من ضعف د ب في د هـ ثم في ج د، بمقدار مربع د هـ في ج د. فليتنقص من كل واحد من الجانبين المتساويين مربع د هـ في ج د، يصير في ١٥

أحد الجانبين علم د ب هـ في د هـ مضروباً في ج د، وفي الجانب الآخر علم هـ ب ا في آ هـ مضروباً في د هـ، ومربع د هـ في هـ م. فإذا زدنا على كل واحد من الجانبين مربع ب هـ في ج د، ومربع ب ا في د هـ، يصير في أحد الجانبين مربع ب د في ج د ومربع ب ا في د هـ، وفي الآخر مربع هـ ب في ج د، ومربع د هـ في هـ م. فإذا زدنا على كلا ١٥

الجانبين مربع ب ا في ب هـ، يصير في أحد الجانبين مربع ب د في ج د، ومربع ب ا في د ب، وهو العدد الأعظم، وفي الجانب الآخر مربع ب هـ في ج هـ مع مربع ب ا في ب هـ ومربع د هـ في هـ م.

والأولان مثل العدد الذي يجب أن يكون مع ضلع / هـ ب في المسألة. ل - ١٥٦ - و

فعدد ضلع هـ ب مع مربع د هـ في هـ م مثل العدد الأعظم، وقد كان ٢٠

العدد المسؤول مع مربع د هـ في هـ م مثل العدد الأعظم. فالعدد المسؤول / هو العدد الذي يكون مع ضلع ب هـ < ف > هـ ب هو الضلع المطلوب. ب - ٢١ - و

9 يغير: يصير [ب]، نصير [ل]، والصواب ما أثبت لأن الفعل مجزوم لوقوعه جواباً لطلب - 21 ب هـ: الماء محموة [ب] / آ هـ ب: محموة [ب]

ج د ا ب م ي

وإن كان المطلوب الذي يخرج بتلك المسألة مثل $\overline{د أ}$ فأقول: إن $\overline{أ ب}$ هو مطلوبنا في هذه المسألة.

لأن ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ مثل $\overline{د ب}$ $\overline{ب أ}$ في $\overline{د أ}$ لما مرّ، ف ضرب
 ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ مضروباً في $\overline{أ د}$ مثل $\overline{د ب}$ $\overline{ب أ}$ في $\overline{أ د}$ ، وهو
 5 العلم، مضروباً في $\overline{أ د}$. لكن العلم مضروباً في $\overline{أ د}$ ، هو مربع $\overline{د أ}$ في $\overline{أ ب}$
 وفي $\overline{د ب}$ ، أعني مربع $\overline{د أ}$ في $\overline{أ ي}$ ؛ وضرب ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$
 مضروباً في $\overline{أ د}$ ، هو ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{د أ}$ ، ثم في $\overline{ج د}$ ؛ وضعف $\overline{د ب}$
 في $\overline{أ د}$ أعظم من $\overline{د ب}$ $\overline{ب أ}$ في $\overline{أ د}$ بمقدار مربع $\overline{د أ}$. ف ضرب هذا العلم
 في $\overline{ج د}$ أنقص من ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{أ د}$ ثم في $\overline{ج د}$ بمقدار مربع $\overline{أ د}$ في
 10 $\overline{ج د}$. فليتنقص من كل واحدٍ من الجانبين المتساويين مربع $\overline{أ د}$ في $\overline{ج د}$ ،
 يَبْقَى في أحد الجانبين علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب أ}$ في $\overline{أ د}$ مضروباً في $\overline{ج د}$ ، وفي الجانب
 الآخر مربع $\overline{د أ}$ في $\overline{أ م}$. فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع / $\overline{ب أ}$ في $\overline{ل - ١٥٦ - ظ}$
 $\overline{ج د}$ ، يصير في أحدهما مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ ، وفي الآخر مربع $\overline{د أ}$ في
 $\overline{أ م}$ ، مع مربع $\overline{ب أ}$ في $\overline{ج د}$. فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع $\overline{ب أ}$ في
 15 $\overline{ب د}$ ، يصير في أحد الجانبين مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ مع مربع $\overline{ب أ}$ في $\overline{ب د}$
 وهو العدد الأعظم، وفي الجانب الآخر مربع $\overline{د أ}$ في $\overline{أ م}$ مع مربع $\overline{ب أ}$
 في $\overline{ب ج}$ ، أعني العدد الذي يجب أن يكون مع ضلع $\overline{ب أ}$ ؛ فعدد ضلع
 $\overline{ب أ}$ مع مربع $\overline{د أ}$ في $\overline{أ م}$ مثل العدد الأعظم. وقد كان العدد المسؤول
 مع مربع $\overline{د أ}$ في $\overline{أ م}$ مثل العدد الأعظم، فالعدد المسؤول هو العدد الذي
 20 يكون مع ضلع $\overline{أ ب}$ ، ف $\overline{أ ب}$ هو الضلع المطلوب.

11 يبق: يبق [ب، ل] - 15 $\overline{ب د}$ (الثانية): ناقصة [ل]

ج د ا ب م ي

وإن كان المطلوب الذي يخرج بتلك المسألة أعظم من دَا مثل ضلع د ه ف ب ه هو مطلوبنا في هذه المسألة.

لأن د ب مثل ب ي، فيكون د ب ب ه مثل ي ه. ف ضرب د ب ب ه في د ه، وهو العلم، مثل ي ه في د ه. ف ضرب العلم في د ه مثل ي ه في د ه ثم في د ه، وهو مربع د ه في ي ه. فعلم د ب ب ه في د ه المضروب في د ه مثل مربع د ه في ي ه. ولأن علم د ب ب آ في دَا مثل ضعف ب د في ج د لِمَا مرّ، فإذا ضربنا كل واحدٍ منها في

- د ه. يكون علم د ب ب آ / في دَا مضروباً في د ه مثل ضعف د ب د ه في ج د مضروباً في د ه؛ فيكون أيضاً مربع د ه في ي ه مع علم د ب ب آ في دَا مضروباً في د ه، وهو في أحد الجانبين مثل علم د ب ب ه في د ه مضروباً في د ه مع ضعف ب د في ج د مضروباً في د ه، وهو في الجانب الآخر. ولأن د ب ب ه في ج د أقل من ضعف د ب في ج د بمقدار ضرب د ه في ج د، فيكون ضرب < د ب > ب ه في ج د المضروب في ه د أقل من ضعف ب د في ج د ثم في د ه بمقدار مربع د ه في ج د، وهو مثل ضرب د ب ب ه في د ه ثم في ج د. فإذا نقصنا من ضعف د ب في ج د المضروب في د ه مربع ه د في ج د، يبقى في هذا الجانب علم د ب ب ه في د ه المضروب في ج د، وعلم د ب ب ه في د ه المضروب في د ه، ومجموعها هو علم د ب ب ه في د ه المضروب في ج ه. وإذا نقصنا مربع ه د في ج د من مضروب مربع ه د في ي ه الذي في الجانب الآخر، يبقى < في > ذلك الجانب مربع ه د في م، مع علم د ب ب آ في دَا المضروب في د ه، مع

1 ضلع: مربع [ب، ل] - 12 ج د: محوة [ب]، ج [ل] / أقل: محوة [ب]

تساوي الجانبين. فعمل $\overline{د ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{د ه}$ المضروب في $\overline{ج ه}$ مثل علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ا}$ في $\overline{د ا}$ المضروب في $\overline{د ه}$ ، مع مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{ه م}$. ففضل $\overline{ل} - ١٥٧ - \overline{ط}$ علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{د ه}$ المضروب في $\overline{ج ه}$ على علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ا}$ في $\overline{د ا}$ المضروب في $\overline{د ه}$ ، إنما هو مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{ه م}$. ولأن فضل الأموال والجنذور التي لضلع $\overline{ب ه}$ على مكعبه أصغر من فضل الأموال والجنذور التي لضلع $\overline{ب د}$ على مكعبه إنما هو العدد الأعظم، فإذا نقصنا من أمواله علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{د ه}$ المضروب في $\overline{ج ب}$ ، يبقى مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ج ب}$ ، وهو أموال ضلع $\overline{ب ه}$ ، وإذا نقصنا من جنذوره مربع $\overline{ب ا}$ في $\overline{د ه}$ ، يبقى مربع $\overline{ب ا}$ في $\overline{ب ه}$ وهو جنذور ضلع $\overline{ب ه}$ ، وإذا نقصنا من مكعبه مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{د ه}$ وعلم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{د ه}$ المضروب في $\overline{ب ه}$ ، يبقى مكعب ضلع $\overline{ب ه}$ ؛ وفضل الأموال والجنذور التي لضلع $\overline{ب ه}$ على مكعبه أقل من فضل الأموال والجنذور التي لضلع $\overline{ب د}$ على مكعبه، أعني من العدد الأعظم، والنقصان الواقع في جانب الأموال والجنذور أكثر من النقصان الواقع في جانب المكعب بمقدار مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{ه م}$. فيكون فضل الأموال والجنذور التي لضلع $\overline{ب ه}$ على مكعبه، وهو العدد الذي معه، أقل من فضل الأموال والجنذور التي لضلع $\overline{ب د}$ على مكعبه، أعني من العدد الأعظم، بمقدار مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{ه م}$.

ج د ا ب م ه

بيان أن نقصان الأموال والجنذور أكثر من نقصان المكعب بمقدار مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{ه م}$:

1 $\overline{ب ه}$ في $\overline{د ه}$: محوة [ب] - 3 على: محوة [ب] / علم: محوة [ب]، م [ل] - 6 $\overline{ب د}$: $\overline{ب ه}$ [ل] - 9-6 على مكعبه ... ضلع $\overline{ب ه}$: ناقصة [ل] - 8 وإذا: غلذا [ب]

- لأننا قد ذكرنا أن نقصان الأموال / والجذور هو علم $\overline{د ب ه}$ ل - ١٥٨ - د
- المضروب في $\overline{د ه}$ ثم في $\overline{ج ب}$ ، مع مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{د ه}$ ، وهذان في جانب، ونقصان المكعب هو مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{د ه}$ وعلم $\overline{د ب ه}$ في $\overline{د ه}$ مضروباً في $\overline{ب ه}$ ، وهذا في جانب آخر؛ فإذا ألقينا من كلا الجانبين العلم المضروب في $\overline{ب ه}$ ، يبقى في جانب نقصان الأموال والجذور العلم مضروباً في $\overline{ج ه}$ ومربع $\overline{ب أ}$ في $\overline{د ه}$ ، ويبقى في جانب نقصان المكعب مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{د ه}$. فإذا ألقينا من كلا الجانبين مربع $\overline{ب أ}$ في $\overline{د ه}$ ، يبقى في جانب نقصان / الأموال والجذور علم $\overline{د ب ب ه}$ في $\overline{د ه}$ مضروباً في $\overline{ب ه}$ - ٢١ - ظ
- $\overline{ج ه}$ ، وفي جانب نقصان المكعب علم $\overline{د ب ب أ}$ في $\overline{د أ}$ مضروباً في $\overline{د ه}$. وقد تبين أن فضل علم $\overline{د ب ب ه}$ في $\overline{د ه}$ المضروب في $\overline{ج ه}$ على علم $\overline{د ب ب أ}$ في $\overline{د أ}$ ثم في $\overline{د ه}$ بمقدار مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{م ه}$. فيكون فضل العدد الأعظم على العدد الذي يكون مع ضلع $\overline{ب ه}$ إنما هو مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{م ه}$. وقد كان فضله أيضاً على العدد المسؤول هو مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{م ه}$ بعينه. فالعدد الذي مع ضلع $\overline{ب ه}$ إنما هو العدد المسؤول، فضلع $\overline{ب ه}$ هو المطلوب / 15

وأما استخراج المطلوب الأعظم، فالعدد المسؤول إن كان أعظم من مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، فالمطلوب الأعظم يكون أقل من $\overline{ب ج}$ مثل $\overline{ب ه}$. فلأنه قد تبين أن خاصّة العدد الأعظم هو $\overline{د ب ب أ}$ في $\overline{أ د}$ مضروباً في $\overline{د ه}$ ، وخاصّة العدد الثاني الذي مع ضلع $\overline{ب ه}$ هو $\overline{ب ه ب د}$ في $\overline{د ه}$ المضروب في $\overline{ج ه}$ ؛ ففضل خاصّة العدد الأعظم على خاصّة العدد الثاني مثل فضل العدد الأعظم على العدد المسؤول، وهو عدد تفاوت بينهما.

2 $\overline{د ه}$ (الثاني): الهاء محو [ب] / هذان: محو [ب] - 3 $\overline{د ب}$ (الأول): $\overline{أ ب}$ [ب، ل] -

18 أن: ناقصة [ل] / خاصة: فخاصة [ب]

فيكون خاصّة العدد الثاني مع عدد التفاوت مثل خاصّة العدد الأعظم.
 وإذا تَقَدَّرَ هذا، فنجعل $\overline{د ه}$ شيئاً، فيكون خاصّة العدد الأعظم - وهو
 $\overline{علم ا ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{د ا}$ المضروب في $\overline{د ه}$ - أشياء بعدّة هذا العلم. وهو $\overline{ب د}$
 $\overline{ب د}$ في $\overline{د ه}$ ، وهو العلم، يكون ضعف $\overline{ب د}$ ، وهو المطلوب الأول،
 5 وشيء في شيء، فيكون أشياء بعدّة ضعف المطلوب الأول ومالاً. فإذا
 ضربناه في $\overline{ج ه}$ - وهو عدد $\overline{ج د}$ إلا شيئاً - يصير أشياء بعدّة ضعف
 $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ إلا أموالاً بعدّة ضعف المطلوب الأول منقوصاً من هذا
 الضعف $\overline{ج د}$. وإلا كعباً. وهو خاصّة / العدد الثاني. فمع عدد التفاوت $\overline{د - ١٥٩ - و}$
 يعدل خاصّة العدد الأعظم، وهو أشياء بعدّة $\overline{ب د}$ $\overline{ب ا}$ في $\overline{د ا}$ وهو
 10 العلم. فإذا جبرنا يصير المبلغ هذه الأشياء وكعباً وأموالاً بعدّة ضعف $\overline{ب د}$
 بنقصان $\overline{ج د}$ يعدل أشياء بعدّة ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ وعدد التفاوت. لكنّ
 عدد الأشياء من كلا الجانبين متساوية، فَنُسْقِطُهَا، يبقى كعب وأموال بعدّة
 ضعف $\overline{ب د}$ ، منقوصاً منه $\overline{ج د}$ ، يعدل عدد التفاوت بين المسؤول
 والأعظم. فإذا جعلنا عدد التفاوت عدداً، ونقصنا من ضعف $\overline{ب د}$ -
 15 المطلوب الأول - $\overline{ج د}$ ، وهو فضل عدد الأموال على المطلوب الأول،
 وجعلنا الباقي أموالاً، واستخرجنا المطلوب بتلك المسألة، فيخرج $\overline{د ه}$ ،
 فزيده على $\overline{ب د}$ فيحصل $\overline{ب ه}$ ، وهو المطلوب الأعظم.

ج د ه ا ب ي

١ فيكون: ناقصة [ل] - 2 تقدّر: ومعناها انتهاء - 6 شيئاً: شيء [ب. ل] - 11 بنقصان ... $\overline{ب د}$:
 ناقصة [ل]

وإن كان العدد المسؤول مثل مربع $\overline{ب}$ في $\overline{ب ج}$ ؛ فال المطلوب مثل $\overline{ب ج}$.

وإن كان أقل منه فال المطلوب أعظم من $\overline{ب ج}$ مثل $\overline{ب ه}$.

فلأنه إذا كان مقدار له فضل على مقدار آخر، وزيد على الفاضل

5 مقدار أقل وعلى المفضول أكثر؛ فيكون فضل حاصل الفاضل على حاصل

المفضول أقل من الفضل الأول بمقدار تفاوت ما بين الزيادتين. ومكعب

/ $\overline{ب د}$ مع العدد الأعظم مثل مجموع المجسمين: أحدهما مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{د}$ - ١٥٩ - $\overline{ط}$

$\overline{ب ج}$ ، وهو مجسم الأموال، والآخر $\overline{ب د}$ في مربع $\overline{أ ب}$ وهو مجسم

الجنذور. فمجموع المجسمين هو الفاضل، والمكعب هو المفضول. فإذا زدنا

10 على مجسم الجنذور - وهو $\overline{ب د}$ في مربع $\overline{أ ب}$ - ضرب $\overline{ه د}$ في مربع

$\overline{أ ب}$ ؛ يصير المبلغ ضرب $\overline{ب ه}$ في مربع $\overline{أ ب}$. وإذا زدنا على مجسم

الأموال - وهو مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ب ج}$ - ضرب $\overline{ه ب}$ في $\overline{ه د}$ ، ثم

في $\overline{ب ج}$ ، يصير مربع $\overline{ه ب}$ مضروباً في $\overline{ب ج}$. فإذا جمعنا الجانبين

الزائدين، يكون $\overline{ه ب}$ في مربع $\overline{أ ب}$ ، ومربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ج ب}$ ، وهما

15 مجسمان، وزاد مجموعهما على مجموع المجسمين الأولين بمقدار ضرب $\overline{ه د}$ في

مربع $\overline{أ ب}$ ، مع العلم المذكور في $\overline{ج ب}$.

أما الجانب المفضول، وهو مكعب $\overline{ب د}$: فإذا زدنا عليه مربع $\overline{ب د}$

في $\overline{ه د}$ وضرب العلم المذكور في $\overline{ب ه}$ ، يحصل المبلغ مكعب $\overline{ب ه}$. فإذا

جعلنا $\overline{ب ه}$ ضلعاً، فيكون المجسمان الحاصلان من الزيادتين جنوداً

20 وأموالاً، والمكعب الحاصل من هذه الزيادة مكعبه. وفضل مجموع

المجسمين على هذا المكعب هو العدد / الذي يجب أن يكون معه. فيلزم $\overline{د}$ - ١٦٠ - $\overline{و}$

نقصان هذا العدد على فضل المجسمين الأولين على المكعب الأول، وهو

العدد الأعظم، بمقدار فضل الزيادة التي زدناها على المكعب الأول حتى حصل المكعب الثاني على الزيادة التي زدناها على المجسمين الأولين حتى حصل المجسمان الآخران. ولما كان زيادة المكعب الأول مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ه د}$ وعلم $\overline{ه ب د}$ في $\overline{ه د}$ ثم في $\overline{ب ه}$ ، وزيادة المجسمين $\overline{ه د}$ في مربع $\overline{ا ب}$ والعلم المذكور في $\overline{ب ج}$: فإذا ألقينا العلم في $\overline{ب د}$ من كل واحد من الجانبين، يبق زيادة المكعب مربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ه د}$ ، وزيادة المجسمين $\overline{ه د}$ في مربع $\overline{ا ب}$ والعلم في $\overline{ج د}$ ؛ فإذا ألقينا من كل واحد من الجانبين مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ه د}$ ، يبق منها زيادة المكعب: علم $\overline{ه ب د}$ في $\overline{ا ه}$ ، ثم في $\overline{ه د}$ ، وزيادة المجسمين علم $\overline{ه ب د}$ في $\overline{ه د}$ ، ثم في $\overline{ج د}$. ففضل الزيادة الباقية للمكعب على الزيادة الباقية للمجسمين، هو فضل العدد الأعظم على العدد المسؤول الذي يكون مع ضلع $\overline{ه ب}$. فليكن $\overline{ه د}$ شيئاً، أما الزيادة الباقية في جانب المكعب / فتكون علم $\overline{ه ب د}$ في $\overline{ا ه}$ - ١٦٠ - $\overline{ا ه}$ مضروباً في $\overline{ه د}$. أما $\overline{ه ب د}$ فهو عدد / المطلوب الأول، أعني $\overline{ب د}$ مع جذر عدد الجذور، أعني $\overline{ا ب}$ و شيئاً، و $\overline{ا ه}$ وهو عدد $\overline{د ا}$ ١٥ و شيء، ومن ضرب عدد $\overline{د ب}$ في $\overline{ا ه}$ شيء، في عدد $\overline{د ا}$ و شيء يحصل عدد معلوم، وهو عدد $\overline{د ب}$ في $\overline{ا ه}$ في $\overline{د ا}$ وأشياء بعلة ضعف $\overline{د ب}$ ومال. وهذه الجملة هو العلم < والأشياء والمال > ومضروبها في $\overline{ه د}$ ، الشيء، يكون أشياء عددها ضرب $\overline{د ب}$ في $\overline{ا ه}$ في $\overline{د ا}$ ، وأموالاً بعلة ضعف $\overline{د ب}$ وكعباً، وهو حاصل الزيادة الباقية من < زيادة > المكعب. 20 وأما زيادة المجسمين فعلم $\overline{ه ب د}$ في $\overline{ه د}$ وهو ضعف عدد $\overline{ب د}$ و شيء

2 للمكعب: كتب ناسخ [ل] والعدد، ثم كتب «المكعب» بين «والعدد» فوق السطر. وكلمة «العدد» هنا زائدة - 3 الأول مربع: الثاني مع [ب، ل] - 10 هو: وهو [ب، ل] - 13 فهو: هو [ب، ل] - 14 و شيئاً: و شيء [ب، ل] / و $\overline{ا ه}$: $\overline{ا ه}$ [ل] / وهو: هو [ل] - 15 يحصل: ناقصة [ل] - 17 وهذه: وهذا [ب، ل]

في $\overline{هـ د}$ ، الشيء، يكون أشياء بعدة ضعف $\overline{ب د}$ ، ومالاً، وهو العلم، ومضروبها في $\overline{ج د}$ المعلوم يكون أشياء بعدة ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ وأموالاً بعدة $\overline{ج د}$ ، وهو حاصل الزيادة الباقية من زيادة المجسمين. فنسقط هذه الجملة من زيادة المكعب، «أعني» من أشياء عددها ضرب $\overline{ب د}$ $\overline{ب أ}$ 5 في $\overline{د أ}$ وأموال بعدة ضعف $\overline{ب د}$ وكعب. أما الأشياء من الجانبين فتساوية. نقصنا تلك الأشياء من هذه الأشياء فلم يبق منه شيء. وإذا ألقينا تلك الأموال من هذه الأموال يبقى فضلُ زيادةٍ / المكعب على $\overline{ل - ١٦١ - و}$ زيادة المجسمين، أموال بعدة ضعف $\overline{ب د}$ بنقصان $\overline{ج د}$ من هذا الضعف ومكعب، وهو مساوٍ لعدد التفاوت بين العدد الأعظم والمسؤول. فقد تأذى إلى مسألة: مكعب وأموال يعدل عدداً. والعدد هو التفاوت بين العدد الأعظم والمسؤول، وعدد الأموال هو ضعف المطلوب الأول بنقصان فضل عدد الأموال عليه. فيستخرج المطلوب بتلك المسألة، فيخرج $\overline{د هـ}$ ، فزيده على المطلوب الأول فيحصل المطلوب الأعظم.

ن د ج ب

وأما استخراج المطلوب الأصغر فننقص فضل عدد الأموال على 15 المطلوب الأول من ضعف المطلوب الأول، ونجعل الباقي عدد أموالٍ، ونجعل عدد التفاوت بين العدد الأعظم والمسؤول عدداً، ونستخرج المطلوب بمسألة: مكعب وعدد يعدل أموالاً. فالمطلوب الذي يخرج: إن كان أقل من الفضل بين المطلوب الأول وجذر عدد الجذور، فالمطلوب الأصغر أعظم من جذر عدد الجذور مثل $\overline{ب هـ}$. 20 فلأن العدد الأعظم قسمان: أحد قسميه، وهو مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ب د}$ ،

6 فتساوية: متساوية [ب، ل] - 15 من ... الأول: ناقصة [ل]

ينقسم إلى مربع $\overline{اب}$ في $\overline{هـ ب}$ ، وإلى مربع $\overline{اب}$ في $\overline{هـ د}$ ، وقسمه الآخر وهو مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ج د}$ / ينقسم إلى مربع $\overline{هـ ب}$ في $\overline{ج د}$ وإلى ضرب علم ل - ١٦١ - ظ
 $\overline{د ب ب هـ}$ في $\overline{د هـ}$ ثم في $\overline{ج د}$ ؛ والعدد المسؤول هو مربع $\overline{ب ا}$ في $\overline{ب هـ}$
 ومربع $\overline{هـ ب}$ في $\overline{ج هـ}$ المتقسم إلى مربع $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ج د}$ ، وإلى مربع $\overline{ب هـ}$
 في $\overline{هـ د}$. فنسقط مربع $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ج د}$ ، ومربع $\overline{اب}$ في $\overline{ب هـ}$ من
 الجانبين، يبقى من العدد الأعظم مربع $\overline{اب}$ في $\overline{هـ د}$ ، وعلم $\overline{د ب ب هـ}$ في
 $\overline{د هـ}$ مضروباً في $\overline{ج د}$ ، ومن العدد المسؤول مربع $\overline{هـ ب}$ في $\overline{هـ د}$. فإذا
 ألقينا من كلا الجانبين مربع $\overline{اب}$ في $\overline{د هـ}$ ، تبقى خاصة العدد الأعظم علم
 $\overline{د ب ب هـ}$ في $\overline{د هـ}$ مضروباً في $\overline{د ج}$ ، وخاصة العدد المسؤول علم $\overline{هـ ب}$
 ١٥ $\overline{ب ا}$ في $\overline{هـ ا}$ مضروباً في $\overline{د هـ}$. وفضل خاصة العدد الأعظم على خاصة
 العدد المسؤول هو عدد التفاوت بين الأعظم والمسؤول. فنجعل $\overline{د هـ}$ شيئاً.
 أما خاصة العدد الأعظم فعلم $\overline{د ب ب هـ}$ في $\overline{د هـ}$ ، وهو ضعف $\overline{د ب}$ إلا
 شيئاً في شيء، يكون أشياء - بعدة ضعف $\overline{د ب}$ - إلا مالاً، ومضروبها
 في $\overline{ج د}$ يكون أشياء - بعدة ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{د ج}$ - إلا أموالاً - بعدة
 ١٥ $\overline{د ج}$ - وهو خاصة العدد الأعظم. وأما خاصة العدد المسؤول فعلم $\overline{هـ ب}$
 $\overline{ب ا}$ في $\overline{هـ ا}$ مضروباً في $\overline{د هـ}$. أما $\overline{هـ ب ب ا}$ فمجموع $\overline{د ب ب ا}$ / إلا ل - ١٦٢ - و
 شيئاً، و $\overline{هـ ا}$ عدد $\overline{د ا}$ إلا شيئاً، والعلم الحاصل من ضربها يكون عدد
 الحاصل من ضرب $\overline{د ب ب ا}$ في $\overline{د ا}$ ، وهو العلم إلا أشياء بعدة ضعف
 $\overline{د ب}$ ، ومال. ومضروبها في $\overline{د هـ}$ الشيء يكون أشياء - بعدة العلم -
 ٢٥ وكعباً إلا أموالاً بعدة ضعف $\overline{د ب}$ ، وهو خاصة العدد المسؤول، فمع عدد
 التفاوت يعدل خاصة العدد الأعظم، وهي أشياء بعدة ضعف $\overline{د ب}$ في

2 علم: م [ل] - 13 شيئا: شيء [ب، ل] - 17 شيئا (الأولى والثانية): شيء [ب، ل] - 20 وهو:
 محورة [ب]

جـ د إلا أموالاً بعدة جـ د. فإذا جبرنا وقابلنا وألقينا الأشياء من الجانبين لتساويها، يصير أموالاً بعدة ضعف د ب منقوصاً منه د ج، يعدل عدد الثماوت وكعباً. فَيُستخرج المطلوب بتلك المسألة، فيخرج د ه الشيء، وتنقصه من المطلوب الأول، فيبقى ب ه وهو المطلوب الأصغر.

جـ د بـ هـ

- 5 وإن كان المطلوب الذي يخرج بتلك المسألة مثل الفضل بين المطلوب الأول وجذر عدد الجذور، فالمطلوب الأصغر هو جذر عدد الجذور، وإن كان أعظم منه، فالمطلوب الأصغر أقل من جذر عدد الجذور مثل ب ز. فلأنه إذا كان مقدار له فضل على مقدار آخر ونقص من الفاضل مقدار أكثر مما نقص من المفضول، فيكون / فضل الباقي من الفاضل على ل - ١٦٢ -
- 10 الباقي من المفضول أقل من الفضل الأول بمقدار التفاوت بين المنقوصين. وفضل مجموع المجسمين المذكورين اللذين مع ضلع ب د - وهما جذوره وأمواله - على مكعبه هو العدد الأعظم. فمجموع المجسمين هو الفاضل، والمكعب هو المفضول. فإذا نقصنا من جذوره، وهو ضرب ب د في مربع ا ب، ضرب د ز في مربع ا ب، يبقى ضرب ب ز في مربع ا ب. وإذا
- 15 نقصنا من أمواله - وهو مربع ب د في ب ج - علم د ب ب ز في د ز مضروباً في ب ج، يبقى مربع ب ز في ب ج. وإذا نقصنا من مكعبه / - وهو ضرب مربع د ب في د ب - علم د ب ب ز في د ز مضروباً ب - ٢٢ -
- في د ب، ومربع ب ز في د ز، يبقى مكعب ب ز. فإذا جعلنا ب ز ضلعاً، فيكون جذوره هو [مربع] ب ز في مربع ا ب وهو الباقي من

6 عدد الجذور (الأولى): محوة [ب] - 8 مقدار (الأولى والثانية): مقدارا [ب، ل] - 9 من المفضول: محوة [ب] - 13 ناقصة [ل]

- الجزور الأول، وأمواله مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ب ج}$ وهو الباقي من الأموال الأول، ومكعبه هو مكعب $\overline{ب ز}$ الباقي من المكعب الأول. والعدد الذي يكون معه مثل فضل مجموع جذوره وأمواله، وهي بقية الجسمين المذكورين بعد النقصانين المذكورين، \langle على المكعب الذي يكون معه \rangle .
 5 وهذا المكعب بقية المفضل. وفضل مجموع هذين الجسمين على هذا المكعب هو العدد / الذي يكون مع ضلع $\overline{ب ز}$ ، وهو أقل من الفضل $\overline{ل - ١٦٣ - و}$ الأول، وهو العدد الأعظم، بقدر زيادة النقصان الذي نقصناه من الجسمين على النقصان الذي نقصناه من المكعب. فهذا التفاوت بين النقصانين مثل التفاوت بين العدد الأعظم والمسؤول. ونقصان الجسمين $\overline{د ز}$ في مربع $\overline{أ ب}$ وعلم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ز}$ في $\overline{د ز}$ ثم في $\overline{ب ج}$ ، ونقصان المكعب مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{د ز}$ ، والعلم في $\overline{د ب}$. فإذا ألقينا ضرب العلم في $\overline{ب ز}$ من كلا الجانبين، يبقى منها نقصان الجسمين $\overline{د ز}$ في مربع $\overline{أ ب}$ والعلم في $\overline{ز ج}$ ، ونقصان المكعب مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{د ز}$ والعلم في $\overline{د ز}$. فإذا ألقينا من كلا الجانبين مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{د ز}$ يبقى منها نقصان الجسمين، العلم وهو $\overline{د ب}$ $\overline{ب ز}$ في $\overline{د ز}$ ثم في $\overline{ز ج}$ ، ونقصان المكعب، علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب أ}$ 15 في $\overline{أ م}$ مضروباً في $\overline{د ز}$. وهاتان البقيتان هما جانبان النقصانين. فليكن $\overline{د ز}$ شيئاً. أما خاصة نقصان المكعب فتكون أشياء بعدة العلم الذي في خاصيته. وأما خاصة نقصان الجسمين فالعلم - وهو $\overline{د ب}$ $\overline{ب ز}$ في $\overline{د ز}$ وهو ضعف $\overline{د ب}$ إلا شيئاً في شيء - يكون أشياء بعدة ضعف $\overline{ب د}$ 20 / إلا مالا، ومضروبها في $\overline{ج ز}$ وهو عدد $\overline{د ج}$ وشيء يصير أشياء بعدة $\overline{ل - ١٦٣ - ظ}$ ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{د ج}$ ، وأموالاً بعدة ضعف $\overline{د ب}$ بنقصان $\overline{ج د}$ ، وإلا

6 من: بين [ب، ل] - 10 $\overline{ب ز}$: $\overline{ب أ}$ [ب، ل] - 12 $\overline{د ز}$: $\overline{ز ب}$: [ب، ل] - 17 فتكون:
 فيكون [ب، ل] - 19 شيئاً: شيء [ب، ل]

كعباً. فلأنا بينا أن فضل المحسّمين الأولين على المكعب الأول - وهو مكعب $\overline{ب د}$ - هو العدد الأعظم، وفضل مجموع المحسّمين الآخرين على مكعب $\overline{ب ز}$ هو العدد الثاني، وهو العدد المسؤول، وهذا الفضل أقل من ذلك الفضل، أعني هذا العدد «أقل» من ذلك العدد بمقدار زيادة 5 نقصان الواقع في المحسّمين «على النقصان الواقع في المكعب»، وزيادة أحد النقصانين على الآخر هي بعينها زيادة أحد الفضلين على الآخر، فيكون فضل العدد الأعظم على العدد المسؤول بمقدار زيادة خاصّة نقصان المحسّمين على خاصّة نقصان المكعب. فذلك الفضل، إذا جُمع مع خاصّة نقصان المكعب، يصير معادلاً لخاصّة نقصان المحسّمين. فعدد 10 التفاوت بين الأعظم والمسؤول، إذا جمعناه مع خاصّة نقصان المكعب - وهي أشياء بعدّة [ضعف] علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب آ}$ في $\overline{د آ}$ - يكون معادلاً لخاصّة نقصان المحسّمين، وهي أشياء بعدّة ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{د ج}$ ، وأموالٌ بعدّة ضعف $\overline{د ب}$ بنقصان $\overline{ج د}$ وإلا كعباً. فإذا جبرنا وقابلنا وألقينا الأشياء / من كلا الجانبين لتساويهما، يبقى عدد التفاوت وكعبٌ يعدل أموالاً بعدّة 15 ضعف $\overline{د ب}$ منقوصاً منه $\overline{د ج}$. فيُستخرج المطلوب بتلك المسألة، فيخرج $\overline{د ز}$ ، فننقصه من المطلوب الأول، فيحصل المطلوب الأصغر.

$$\overline{\text{ج} \quad \text{د} \quad \text{آ} \quad \text{ب} \quad \text{ز}}$$

فحاصل الكلام في هذا القسم، أن نجعل ثلث عدد الجذور عدداً، وثلاثي عدد الأموال جذوراً، ونستخرج المطلوب بمسألة: عدد وجذور يعدل مالاً؛ فما خرج فهو المطلوب الأول. ونضرب مربع المطلوب في فضل

- عدد الأموال على المطلوب الأول؛ فما حصل فهو المَجَسَّم. ونضرب
المطلوب في عدد الجذور، ونزيد المبلغ على المَجَسَّم؛ فما حصل فهو العدد
الأعظم. فإن كان العدد المسؤول أكثر من العدد الأعظم فالمسألة
مستحيلة؛ وإن كان مساوياً له فهي مُمكنة، ولها جواب واحد وهو
5 المطلوب الأول؛ وإن كان أقلّ منه فهي أيضاً ممكنة ولها جوابان: أحدهما
أعظم من المطلوب الأول، والثاني أصغر منه. فإن كان العدد المسؤول مثل
ضرب عدد الجذور في عدد الأموال، فالمطلوب الأعظم مثل عدد
الأموال، والأصغر مثل جذر عدد الجذور؛ وإن كان أقلّ منه / أو أكثر ل - ١٦٤ - ط
فنتقص العدد المسؤول من العدد الأعظم، ونجعل الباقي عدداً، ونضعف
10 المطلوب الأول، ونقص من ضعفه فضل عدد الأموال على المطلوب
الأول، ونجعل الباقي عدد الأموال. فإن استخرجنا المطلوب بمسألة:
مكعب وأموال يعدل عدداً، فالمطلوب الذي يخرج نزيده على المطلوب
الأول، فيحصل الجواب الأعظم؛ وإن استخرجناه بمسألة: مكعب وعدد
يعدل أموالاً؛ فالمطلوب الذي يخرج ننقصه من المطلوب الأول، فيبقى
15 الجواب الأصغر.

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون عدد الأموال أقلّ من جذر عدد
الجذور:

- فليكن $\overline{أ ب}$ جذر عدد الجذور، و $\overline{ب ج}$ عدد الأموال. ونجعل ثلث
مربع $\overline{أ ب}$ - وهو ثلث عدد الجذور - عدداً، وثلاثي $\overline{ب ج}$ عدد جذور،
20 ونستخرج المطلوب على مسألة: عدد وجذور يعدل مالاً. وليكن المطلوب

الذي يخرج $\overline{ب د}$ ، فيكون مربعه مثل ضربه في ثلثي $\overline{ب ج}$ مع ثلث مربع $\overline{أ ب}$ ، فأقول: إن $\overline{ب د}$ يكون أعظم من $\overline{ب ج}$ وأصغر من $\overline{أ ب}$.

لأنه إن كان مثل $\overline{ب ج}$ فيكون فضلُ مربعه على ضربه في ثلثيه أقلَّ من

ثلث مربع $\overline{أ ب}$ ، وكان من الواجب / أن / يعادل ثلثه؛ وإن كان $\overline{ب د}$ ب - ٢٣ - و
ل - ١٦٥ - و

أصغر من $\overline{ب ج}$ فيكون فضلُ مربعه على ضربه في ثلثي $\overline{ب ج}$ أقلَّ من ثلث

مربع $\overline{أ ب}$ بكثير؛ وإن كان مثل $\overline{أ ب}$ ففضلُ مربعه على ضربه في ثلثي

$\overline{ب ج}$ أكثر من ثلث مربع $\overline{أ ب}$ ؛ وإن كان أعظم من $\overline{أ ب}$ ففضلُ مربعه

على ضربه في ثلثي $\overline{ب ج}$ أكثر من ثلث مربع $\overline{أ ب}$ بكثير. فقد تبين أن

$\overline{ب د}$ أعظم من $\overline{ب ج}$ وأصغر من $\overline{أ ب}$.

10 فلأن مربع $\overline{ب د}$ مثلُ ضرب $\overline{ب د}$ في ثلثي $\overline{ب ج}$ وثلثُ مربع $\overline{أ ب}$ ،

فثلاثة مربعات $\overline{ب د}$ تعدل ضرب $\overline{ب د}$ في $\overline{ب ج}$ مرتين ومربع $\overline{أ ب}$. فإذا

ألقينا من كلا الجانبين مربع $\overline{د ب}$ مرةً، يبقى مربعاً $\overline{د ب}$ مثل ضرب $\overline{أ ب}$

$\overline{ب د}$ في $\overline{أ د}$ ، وهو العلم، مع ضرب $\overline{ب د}$ في $\overline{د ج}$ مرتين. فإذا ألقينا

ضرب ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ب ج}$ من الجانبين، يبقى من المربعين ضعف $\overline{د ب}$

15 في $\overline{د ج}$ مساوياً للعلم الباقي من الجانب الآخر. فعلم $\overline{أ ب د}$ في $\overline{أ د}$ مثل

ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{د ج}$. فنسبة $\overline{أ ب د}$ إلى ضعف $\overline{ب د}$ كنسبة $\overline{ج د}$ إلى

$\overline{أ د}$. فإذا جعلنا $\overline{ب د}$ ضلعاً، فالأموال هو مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ب ج}$ ،

والمكعب فربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ب د}$ ، والجذور ضرب $\overline{ب د}$ في مربع $\overline{أ ب}$.

فلأن الجذور أكثر من المكعب بمقدار ضرب $\overline{ب د}$ في العلم، يلزم أن يكون

20 العدد أكثر من الأموال / بمثل ذلك. فربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ب ج}$ ، وهو ل - ١٦٥ - ط

الأموال، مع ضرب $\overline{ب د}$ في العلم يكون مثل العدد، وهو العدد الأول.

فأقول: إنه أعظم عدد يوجد مع فرض هذه الأموال والجذور حتى لو كان

العددُ (المسؤول) أكثر من ذلك تستحيل المسألة. وأي ضلع يفرض أعظم من $\overline{ب د}$ أو أصغر منه، فإن العدد الذي يوجد معه حتى تصح المسألة يكون أقل من العدد الأول.

ا ب د ج هـ

فليكن $\overline{ب هـ}$ أعظم من $\overline{ب د}$ ، فأقول: إن العدد الذي يكون مع 5 ضلع $\overline{ب هـ}$ أقل من العدد الأعظم.

فلأن ضرب ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{د ج}$ مثل علم $\overline{ا ب ب د}$ في $\overline{ا د}$ ؛ لكن علم $\overline{ا ب ب هـ}$ في $\overline{ا هـ}$ أصغر من ذلك العلم، وضرب $\overline{هـ ب ب د}$ في $\overline{د ج}$ أعظم من ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{د ج}$ ؛ فيكون ضرب $\overline{د ب ب هـ}$ في $\overline{د ج}$ أعظم من علم $\overline{ا ب ب هـ}$ في $\overline{ا هـ}$. فنسبة $\overline{هـ ب ب د}$ إلى $\overline{ا ب ب هـ}$ أعظم من نسبة $\overline{ا هـ}$ إلى $\overline{د ج}$. فنجعل نسبة $\overline{د هـ}$ إلى $\overline{ا هـ}$ مشتركة، فيكون 10 النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{د هـ}$ إلى $\overline{ا هـ}$ ومن نسبة $\overline{هـ ب ب د}$ إلى $\overline{ا ب ب هـ}$ - وهي نسبة علم $\overline{هـ ب ب د}$ في $\overline{د هـ}$ إلى علم $\overline{ا ب ب هـ}$ في $\overline{ا هـ}$ - أعظم من النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{د هـ}$ إلى $\overline{ا هـ}$ ومن نسبة $\overline{ا هـ}$ إلى $\overline{د ج}$ (وهي نسبة $\overline{د هـ}$ إلى $\overline{د ج}$). فنسبة علم $\overline{هـ ب ب د}$ في $\overline{د هـ}$ إلى علم $\overline{ا ب ب هـ}$ في $\overline{ا هـ}$ أعظم من نسبة $\overline{د هـ}$ إلى $\overline{د ج}$ ؛ فعلم $\overline{هـ ب ب د}$ في $\overline{د هـ}$ مضروباً في $\overline{د هـ}$ 15

فإذا / زدنا على كلا الجانبين علم $\overline{ا ب ب هـ}$ في $\overline{ا هـ}$ مضروباً في $\overline{د ج}$ ، ل - ١٦٦ - و فيصير في الجانب الأعظم علم $\overline{ا ب ب د}$ في $\overline{ا د}$ مضروباً في $\overline{د ج}$ ، وفي الأصغر علم $\overline{ا ب ب هـ}$ في $\overline{ا هـ}$ مضروباً في $\overline{هـ ج}$. فإذا زدنا على الجانبين

12-9 أعظم من ... وهي نسبة: ناقصة [ل] - 11 د هـ : ح هـ [ب] - 13 ومن نسبة ا هـ : ناقصة [ل] - 16 علم : ناقصة [ل]

علم $\overline{ا ب ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ ، وعلم $\overline{ه ب ب د}$ في $\overline{د ه}$ مضروبين في $\overline{ب ج}$ ،
 فيصير الأعظم علم $\overline{ا ب ب د}$ في $\overline{ا د}$ مضروباً في $\overline{د ب}$ ، والأصغر علم
 $\overline{ا ب ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ مضروباً في $\overline{ه ب}$ مع علم $\overline{ه ب ب د}$ في $\overline{د ه}$ مضروباً
 في $\overline{ب ج}$. فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، يصير الجانب
 5 الأعظم هو العدد الأعظم، والأصغر هو علم $\overline{ا ب ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ المضروب
 في $\overline{ه ب}$ ، مع مربع $\overline{ه ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، وهو العدد الذي يكون مع ضلع
 $\overline{ب ه}$ ؛ لأنه فضلُ أمواله وجذوره على مكعبه.

ا ب ج د ه

وإن فرضنا الضلع مثل $\overline{ا ب}$ (الذي) مكعبه مساوٍ لجذوره، فيكون
 عدده مثل أمواله، وهو مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ج}$. فلتبين أنه أيضاً أقلُّ من
 10 العدد الأعظم.

فلأن علم $\overline{ا ب ب ا}$ د في $\overline{ا د}$ مضروباً في $\overline{ب د}$ أعظم من مضروبه في
 $\overline{ب ج}$ ، فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{ب ج}$ يصير الجانبُ
 الأعظم هو العدد الأعظم والأصغر هو مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ج}$.

ا ب ج د ه

وأيضاً: إن فرضنا الضلع أعظم من $\overline{ا ب}$ مثل $\overline{ب ط}$ ؛ فلأن فضل
 15 مكعب $\overline{ب ط}$ على جذوره، وهو علم $\overline{ط ب ب ا}$ في $\overline{ا ط}$ مضروباً / في ل - ١٦٦ - ط
 $\overline{ط ب}$ ، فيكون فضل أمواله على العدد مثل ذلك. فإذا نقصنا هذا الفضل
 من أمواله، أعني من مربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{ب ج}$ ، يكون الباقي مثل العدد الذي

8 الضلع مثل: محمودة [ب] - 11-13 فلأن علم ... العدد الأعظم: ناقصة [ل] - 11 علم $\overline{ب ا ب د}$:
 محمودة [ب]

معه. فلأنا إذا نقصنا من مضروب مربع $\overline{ب\ ط}$ في $\overline{ب\ ج}$ مضروب العلم في $\overline{ب\ ج}$ ، يبقى مضروب مربع $\overline{ا\ ب}$ في $\overline{ب\ ج}$ ، فلو نقصنا مضروب العلم في $\overline{ب\ ط}$ يكون الباقي، وهو العدد. أقل من مضروب مربع $\overline{ا\ ب}$ في $\overline{ب\ ج}$. وهذا المضروب قد تبين أنه أقل من العدد الأعظم، فعدد ضلع $\overline{ب\ ط}$ أقل من العدد الأعظم بكثير.

ط ا د ج ب

- وأيضاً: إن فرضنا الضلع أصغر من $\overline{ب\ د}$ وأعظم من $\overline{ب\ ج}$ مثل $\overline{ب\ ز}$ ، فيكون فضل جذوره على مكعبه هو علم $\overline{ا\ ب}$ $\overline{ب\ ز}$ في $\overline{ا\ ز}$ مضروباً في $\overline{ب\ ز}$ ؛ فيكون فضل العدد الذي معه على أمواله بهذا المقدار؛ فيكون علم $\overline{ا\ ب}$ $\overline{ب\ ز}$ في $\overline{ا\ ز}$ مضروباً في $\overline{ب\ ز}$ مع الأموال، وهو مربع $\overline{ب\ ز}$ في $\overline{ب\ ج}$ ، مساوياً للعدد الذي يكون معه. فلأنه قد تبين أن $\overline{ب\ ج} - \overline{ب\ ز} - \overline{ط}$
- ضعف $\overline{ب\ د}$ في $\overline{د\ ج}$ مثل $\overline{ا\ ب}$ $\overline{ب\ د}$ في $\overline{ا\ د}$ ، العلم، فيكون هذا العلم أعظم من ضرب $\overline{د\ ب}$ $\overline{ب\ ز}$ في $\overline{د\ ج}$. فنسبة $\overline{ا\ ب}$ $\overline{ب\ د}$ إلى $\overline{د\ ب}$ $\overline{ب\ ز}$ أعظم من نسبة $\overline{ج\ ز}$ إلى $\overline{ا\ د}$. ونجعل نسبة $\overline{ا\ د}$ إلى $\overline{د\ ز}$ مشتركة. فالنسبة المؤلفة من $\overline{ا\ ب}$ $\overline{ب\ د}$ إلى $\overline{د\ ب}$ $\overline{ب\ ز}$ ، ومن نسبة $\overline{ا\ د}$ إلى $\overline{د\ ز}$ ، وهي
- نسبة علم $\overline{ا\ ب}$ $\overline{ب\ د}$ في $\overline{ا\ د}$ إلى علم $\overline{د\ ب}$ $\overline{ب\ ز}$ في $\overline{د\ ز}$ ، أعظم / من $\overline{ا\ د} - \overline{ا\ ب} - \overline{و}$
- النسبة المؤلفة من نسبة $\overline{ج\ ز}$ إلى $\overline{ا\ د}$ ، ومن نسبة $\overline{ا\ د}$ إلى $\overline{د\ ز}$ ، وهي نسبة $\overline{ج\ ز}$ إلى $\overline{د\ ز}$. فنسبة العلم إلى العلم أعظم من نسبة $\overline{ج\ ز}$ إلى $\overline{د\ ز}$ ؛ فيكون علم $\overline{ا\ ب}$ $\overline{ب\ د}$ في $\overline{ا\ د}$ المضروب في $\overline{د\ ز}$ أعظم من علم $\overline{د\ ب}$ $\overline{ب\ ز}$ في $\overline{د\ ز}$ المضروب في $\overline{ز\ ج}$. فإذا زدنا على كلا الجانبين علم $\overline{ا\ ب}$ $\overline{ب\ د}$ في $\overline{ا\ د}$ المضروب في $\overline{ز\ ج}$ ، صار الجانب الأعظم هذا العلم مضروباً

في $\overline{د ج}$ ، والأصغر علم $\overline{أ ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{أ ز}$ مضروباً في $\overline{ز ج}$. فإذا زدنا على كلا الجانبين علم $\overline{أ ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{د أ}$ ، وعلم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ز}$ في $\overline{د ز}$ مضروبين في $\overline{ب ج}$ ، يصير الجانب الأعظم علم $\overline{أ ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{أ د}$ مضروباً في $\overline{د ب}$ ، مع علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ز}$ في $\overline{د ز}$ مضروباً في $\overline{ب ج}$ ، والأصغر علم $\overline{أ ب}$ $\overline{ب ز}$ في $\overline{أ ز}$ مضروباً في $\overline{ب ز}$. فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع $\overline{ب ز}$ في $\overline{ب ج}$ ، يصير الجانب الأعظم هو العدد الأعظم، والأصغر عدد ضلع $\overline{ب ز}$.




وأيضاً: إن فرضنا الضلع المطلوب مثل $\overline{ب ج}$ ، فيكون مكعبه مثل أمواله، فعدده مثل جذوره، وهو مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ب ج}$. فلأن علم $\overline{أ ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{أ د}$ المضروب في $\overline{د ب}$ أعظم من مضروبه في $\overline{ب ج}$ ، فإذا زدنا على الجانبين علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ج}$ في $\overline{د ج}$ مضروباً في $\overline{ب ج}$ ، يصير الجانب الأعظم هو العلم الأول في $\overline{د ب}$ والعلم الثاني في $\overline{ب ج}$ ، والأصغر علم $\overline{أ ب}$ $\overline{ب ج}$ في $\overline{أ ج}$ مضروباً في $\overline{ب ج}$. فإذا زدنا على الجانبين مربع $\overline{ب ج}$ في $\overline{ب ج}$ يصير الجانب الأعظم هو العلم الأول في $\overline{د ب}$ ، ومربع $\overline{د ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، وهو العدد الأعظم، والأصغر مربع $\overline{أ ب}$ $\overline{ب ج}$ ، وهو عدد ضلع $\overline{ب ج}$.



وأيضاً: إن فرضنا الضلع أصغر من $\overline{ب ج}$ مثل $\overline{ب ي}$ ، فلأن فضل أمواله، وهو مربع $\overline{ب ي}$ في $\overline{ب ج}$ ، على مكعبه، وهو مكعب $\overline{ب ي}$ ، إننا هو مربع $\overline{ب ي}$ في $\overline{ب ي ج}$ ، ففضل عدده على جذوره مثل ذلك. فيكون

جذوره، وهو مربع $\overline{ب\text{ أ}}$ في $\overline{ب\text{ ي}}$ ، مع مربع $\overline{ب\text{ ي}}$ في $\overline{ي\text{ ج}}$ ، مثل عدده. فلأن مربع $\overline{أ\text{ ب}}$ في $\overline{ب\text{ ج}}$ أعظم من مربع $\overline{أ\text{ ب}}$ في $\overline{ب\text{ ي}}$ ومربع $\overline{ب\text{ ي}}$ في $\overline{ي\text{ ج}}$ ، الذي هو عدد ضلع $\overline{ب\text{ ي}}$ ؛ وقد كان مربع $\overline{أ\text{ ب}}$ في $\overline{ب\text{ ج}}$ أصغر من العدد الأعظم، فعدد ضلع $\overline{ب\text{ ي}}$ أصغر من العدد الأعظم بكثير. 5



فقد تبين أن أعظم عددٍ يمكن أن يوجد في هذه المسألة بعد فرض عدد الأموال والجذور، إنَّما هو العدد الذي مع ضلع $\overline{ب\text{ د}}$ ، وهو العدد الأعظم حتى لو فرض عددٌ أكثر من العدد الأعظم فلا يمكن أن يوجد له ضلع، فيكون مستحيلاً؛ فإن / كان العدد المسؤول مثل العدد الأعظم ل - ١٦٨ - و 10 فالضلع المطلوب هو $\overline{ب\text{ د}}$ ، وإن كان أقل من العدد الأعظم فيوجد له ضلعان: أحدهما أعظم من $\overline{ب\text{ د}}$ ، والآخر أصغر منه.

أما المطلوب الأعظم: فليكن $\overline{ب\text{ ك}}$ مثل $\overline{ب\text{ د}}$ ، ولنجعل $\overline{ك\text{ م}}$ مثل $\overline{د\text{ ج}}$ ، ونجعل فضل العدد الأعظم على العدد المسؤول عدداً، وخط $\overline{د\text{ م}}$ عدد أموال. ونستخرج المطلوب على مسألة: مكعب وأموال بعدة $\overline{د\text{ م}}$ 15 يعدل عدد التفاوت. وليكن المطلوب الذي يخرج أولاً أقل من $\overline{أ\text{ د}}$ ، مثل $\overline{د\text{ ه}}$. فاقول: إن $\overline{ب\text{ ه}}$ هو الضلع المطلوب.

فلأنه قد تبين أن ضعف $\overline{د\text{ ب}}$ في $\overline{د\text{ ج}}$ مثل $\overline{أ\text{ ب}}$ $\overline{ب\text{ د}}$ في $\overline{أ\text{ د}}$ ، وأيضاً علم $\overline{ه\text{ ب}}$ $\overline{ب\text{ د}}$ في $\overline{د\text{ ه}}$ مثل مربع $\overline{د\text{ ه}}$ وضرب $\overline{ه\text{ د}}$ في ضعف $\overline{د\text{ ب}}$ ، فضروب هذا العلم في $\overline{د\text{ ج}}$ ، ونسميه: المجسم الأول، مثل مربع $\overline{ه\text{ د}}$ في $\overline{د\text{ ج}}$ وضعف $\overline{د\text{ ب}}$ في $\overline{ه\text{ د}}$ ثم في $\overline{د\text{ ج}}$ ، أعني ضعف $\overline{د\text{ ب}}$ في 20

- د ج ث في ه د، وهو مثل علم ا ب ب د في ا د ث في ه د. فالجسم الأول مثل مربع ه د في د ج، أعني في ك م مع هذا العلم في د ه. لكن هذا العلم في ه د ينقسم إلى علم ا ب ب ه في ا ه ث في ه د، ونسميه الجسم الثاني، وإلى علم ه ب ب د في ه د ث في ه د، وهو مثل مربع / ه د في ه ب ب د أعني في ه ك. فالجسم الأول مثل الجسم ل - ١٦٨ - ط
- الثاني مع مربع ه د في ه م. فإذا زدنا على كلا الجانبين علم ا ب ب ه في ا ه ث في د ج، يصير جانب الجسم الأول علم ا ب ب د في ا د مضروباً في د ج، وجانب الجسم الثاني علم ا ب ب ه في ا ه مضروباً في ه ج، مع مربع ه د في ه م، ويتعادل الجانبان. فإذا زدنا على 10 الجانبين علم ا ب ب ه في ا ه، وعلم ه ب ب د في ه د مضروبين كلاهما في ب ج؛ يصير أحد الجانبين علم ا ب ب د في ا د مضروباً في د ب، يعادل الجانب الآخر وهو علم ا ب ب ه في ا ه مضروباً في ه ب مع علم ه ب ب د في ه د مضروباً في ب ج، ومع مربع ه د في ه م. فإذا زدنا على الجانبين مربع د ب في ب ج يصير أحد الجانبين علم 15 ا ب ب د في ا د مضروباً في د ب، مع مربع ب د في ب ج، وهو العدد الأعظم، وفي الجانب الآخر علم ا ب ب ه في ا ه مضروباً في ه ب مع مربع ه ب في ب ج، ومجموعها عدد ضلع ب ه، مع مربع ه د في ه م. ففضل العدد الأعظم على < عدد > ضلع ب ه هو / مربع ل - ١٦٩ - و
- ه د في ه م. وقد كان فضله على العدد المسؤول هو بعينه، فالعدد 20 المسؤول هو مثل عدد / ضلع ه ب، ف ب ه هو الضلع المطلوب. ب - ٢٤ - و

ا د ج ب ك م

وأيضاً: فليكن المطلوب الذي يخرج مثل $\overline{ا د}$ ، فأقول: إن $\overline{ا ب}$ هو الضلع المطلوب.

فلأن $\overline{ا ب}$ إذا كان ضلعاً، فيكون مكعبه مثل جذوره، فيبقى عدده مثل أمواله، أعني مثل مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ج}$. فلأن مربع $\overline{ا د}$ في $\overline{ا م}$ ينقسم ⁵ إلى مربع $\overline{ا د}$ في $\overline{م ك}$ ، أعني في $\overline{د ج}$ ، وإلى مربع $\overline{ا د}$ في $\overline{د ك}$ ، أعني في $\overline{ا ب ب د}$ ، وهو مثل ضرب $\overline{ا ب ب د}$ في $\overline{ا د}$ المضروب في $\overline{ا د}$ ، أعني ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{د ج}$ المضروب في $\overline{ا د}$ ، فربع $\overline{ا د}$ في $\overline{ا م}$ مثل مربع $\overline{ا د}$ في $\overline{د ج}$ ، وضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{ا د}$ ثم في $\overline{د ج}$ ، وبمجموعها $\overline{ا ب ب د}$ في $\overline{ا د}$ ثم في $\overline{د ج}$. فإذا زدنا على كلا الجانبين علم $\overline{ا ب د ب}$ في $\overline{ا د}$ مضروباً في $\overline{ب ج}$ ، يصير أحد الجانبين مربع $\overline{ا د}$ في $\overline{ا م}$ ، وهذا العلم المضروب في $\overline{ب ج}$ ، والآخر هذا العلم مضروباً في $\overline{د ب}$. فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ب ج}$ ، يصير أحد الجانبين مربع $\overline{ا د}$ في $\overline{ا م}$ ، مع مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، وفي الجانب الآخر العدد الأعظم. ¹⁰ ففضل العدد الأعظم على مربع $\overline{ا ب}$ (في $\overline{ب ج}$ إنما هو مربع $\overline{ا د}$ في $\overline{ا م}$ - 169 - ط $\overline{ا م}$ ، وفضله على العدد المسؤول هو بعينه. فالعدد المسؤول هو عدد ضلع $\overline{ا ب}$ ، فـ $\overline{ا ب}$ هو الضلع المطلوب.

وأيضاً: فليكن المطلوب الذي يخرج بتلك المسألة أعظم من $\overline{ا ا}$ ، مثل $\overline{د ط}$. فأقول: إن $\overline{ب ط}$ هو الضلع المطلوب. فليكن مكعب $\overline{ب د}$ في جانب وأمواله وجذوره في الجانب الآخر. ²⁰ وفضل جانب الأموال والجذور على جانب المكعب هو العدد الأعظم، وهو علم $\overline{ا ب ب د}$ في $\overline{ا د}$ المضروب في $\overline{ب د}$ ، مع مربع $\overline{ب د}$ في

3 فلأن: مطبوعة [ب] - 7 أعني ... في $\overline{ا د}$: مكورة [ب]، ل] - 12 $\overline{ا د}$: $\overline{ا ب}$ [ب]، ل] - 21 في $\overline{ا د}$: في $\overline{ا ب ب د}$ في $\overline{ا د}$ [ل]

ب ج. فإذا زدنا على كلا الجانبين علم ط ب ب د في ط د مضروباً في ب ج، ومربع ا ب في ط د، يصير جانب الأموال والجذور هو مربع ب ط في ب ج، وهو أموال ضلع ب ط، ومربع ا ب في ب ط، وهو جذوره، وفي الجانب الآخر مكعب ب د وعلم ط ب ب د في د ط مضروباً في ب ج، ومربع ا ب مضروباً في د ط. وفضل جانب الأموال والجذور على هذا الجانب يكون باقياً على حاله، أعني يكون مثل العدد الأعظم. فإذا زدنا على هذا الجانب فقط ط ب ب د في ط د المضروب في ج د، وعلم ط ب ب ا في ا ط المضروب في ط د، يصير فضل جانب الجذور والأموال / (على الجانب الآخر) أنقص ممّا كان، أعني ل - ١٧٠ - و 10 من العدد الأعظم بمقدار هذين العلمين اللذين زدناهما على هذا الجانب خاصّةً، فيصير هذا الجانب مثل مكعب ب ط. فإذا جعلنا ب ط ضلعاً، فيكون أحد هذين الجانبين - وهو جانب الأموال والجذور - أمواله وجذوره، وهذا الجانب مكعبه، وفضل أمواله وجذوره على مكعبه يكون أنقص من العدد الأعظم بمقدار هذين الزيدتين، أعني علم ط ب ب د في 15 ط د المضروب في د ج، وعلم ط ب ب ا في ا ط المضروب في ط د. لكن فضل الجذور والأموال التي لضلع ب ط على مكعبه إنّما هو عدده. فيكون عدده مع هذين العلمين الزيدتين مثل العدد الأعظم. فلأن علم ط ب ب د في ط د هو مربع ط د، وضعف ب د في ط د، فضروب هذا العلم في د ج هو مربع ط د في د ج، مع ضعف ب د في ط د ثم في د ج، أعني ضعف ب د في د ج ثم في ط د، أعني علم ا ب ب د في ا د ثم في ط د. فعلم ط ب ب د في ط د ثم في د ج، وهو أحد الزيدتين، مثل مربع ط د في د ج مع علم ا ب ب د في ا د ثم

7 ب د: محوة [ب] - 21 ب د في ط د ثم: محوة [ب]

في $\overline{\text{ط د}}$. والمزید الآخر علم $\overline{\text{ط ب}}$ $\overline{\text{ب آ}}$ في $\overline{\text{ط ا}}$ ثم في $\overline{\text{ط د}}$. فصار مجموع المزيدين / هو مربع $\overline{\text{ط د}}$ في $\overline{\text{د ج}}$ ، مع مجموع هذين العلمين في $\overline{\text{ل - ١٧٠ - ط}}$ $\overline{\text{ط د}}$. ومجموع هذين العلمين هو علم $\overline{\text{ط ب}}$ $\overline{\text{ب د}}$ في $\overline{\text{ط د}}$. فمجموع هذين المزيدين هو مربع $\overline{\text{ط د}}$ في $\overline{\text{د ج}}$ ، أعني في $\overline{\text{ك م}}$ ، مع علم $\overline{\text{ط ب}}$ $\overline{\text{ب د}}$ في $\overline{\text{ط د}}$ مضروباً في $\overline{\text{ط د}}$. لكن هذا العلم هو مربع $\overline{\text{ط د}}$ ، وضرب $\overline{\text{ط د}}$ في $\overline{\text{د ج}}$ ضعف $\overline{\text{ب د}}$ ، أعني في $\overline{\text{د ك}}$. فالعلم مثل $\overline{\text{ك ط}}$ في $\overline{\text{ط د}}$ ، ومضروب العلم في $\overline{\text{ط د}}$ هو مضروب $\overline{\text{ك ط}}$ في $\overline{\text{ط د}}$ ثم في $\overline{\text{ط د}}$ ، وهو مربع $\overline{\text{ط د}}$ في $\overline{\text{ط ك}}$. فقد صار مجموع هذين المزيدين مثل مربع $\overline{\text{ط د}}$ في $\overline{\text{ط ك}}$ ، وفي $\overline{\text{ك م}}$ ، أعني مربع $\overline{\text{ط د}}$ في $\overline{\text{ط م}}$. فربع $\overline{\text{ط د}}$ في $\overline{\text{ط م}}$ مع عدد ضلع $\overline{\text{ب ط}}$ إنَّما هو مثل العدد الأعظم. وقد كان مع العدد المسؤول أيضاً مثل العدد الأعظم، فعدد ضلع $\overline{\text{ب ط}}$ هو العدد المسؤول، ف $\overline{\text{ب ط}}$ هو الضلع المطلوب.

ط د ج ب ك م


وأقول: إن المطلوب الأعظم له نهاية في العظم. فنجعل مربع $\overline{\text{أ ب}}$ عدداً وهو عدد الجذور، وعدد $\overline{\text{ب ج}}$ - وهو عدداً 15 الأموال - جذوراً، ونستخرج المطلوب على مسألة: مال يعدل عدداً وجذوراً. وليكن المطلوب الذي يخرج $\overline{\text{ب ط}}$. فأقول: إن أي ضلع يوجد في هذه المسألة هو أصغر من $\overline{\text{ب ط}}$.
فلأن مربع $\overline{\text{ب ط}}$ /، وهو المال، في جانب، وهو مثل ضرب $\overline{\text{ب ط}}$ $\overline{\text{ل - ١٧١ - و}}$ في $\overline{\text{ب ج}}$ - وهو الجذور - مع مربع $\overline{\text{أ ب}}$ وهو العدد، وهذان في

2 هو: وهو [ب، ل] - 4 هو مربع $\overline{\text{ط د}}$: محوة [ب] - 6 في $\overline{\text{د ك}}$. فالعلم مثل $\overline{\text{ك ط}}$: محوة [ب] - 7 ثم في $\overline{\text{ط د}}$: ناقصة [ل] - 15 جذوراً ونستخرج: محوة [ب] - 17 هو: فهو [ب، ل] - 18 $\overline{\text{ب ط}}$ وهو المال: محوة [ب]

جانب، فإذا ضربنا كلا الجانبين في $\overline{ب ط}$ ، يصير في أحد الجانبين مكعب $\overline{ب ط}$ ، وفي الجانب الآخر مربع $\overline{ب ط}$ في $\overline{ب ج}$ ، وهو أمواله، ومربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ب ط}$ وهو جذوره. فكعبه مساوٍ لأمواله وجذوره. وكان من الواجب أن يكون مكعب الضلع أنقص من أمواله وجذوره بمقدار العدد.

5 $\overline{ف ب ط}$ لا يصلح أن يكون مطلوباً، وأيُّ ضلعٍ يُفرضُ فهو أقل من $\overline{ب ط}$ ضرورةً. /


ب - ٢٤ - ظ



وأقول أيضاً: إن كل خط يفرض أصغر من $\overline{ب ط}$ يصلح أن يكون مطلوباً.

فليفرض $\overline{ب ع}$ أصغر من $\overline{ب ط}$ ، فلأن فضل مكعب $\overline{ب ط}$ على مكعب $\overline{ب ع}$ إنما هو مربع $\overline{ع ب}$ في $\overline{ط ع}$ ، مع علم $\overline{ط ب}$ $\overline{ب ع}$ في $\overline{ط ع}$ مضروباً في $\overline{ط ب}$ ، وهو بعينه فضلُ أموالٍ وجذورٍ $\overline{ب ط}$ على مكعب $\overline{ب ع}$. وفضلُ أموالٍ وجذورٍ $\overline{ب ط}$ على أموالٍ وجذورٍ $\overline{ب ع}$ إنما هو مربع $\overline{ا ب}$ في $\overline{ط ع}$ مع العلم المذكور في $\overline{ب ج}$ ؛ وهذا الفضل أقل من الفضل الأول بكثير، فكعب $\overline{ب ع}$ / أصغر من أمواله وجذوره. فإذا ل - ١٧١ - ظ

15 جعل فضلُ أمواله وجذوره على مكعبه عدداً، فتصح المسألة، ويكون مكعب $\overline{ب ع}$ مع ذلك العدد مثلَ أمواله وجذوره.



١ كلا: كل [ب، ل] - 7 يصلح: فيصلح [ب، ل] - 15 فصيح: فيصح [ب، ل]

وأما المطلوب الأصغر: فلنجعل فضل العدد الأعظم على المسؤول عدداً، و $\overline{د م}$ عددَ أموالٍ، ونستخرج المطلوب على مسألة: مكعب وعدد يعدل أموالاً.

وليكن المطلوب الذي يخرج بتلك المسألة أولاً أصغرَ من $\overline{د ج}$ ، وهو $\overline{د ه}$. فيكون مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{ه م}$ مثلَ عدد الفضل. فأقول: إن $\overline{ب ه}$ هو الضلع المطلوب.

فلأن $\overline{ا ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{ا د}$ ، العلم، هو مثلُ ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{د ج}$ ، فضرباً كل واحدٍ منهما في $\overline{د ه}$ متساويان. لكن مضروب ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{د ج}$ ، ثم في $\overline{د ه}$ ، هو ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{د ه}$ ثم في $\overline{د ج}$. لكن ضعف $\overline{ب د}$ في $\overline{د ه}$ هو مربع $\overline{د ه}$ مع علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{د ه}$. فربيع $\overline{د ه}$ في $\overline{د ج}$ ، أعني $\overline{ك م}$ ، مع هذا العلم في $\overline{د ج}$ ، أعني $\langle \overline{د ب}$ مع $\overline{ب ه} \rangle$ في $\overline{د ه}$ وفي $\overline{د ج}$ ، مثلُ علم $\overline{ا ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{ا د}$ المضروب في $\overline{د ه}$. لكن علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{د ه}$ ثم في $\overline{د ه}$ ، مثلُ مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{ه ك}$ \langle الذي \rangle مع مربع $\overline{ه د}$ في $\overline{م ك}$ ، هو مربع $\overline{ه د}$ في $\overline{ه م}$. فعلم $\overline{ا ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{ا د}$ ثم

في $\overline{د ه}$ - وهو أحد الجانبين - / يعادل مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{د ج}$ مع علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{د ه}$ - وهو الجانب الآخر. فليزد على الجانبين

علم $\overline{ا ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{ا د}$ ثم في $\overline{ه ج}$ ، فيصير أحدهما هذا العلم مضروباً في $\overline{د ج}$ والآخر كلا العلمين \langle أحدهما \rangle في $\overline{ه ج}$ \langle والآخر في $\overline{د ه}$ \rangle أعني علم $\overline{ا ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ المضروب في $\overline{ه ج}$ ، ومربع $\overline{د ه}$ في $\overline{ه م}$. فإذا زدنا على كلا الجانبين علم $\overline{ا ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{ا د}$ المضروب في $\overline{ب ج}$ ، يصير أحدهما هذا العلم مضروباً في $\overline{د ب}$ ، والآخر علم $\overline{ا ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$

12 وفي $\overline{د ج}$: وفي $\overline{ه ج}$ [ب، ل] - 13 مع: ومع [ب، ل] - 14 هو: وهو [ب، ل] - 15 $\overline{د ج}$: $\overline{ه ب}$ [ب، ل] / $\overline{د ب}$: $\overline{ا ب}$ [ب، ل] - 16 $\overline{د ج}$: $\overline{ه ج}$ [ب، ل]


المضروب في $\overline{هـ ج}$ ، ومربع $\overline{د ه}$ في $\overline{هـ م}$ ، وعلم $\overline{اب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{اد}$ مضروباً في $\overline{ب ج}$. فإذا زدنا على كلا الجانبين علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{د ه}$ المضروب في $\overline{ب ج}$ ، يصير أحدهما علم $\overline{اب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{اد}$ المضروب في $\overline{د ب}$ ، مع علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{د ه}$ المضروب في $\overline{ب ج}$ ، والآخر علم $\overline{اب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ المضروب في $\overline{ب ه}$ ، مع مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{هـ م}$. فإذا زدنا على الجانبين مربع $\overline{هـ ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، يصير أحدهما علم $\overline{اب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{اد}$ المضروب في $\overline{د ب}$ ، ومربع $\overline{د ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، وهو العدد الأعظم، والآخر علم $\overline{اب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{ا ه}$ المضروب في $\overline{ب ه}$ ، / ومربع $\overline{هـ ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، ل - ١٧٢ - ظ ومجموعها عدد ضلع $\overline{هـ ب}$ ، مع مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{هـ م}$. فعدد ضلع $\overline{هـ ب}$ مع مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{هـ م}$ مثل العدد الأعظم. وقد كان العدد المسؤول مع مربع $\overline{د ه}$ في $\overline{هـ م}$ مثل العدد الأعظم. فالعدد المسؤول مثل عدد ضلع $\overline{هـ ب}$ ، ف $\overline{هـ ب}$ هو الضلع المطلوب.

ا د ج ب ه م

وأيضاً: فليكن الضلع الذي يخرج بتلك المسألة إنَّما هو $\overline{د ج}$ ، فأقول: إن $\overline{ب ج}$ هو الضلع المطلوب.

١٥ فلأن علم $\overline{اب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{اد}$ المضروب في $\overline{ج د}$ هو مربع $\overline{د ج}$ في ضعف $\overline{ب د}$ ، أعني في $\overline{د ك}$ ، أعني في $\overline{ج م}$ ، فعلم $\overline{اب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{اد}$ المضروب في $\overline{د ج}$ ، وهو في جانب، مثل مربع $\overline{د ج}$ في $\overline{ج م}$ ، وهو في الجانب الآخر. فإذا زدنا على كلا الجانبين هذا العلم في $\overline{ب ج}$ ، يصير أحدهما العلم في $\overline{د ب}$ ، والآخر العلم في $\overline{ب ج}$ مع مربع $\overline{د ج}$ في $\overline{ج م}$. 20 فإذا زدنا على كلا الجانبين مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، يصير أحدهما مثل العدد

الأعظم، والآخر هو مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، وهو عدد ضلع $\overline{ب ج}$ ، / مع $ل - ١٧٣ - و$
 مربع $\overline{د ج}$ في $\overline{ج م}$. ففضل العدد الأعظم على العدد الذي مع ضلع
 $\overline{ب ج}$ إنها هو مربع $\overline{د ج}$ في $\overline{ج م}$. وقد كان فضله على العدد المسؤول بعينه
 مربع $\overline{د ج}$ في $\overline{ج م}$. فالعدد المسؤول مثل مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ب ج}$. فإذا
 جعلنا $\overline{ب ج}$ ضلعاً فكعبه يكون مثل أمواله، فعدده أيضاً مثل جذوره،
 وهو مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ب ج}$. فالعدد المسؤول مثل عدد ضلع $\overline{ب ج}$ ،
 ف $\overline{ب ج}$ هو الضلع المطلوب.



وليكن المطلوب الذي يخرج بتلك المسألة إنها هو $\overline{د ط}$ ، وهو أعظم من
 $\overline{د ج}$ ، فأقول: إن $\overline{ب ط}$ هو الضلع المطلوب.

١٠ فلأن فضل أموال وجذور $\overline{د ب}$ على مكعبه هو العدد الأعظم، فليكن

أموال وجذور $\overline{د ب}$ في جانب، ومكعبه في جانب آخر، وفضل أحد
 الجانبين على الآخر هو العدد الأعظم؛ فإذا نقصنا من كلا الجانبين علم

$\overline{د ب}$ $\overline{ب ط}$ في $\overline{د ط}$ المضروب في $\overline{ب ط}$ ، وهو من الأموال، ومربع

$\overline{د ب}$ في $\overline{د ط}$ ، / وهو من الجذور، يبقى جانب المكعب مكعب $\overline{ب ط}$ ، ب - ٢٥ - و

١٥ وجانب الأموال والجذور الأموال والجذور بنقصان هذين النقصين،

ويكون فضل الجانبين على حالهما، وهو مثل العدد الأعظم. فإذا نقصنا من

جانب / الأموال والجذور فقط العلم المذكور في $\overline{ج ط}$ ، وهو من $ل - ١٧٣ - ط$

الأموال، وعلم $\overline{أ ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{أ د}$ المضروب في $\overline{د ط}$ ، وهو من الجذور،

يصير فضل الباقي في جانب الأموال والجذور على مكعب $\overline{ب ط}$ أنقص

2 الأعظم: كرر ناسخ [ل] بعدها العبارة السابقة وهي والآخر هو مربع ... في $\overline{ج م}$ - 16 العدد:

محوة [ب]

مما كان، أعني من العدد الأعظم، بهذا المنقوص، أعني بمقدار علم $\overline{د ب}$
 $\overline{ب ط}$ (في $\overline{د ط}$ المضروب في $\overline{ج ط}$ ، وبمقدار علم $\overline{أ ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{أ د}$
 المضروب في $\overline{د ط}$ ، ويصير جانب الأموال والجذور إنهما هو مربع $\overline{ب ط}$
 في $\overline{ب ج}$ ، وهو أموال ضلع $\overline{ب ط}$ ، ومربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ب ط}$ ، وهو
 جذوره. 5 ففضل أموال وجذور $\overline{ب ط}$ على مكعبه أقل من العدد الأعظم
 بالمقدارين المذكورين. لكن هذا الفضل هو عدد ضلع $\overline{ب ط}$ ؛ فعدد
 ضلع $\overline{ب ط}$ أقل من العدد الأعظم بالمقدارين المذكورين. وأحد المقدارين،
 وهو علم $\overline{أ ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{أ د}$ ثم في $\overline{د ط}$ ، هو ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{د ج}$ ثم في
 $\overline{د ط}$ ، أعني ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{د ط}$ ثم في $\overline{د ج}$. لكن ضعف $\overline{د ب}$ في
 10 $\overline{د ط}$ مثل مربع $\overline{د ط}$ مع علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ط}$ في $\overline{د ط}$. فضعف $\overline{د ب}$ في
 $\overline{د ط}$ ثم في $\overline{د ج}$ مثل مربع $\overline{د ط}$ في $\overline{د ج}$ ، أعني في $\overline{م ك}$ ، مع علم $\overline{د ب}$
 $\overline{ب ط}$ في $\overline{د ط}$ ثم في $\overline{د ج}$. فأحد المقدارين مثل / مربع $\overline{د ط}$ في $\overline{م ك}$ ل - ١٧٤ - و
 مع هذا العلم المذكور في $\overline{د ج}$. وقد كان المقدار الآخر هو العلم المذكور في
 $\overline{ج ط}$. فكلما المقدارين مثل مربع $\overline{د ط}$ في $\overline{م ك}$ مع علم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ط}$ في
 15 $\overline{د ط}$ ثم في $\overline{د ط}$ ، أعني مربع $\overline{د ط}$ في $\overline{ط ك}$. وكلما المقدارين مثل مربع
 $\overline{د ط}$ في $\overline{ط م}$. وقد كان العدد المسؤول أقل من العدد الأعظم بهذا
 المقدار. فعدد ضلع $\overline{ب ط}$ مثل العدد المسؤول، ف $\overline{ب ط}$ هو الضلع
 المطلوب.

أ د ج ط ب ك م

وأما استخراج المطلوب الأعظم: فنجعل عدد التفاوت بين العدد
 20 الأعظم والمسؤول عدداً، ونزيد فضل المطلوب الأول على عدد الأموال،

10-9 لكن ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{د ط}$: كررها ناسخ [ل]، بعد أن أبدل $\overline{د ط}$ ب $\overline{د ج}$ - 14 ج ط: خط [ل]


/ فكلما: فكل: [ب، ل]

على ضعف المطلوب الأول، ونجعل المبلغ عددَ أموالٍ، ونستخرج
المطلوب بمسألة: مكعب وأموال يعدل عدداً. فإن كان المطلوب الذي
يخرج بتلك المسألة أصغرَ من فضل جذر عدد الجذور على المطلوب الأول
مثل $\overline{د ه}$ ؛ فلأن العدد الأعظم هو ضرب $\overline{ب د}$ في العلم الباقي من
5 مربعه - وهو ضرب $\overline{ب د}$ في العلم الداخل، و $\overline{ب د}$ في العلم الخارج -
ومربع $\overline{ب د}$ في $\overline{ب ج}$ ؛ فهو ثلاثة أقسام. وأما العدد الذي مع ضلع $\overline{ب ه}$
فهو $\overline{ب ه}$ في العلم / الخارج ومربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ب ج}$. أما $\overline{ب ه}$ في العلم ل - ١٧٤ - ط
الخارج، فينقسم إلى $\overline{ب د}$ في العلم الخارج وإلى $\overline{د ه}$ في العلم الخارج.
ومربع $\overline{ب ه}$ في $\overline{ب ج}$ ينقسم إلى العلم الداخل في $\overline{ب ج}$ ، ومربع $\overline{ب د}$ في
10 $\overline{ب ج}$. فقد انقسم العدد الذي مع ضلع $\overline{ب ه}$ إلى أربعة أقسام؛ و $\overline{ب د}$
في العلم الخارج، ومربع $\overline{د ب}$ في $\overline{ب ج}$ مشتركان في كلا الجانبين، فإذا
ألقيناهما بقي في جانب العدد الأعظم ضرب $\overline{ب د}$ في العلم الداخل، وفي
جانب العدد المسؤول ضرب $\overline{ه د}$ في العلم الخارج، و $\overline{ب ج}$ في العلم
الداخل. والذي بقي في جانب العدد الأعظم - وهو ضرب $\overline{ب د}$ في العلم
15 الداخل - ينقسم إلى ضرب $\overline{ب ج}$ في العلم الداخل وإلى $\overline{د ج}$ في العلم
الداخل. فإذا ألقينا $\overline{ب ج}$ في العلم الداخل من كلا الجانبين يبقى خاصّة
العدد الأعظم، ضرب $\overline{ج د}$ في العلم الداخل، وخاصّة العدد المسؤول،
ضرب $\overline{ه د}$ في العلم الخارج. فنجعل $\overline{د ه}$ شيئاً. أما خاصّة العدد الأعظم
فهو علم $\overline{ه ب د}$ في $\overline{ه د}$ المضروب في $\overline{د ج}$. و $\overline{ه ب د}$ الذي هو
20 ضعف عدد $\overline{ب د}$ وشيء، في $\overline{ه د}$ الشيء يكون أشياء بعدّة ضعف
 $\overline{ب د}$ ، ومالاً؛ ومضروبه في عدد $\overline{د ج}$ أشياء بعدّة ضعف / $\overline{د ب}$ في ل - ١٧٥ - و

6 فهو: وهو [ب، ل] - 7 فهو: هو [ب، ل] - 8 فينقسم: ينقسم [ب، ل] - 11 العلم: ناقصة

[ل] - 19 فهو: هو [ب، ل]

د ج وأموالٌ بعدّة د ج. وخاصّة العدد المسؤول هو علم $\overline{اب}$ ب ه في $\overline{اه}$ المضروب في ه د. و $\overline{اب}$ ب ه الذي هو $\overline{اب}$ ب د وشيء، في $\overline{اه}$ الذي هو عدد $\overline{اد}$ إلّا شيئاً يكون عدداً بعدّة علم $\overline{اب}$ ب د في $\overline{اد}$ إلّا أشياء بعدّة ضعف ب د وإلّا مالا. ومضروبها في د ه يصير أشياء 5 بعدّة العلم، إلّا أموالاً بعدّة ضعف ب د، وإلّا كعباً، فمع عدد التفاوت يعدل خاصّة العدد الأول، وهو أشياء بعدّة ضعف دب في د ج، وأموالٌ بعدّة د ج. فبعد الجبر والمقابلة وإلقاء الأشياء من الجانبين لتساويهما، يصير أموالاً بعدّة ضعف ب د، وهو ضعف المطلوب الأول وزيادة ج د الذي هو فضل المطلوب الأول على عدد الأموال، مع 10 كعب، تعدل عدد التفاوت. فيستخرج المطلوب بتلك المسألة، فيخرج



د ه، فتزيده على المطلوب الأول، فما حصل فهو الضلع المطلوب.

وإن كان المطلوب الذي يخرج بتلك المسألة مثل فضل جذر عدد

الجذور على المطلوب الأول، فالمطلوب < الأعظم > مثل جذر عدد الجذور.

وإن كان أعظم منه مثل د ز، فلأن العدد / الأعظم / هو فضل مجسمي ب - ٢٥ - ظ
ل - ١٧٥ - ظ

2 ب د: ب ج [ب، ل] - 3 شيئا: شيئا [ب، ل] - 7 الأشياء: محوة [ب] - 10 تعدل: يعدل

[ب، ل]

الجنور والأموال اللذين مع ضلع $\overline{ب د}$ على مكعبه، فإذا زيد على
المجسمين زيادة، وعلى المكعب أكثر، حتى حصل مكعب ضلع $\overline{ب ز}$
ومجسميه، فالعدد الذي يكون مع ضلع $\overline{ب ز}$ أقل من العدد الأعظم
بمقدار فضل الزيادة التي زدناها على المكعب على الزيادة التي زدناها على
5 المجسمين. فلأن مجسم جنور $\overline{ب د}$ هو $\overline{د ب}$ في مربع $\overline{أ ب}$ ، فإذا زدنا
عليه $\overline{ز د}$ في مربع $\overline{أ ب}$ ، يصير $\overline{ز ب}$ في مربع $\overline{أ ب}$ وهو مجسم جنور
 $\overline{ز ب}$ ؛ ومجسم أموال $\overline{د ب}$ هو مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، فإذا زدنا عليه $\overline{ز ب}$
 $\overline{ب د}$ في $\overline{ز د}$ ، وهو العلم المضروب في $\overline{ب ج}$ ، يحصل المجسم الذي يكون
من ضرب مربع $\overline{ز ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، وهو أموال ضلع $\overline{ب ز}$. فقد صار فضل
10 مجسمي ضلع $\overline{ب ز}$ على مجسمي ضلع $\overline{ب د}$ هو ضرب $\overline{ز د}$ في مربع $\overline{أ ب}$
و $\overline{ز ب}$ في $\overline{ب د}$ في $\overline{ز د}$ ، وهو العلم المضروب في $\overline{ب ج}$. أما زيادة مكعب
 $\overline{ب ز}$ على مكعب $\overline{ب د}$ فهو مربع $\overline{ز ب}$ في $\overline{ز د}$ وعلم $\overline{ز ب}$ في $\overline{ب د}$ في $\overline{ز د}$
مضروباً في $\overline{ب د}$. فحاصل زيادة المكعب مربع $\overline{ز ب}$ في $\overline{ز د}$ ، والعلم في
 $\overline{ب د}$. وزيادة المجسمين مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ز د}$ ، والعلم في $\overline{ب ج}$. فإذا ألقينا
15 من الجانبين العلم في $\overline{ب ج}$ / يبقى بقية زيادة المكعب مربع $\overline{ز ب}$ في $\overline{ز د}$ ، ل - ١٧٦ - و
والعلم في $\overline{ب ج}$ ، وبقية زيادة المجسمين: مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ز د}$. وإذا ألقينا
مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{ز د}$ من الجانبين لا يبقى من زيادة المجسمين شيء، ويبقى
فضل زيادة المكعب على زيادة المجسمين هو $\overline{ز ب}$ في $\overline{أ ب}$ في $\overline{ز أ}$ ، وهو
العلم، مضروباً في $\overline{ز ز}$ ، والعلم الآخر وهو علم $\overline{ز ب}$ في $\overline{ب د}$ في $\overline{ز د}$
20 مضروباً في $\overline{ب ج}$. وجموع هذين العلمين مثل عدد التفاوت، فنجعل $\overline{ز د}$
شيئاً، فعلم $\overline{ز ب}$ في $\overline{أ ب}$ في $\overline{ز أ}$ هو من ضرب عددي $\overline{أ ب}$ في $\overline{ب د}$ وشيء

3. ومجسميه: ومجسمه [ب، ل] - 12 فهو: هو [ب، ل] - 15 $\overline{ز ب}$: $\overline{د ب}$ [ب، ل] - 19 علم
 $\overline{ز ب}$ في $\overline{ب د}$: علم $\overline{أ ب}$ في $\overline{ب د}$ [ب، ل] / $\overline{ز د}$: $\overline{أ د}$ [ب، ل]

في الشيء إلا عدد د أ. فيكون أشياء بعدة ضعف ب د ومالاً إلا عدداً
 مثل ضرب $\overline{اب}$ ب د مضروباً في أ د، ومضروبها في ز د الشيء يكون
 أموالاً بعدة ضعف ب د وكعباً إلا أشياء بعدة ضرب $\overline{اب}$ ب د في أ د.
 وأما العلم الآخر وهو علم ز ب ب د في ز د، فهو ضعف ب د وشيء في
 5 الشيء، فيكون أشياء بعدة ضعف ب د ومالاً، ومضروبها في عدد د ج
 يصير أشياء بعدة ضعف ب د في ج د وأموالاً بعدة ج د. فإذا جمعنا
 هذا الحاصل مع حاصل العلم الأول، تذهب الأشياء الزائدة بالناقصة
 لتساويها، ويحصل أموال بعدة ضعف ب د وزيادة ج د، ومكعب،
 يعدل عدد التفاوت بين المسؤول / والأعظم. فيُستخرج المطلوب بمسألة: ج - ١٧٦ - ظ
 10 مكعب وأموال يعدل عدداً، فيخرج ز د الشيء، فتزيده على ب د
 فيحصل المطلوب (الأعظم).

ز ا د ج ب

وأما استخراج المطلوب الأصغر: فنجعل عددَ التفاوت بين العدد
 الأعظم والمسؤول عدداً، ويزيد فضل ب د على ب ج على ضعف
 ب د، ونجعل المبلغ عدد أموال، ونستخرج المطلوب بمسألة: مكعب
 15 وعدد يعدل أموالاً. فإن كان المطلوب الذي يخرج بتلك المسألة أصغر من
 فضل المطلوب الأول على عدد الأموال مثل د ك، فلأن جذور ضلع
 ك ب هو ضرب ك ب في مربع ا ب، وأمواله هو مربع ك ب في ب ج،
 والجذور أعظم من المكعب بمقدار العلم الكبير، وهو مجموع العلمين في
 ك ب، فيكون العدد أعظم من الأموال يمثل ذلك. فيكون العدد مساوياً
 20 لمربع ك ب في ب ج وهو الأموال (وب ك) في مجموع العلمين؛ والعدد

الأعظم هو مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، وضرب $\overline{د ب}$ في العلم الخارج. أما مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، فهو مربع $\overline{ك ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، والعلم الداخل في $\overline{ب ج}$. أما $\overline{د ب}$ في العلم الخارج، فهو $\overline{ك ب}$ في العلم الخارج، و $\overline{ك د}$ في العلم الخارج. فقد انقسم العدد الأعظم إلى أربعة أقسام. أما $\overline{ك ب}$ / في العلم الخارج، $ج - ١٧٧ - و$


5 ومربع $\overline{ك ب}$ في $\overline{ب ج}$ ، فمشتركان في الجانبين. فإذا ألقيناهما، فبقي في جانب العدد الأعظم العلم الداخل في $\overline{ب ج}$ ، و $\overline{ك د}$ في العلم الخارج، وفي جانب العدد المسؤول ضرب $\overline{ك ب}$ في العلم الداخل. فإذا ألقينا $\overline{ب ج}$ في العلم الداخل، تبقى خاصة العدد المسؤول $\overline{ج ك}$ في العلم الداخل، وخاصة العدد الأعظم $\overline{ك د}$ في العلم الخارج. فخاصة العدد المسؤول مع

10 عدد التفاوت يعدل خاصة العدد الأعظم. فتجعل $\overline{د ك}$ شيئاً، فتكون خاصة العدد الأعظم أشياء بعدة $\overline{أ ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{أ د}$ العلم. وأما خاصة العدد المسؤول، فالعلم من ضعف $\overline{د ب}$ إلّا شيئاً في شيء؛ فيكون أشياء بعدة ضعف $\overline{د ب}$ إلّا مالاً، ومضروبها في $\overline{ج ك}$ - وهو عدد $\overline{ج د}$ إلّا شيئاً - يصير أشياء بعدة ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{ج د}$ وكعباً إلّا أموالاً عدتها

15 ضعف $\overline{د ب}$ وزيادة $\overline{ج د}$ ؛ وهو مع عدد التفاوت يعدل أشياء بعدة $\overline{أ ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{أ د}$ العلم. فبعد الجبر والمقابلة وإلقاء الأشياء من الجانبين لتساويهما؛ يكون كعباً وعدد التفاوت يعدل أموالاً عدتها ضعف $\overline{د ب}$ وزيادة $\overline{ج د}$. فيستخرج / المطلوبُ بمسألة: مكعب وعدد يعدل أموالاً، $ج - ١٧٧ - ظ$

فيخرج $\overline{د ك}$ فنقصه من $\overline{ب د}$ فبقي المطلوب.

2 فهو: هو [ب، ل] - 3 فهو: هو [ب، ل] - 7 المسؤول: هكذا، والمقصود العدد الذي مع
 $\overline{ك ب}$ - 9 فخاصة العدد: محمودة [ب] - 12 شيئاً: شيء [ب، ل] - 14 شيئاً: شيء [ب، ل]



وإن كان المطلوب الذي يخرج بتلك المسألة مثل فضل المطلوب الأول


على عدد الأموال؛ / فالمطلوب (الأصغر) مثل عدد الأموال. ب - ٢٦ - و

وإن كان أعظم منه مثل $\overline{د هـ}$: فلأنه إذا نقص من مجسم جذور $\overline{ب د}$ ، أعني من ضرب $\overline{ب د}$ في مربع $\overline{ا ب}$ - ضرب $\overline{د هـ}$ في مربع $\overline{ا ب}$ ، يكون الباقي ضرب $\overline{ب هـ}$ في مربع $\overline{ا ب}$ ، وهو مجسم جذور $\overline{ب هـ}$. وإذا نقص من مجسم أموال $\overline{د ب}$ - وهو مربع $\overline{د ب}$ في $\overline{ج ب}$ - ضرب $\overline{د ب هـ}$ في $\overline{د هـ}$ ، وهو العلم المضروب في $\overline{ب ج}$ ؛ يكون الباقي مجسم أموال ضلع $\overline{ب هـ}$ ، وهو مربع $\overline{ب هـ}$ في $\overline{ب ج}$. ففضل مجسمي ضلع $\overline{ب د}$ على مجسمي ضلع $\overline{ب هـ}$ هو ضرب $\overline{د هـ}$ في مربع $\overline{ا ب}$ ، والعلم المذكور في $\overline{ب ج}$. وفضل مكعب $\overline{ب د}$ على مكعب $\overline{ب هـ}$ هو مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{د هـ}$ ، وعل $\overline{د ب هـ}$ في $\overline{د هـ}$ مضروباً في $\overline{ب هـ}$. ولأن فضل مجسمي $\overline{ب هـ}$ على مكعبه هو العدد المسؤول الذي مع ضلع $\overline{ب هـ}$ ؛ فيكون فضل العدد الأعظم على المسؤول كفضل النقصان الذي وقع بمجسمي $\overline{ب هـ}$ عن مجسمي $\overline{ب د}$ على النقصان الذي وقع في مكعبه

4 مربع $\overline{ا ب}$: كررناسخ [ل] و $\overline{د هـ}$ في مربع $\overline{ا ب}$ ، وهي كليات من الجملة التي تلي الوضع المشار إليه - 14 مكعبه: المقصود مكعب $\overline{ب هـ}$

- / عن مكعب $\overline{ب د}$. ونقصان المكعب مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{د ه}$ ، والعلم في $\overline{د ه}$ - ١٧٨ - و
 $\overline{ب ه}$. ونقصان المجسمين مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{د ه}$ ، والعلم في $\overline{ب ج}$. فإذا
ألقينا من كلا الجانبين العلم في $\overline{ب ه}$ ، يبقى في كل واحدٍ منها بقية. أما
بقية نقصان المكعب، «فهي» مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{د ه}$ ، وبقية نقصان
5 المجسمين مربع $\overline{أ ب}$ في $\overline{د ه}$ ، والعلم في $\overline{ج ه}$. فإذا ألقينا من الجانبين
مربع $\overline{ب د}$ في $\overline{د ه}$ ، لا يبقى من جانب نقصان المكعب شيء، ويبقى فضل
نقصان المجسمين على نقصان المكعب علم $\overline{أ ب}$ $\overline{ب د}$ في $\overline{أ د}$ مضروباً في
 $\overline{د ه}$ ، وعلم $\overline{د ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{د ه}$ مضروباً في $\overline{ج ه}$ ، ومجموعها مثل عدد
التفاوت بين الأعظم والمسؤول. فنجعل $\overline{د ه}$ شيئاً، فعلم $\overline{أ ب}$ $\overline{ب د}$ في
10 $\overline{أ د}$ عدد معلوم، ومضروبه في $\overline{د ه}$ يكون أشياء بعدة ذلك العلم؛ وعلم
 $\overline{د ب}$ $\overline{ب ه}$ في $\overline{د ه}$ - وهو ضعف $\overline{د ب}$ إلا شيئاً في $\overline{د ه}$ الشيء - يكون
أشياء بعدة ضعف $\overline{د ب}$ إلا مالاً؛ ومضروبه في $\overline{ج ه}$ ، وهو شيء إلا عدد
 $\overline{ج د}$ ، يكون أموالاً بعدة ضعف $\overline{د ب}$ وزيادة $\overline{ج د}$ ، إلا أشياء بعدة
ضعف $\overline{د ب}$ في $\overline{ج د}$ ، وإلا كعباً. فإذا جمعنا هذا الحاصل مع حاصل
15 العلم الآخر وهو أشياء بعدة علم $\overline{أ ب}$ $\overline{ب د}$ / في $\overline{أ د}$ ، فالأشياء الزائدة $\overline{د ه}$ - ١٧٨ - ط
تذهب بالأشياء الناقصة لتساويها، ويصير أموالاً بضعف $\overline{د ب}$ وزيادة
 $\overline{ج د}$ ، إلا كعباً، يعدل عدد التفاوت. فبعد الجبر والمقابلة يكون أموالاً
بعدة ضعف $\overline{د ب}$ وزيادة $\overline{ج د}$ يعدل عدد التفاوت وكعباً. فقد تأدّى إلى
مسألة: كعب وعدد يعدل أموالاً. فيستخرج المطلوب بتلك المسألة،
20 فيخرج $\overline{د ه}$ الشيء، فننقصه من المطلوب الأول؛ فما بقي فهو الضلع
المطلوب.

8 ج ه: ج د - [ب، ل] - 11 شيئاً: شيء [ب، ل] / يكون: فيكون [ب، ل]



فحاصل الكلام في هذا القسم: أن نجعل ثلث عدد الجذور عدداً،
 وثلاثي عدد الأموال عدد جذور، فنستخرج المطلوب على مسألة: جذور
 وعدد يعدل مالاً، فما خرج فهو المطلوب الأول؛ فنزيد عليه جذر عدد
 الجذور، ونضرب المبلغ في فضل جذر عدد الجذور على المطلوب الأول،
 ونضرب المبلغ في المطلوب، فما حصل فهو المجسم، ونضرب مربع المطلوب
 الأول في عدد الأموال، ونزيد المبلغ على المجسم، فما حصل فهو العدد
 الأعظم. فإن كان العدد المسؤول أكثر من العدد الأعظم فالمسألة

مستحيلة؛ وإن كان / مساوياً له فهي ممكنة، ولها جواب واحد وهو ١٧٩ - و
 المطلوب الأول؛ وإن كان أقل فهي ممكنة، ولها جوابان: أحدهما أعظم
 ١٥ من المطلوب الأول، والآخر أصغر منه. فننقص العدد المسؤول من العدد
 الأعظم، ونجعل الباقي عدداً، ونأخذ ضعف المطلوب الأول، ونزيد عليه
 فضل المطلوب الأول على عدد الأموال، ونجعل المبلغ عدد أموال. فإن
 استخرجنا المطلوب بمسألة: مكعب وأموال يعدل عدداً، فنزيد المطلوب
 الذي يخرج على المطلوب الأول، فما حصل فهو الجواب الأعظم. وإن
 ١٥ استخرجنا المطلوب بمسألة: مكعب وعدد يعدل أموالاً، فينقص المطلوب
 الذي يخرج من المطلوب الأول، فما بقي فهو الجواب الأصغر. وذلك ما
 أردنا بيانه.

تمّ الكتاب الموسوم
بالمعادلات

بمحمد الله وحسن توفيقه
في السابع من شهر
الله المعظم رمضان
سنة ست وتسعين وستمائة

5

قوبل وصحح بقدر الوسع

في الخطين اللذين يقربان ولا يلتقيان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ومنه العون

رسالة لشرف الدين الطوسي في الخطين اللذين يقربان ولا يلتقيان

مقدمة :

5 إذا كان مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين كمثلث $\overline{أ ب ج}$ زاويته القائمة $\overline{ب}$ وأخرج من نقطة $\overline{ب}$ عمود إلى $\overline{أ ج}$ وليكن $\overline{ب د}$ ، ويَبين أنه يقسم $\overline{أ ج}$ بنصفين، وتوهمنا حركة مثلث $\overline{ب د ج}$ مع ثبوت $\overline{ب د}$ حتى يطابق مثلث $\overline{أ د ب}$ ، فإنه يرسم بحركته نصف منحروط، ونخط $\overline{د ج}$ يرسم بحركته نصف دائرة، وكذلك كلُّ خطٍ موازٍ له يرسم نصف دائرة. لأن $\overline{ب د}$ عمود على $\overline{د ج}$ ، فـ $\overline{د ج}$ عمود عليه ويرسم بحركته خطوطاً هي أعمدة على $\langle \overline{ب د} \rangle$ في ذلك السطح، أبعادها عن نقطة $\overline{د}$ متساوية؛ فهي دائرة سطحها قائم على سطح المثلث على زوايا قائمة لأن $\overline{د ج}$ - الذي رسمها - عمود على $\langle \overline{ب د} \rangle$ الذي في ذلك السطح؛ وهي قاعدة المخروط ومركزها $\overline{د}$.


15 ثم إذا أخرج $\overline{ب ج}$ على استقامته إلى $\overline{ه}$ وأخرج من $\overline{ه}$ خط مواز لـ $\overline{ب د}$ ، يلقى $\overline{أ ب}$ على استقامته لأن $\overline{أ ب}$ قطع أحد المتوازيين، فهو يقطع الآخر؛ وليقطعه على $\overline{ز}$ ، وليقطع $\overline{أ ج}$ على $\overline{ح}$. وتوهمنا سطحاً يمر بخط $\overline{ه ز ح}$ ويقوم على سطح المثلث $\langle \overline{ب د ج} \rangle$ على زوايا قائمة، فهو

3 اللذين: اللذين - 5 $\overline{أ ب ج}$: كتب الناسخ الباء فاء والجيم حاء، ولقد أعدناها هنا وفيها على من النص للالتزام بالأبجدية، ولم نشبها - 10 خطوطاً: خطوط - 13 عمود: عموداً - 15 خط مواز: خطاً موازياً - 17 $\overline{أ ج}$: $\overline{ب ج}$

ز ك م قائمة وزاوية ك ه م نصف قائمة، تبقى زاوية ك ه م نصف قائمة،
فخط ه ك مثل خط ك م. وزاوية ز ك ل قائمة، ولأن زاوية ز ك ل
قائمة وزاوية ك ل ز نصف قائمة، تبقى زاوية ل ز ك نصف قائمة، فخط
ز ك مثل خط ك ل. ولأن ضرب م ك (في ك ل) مثل مربع ك ط
5 لكونه عموداً في نصف دائرة، وك م مثل ك ه، ول ك مثل ز ك،
ف ضرب ه ك في ك ز مثل مربع ك ط، وهو المراد.

مقدمة أخرى:

إذا توهمنا القطع مسطوحاً على سطح مستوي، وليكن قطع ب ج د،
والمجانب أ ب، ومركز القطع - وهو منتصف المجانب - ه، وأخرج من
10 ب، وهي رأس القطع، عمود على أ ب، وفصلنا ضلعاً مثل ب ه وليكن
ب ح، ووصلنا ه ح، وأخرجناه على استقامته إلى غير نهاية، وأخرجنا
محيط القطع إلى غير نهاية.



3 ل ل ز: ل ك ز - 8 مسطوحا: مسطوحا / مستوي / مستوي / ب ج د: ب ح د - 10 عمود:
عمودا / وفصلنا ضلعاً: وضلعاه

أقول: إن هذا الخط المستقيم يقرب أبداً من محيط القطع ولا يلقاه.
برهانه: أنا نتعلم على محيط القطع نقطة ج، ونُخرج منها خطاً ترتب
وليكن ج ز، ونخرجه على استقامته حتى يلتقي الخط المستقيم على ط،
ونخرج من نقطة ج عموداً على الخط المستقيم وهو ج ك، وهذا يسمى بُعد
النقطة، ويسمى ما بين العمود ومركز القطع من الخط المستقيم ضلع
النقطة، ونخرج من نقطة ب أيضاً عموداً على الخط المستقيم وهو ب ل.
فلأن زاوية ز ه ل نصف قائمة، وزاوية ه ز ط قائمة، تبقى زاوية
ز ط ه نصف قائمة، فخطا ز ط ز ه متساويان. فخط ه ز ط إذا قُدر
مستقيماً فقد قُسم بقسمين متساويين على نقطة ز، وبقسمين مختلفين على
ج، فسطح ه ز ط في ج ط مع مربع ج ز مثل مربع ز ط. لكن ا ب
قد قُسم بنصفين على ه، وزيد فيه خط ب ز، فسطح ا ز (في) ب ز
مع مربع ب ه مثل مربع ه ز. وقد كان ه ز ج في ج ط مع مربع ز ج
مثل مربع ه ز، فسطح ا ز في ب ز مع مربع ه ب مثل سطح ه ز ج
في ج ط مع مربع ز ج. لكن سطح ا ز في ب ز مثل مربع ز ج كما قد
تبين، يبقى مربع ه ب مثل سطح ه ز ج في ج ط. فنسبة ه ز ج إلى
ه ب كنسبة ه ب إلى ج ط /، وه ز ج أعظم من ه ب، فيكون ٧١ - ط
ه ب أعظم من ج ط. ولأن زاوية ه نصف قائمة، وزاوية ه ل ب
قائمة، تبقى (زاوية) ه ب ل نصف قائمة. فخطا ه ل ب ل متساويان،
فربع ه ب مساوٍ لضعف مربع ب ل. ولأن زاوية ط نصف قائمة وزاوية
ج ك ط قائمة، تبقى زاوية ط ج ك نصف قائمة، فخطا ج ك ط ك
متساويان؛ فربع ج ط مساوٍ لضعف مربع ك ج؛ فضعف مربع ب ل

2 ج: ح. من هنا وبعد ذلك تُكتب الجيم حاء - 3 ونخرجه: كتبها ونخرج: ثم صححها عليها -

10 ز ط: ه ز ح - 11 ا ز (في) ب ز: ا ر ح بر - 16 ج ط: ه ط - 21 ضعف ... أعظم

من: كرر التاسع هكذا وضع مربع ب ل أعظم من

أعظم من ضعف مربع ج ك؛ فنصفه، وهو مربع ب ل، أعظم من نصف ذلك وهو مربع ج ك، فخط ب ل أعظم من خط ج ك.

وكذلك لو تعلمنا على محيط القطع نقطة د، وأخرجنا منها خط ترتيب كخط د م، وأخرجناه على استقامته حتى لقي الخط المستقيم على ن،

5 وأخرجنا من د عموداً على الخط المستقيم كعمود د س، فلأن زاوية ه نصف قائمة وزاوية م قائمة، تبقى زاوية ن نصف قائمة، فخطا م ه م ن متساويان. ولأن خط ه م ن إذا قُدِّرَ مستقيماً فقد قُسم بقسمين متساويين على م وقسمين مختلفين على د، فسطح ه م د في د ن مع مربع م د مساوٍ لمربع م ن، أعني مربع ه م. وخط ا ب قد قُسم بنصفين على نقطة 10 ه، وزيد فيه خط ب م، فسطح ا م في م ب مع مربع ه ب مثل مربع ه م. وقد كان سطح ه م ن مع مربع م د مثل مربع ه ب، فسطح ا م في م ب مع مربع ه ب مثل سطح ه م د في د ن مع مربع م د. لكن سطح ا م في م ب مثل مربع م د، يبقى مربع ه ب مثل سطح ه م د في د ن. وقد كان مربع ه ب مثل سطح ه ز ج في ج ط، فسطح 15 ه ز ج في ج ط مثل سطح ه م د في د ن فهذه السطوح جميعها متساوية، ويسمى كل سطح منها سطح النقطة. ونسبة ه م د إلى ه ز ج كنسبة ج ط إلى د ن، وه م د أعظم من ه ز ج، فخط ج ط أعظم من د ن، ومربع ج ط كما بيناه مساوٍ لضعف مربع ج ك، ومربع د ن مساوٍ لضعف مربع د س، فنصفه وهو مربع ج ك أعظم من نصفه وهو 20 مربع د س، فخط ج ك أعظم من خط د س، فقد بان أن الخطين يتقاربان أبداً.

1 ج ك : د ك / ب ل : د ب - 3 وكذلك : وذلك - 10 سطح ا م في م ب : مكررة - 14 سطح : سطح.

فأقول: إنها لا يلتقيان.

برهانه: أنهما إن التقيا، فليتقيا على نقطة $\overline{ص}$ ، ونخرج منها خطاً ترتيباً كخط $\overline{ص ع}$. فلأن $\overline{ص ع}$ مساوٍ لخط $\overline{ع ه}$ - لكن سطح $\overline{ع ا}$ في $\overline{ع ب}$ مثل مربع $\overline{ص ع}$ ، أعني مربع $\overline{ع ه}$ ، لكن مربع $\overline{ع ه}$ مساوٍ لسطح $\overline{ا ع}$ 5 في $\overline{ع ب}$ مع مربع $\overline{ه ب}$ - فسطح $\overline{ا ع}$ في $\overline{ع ب}$ مع مربع $\overline{ه ب}$ مثل سطح $\overline{ا ع}$ في $\overline{ع ب}$ ، هذا خلف.

وأقول أيضاً: إن السطوح الكائنة من أبعاد النقط وأضلاعها متساوية. برهانه: أن مربع $\overline{ه م ن}$ - إذا قُدِّرَ خطاً مستقيماً - مساوٍ لضعف مربع $\overline{ه ن}$ ، ومربع $\overline{د ن}$ ضعف مربع $\overline{س ن}$ ، فنسبة مربع $\overline{ه م ن}$ إلى مربع $\overline{ن ه}$ كنسبة مربع $\overline{د ن}$ إلى مربع $\overline{س ن}$ ، فنسبة خط $\overline{ه م ن}$ إلى خط $\overline{ه ن}$ كنسبة خط $\overline{د ن}$ إلى خط $\overline{س ن}$. فنسبة الباقي وهو $\overline{م د}$ إلى الباقي وهو $\overline{س ه}$ كنسبة الكل إلى الكل، أعني كنسبة $\overline{د س ن}$ إلى $\overline{د ن}$ ؛ فسطح $\overline{ه م د}$ في $\overline{د ن}$ مثل سطح $\overline{س ه د}$ في $\overline{د س ن}$. لكن سطح $\overline{ه م د}$ في $\overline{د ن}$ مثل مربع $\overline{ه ب}$ ؛ فسطح $\overline{س ه د}$ في $\overline{د س ن}$ مثل مربع 15 $\overline{ه ب}$ ؛ فسطح $\overline{س ه د}$ في نصف ذلك، وهو $\overline{د س}$ ، مثل نصف مربع $\overline{ه ب}$ ، أعني نصف ذلك السطح. لكن مربع $\overline{ه ب}$ مساوٍ لتلك السطوح، وهي سطوح النقط. فالسطوح الحادثة من أبعاد النقط وأضلاعها متساوية لأن أضلاعها متساوية، وهو المراد.

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

تمت الرسالة بعون الله العزيز الوهاب. 20

3 ع ا ع - ه - 6 هذا خلف: كتبها بالاختصار المعروف - 12 ه س - ه س ن - 17 وهي: وهو

رسالة في عمل مسألة هندسية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٢٩

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين.
مسألة سألها شمس الدين أمير الأمراء النظامية عن الإمام الأجل الأوحد
العالم شرف الدين بهاء الإسلام حجة الزمان مظفر بن محمد المظفر الطوسي
5 أدام الله توفيقه بيلد همذان سنة <...> وخمسمائة هجرية.

عن مربع متساوي الأضلاع، كل ضلع منه معلوم، وأردنا أن نقسمه
إلى أربعة سطوح أحدها سطح متوازي الأضلاع مستطيل، في الوسط،
وثلاثة منحرفات تحيط به من ثلاثة جوانب على هذا المثال <فيه> على وجه
تكون السطوح الأربعة بعضها إلى بعض <على> نسبة مفروضة معلومة،
10 وقد عيّن ضلع المربع ونسبة السطوح: يقال كل ضلع من أضلاع المربع
عشرة، والمطلوب أن يكون السطح المتوازي الأضلاع الذي في الوسط
نصف المنحرف الذي على أحد جانبيه، والمنحرف الذي فوقه ثلاثة أمثاله،
والمنحرف الذي على الجانب الآخر منه خمسة أمثاله.

مثال ذلك: مربع $\overline{أ ب ج د}$ متساوي الأضلاع، وضلع $\overline{أ ب}$ عشرة،
15 وأردنا العمل المذكور، فنخرج ضلع $\overline{أ ب}$ على استقامته، ويتعلم عليه
نقطة $هـ$ كيفما اتفقت، ونزيد على خط $\overline{ب هـ}$ تسعة أمثاله، فيكون خط
 $\overline{ب ط}$ عشرة أمثال خط $\overline{ب هـ}$ ، ونصل $\overline{ط د}$ ، ونخرج من نقطة $هـ$ خط
 $هـ و$ يوازي $\overline{ط د}$ ، ثم يتعلم نقطة $ظ$ على خط $\overline{ب هـ}$ ، نقطة $ظ$ كيفما
وقعت. ونجعل $\overline{ظ ز} = ٤ هـ$ مثل $\overline{ب ظ}$ وخط $\overline{ز ح} = ٤$ مثل $\overline{ب ظ}$ ،

3 شمس الدين: من الواضح أن هذا لقب، ولم نهد إلى معرفة صاحبه من المصادر والدراسات التي رجعنا
إليها - 4 حجة: حجب - 5 <...> : نسي النسخ كتابة الأحاد والعقود ولم يثبت إلا القرن؛ ولقد أنخطأ
ناسخ مخطوطة ليدن عند نقله للمخطوطة كما بينا في المقدمة - 7 أربعة: أربع - 8 به: بها - 19 $\overline{ب ظ}$:
 $\overline{ب ط} / \overline{ز ح}$

ونصل $\overline{ز و}$ / ونخرج من نقطة $\overline{ح}$ خطاً يوازي خط $\overline{ز و}$ ، وهو خط ٣٠
 $\overline{ح ي}$ ، ثم نخرج من نقطة $\overline{ي}$ خط $\overline{ي س}$ يوازي $\overline{ا ب}$ ، ونخرج خط $\overline{س ي}$
على استقامته إلى نقطة $\overline{ل}$ حتى يكون خط $\overline{ي ل}$ مثل $\overline{ب و}$ وثلاثة أرباعه،
ونجعل $\overline{ي م}$ مثلي $\overline{ب و}$ ، ثم يتعلم نقطة $\overline{ج ب}$ ، ونجعل خط $\overline{ج ب}$ يـ
٥ ٣٠٢٤ مثل خط $\overline{ي ج ب}$ ، ثم نجعل خط $\overline{ي د}$ ٧٢٥ أمثلاً لخط
 $\overline{ي ج ب}$ ، ونصل خط $\overline{ي م}$ ، ونخرج خط $\overline{ي د}$ موازياً له، وندير على قطر
 $\overline{ن ل}$ نصف دائرة، ثم نجعل خط $\overline{س ع}$ خمسة أمثال وخمسة أجزاء من
أحد عشر جزءاً من خط $\overline{ب و}$. ولأن قطر $\overline{س ع}$ أعظم من قطر $\overline{ن ل}$ ،
فلنا أن نخرج من نقطة $\overline{س}$ في دائرة $\overline{س ع}$ وترأ مساوياً لضعف $\overline{ك ي}$ وهو
١٠ $\overline{س ف}$. ونقسم قوس $\overline{س ف}$ بنصفين على $\overline{ص}$ ، ونخرج من نقطة $\overline{ص}$ عمود
 $\overline{ص ق}$ ، ثم نعلم نقطة $\overline{ش}$ على $\overline{ص ق}$ كيف $\langle ما \rangle$ وقعت، ونجعل
 $\overline{ش ت}$ مثل $\overline{ث لث ق ش}$ ، ونصل خط $\overline{ت س}$ ، ونخرج من $\overline{ش}$ خط
 $\overline{ش ر}$ موازياً له، ونجعل $\overline{س خ}$ مثل $\overline{س ر}$ ، ونخرج $\overline{خ ك ب}$ يوازي $\overline{ا ب}$ ،
ثم نجعل $\overline{د ل ب}$ مثلي ونصف $\overline{ب ك ب}$ ، ونخرج $\overline{ل ب ل ج}$ يوازي $\overline{ا ب}$ ،
١٥ ونجعل $\overline{ا ض}$ مثل ونصف $\overline{ب ي}$ مزيداً عليه ثلاثة أمثال ونصف $\overline{ي ك ب}$ ،
ونخرج $\overline{ض لا}$ ، ثم نخرج $\overline{ا ذ ج غ}$.

فأقول: إن المربع قد انقسم على الجهة المطلوبة، وهي أن منحرف
 $\overline{ا ب ذ ك ب}$ ضعف سطح $\overline{ذ غ ل ب ك ب}$ ، ومنحرف $\overline{ا ذ غ ج}$ خمسة
أمثاله، ومنحرف $\overline{ج د ل ب غ}$ ثلاثة أمثاله.

١ $\overline{ح غ}$ - ٢ $\overline{ح ي}$ - ٣ $\overline{غ ي}$ - ٧ أمثال: أمثاله - ١١ ونجعل: وتزيد عليه - ١٢ $\overline{ت س}$: $\overline{ت س}$ -
١٣ $\overline{س خ}$: $\overline{س ح}$ - ١٦ $\overline{ا ذ}$: $\overline{ا ط}$ - ١٨ $\overline{ا ب ذ ك ب}$: $\overline{ا ب ط ك ب}$ / $\overline{ذ غ ل ب ك ب}$: $\overline{ظ ن غ ل ب ك ب}$ /
 $\overline{ا ذ غ ج}$: $\overline{ا ط ع ج}$ / خمسة: ثلاثة - ١٩ $\overline{ج د ل ب غ}$: $\overline{ج د ل ب ع}$ / ثلاثة: خمسة / أمثاله: أي أمثال
السعيل

برهان ذلك: لأن $\overline{ب ط}$ عشرة أمثال $\overline{ب ه}$ ، ونسبة $\overline{د ب}$ إلى $\overline{ب و}$ كنسبة $\overline{ط ب}$ إلى $\overline{ب ه}$ ، فيكون $\overline{د ب}$ عشرة أمثال $\overline{ب و}$ ، ونسبة الواحد. ولأن $\overline{ز ب}$ ٥٥ أمثال $\overline{ب ظ}$ / وزح ٤٥٥ مثلاً له، يكون ٣١ نسبة $\overline{ز ب}$ إلى $\overline{ز ح}$ كنسبة ٥٥ إلى ٤٥٥ ، ونسبة $\overline{ب و}$ إلى $\overline{ب ي}$ كنسبة ٥٥ إلى ٤٥٥ ، فيكون $\overline{ب و}$ ٥٥ أجزاء على أن $\overline{ب و}$ الواحد أحد عشر جزءاً.

ولأن $\overline{م ي}$ ضعف $\overline{و ب}$ ويحي ٣٠٢٥ أمثال $\overline{ي ج ب}$ ويد يحي ٧٢٥ أمثاله، ونسبة $\overline{ن م}$ إلى $\overline{م ي}$ كنسبة $\overline{يد يحي}$ إلى $\overline{يحي ي}$ ، فيكون $\overline{ن م}$ ٧٢٥ جزءاً بالمقدار الذي \langle به \rangle يكون $\overline{م ي}$ ٣٠٢٥ ، وهو 10 ضعف $\overline{و ب}$ ، وبالمقدار الذي \langle به \rangle يكون $\overline{و ب}$ ٣٠٢٥ فيكون $\overline{ن م}$ ١٤٥٠ .

وقد ذكرنا أن $\overline{ي ل}$ مثل وثلاثة أرباع $\overline{ب و}$ الواحد، فسطح $\overline{ي ن}$ \langle في $\overline{ي ل}$ هو سطح $\overline{م ي}$ \rangle - الذي هو اثنان - وم $\overline{ن و}$ - وهو ١٤٥٠ من ٣٠٢٥ من الواحد - في $\overline{ي ل}$ الذي هو واحد وثلاثة 15 أرباع، فيكون تكسيه أربعة \langle و \rangle ١٠٢٥ من ٣٠٢٥ من واحد، وهو تكسير مربع $\overline{ك ي}$ ، لأن ضرب $\overline{ن ي}$ في $\overline{ي ل}$ يساوي مربع $\overline{ك ي}$. ولأن $\overline{س ف}$ ضعف $\overline{ك ي}$ و $\overline{ص ق}$ نصف $\overline{س ف}$ ، يكون $\overline{ص ق}$ يساوي $\overline{ك ي}$ ، ومربعه مربعه، ومربع $\overline{ص ق}$ يساوي $\overline{س ق}$ في $\overline{ق ع}$ ، فيكون تكسير سطح $\overline{س ق}$ في $\overline{ق ع}$ أربعة ١٠٢٥ من ٣٠٢٥ من واحد. ولأن $\overline{ق ش}$ ثلاثة بالمقدار الذي به يكون $\overline{ش ت}$ أربعة، ونسبة 20 $\overline{س ر}$ إلى $\overline{ق ر}$ كذلك، فيكون $\overline{ق ر}$ ثلاثة أسباع $\overline{ق س}$ و $\overline{س ر}$ أربعة

13 وم ن: و / وهو: هو - 14: 1450: 145 - 15 فيكون: يكون - 20 بالمقدار: المقدار / ش ت: ش ت


- أسباعه، فيكون سطح $\overline{ع ق}$ في $\overline{ر س}$ أربعة أسباع $\overline{ع ق}$ في $\overline{ق س}$ المذكور
 تكسيه، وسطح $\overline{ع ق}$ في $\overline{ر س}$ هو سطح $\overline{ع ث}$ ، لأن $\overline{ق ث}$ يساوي
 $\overline{س خ}$ و $\overline{س خ}$ مثل $\overline{س ر}$ ، فسطح $\overline{ع ث}$ اثنان و ١٤٥٠ من
 ٣٠٢٥ ، وسطح $\overline{ر خ}$ مربع $\overline{ر س}$ ، وسطح $\overline{ر ث}$ ثلاثة أرباع مربعه.
 5 ولأننا فصلنا $\overline{س ع}$ خمسة و ٢٥ من ٥٥ / \langle من \rangle واحد، يبقى $\overline{ع ي}$ ٣٢
 \langle من \rangle تمام العشرة أربعة و ٣٠ من ٥٥ من واحد. فجميع سطح $\overline{خ ي}$
 المستطيل يساوي مربع $\overline{ر س}$ - وهو سطح $\overline{ر خ}$ - وثلاثة أرباع مربعه -
 وهو سطح $\overline{ر ث}$ - وسطحاً تكسيه اثنان و ١٤٥٠ من ٣٠٢٥ من
 واحد - وهو سطح $\overline{ث ع}$ - وسطحاً أحد ضلعيه $\overline{ر س}$ وضلعه الآخر
 10 أربعة و ٣٠ من ٥٥ من الواحد، وهو سطح $\overline{ع ك ب}$ الباقي. ولأن سطح
 $\overline{خ ض}$ هو ضرب $\overline{ا خ}$ في $\overline{ا ض}$ ، و $\overline{ا خ}$ يساوي $\overline{ب ك ب}$ - وهو واحد
 وتسعة أجزاء من أحد عشر جزءاً من واحد مع زيادة $\overline{خ س}$ أي $\overline{ر س}$ -
 وضلع $\overline{ا ض}$ هو مثل ونصف $\overline{ب ي}$ مع ثلاثة أمثال ونصف $\overline{ر س}$ ،
 فيبرهان أشكال المقالة الثانية من أقليدس يكون ضرب $\overline{ا خ}$ في $\overline{ا ض}$
 15 يساوي سطح $\overline{ا ض}$ في $\overline{ا س}$ وسطح $\overline{ا ض}$ في $\overline{خ س}$. ولأن أحد قسمي
 $\overline{ا ض}$ مثل ونصف $\overline{ا س}$ ، وقسمه الآخر ثلاثة أمثال ونصف $\overline{س خ}$ ،
 فسطح $\overline{ا ض}$ في $\overline{ا س}$ يساوي مجموع سطحين، أحدهما \langle ثلاثة أنصاف
 مربع \rangle $\overline{ا س}$ - وهو واحد وتسعة أجزاء من أحد عشر، فيكون تكسيه
 أربعة و ٢٩٠٠ من ٣٠٢٥ ، والسطح الآخر هو ثلاثة أمثال ونصف
 20 $\overline{ر س}$ في $\overline{ا س}$ ، وهو سطح يكون أحد ضلعيه $\overline{ر س}$ والآخر ستة و ٢٥

2 هو: وهو - 3 $\overline{س خ}$: $\overline{س ح}$ / $\overline{و س خ}$: $\overline{و س ح}$ - 4 $\overline{د خ}$: $\overline{د ح}$ - 6 $\overline{خ ي}$: $\overline{ح ي}$ - 7 $\overline{د خ}$:
 $\overline{د ح}$ - 11 $\overline{خ ض}$: $\overline{ح ض}$ / هو: وهو / $\overline{ا خ}$: $\overline{ا ح}$ / $\overline{وا خ}$: $\overline{وا ح}$ - 12 $\overline{خ س}$: $\overline{ح س}$ - 13 $\overline{ا ض}$:
 $\overline{ا ص}$ / هو: وهو - 14 فيبرهان: فيبرهان / $\overline{ا خ}$: $\overline{ا ح}$ - 15 سطح $\overline{ا ض}$: سطح $\overline{ا ص}$ / $\overline{خ س}$:
 $\overline{ح س}$ - 16 $\overline{ا ض}$: $\overline{ا ص}$ / $\overline{س خ}$: $\overline{س ح}$ - 17 $\overline{ا ض}$: $\overline{ا ص}$ - 18 تكسيه: تكسيه - 19 هو: وهو

- من $\overline{55}$. أما سطح $\overline{ا\ ض}$ في $\overline{ر س}$ فينحل أيضاً إلى ضرب جزأي $\overline{ا\ ض}$ في $\overline{ر س}$ ، أي إلى ضرب اثنين وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءاً من واحد في $\overline{ر س}$ - فيحصل سطح أحد ضلعيه $\overline{ر س}$ والآخر اثنان وثمانية أجزاء من أحد عشر من واحد - وإلى سطح $\overline{ر س}$ في ثلاثة أمثاله ونصف،
- 5 فيحصل ثلاثة مربعات / $\overline{ر س}$ ونصف مربعه. فحصل لنا \langle من \rangle جميع 33 أجزاء $\overline{خ\ ض}$ سطح تكسيه أربعة و 2900 من 3025 من واحد، وسطحان آخران مجموعها سطح أحد ضلعيه $\overline{ر س}$ وضلعه الآخر \langle ضعف \rangle أربعة و 30 من 55 من واحد، وثلاثة مربعات ونصف مربع $\overline{ر س}$. فإذا نصفنا الجميع يكون نصفها مساوياً لأجزاء سطح $\overline{خ\ ي}$ المستطيل. 10 ولأن سطح $\overline{خ\ ب}$ إذا فصل منه مستطيل $\overline{خ\ ي}$ ، يبقى مستطيل $\overline{س\ ب}$ ، وإذا فصل منه مثلث $\overline{ا\ خ\ ذ}$ ، يبقى منحرف $\overline{ا\ ذ\ ك\ ب}$ ، فيكون مستطيل $\overline{س\ ب}$ مساوياً لمنحرف $\overline{ا\ ذ\ ك\ ب}$. ولأن $\overline{ب\ ي}$ واحد وتسعة أجزاء من أحد عشر جزءاً، ونصفه عشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من الواحد، وإذا قسمنا العشرة بأحد عشر قسماً، يكون 15 كل قسم عشرة أجزاء من أحد عشر من الواحد، فخط $\overline{ب\ ي}$ جزآن من أحد عشر جزءاً من $\overline{ب\ د}$ العشرة، وسطح $\overline{ب\ س}$ من سطح $\overline{ب\ ج}$ يكون على هذه النسبة، فنحرف $\overline{ا\ ذ\ ك\ ب}$ جزآن من أحد عشر جزءاً من مربع $\overline{ا\ ب\ ج\ د}$. ولأن نسبة منحرف $\overline{ا\ ذ\ ك\ ب}$ إلى منحرف $\overline{ج\ د\ ل\ ب}$ كنسبة قاعدة $\overline{ب\ ك\ ب}$ إلى قاعدة $\overline{ل\ ب\ د}$ - وبالمقدار الذي به $\overline{ب\ ك\ ب}$ اثنان 20 ف $\overline{ل\ ب\ د}$ خمسة لأنه مثله ومثل نصفه - فيكون منحرف $\overline{ج\ د\ ل\ ب}$

1 ينحل - 2 أي إلى: أما - 3 فيحصل: يحصل - 6 $\overline{خ\ ض}$: $\overline{ح\ ض}$ - 9 $\overline{خ\ ي}$: $\overline{ح\ ي}$ -
 10 $\overline{خ\ ب}$: $\overline{ح\ ب}$ / $\overline{خ\ ي}$: $\overline{ح\ ي}$ - 11 $\overline{ا\ خ\ ذ}$: $\overline{ا\ ح\ ط}$ - 12 $\overline{ا\ ذ\ ك\ ب}$ (الأول والثانية):
 $\overline{ا\ ط\ ك\ ب}$ - 17 $\overline{ا\ ذ\ ك\ ب}$: $\overline{ا\ ط\ ك\ ب}$ - 18 $\overline{ا\ ذ\ ك\ ب}$: $\overline{ا\ ط\ ك\ ب}$ - 20 لأنه مثله: لأن
 مثله

خمس أجزاء من أحد عشر جزءاً من المربع الكبير. ولأن نسبة مثلث
 ا ض ذ المساوي لمستطيل خ ي إلى مثلث ج غ لا كنسبة قاعدة ض ذ
 إلى قاعدة غ لا، وهو مثلان ونصف، فيكون مثلث ج غ لا / مثلي ٣٤
 ونصف ا ض ذ، ومجموعها ثلاثة أمثال ونصف مستطيل خ ي. ولأن
 5 مستطيل ا لا مركب من ضرب ضلع المربع الكبير في جزأي ا ض -
 وأحدهما مثل ونصف ب ي، والآخر ثلاثة أمثال ونصف خ س، وذلك
 يساوي مجموع المثلثين (ومنحرف ج غ ذ ا) - فإذا فصلنا المثلثين من
 سطح ا لا، فكأننا قد فصلنا منه سطح ضلع المربع الكبير في ثلاثة أمثال
 ونصف خ س، فيكون منحرف ج غ ذ ا مساوياً لضرب ضلع المربع
 10 الكبير في مثل ونصف ب ي. فنحرف ج غ ذ ا مثل ونصف سطح
 ب س أي منحرف ا ذ ك ب، فبالقادر الذي به يكون منحرف
 / ج د لب غ خمسة، يبقى سطح غ لب ك ب ذ واحداً، وهو واحد، وهو ٣٥
 المطلوب.



2 ا ض ذ: ا ض ظ / خ ي: ح ي / ج غ لا: و غ لا - 2 ض ذ: ض ط - 4 ونصف:
 أضافها الناسخ في الهامش مع بيان موضعها. / ا ض ذ: ا ض ظ / خ ي: ح ي - 6 وأحدهما:
 أحدهما / خ س: ح س - 9 خ س: ح س / ج غ ذ ا: ج غ ظ ا - 10 ج غ ذ ا: ج غ ظ ا -
 11 ا ذ ك ب: ا ظ ك ب / يكون منحرف: يكون ومنحرف - 12 يقي: يقي / غ لب ك ب ذ:
 غ لب ك ب ظ / واحداً: واحد

والمأمول من كرم المخدم والمنعم، أدام الله علوه، أن ينعم بالنظر والتأمل في هذا الشكل، ويصفح عن السهو القليل إن وقع في بعض حساباته الجزئية فقط؛ وإن عثر على خطأ في بعض براهينه، فنيبها عليه مفيداً ادّعاءه؛ فقد عُمي علينا لكثرة المقدمات واختلاط الهندسية فيها بالحساب،

5 ولا ينكر كثرة التطويل في مقدماتها، فإن الوصول / إلى المطلوب البرهاني ٣٦ بكثرة المقدمات < و > بالمتوسطة مع العصمة من الغلط إن كانت، يكون [إليه] بالدربة والارتياض، وأدل على < أن > الإصابة في المعقولات يكثر بالضرورة مقدمات براهينها ومتوسطاتها، وأعظم فوائد العلوم الرياضية إنما هو ذلك. ولقد تحيّزت عن التطويل في مقدمات براهين هذا الشكل مع

10 كونها حقاً ضرورية في إفادة النتيجة المطلوبة، ثم إن أشار المخدم المنعم، فسأعرض سائر الطرق، على رأيه الناقد العالي إن شاء الله تعالى. والسلام.

1 بالنظر: كذا، والمعروف أن فعله أنهم يتعدى بنفسه، فيقال وأنتم النظر في كذا - 2 وقع: وقعت / حساباته: حساباتها - 4 ادّعاءه: لدّعاءه، والمقصود ما ذهب إليه. / قد: وقد / الهندسية فيها: إما أنّ المقصود هو البراهين الهندسية فيها، وإما أنّ فيها تحريف منها - 9 ولقد: ولهذا - 10 ضرورية: ضرورياً - 11 الطرق: الطرف

قائمة التعابير والمصطلحات التي استعملها الطوسي

لقد عمدنا، في مرحلة أولى، إلى القيام بجردة كاملة للتعابير التي استعملها الطوسي. لكن هذا العمل الذي يهتم اللغوي، قد لا يهتم المؤرخ للرياضيات. لذلك اخترنا أن نترك جانباً التعابير الغريبة عن لغة الرياضيات بالذات.

ولم يكن ما يدعو للقيام بلائحة للأسماء الواردة في عمل الطوسي لأن الأسماء الوحيدة المذكورة هي أسماء شمس الدين (II - 137,3)، النظامية (II - 137,3)، همدان (II - 137,5) و«الكتاب الثاني» من الأصول لإقليدس (II - 140,4).

نشير إلى أنه عندما تتردد الكلمة غير مرة عبر النص، مع المحافظة على المعنى نفسه، فلن نذكر سوى موقع ورودها في المرة الأولى. كما نشير إلى أن الأرقام التي تقابل الكلمات تشير (من الشمال إلى اليمين) إلى رقم الصفحة ثم إلى رقم السطر في النص (العائد للطوسي)، ويشير الرقم الروماني II إلى القسم الثاني، وفي حالة عدم وجوده يكون المقصود هو القسم الأول. النقاط الثلاث المتتالية، «...» تشير إلى تردد العبارة مرات عدة في الصفحة بعد الموقع المذكور.

(ملاحظة: رأينا من الأفضل ذكر ما يقابل بعض التعابير باللغة الفرنسية، وذلك كما أوردها المؤلف الذي حقق النص ونقله إلى الفرنسية. (المترجم)).

principe (de la question)	أصل (أصل السؤال) 39,1
ألف	
composé de	- مؤلف من 25,8 ؛ 30,12
بدل	
par permutation	- بالتبديل 21,4
برهن	
la démonstration	- البرهان 2,8 ؛ 131,9 II ؛ 133,2 ؛ 135,8 ؛ 139,1 ؛ 140,14 ؛ 143,3,9
objet d'une recherche démonstrative	- المطلوب البرهاني 146,5
surface latérale du cône	- بسيط المخروط 2,13 ؛ 5,11 ؛ 131,1 II

بطل

– أبطل 50,15 ؛ 52,3 ؛ 70,1 ؛ 71,8 ؛ 89,9 ؛ 91,17 ؛ 92,1 ؛ 93,19
115,12,19 ؛ 114,7 ؛ 112,10 ؛ 104,6 ؛ 102,11

بعد النقطة 57,8 ؛ 108,11 ؛ 133,4 ؛ 137,7

بعد الخط 130,11 II

بقي 7,10 ؛ 9,4 . . . ؛ 11,1 ؛ 13,1 ؛ 25,4 ؛ 30,9 ؛ 32,19 ؛ 35,3,16 ؛ 36,7 ؛ ...

بقية 29,14 ؛ 30,1 ؛ 35,12 ؛ 36,2 . . . ؛ 46,9 ؛ 55,14 ؛ 56,12 ؛ 65,14 ؛ 66,2 ؛ ...

البقية العظمى 40,7 II ؛ 57,2

تحت

– التثنت 2,8 ؛ 18,8 ؛ 21,8 ؛ 24,10 ؛ 25,10 ؛ 31,11 ؛ 34,3 ؛ 41,12 ؛ 58,1 ؛ 69,1 ؛ ...

ثني

– مثناة (بالتكرير) 24,4

– المستثنى 9,7,8 II ؛ 30,9 ؛ 31,18 ؛ 44,20 ؛ 46,9

جبر 9,7 II ؛ 67,14 ؛ 96,10 ؛ 101,1

– الجبر والمقابلة 2,3

– فبعد الجبر 12,13 II

– فبعد الجبر والزيادة 57,8 II

– فبعد الجبر والمقابلة 69,5 II ؛ 121,7 ؛ 124,16
126,17

جدول 2,6

جذر (جذور) 16,5 ؛ ... ؛ 17,1

الأجذار 44,10 ؛ 52,8

بجذر ولا جذر 34,4 ؛ 41,14 ؛ 42,1 ؛ 49,6 ؛ 51,9 ؛ 59,16 ؛ 78,7

الجذر السطحي، الجذور السطحية 15,15 ؛ 16,2 ؛ 17,9 ؛ 18,13 ؛ 19,1 ؛ 20,14
37,6 ؛ 38,4

الجذر الجسمي، الجذور الجسمية 16,2 ؛ 17,12 ؛ 19,4 ؛ ... ؛ 20,5 ؛ ... ؛ 36,12
37,6 ؛ 38,3,11

الجذر الخطي 15,14 ؛ ... ؛ 17,7

جسم

– مجسم 15,13 ؛ 16,1 ؛ ... ؛ 18,4

– المجسم الأعظم 47,10 II ؛ 48,1

جمع 2,8 ؛ 13,14 ؛ 24,13 ؛ 39,4 ؛ 45,14 ؛ 77,9 ؛ 94,19 ؛ 95,1 ؛ 116,6
12,7 II ؛ 21,10 ؛ 29,9 ؛ 89,3 ؛ 97,13 ؛ 103,8,10 ؛ 123,6 ؛ 126,14

جمل

expression - الجملة 55,5.

somme II 88,8; 98,17; 99,4.

le carré tout entier - جملة مال 72,20.

la ligne tout entière - جملة الخط 11,15 II.

tout ce qu'il fallait - جملة الواجب 16,15 II.

جنب

diamètre transverse - المجانب 3,8 ; 6,14 ; 7,1... ; 11,8,19 ; 12,1 ; 13,4 ; 14,2,6 ; 47,8 ; 67,2 ; 87,7... .

côté - الجانب 5,6 108.

membre 109,9...; 111,2; II 30,9,12; 31,18,20; 37,5...; 38,9; 43,7;... .

جهل

inconnu - مجهول 31,2,5 ; 85,4 ; 16,9 II.

solution - جواب 33,10 ; 34,1 ; 35,3 ; 38,15.

la plus grande solution - الجواب الأعظم 10,5 II ; 48,10 ; 67,19 ; 70,11 ; 76,13 ; 104,13 ; 127,14.

la plus petite solution - الجواب الأصغر 10,6 II ; 46,14 ; 48,20 ; 70,13 ; 76,15 ; 104,15 ; 127,16.

حدث

se former - حَدَثَ 2,12 ; 3,14 ; 5,9.

engendrer, former - أحدث 6,14 ; 7,6 ; 11,19 ; 131,12 II.

produit (section, surface...) - الحادث 131,2 II ; 135,17.

حدد

à une limite - إلى حدّ 34,16 II.

حذو

parallèlement - بحذاء 26,15 ; 42,15 ; 50,14 ; 52,3 ; 58,17 ; 64,19 ; 78,18 ; 104,4 ; 112,12 ; 114,10 ; 115,16.

être parallèle - حاذى 34,6,9 ; 51,12 ; 52,8 ; 56,1... ; 58,14 ; 59,6 ; 65,18 ; 70,2,19 ; 71,5.

حرف

trapèze - المنحرف 137,8 II... ; 138,17... ; 141,11... ; 142,9....

حسب

calculs - حسابات 143,2 II.

calcul, arithmétique - الحساب 2,6 ; 143,4 II.

se décomposer	حلل - انحَلَّ إلى II 10,16 ؛ 141,1 .
courbe	حنى - المنحني (الخطَّ) II 131,1 .
entourer	حوط - أحاط II 137,8 .
périmètre	- محيط (عِيط القطع ...) ؛ 3,1 ؛ 5,2 ؛ 6,14 ؛ 7,3,18 ؛ 8,2 ؛ 13,5 ؛ 14,4,7 15,5 ؛ ... 22,10 ؛ ... 23,2 ؛
impossible	حول - مستحيل 38,15 ؛ ... 39,1 ؛ 116,7 ؛ II 47,15 ؛ 69,11 ؛ 70,4 ؛ 71,3 ؛ 110,9 .
le problème est impossible	- المسألة مستحيلة 32,12 ؛ 33,9 ؛ II 2,2,9 ؛ 5,2 ؛ 23,4 ؛ 32,7,11 ؛ 34,18 ؛ 35,9 ؛ 40,2 ؛ 49,4 ؛
il est impossible	- يستحيل أن II 64,11 ؛ 108,16 .
le problème devient impossible	- تستحيل المسألة II 19,17 ؛ 78,12 ؛ 106,1 .
impossible	- مُحال II 8,1 .
nécessairement	- لا مُحال II 133,1 .
impossibilité	- استحالة II 23,13 ؛ 49,15 ؛ 51,4,12 ؛ 65,5 .
cône	خرط - المخروط 2,12 ؛ ... 3,3 ؛ 4,6 ؛ 6,11 ؛ 7,6 ؛ 11,17,19 ؛ II 130,13 ؛ 131,1
propriété	خصص - خاصية 61,21 ؛ 62,3 ؛ 82,16 ؛ II 102,18 ؛ 106,12 .
ce qui appartient en propre au solide	- خاصية المجسم II 29,13,15 ؛ 30,8 ؛ 31,3 ؛ 36,10,17 ؛ 38,5 ؛ 44,6 ؛ 45,14 ؛ 53,5,14 ؛ 55,7 ؛ 56,1 ؛
ce qui appartient en propre au nombre	- خاصية العدد II 79,11 ؛ 80,18 ؛ 95,18 ؛ 96,1 ؛ 110,8 ؛ ... 120,16 ؛ 121,1 .
ce qui appartient en propre à la diminution	- خاصية نقصان II 102,17,18 ؛ 103,8 ؛
appartenir en propre	- يُخصَّص (المجسم) II 8,12 ؛ 9,3 ؛ 11,8 ؛ 29,5 ؛ ... 36,3 ؛ 53,1 .
ordonnée	- خطَّ الترتيب، خطوط الترتيب 3,1 ؛ 4,2 ؛ ... 7,1 ؛ 9,11 ؛ 10,6 ؛ 40,14,15 ؛ 47,9 ؛ 56,19 ؛ 67,3 ؛ 68,4 ؛
ligne droite	- خطَّ مستقيم 8,3 ؛ 9,1 ؛ 10,1,2 ؛ 76,8 ؛ II 133,1 ؛ 134,5 ؛ 135,8 .
absurde	- خُلف 4,8 ؛ 10,8 ؛ 15,6 ؛ 40,12,17 ؛ 108,15 ؛ II 7,20 ؛ 63,13 ؛ 64,11,18 ؛ 73,18 ؛ 77,6,10 ؛ 135,6 .
contradiction	95,3.
cercle	دائرة 3,15 ؛ 7,6 ؛ 40,4 ؛ ... II 130,9 ؛ 131,13 ؛ 138,9 .

disparaître, s'en aller avec (réduction des termes semblables) 126,16 ؛ 123,7 ؛ II 17,9

sommet (d'un cône, d'une section...) رأس (رأس المخروط، رأس القطع...) 4,2 ؛ ...3,3 ؛ 40,4 ؛ 22,6,7 ؛ 15,4 ؛ 13,4,7 ؛ 11,19 ؛ 7,2,19 ؛ 5,1

ربع

carré مربع 4,2 ؛ 7,2 ؛ 9,7 ؛ 10,6 ؛ 11,1 ؛ 13,7 ؛ 15,2 ؛ 17,7 ؛ 18,3,6 ؛ 19,1 ؛ 20,4 ؛ ...

رتب

rang مرتبة 15,14 ؛ 25,10,11 ؛ 26,2 ؛ 27,4 ؛ 28,1 ؛ 29,3 ؛ 30,1 ؛ 34,3 ؛ ...

réduire à رد إلى 42,10 ؛ 50,6 ؛ 52,1 ؛ 58,9 ؛ 65,3,19 ؛ 70,2 ؛ 71,9 ؛ 80,15 ؛ 82,4 ؛ 89,5 ؛ ...

دفع

hauteur ارتفاع 15,13 ؛ 16,1,3 ؛ 17,10 ؛ 18,4 ؛ 19,3 ؛ 20,5 ؛ 39,9 ؛ 66,5 ؛ ...

plus élevé أرفع (اسم تفضيل) 26,2 ؛ 27,4,10 ؛ 28,12 ؛ 42,4 ؛ 43,8 ؛ 44,2 ؛ 45,3 ؛ 46,3 ؛ ...

de rang plus élevé مرفوع 56,8 ؛ 60,9 ؛ 65,11 ؛ 80,13 ؛ 81,18 ؛ 90,14 ؛ 103,2 ؛ 113,11,19 ؛ ...

de rang plus élevé مرتبة مرفوعة عن 80,5

disparaître (le nombre) يرتفع العدد 27,1 ؛ 43,5 ؛ 70,13 ؛ 79,11 ؛ 101,11 ؛ 14,15 ؛ II

composer (une équation) ركب 23,19 ؛ II 25,20 ؛ 28,6,8

composé de مركب من 27,14 ؛ 35,6 ؛ 44,6 ؛ 61,1 ؛ 72,3 ؛ 82,16 ؛ 84,16 ؛ ...

105,20 ؛ II 16,21 ؛ 53,13 ؛ ...

par composition فبالتركيب 107,2 ؛ II 7,7,14

ركز

centre du cercle مركز (الدائرة) 49,16 ؛ II 63,3 ؛ 132,13

centre de la section مركز (القطع) 131,4 ؛ II 141,9

angle زاوية 2,15 ؛ 3,9 ؛ 4,11 ؛ 5,11 ؛ 6,8 ؛ ...

ajouter à زاد على 26,18 ؛ 29,4 ؛ 31,8 ؛ 35,7 ؛ 36,4 ؛ 42,17 ؛ 43,1 ؛ 47,18 ؛ 50,13 ؛ 51,1 ؛ ...

ajouter à زاد في 9,8 ؛ 51,9 ؛ II 133,11 ؛ 134,10

excédent, augmentation, ajout زيادة 35,13 ؛ 36,3,7 ؛ 47,18 ؛ 54,11 ؛ 73,21 ؛ 74,9 ؛ ...

9,8 ؛ II 17,9 ؛ 36,12 ؛ 44,20 ؛ ...

سأل

problème مسألة 2,6 ؛ 16,4 ؛ 17,2 ؛ 18,1 ؛ 20,1,2 ؛ 21,1,2 ؛ 22,1 ؛ 24,15 ؛ ...

question السؤال 17,4 ؛ 18,2,6 ؛ 19,1,5 ؛ 20,8 ؛ 21,6,7 ؛ ...

nombre cherché العدد المطلوب 105,13 ؛ 6,14 ؛ II 8,6,10 ؛ 10,1 ؛ 12,6 ؛ ...

14,18 ؛ 15,4 ؛ 18,7 ؛ 23,10 ؛ 27,1 ؛ ...

nombre en question مسؤول عنه 41,11 ؛ II 23,13

les carrés en question الأموال المسؤولة 45,9 ؛ II 76,12

plan	سطح ... 2,12 ؛ 3,12 ؛ 4,4 ؛ 5,10 ؛ 6,6 ؛ 7,5 ؛ 11,18 ؛ ...
rectangle	- مسطح 20,7,18 ؛ 27,15 ؛ 28,18 ؛ 29,2 ؛ 31,6 ؛ 35,5,6 ؛ 36,5 ... 37,11 ؛ 44,7 ؛ 45,18,20
mettre en ligne	- وضعناه مسطحاً (حال) 73,3,4 ؛ 74,4,5 ؛ 75,10,11
surface du point	- سطح النقطة II 134,16
ligne d'un tableau	سطر 26,15 ؛ 27,1 ؛ 28,16,17 ؛ 29,2,5 ؛ 34,7 ؛ 35,2,11 ... 36,6 ؛ 42,15 ؛ 43,1 ؛ 45,15 ؛ 51,5
	سقط
négliger	- أسقط 25,4 ؛ 30,9 ؛ 76,16 ؛ II 6,10 ؛ 24,10 ؛ 30,11 ؛ 37,4 ؛ 43,14
homonyme	سمي 25,11 ؛ 26,2 ؛ 27,4,10 ؛ 28,2 ؛ 41,14 ؛ 42,1 ؛ 43,8 ؛ 44,2 ؛ 45,17 ؛ 46,4 ؛ 49,6,7 ؛ 50,2 ؛ ...
axe	سهم 2,12 ؛ 3,6,16 ؛ 22,6 ؛ 23,1 ؛ 40,5,19 ؛ 47,6,8 ؛ 48,15 ؛ 56,18,19 ؛ 57,1,6 ؛ ...
les deux côtés du triangle	ساقا المثلث 2,13 ؛ 3,9 ؛ 5,13 ؛ 11,9 ؛ 13,2 ؛ II 130,5
	سوى
par égalisation	- بالمساواة 37,1
	شرك
intersection	- المشترك (الفصل) 2,3 ؛ 4,6,8 ؛ 7,8
commun	- المشترك 25,4 ؛ 30,9 ؛ 32,19 ؛ 76,16 ؛ 87,9 ؛ 98,2 ؛ 108,20,21 ؛ ...
avoir en commun avec	- يُشارك II 84,16
proposition, figure	شكل 2,11 ؛ 7,9 ؛ II 140,14 ؛ 143,2,9
chose	شيء 31,2 ؛ 75,14 ؛ ...
possibilité	صفة 32,5,10
existence vraie	- صحيح الوجود 38,15
pour que le problème soit possible	- تصح المسألة II 71,16 ؛ 72,6 ؛ 75,5 ؛ 78,14 ... 84,2 ؛ 88,13 ؛ 89,5,20 ؛ 106,2 ؛ 115,15
	صغر
la petitesse (limite dans)	- الصغر II 63,2
zéro (pour marquer les places affectées de racines)	صفر 25,11 ؛ 26,14 ؛ 34,4 ؛ 41,13 ... 49,5 ؛ 50,12 ؛ 51,10,11 ؛ 58,1 ؛ 69,1 ؛ 71,4 ؛ ...
	صمم
irrationnel	- أصم 15,15
figure	صورة، صور 25,12 ؛ 26,1 ؛ 27,1 ؛ 28,4 ؛ 29,8,15 ؛ 31,12,13 ؛ 34,5,9 ؛ 35,2 ؛ 42,2 ؛ ...
multiplier, multiplication	ضرب 4,1 ؛ 7,1 ؛ 9,6 ؛ 10,5 ؛ ...

le produit	- ضربة 42,14 ؛ 43,4 ؛ 45,8 ؛ ... 50,14 ؛ 51,4 ؛ 53,13 ؛ ...
	... 54,10 ؛ 55,9 ؛ 58,17 ؛ 59,5
nécessairement	- ضرورة 23,11 ؛ 32,5 ؛ 53,5,6 ؛ 57,5 ؛ 66,16 ؛ II 1,11 ؛ 19,12 ؛ 143,8 ؛ 115,6 ؛ 83,15 ؛ 73,14 ؛ 67,15 ؛ 51,2
nécessaires	- ضرورة II 143,10
côté (d'un polygone c. droit d'une section conique, racine d'un nombre...)	- ضلع 3,2 ؛ 4,1 ؛ 5,4 ؛ 5,11 ؛ 13,7 ؛ 15,2 ؛ 17,7 ؛ 22,6 ؛ 24,10 ؛ 25,1,2 ؛ 30,6 ؛ 32,17 ؛ ...
côté d'un point	- ضلع النقطة II 133,5 ؛ 135,7,8
coïncider	- طابق 3,14 ؛ 5,9 ؛ 6,4 ؛ 11,16
extrême (d'une proportion continue)	- طرف II 65,2,3 ؛ 57,11
	طلب
le plus petit nombre cherché (la petite racine)	- المطلوب الأصغر II 18,10,14 ؛ 29,1
	... 31,1,3 ؛ 32,4 ؛ 42,1 ؛ 44,1 ؛ 45,11 ؛ 48,11 ؛ 60,8 ؛ 66,9 ؛ ...
le plus grand nombre cherché (la grande racine)	- المطلوب الأعظم II 27,1 ؛ 29,1
	... 30,15 ؛ 44,1,3 ؛ 47,16 ؛ 58,6 ؛ 67,8 ؛ 72,11,12 ؛ 75,7,9 ؛ 84,6 ؛ ...
	عدد
le plus grand nombre (le maximum)	- العدد الأعظم II 18,7 ؛ 32,6 ؛ ... 33,6
	... 40,1 ؛ 44,18 ؛ 45,2 ؛ 48,3 ؛ 58,2 ؛ ... 66,10 ؛ 67,4 ؛ ...
	عدل
équation, égalité	- المعادلة II 89,16 ؛ 16,3
	علل
cause	- العلة 65,20
	علم
le gnomon plan	- العلم المسطح II 20,1
le gnomon solide	- العلم المجسم II 19,12 ؛ 20,2 ؛ ... 23,1
le gnomon intérieur	- العلم الداخل II 29,11 ؛ 36,3 ؛ ... 37,1 ؛ 38,4 ؛ 44,6 ؛ ...
	... 46,1 ؛ 120,9 ؛ ... 124,2
le gnomon extérieur	- العلم الخارج II 29,15 ؛ 36,2 ؛ ... 38,4 ؛ 44,8 ؛ ... 45,14
	... 46,3,8 ؛ 120,7 ؛ ... 124,1
perpendiculaire	- عمود 3,1,10 ؛ 4,4 ؛ ... 5,2 ؛ ... 6,2,3 ؛ 7,3 ؛ ... 8,4 ؛ ...
	غير
l'infini	- غير النهاية II 132,11,12 ؛ 8,2 ؛ 6,11,12
indéfiniment	- يغير نهاية 40,18 ؛ 76,12 ؛ 108,4

	فرد
binômes	- مفردة 16,15,16
tout seul	- مفرد 46,10,11
	فرض
supposer ...	- فرضنا 50,3 ؛ 49,19 ؛ 23,11 ؛ II 17,20 ؛ 99,5 ؛ 94,19 ؛ 66,18 ؛ 40,6 ؛ 9,20 ؛ 8,4
donné	- مفروض 67,1 ؛ 57,15 ؛ 24,2 ؛ 22,4 ؛ 15,12 ؛ 14,4 ؛ 12,2 ؛ 11,8 ؛ 5,4,12
	فصل
par séparation	- فبالفصل 107,11
	فضل
l'excédent, la différence	- الفضل 16,8 ؛ 12,7 ؛ 8,11 ؛ 6,14 ؛ 5,14 ؛ II 2,15 ؛ 32,15 ؛ 31,4 ؛ 29,6 ؛ 27,2
la différence	- التفاضل II 53,11
	فوت
le nombre de l'écart	- التفاوت (عدد) 18,11 ؛ ... 15,2 ؛ ... 12,5 ؛ 9,4 ؛ II 8,11 ؛ 31,1 ؛ ... 30,8 ؛ 29,2,8
	قبل
en face de	- في (إلى) مقابلة 101,20 ؛ 71,16 ؛ 51,15 ؛ 50,8
correspondant	- المقابل 52,17 ؛ 51,10 ؛ 44,13 ؛ 35,8 ؛ 30,1 ؛ 29,12,16 ؛ 28,2 ؛ 56,1 ؛ 55,2 ؛ 53,6
réduire l'un par l'autre	- قابل أحدهما بالآخر II 9,8
	قدر
la quantité, de combien	- القدر 62,14,20 ؛ 59,18 ؛ 45,1,4 ؛ 42,12 ؛ ... 28,12 ؛ 80,3 ؛ ... 78,7
de la grandeur de	- بقدر 20,5 ؛ 19,3
grandeur	- المقدار 97,4 ؛ 88,2 ؛ II 36,10 ؛ 83,11
de la quantité de, égal	- بمقدار 36,7 ؛ II 34,7,8 ؛ 74,6 ؛ 73,17 ؛ 69,9 ؛ 54,3 ؛ 36,3,7 ؛ 44,15 ؛ 38,8
	قرب
s'approcher (asymptote)	- قارب, تقارب 86,11 ؛ 67,4,7 ؛ 15,8 ؛ 14,6 ؛ 10,3 ؛ 8,3 ؛ 134,21 ؛ II 133,1 ؛ 107,7 ؛ 97,9,16 ؛ 87,1
plus proche de	- أقرب إلى II 15,11,13 ؛ 83,7 ؛ 67,1,4 ؛ 15,1 ؛ 14,5
voisin de (nombre)	- قريب من II 15,10
	قرن
polynôme	- مقترنة 24,13 ؛ 16,15

diviser de sorte que	قسَمَ قسمةً II 34,16 § 51,5
diviser en	قسَمَ بـ 141,14 § 138,10 § 134,7 § 133,9 § 130,7 § II 108,4 § 32,12,14 § 9,5,7 § 5,5,5
diviser par	قسَمَ على 15,6 § II 10,19,20 § 85,16 § 84,8 § 64,16 § 46,1
être divisé	انقسمَ (بـ إلى) 2,8 § II 1,12 § 96,17 § 77,5 § 48,20 § ... 32,5
	... 11,3 § 6,4 § 5,19 § 4,2 § 3,19
partie	القسم 10,8 § II 5,20 § 108,6 § ... 95,7 § ... 56,2 § ... 55,1 § 54,14 § ... 32,4
la division ...	القِسْمَةُ 106,14 § 103,12 § 85,9 § 81,15 § 59,16 § 46,2,9 § 44,8 § 35,9 § 28,10,11
dividende	مقسوم 113,9 § 103,11 § 102,20 § 81,8 § 80,2
diviseur	مقسوم عليه 102,19 § 81,7 § 80,1 § 59,15 § 43,11 § 35,9 § 34,5 § 28,11 § 27,7,12
diamètre	قطر 40,17 § 15,7 § 10,1 § 8,4 § ... 7,2 § 6,14 § 5,1 § ... 4,2 § 3,1,6 § 2,17
la section	القطع 97,18 § 47,7 § 40,16 § ... 8,2 § ... 7,2 § ... 4,2 § ... 3,1 § 2,16,17
hyperbole	القطع الزائد 47,7,13 § 15,4 § 14,1 § 13,3 § 12,1 § 11,8,19 § 7,18 § 6,14 § 3,3,7
parabole	القطع المكافئ 57,2 § 56,17 § ... 47,6 § 40,4 § 22,5,6 § 5,4,11 § 3,3,15
	... 68,4 § 67,3,6 § 66,13
ellipse	القطع الناقص 3,4
base	قاعدة 66,5 § 18,4 § 16,1 § 15,13 § 11,17 § 6,12 § ... 4,5 § 3,4,10 § 2,14
loi (règle)	قانون 57,13 § II 85,17 § 74,18 § 46,8
arc	قوس 138,10 § II 76,10
mesure	كسر 141,6 § ... 140,2 § ... II 139,15
cube	المكعب (المكعبات) 16,3 § ...
cube	كعب (الكعاب) 44,2 § ... 43,8 § ... 42,4 § 41,13 § 39,4 § 37,8 § 36,11 § 24,13
retrancher	لقي 54,1,8 § 46,9 § 45,4 § 41,17 § 20,8 § 9,9 § 6,16 § 4,3 § II 2,16 § 32,19
être tangent à	مسس 76,8 § 40,5
carré plan	مول 38,11,14 § 37,6,9 § 36,13 § 20,13,19 § 19,8 § 18,7,13 § 16,1 § 15,16
carré solide	مال جسمي 38,3,11 § 37,5,8 § ... 36,11 § ... 20,6 § 19,4,12 § 18,6,7 § 16,1
carré	مال (الأموال) 16,2 § ...

moins élevé	... 55,18 53,1,2 52,8,16 44,3,14 29,17 28,4 27,11	نزل - أَتَزَلَّ (اسم تفضيل)
rapport	... 19,6 10,13 9,12 4,16	نسب
rapport composé	... 22,9,11 21,5,7 7,9 4,12 ... II 3,9	- النسبة المولفة II 3,9
en proportion (proportionnel)	... 84,14 24,3 22,3	- متناسبة 22,3 24,3 84,14
partager en deux	II 51,16 30,5 24,16 5,7	نصف 5,7 24,16 30,5 II 51,16
rationnel	15,15	نطق - مُتَنَطَّق 15,15
soustraire	... 42,13 36,5,7 35,3 34,6 29,2 28,7 26,12,13	نقص 26,12,13 28,7 29,2 34,6 35,3 36,5,7 42,13 ...
soustraction	63,13 54,4,10 51,17 46,14 36,1 35,13 29,6 28,9	- نقصان 28,9 29,6 35,13 36,1 46,14 51,17 54,4,10 63,13 ...
point	... 5,2 4,4 3,7,15	نقطة 3,7,15 4,4 5,2 ...
déplacer	... 35,1 34,10 30,1 29,10 28,13,16 26,6	نقل ... إلى 26,6 28,13,16 29,10 30,1 34,10 35,1 ...
limite (dans la grandeur et la petitesse)	73,12 II 63,1	نهاية (في العظم والصغر) II 63,1 73,12
aboutir à	... 49,6 48,11 47,16 42,9 41,14 26,6 23,2,4 22,10 5,2	انتهى إلى 5,2 22,10 23,2,4 26,6 41,14 42,9 47,16 48,11 49,6 ...
géométriques	II 143,4	هندس - الهندسية II 143,4
corde	II 138,9	وتر II 138,9
unité solide	24,2,7 20,9 19,5,13 18,5 17,11 15,13	وحدة - الواحد الجسمي 15,13 17,11 18,5 19,5,13 20,9 24,2,7
unité linéaire	20,4 19,4 18,4,12 17,3 16,1,3 15,11	- الواحد الخطي 15,11 16,1,3 17,3 18,4,12 19,4 20,4
unité plane	36,17,18 20,19 19,2 18,2 17,5 15,12	- الواحد السطحي 15,12 17,5 18,2 19,2 20,19 36,17,18
parallélogramme	66,5 46,17 39,8 38,4 37,7,10	وزي - متوازي الأضلاع II 137,7 33,1,5
ligne intermédiaire	78,15 71,7 70,1 69,13 60,10 59,1 58,15	وسط - أوسط (سطر) 58,15 59,1 60,10 69,13 70,1 71,7 78,15 ...
moyenne proportionnelle	99,7 98,5 97,13 86,14 77,1 66,7,17	- وسط (في النسبة) 66,7,17 77,1 86,14 97,13 98,5 99,7
proposition intermédiaire	II 143,6,8	- المتوسطة II 143,6,8

المراجع

١ - العربية

كتب

ابن أبي أصيبعة، أبو العباس أحمد. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. شرح وتحقيق نزار رضا. بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٦٥.

ابن باجة، أبو بكر محمد بن يحيى. رسائل فلسفية لأبي بكر بن باجة: نصوص فلسفية غير منشورة. [تحقيق] جمال الدين العلوي. بيروت: دار الثقافة، ١٩٨٣.

ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. حققه احسان عباس. بيروت: [د.ن.]، ١٩٧٧. ٨ج.

ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا. معجم مقاييس اللغة. بتحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٣٦٦ - ١٣٧١هـ. ٦ج.

الإقليدسي، أبو الحسن أحمد بن إبراهيم. الفصول في الحساب الهندي. تحقيق أحمد سعيدان. [عمّان]: اللجنة الأردنية للتعريب والنشر والترجمة، ١٩٧٣. (تاريخ علم الحساب العربي؛ ج٢)

الخيتام، عمر. رسائل الخيتام الجبرية. حققها وترجمها وقدم لها رشدي راشد وأحمد جبّار. حلب: معهد التراث العلمي العربي، ١٩٨١. (مصادر ودراسات في تاريخ الرياضيات العربية؛ ٣)

راشد، رشدي. تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب. ترجمة حسين زين الدين. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٩. (سلسلة تاريخ العلوم عند العرب؛ ١)

السبكي، تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي. طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. القاهرة: [د.ن.]، د.ت.].

السموأل بن يحيى بن عباس المغربي. الباهر في الجبر. تحقيق وتحليل صلاح أحمد ورشدي راشد. دمشق: جامعة دمشق، ١٩٧٢. (سلسلة الكتب العلمية؛ ١٠)

الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك. كتاب الوافي بالوفيات. فيسبادن: فرانز شتاينر، ١٩٧٤. (النشرات الإسلامية؛ ج ٦، ق ١)

طاشكيري زاده، أبو الخير أحمد بن مصطفى. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور. القاهرة: [د.ن.]، ١٩٦٨.

القفطي، أبو الحسن علي بن يوسف. تاريخ الحكماء، وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب اخبار العلماء بأخبار الحكماء. تحقيق يوليوس ليرت. ليبزج: [ديترينج]، ١٩٠٣.

الكاشي، غياث الدين جمشيد بن مسعود. مفتاح الحساب. تحقيق أحمد سعيد الدمرداش ومحمد حمدي الحفني الشيخ؛ مراجعة عبد الحميد لطفي. القاهرة: [د.ن.]، ١٩٦٧.

مخطوطات

ابن أسلم، أبو كامل شجاع (نسب خطأ). رسالة في الجبر والمقابلة. مخطوطة آستان قدس، مشهد، ٥٣٢٥.

ابن الهائم، أبو العباس شهاب الدين أحمد. الممتع في شرح المقنع في علم الجبر والمقابلة. استنبول: مخطوطة شهيد علي باشا، رقم ٢٠٧٦.

أبولونيوس. المخروطات. استنبول: مخطوطة آياصوفيا، ٢٧٦٢.

الأصفهاني، ميرزا علي محمد. تكملة العيون. مخطوطة جامعة طهران، رقم ٣٥٥٢.

إقليدس. الأصول.

_____. ترجمة حنين بن اسحق. هانت ٤٣٥، مكتبة بودلين.

بطليموس. المجسطي. ترجمة الحجاج. مخطوطة ليدن، شريات ٦٨٠.

_____. ترجمة حنين بن اسحق؛ تنقيح ثابت بن قرة. تونس: ٥٧١٦.

الخلاطي. نور الدلالة في علم الجبر والمقابلة. مخطوطة دنشكاه، جامعة طهران، رقم ٤٤٠٩.

- الرازي، فخر الدين. مناظرات العالم الرازي. حيدر آباد، أوك ١٣٦، سلارجانك.
- السلمي، أبو الحسن علي أبو المسلم بن محمد بن الفتح. المقدمة الكافية في حساب الجبر والمقابلة وما يعرف بقياسه من الأمثلة. الفاتيكان: مخطوطة سباط، رقم ٥.
- السموأل بن يحيى بن عباس المغربي. القوامي في الحساب الهندي. Mss. Medicea Laurenziana, Orient, 238.
- الفارسي، كمال الدين أبو الحسن. أساس القواعد في أصول الفوائد. استنبول: مخطوطة شهيد علي باشا، ١٩٧٢.
- الكاشي، يحيى بن أحمد. إيضاح المقاصد في شرح أساس الفوائد. استنبول، جار الله، ١٤٩٤.
- . إيضاح المقاصد لفوائد الفوائد. استنبول: مخطوطة جارا، ١٤٨٤.
- المارديني، شمس الدين. نصاب الخبر في حساب الجبر. استنبول: مخطوطة فيض الله، ١٣٦٦.
- اليزدي، محمد بن باقر. عيون الحساب. استنبول: مخطوطة هازيناسي، ١٩٩٣.

٢ - الأجنبية

Books

- Archimède. *Commentaires d'Eutocius, fragments*. éd. Ch. Mugler. Paris: Les Belles lettres, 1972.
- Becker, Oskar. *Das Mathematische Denken der Antike*. Göttingen: Vandenhoeck V. Ruprecht, 1966. (Studienhefte zur Altertumswissenschaft; Heft 3)
- Brockelmann, Carl. *Geschichte der Arabischen Literatur*. Leiden: E.J. Brill, 1937.
- Clagett, Marshall (ed.). *Archimedes in the Middle Ages*. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1964 - 1980.
- Diophante. *Les Arithmétiques*. Etabli et traduit par R. Rashed. Paris: Les Belles lettres, 1984.
- Fermat, Pierre de. *Œuvres de Fermat*. Publiées par les soins de mm. Paul Tannery et Charles Henry, sous les auspices du ministère de l'instruction publique. Paris: Gauthier - Villars et fils, 1891 - 1896.
- Folkerts and Lindgren. *Festschrift für Helmuth Gericke*. Stuttgart: [n.pb.], 1985. (Reiche «Boethius»; Bd. 12)
- Girard, A. *L'Arithmétique de Simon Stevin de Bruges*. Leiden: [s.n.], 1625.
- Heath, Th. *Euclid's Elements*. Dover: [n. pb.], 1956.
- . *A History of Greek Mathematics*. Oxford: [n. pb.], 1921.

- Itard, J. *Essais d'histoire des mathématiques*. Réunis et introduits par R. Rashed. Paris: Blanchard, 1984.
- Montucla, Jean Etienne. *Histoire des mathématiques*. Nouvel tirage augmenté d'un avant-propos par Ch. Naux. Paris: A. Blanchard, 1960.
- Rashed, Roshdi. *Entre arithmétique et algèbre, recherches sur l'histoire des mathématiques arabes*. Paris: Les Belles lettres, 1984. (Collection sciences et philosophie arabes)
- Schoy, Carl. *Die Gnomonik der Araber*. Berlin: W. de Gruyter, 1923. (Die Geschichte der Zeitmessung under der Uhren; Bd. 1, Lfg. F)
- Suter, Heinrich. *Die Mathematiker und Astronomen der Araber und Ihre Werke*. Leipzig: B.G. Teubner, 1900.
- (Abhandlungen zur Geschichte der Mathematischen Wissenschaften Mit Einschluss Ihrer Anwendungen; 10. hft)
- Volume of Bīrūnī International Congress in Tehran*. Tehran: [n. pb.], 1976.
- Woepcke, Franz. *L'Algèbre d'Omar AlKhayyāmī*. Paris: [s.n.], 1851.
- Youschkevitch, A.P. *Les Mathématiques arabes (VIII^e - XV^es.)*. Paris: [s.n.], 1976.

Periodicals

- Arabic Sciences and Philosophy*: vol. 5, no. 2, September 1995.
- Anbouba, Adel. «Sharaf al-Dīn al-Ṭūsī.» *Dictionary of Scientific Biography*: 1976.
- Bachmakova, I. G. «Les Méthodes différentielles d'Archimède.» *Archive for History of Exact Sciences*: vol. 2, no. 2.
- Rashed, Roshdi. «L'Extraction de la racine numérique et l'invention des fractions décimales (XI^e - XII^e siècles).» *Archive for History of Exact Sciences*: vol. 18, no. 3, 1978.
- . «L'Idée de l'algèbre chez al-Khwārizmī.» *Fundamenta Scientiae*: vol. 4, no. 1, 1983.
- . «Résolution des équations numériques et algèbre: Sharaf Al dīn al Ṭūsī - Viète.» *Archive for History of Exact Sciences*: vol. 12, no. 3, 1974.
- . «Un problème arithmético - géométrique de Sharaf al-Dīn al-Ṭūsī.» *Journal for the History of Arabic Science*: vol. 3, no. 2, Alep 1978.

فهرس

- أ -

- ابن يونس، كمال الدين: ١٨، ٦١، ٦٢
 أبو كامل (شجاع بن أسلم): ٨
 أبولونيوس: ٣٩، ٧٦، ٨٥، ٢٤٢، ٢٥٣، ٢٥٤
 أبيقراط الكيوسي: ٢٥٥
 الإحداثيات السينية: ١٨٨، ٢٠٣، ٢٠٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٥، ٢٣١، ٢٣٣، ٢٤١، ٢٣٩
 أرخميدس: ٣٥، ٥٠
 أرشيتاس: ٢٥٦
 الاسطرلاب الخطي انظر عصا الطوسي
 الأشكال الهندسية: ٣٥
 الأصفهاني، ميرزا علي محمد بن محمد بن حسين: ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٤٩
 الأعداد الصم: ٢٩، ٤٢
 أفلاطون: ٢٥٦
 إقليدس: ١٨، ٢٦، ٦١، ٦٢، ١٧٩
 الإقليدسي، أحمد بن إبراهيم: ٢٤٣
 الأهوازي: ٧٠
 أوطوقوس: ٥٠، ٢٥٦
 الإبانولوجي، محمد بن مصطفى بن موسى:
 إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة الحراني: ٢٢، ٦٩
 ابن أبي أصيبعة: ١٧، ٦١، ٢٥٦
 ابن باجة: ٢٥٦، ٢٥٧
 ابن الحاجب: ١٧
 ابن خلكان: ١٨، ٦١
 ابن سيد، عبد الرحمن: ٢٥٦، ٢٥٧
 ابن الشكر المغربي الأندلسي، يحيى: ٢٣
 ابن عبد العزيز، موفق الدين: ١٧، ٦١
 ابن عراق، أبو نصر منصور: ٧، ٢٨، ٤٠
 ابن الفتح، سنان: ٢٦
 ابن فلوس: ١٩، ٦٤
 ابن الليث، أبو الجود: ٢٨، ٤٠
 ابن المستوفي، أبو البركات المبارك: ١٨
 ابن مصطفى، أحمد (طاشكيري زاده): ٣١
 ابن منعة، موسى بن يونس بن محمد: ٦٢
 ابن الهائم: ٢٠
 ابن الهيثم، أبو علي محمد بن الحسن: ٢٢، ٤٠، ٦٢، ٦٩، ٨٥، ٢٥٣، ٢٥٦
 ابن يامين، أبو الفضل: ١٧، ٦١

٢٥، ٨٥

إيراتوستين: ٢٥٦

- ب -

باليرم، جان دو: ٢٥٣

برولار: ٥٦

بطليموس: ١٨، ٦٢

البناء الهندسي للمعادلات: ٣٩، ٤٧، ١٧٩،

٢٥٤، ٤٢٢، ٤٢٧، ٤٣٠

البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد: ٧،

٢٨، ٤٠

- ت -

التبريزي، تاج الدين: ٢٠

تثليث الزاوية: ٤٠

التحليل الرياضي: ١٠، ٤٢٧

التحويل الأفيني: ٧، ٢٧، ٣٣، ٣٤، ٤٧،

٥٠، ٥٢، ٦٥، ٦٧، ٩٩، ١٣٦، ١٣٧،

١٨٩، ١٩٢، ١٩٣، ٢٧٨ - ٢٨١، ٢٣٠،

التخت: ٢٤٣، ٢٤٤

التراث العلمي العربي: ١١

تزا، إميليو: ٢٣

تطور الجبر العربي: ٨

التنجيم: ٢٤٣

توسيع تايلور انظر مفكوك تايلور

- ث -

ثابت بن قرة: ١٨، ٢٢، ٢٦، ٦٢، ٦٩،

٢٥٦، ٤٢١

- ج -

الجذر الأصغر: ٢٦٧، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٤،

٢٨٢، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٩٣ - ٢٩٥،

٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠٠، ٣٠٧، ٣١٦،

٣١٨، ٣٢٨، ٣٣١، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٤٥،

٣٤٧ - ٣٥١، ٣٥٢، ٣٦٢، ٣٦٦،

٣٦٧، ٣٦٩، ٣٨٥، ٣٨٧، ٣٨٨،

٣٩١، ٣٩٨، ٤٠٦، ٤٠٧، ٤١٠،

٤١٥، ٤١٦، ٤١٩

الجذر الأكبر: ٢٦٦، ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٩٠،

٢٩٢، ٢٩٤، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٥،

٣١٧، ٣٢٦، ٣٣١، ٣٣٦، ٣٤٣،

٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٦٠،

٣٦٤، ٣٦٥، ٣٨١، ٣٨٣، ٣٨٤،

٣٨٨، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٦، ٤٠٩،

٤١٥، ٤١٨

الجذر التربيعي: ٣٢، ٤٥، ٨٧، ٨٨، ١١٥،

٢٥٥

الجذر التكعيبي: ٣٢، ٤٥، ٨٧، ٨٨، ٩٩،

١١٤، ١١٥، ١٨٧، ٢٥٥

الجذر الجسمي: ١٨١، ٢٥٤

الجذر الخطي: ٢٥٤

الجذر السطحي: ١٨٠، ٢٥٤

الجذر اللامي: ٨٨

الجذر المنطق: ١٣٤

الجذر الموجب: ١٩٢، ١٩٧، ٢١٢، ٢١٧،

٢٢٠، ٢٢٤، ٢٣٠، ٢٣٨، ٢٤٥،

٢٦١، ٢٧٥ - ٢٧٨، ٢٨٠، ٢٨١،

٢٩٤، ٣١٢، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٨،

٣٩٧، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠٥، ٤١٢، ٤١٥

الجذور السالبة: ٢٠٨، ٢١٢، ٢٢٠، ٢٢٤،

٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٨، ٢٧٥، ٢٧٦،

٢٨٠، ٢٨١

الجذور النونية: ٤٥، ٨٧، ٨٨، ٩١، ١١٤،

١١٥، ٢٤٩

جيران، أ.: ٥٥

- ح -

٢٤٣، ٢٤٥، ٢٥٤ - ٢٥٦

- د -

الدالات كثيرة الحدود: ٤٩
الدالات المتناظرة للجذور: ١٩٦، ١٩٧
ديكارت، رينه: ١٦، ٢٩، ٣٩، ٤٠، ٤٣،
٤٤، ٥٦
ديوفنتس الإسكندراني: ٢٠، ٢٦، ٦٤
ديوقليس: ٢٥٦

- ر -

الرياضيات العربية: ١١
الرياضيات الكلاسيكية: ٢٨

- ز -

زين الدين، حسين: ١١

- س -

السبكي، تاج الدين: ١٨، ٦١
السجزي، أبو سعيد أحمد بن محمد بن عبد
الجليل: ٢٥٣
السرجمي: ٨٥
السلمي، أبو الحسن علي أبو المسلم بن محمد
علي بن الفتح: ٢٧، ٤٥
السموأل بن يحيى بن عباس المغربي: ٢٤٤

- ش -

الشالوحي، شكر الله: ١١

- ص -

الصوفي انظر الإيانلوغي، محمد مصطفى بن
موسى

الحارثي، أبو الفضل: ١٧، ٦١، ٦٢

الحجاج: ٢٤٤

الحساب الإصبعي: ٢٤٣

الحساب التقريبي للجذور: ٧

الحساب العددي: ١٠

حساب المثلثات: ٣٠

الحساب الهندسي: ٢٩

الحساب الهندسي: ٢٤٣

الحل الخطي: ١٧٨، ١٧٩

الحل السطحي: ١٧٨، ١٧٩، ١٨١

الحل العددي للمعادلات انظر طريقة روفيني-
هورنر

الحل المجسم: ١٧٨، ١٧٩، ١٨١، ١٨٣

حل المعادلات الكثيرة الحدود: ٩١

حنين بن إسحاق: ٢٤٤، ٤٢١

- خ -

الخازن، أبو جعفر: ٧، ٢٨، ٤٠، ٧٠،
٢٥٦

الخلاطي، عبد العزيز: ١٩، ٦٣، ٦٤

الخوارزمي، محمد بن موسى: ٧، ٨، ٢٦،
٤٠

الخوارزمية (Algorithm): ٨٣، ٩٢، ١١١،
١١٢، ١١٤، ١١٨، ١٢١، ١٣٤

١٣٨، ٢٦١

خوارزمية الطوسي: ١٢٣، ١٢٤

الخيام، عمر: ٧-٩، ١٥، ١٦، ٢٠، ٢٥،

٢٨-٣٣، ٣٥، ٣٩، ٤١-٤٧، ٥٧-

٥٩، ٦٣، ٦٤، ٨٤، ١٧٦، ١٧٧،

٢٠٥، ٢٠٨، ٢١٢، ٣١٣، ٢١٧،

٢٢٠، ٢٢٤، ٢٣٠، ٢٣٨، ٢٤٢

قانون التجانس: ١٨٤، ٢٥٤

القطع الزائد: ٣١، ٤٤، ٥٠، ١٦١، ١٦٥،
١٦٧، ١٦٩ - ١٧٦، ٢٠٥، ٢٠٦،
٢٠٩، ٢١٠، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٦ -
٢١٩، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٥ - ٢٢٧،
٢٣٠، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٧، ٢٣٨،
٢٤١، ٢٥٤، ٢٥٦

القطع الزائد المتساوي الأضلاع: ٤٤، ٦٦،
٨٥، ١٧٣، ٢٠٨، ٢١٢، ٢٢٠، ٢٢٤،
٢٣٠

القطع المكافئ: ٣١، ٤٤، ٥٠، ١٦١ -
١٦٤، ١٨٥، ١٨٧، ١٨٨، ٢٠١،
٢٠٣، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٨ - ٢١٤، ٢١٦،
٢١٨ - ٢٢٢، ٢٢٦، ٢٣٣، ٢٤١،
٢٥٣

القطع الناقص: ١٦١، ١٧٥
القطوع المخروطية: ٤٥، ٤٧، ٥٠، ١٦١،
٢٥٦

القفطي، أبو الحسن علي بن يوسف: ١٧،
٦١، ٢٥٦

القليصادي: ٨

القنبي: ٨٥، ٢٥٣

القوهي، أبو سهل ويجن بن يحيى بن رستم:
٢٢، ٣٥، ٤٠، ٦٩، ٢٥٦

القوى الجبرية: ٢٩، ٤١

الكاشي، غياث الدين جمشيد بن مسعود:
٣٠، ٢٤٩

الكاشي، يحيى بن أحمد: ٣٠

طاشكيري زاده انظر ابن مصطفى، أحمد
(طاشكيري زاده)

طريقة روفيني - هورنر: ١٥، ١٦، ٢٠، ٣٢،
٣٥، ٤٥، ٥٧، ٦٧، ٨٣، ٩١، ٩٢،
١١١، ١٣٣، ١٩٧، ٢٠٠، ٢١٠،
٢١٤، ٢١٨، ٢٢٢، ٢٢٧، ٢٣٣،
٢٤١، ٢٤٥، ٢٥٥، ٢٦١

الطوسي، نصير الدين: ٢٥، ٦٨، ٦٩، ٨٥

العدد الأعظم: ٣٤، ٣٥، ٤٨

عصا الطوسي: ٤٣، ٦٥، ٦٨

علاق، عبد الكريم: ١١

العلم العربي - الإسلامي: ٢٤٥

علم الفلك: ٨٦، ٤٢١

علم المثلثات: ٤٢

علم الهيئة: ١٨

العلوم الرياضية: ١٧

عمل المسح في الدائرة: ٤٠

فارس، حبيب: ١٣

فارس، نقولا: ١٣

الفارسي، كمال الدين: ٣٠، ٣١

فزانيني، جوزيبي: ٢٣

فيرما، ب.: ١٠، ٣٥، ٣٩، ٤٠، ٤٤،

٤٩، ٥١، ٥٣ - ٥٧، ٢٥٦

فيت: ٢٥٤

المعادلات الكثيرة الحدود: ٤٥، ٩٢، ١١٠،	كثيرات الحدود: ٢٩، ٤١
١١٢، ١٧٦	الكرجي، أبو بكر محمد بن حسن: ٨، ٢٦،
المعادلة التكميلية: ٤٠ - ٤٢، ٤٥ - ٤٧، ٥٩،	٢٥٤، ٦٤، ٢٧
٨٧، ٩٢، ٩٤، ١١٧، ٢٥٥	كلاغيت، مارشال: ٢٥٣
معادلة الدائرة: ٣١	
المعطيات الجبرية: ٢٥٤	- م -
مفكوك تايلور: ٥١، ٥٤، ٥٥، ١١١، ١٢٣	المارديني، إسماعيل بن إبراهيم انظر ابن
مفهوم المظم الجبري: ٢٩	فلوس
مفهوم وحدة القياس: ٢٩	الماهاني، محمد: ٧، ٢٨، ٤٠
المنحنيات: ٤٠	المثلث القائم الزاوية: ٤٢٥
المنحنيات المخروطية: ٤٠، ٤١، ٦٥، ٨٤	المثلث القائم الزاوية المتساوي الأضلاع:
مونتوكلا، جان إتيان: ٥٣	١٧٢
ميرسين: ٥٦	المثلث القائم الزاوية المتساوي الساقين: ١٧٣
مينيشم: ٢٥٦	محمد خان: ٢٥، ٨٦
- ن -	المربع المجسم: ١٧٩، ١٨٠، ٢٥٤
نظرية المخروطات: ٢٥٦	المربع المسطح: ١٧٩، ١٨٠، ٢٥٤
نظرية المعادلات الجبرية: ١٥، ٢٥٤، ٢٦١	المرتبة السمية: ٨٨، ١٩٠
النهايات الصغرى: ٤٨، ٥٥، ٥٧	المركز الوطني للبحث العلمي (فرنسا): ١١
النهايات العظمى: ١٠، ١٦، ٤٨، ٥٢ - ٥٥،	المسعودي، شرف الدين: ٣٠، ٣١، ٥٩
٥٨، ٥٩، ٢٦٢، ٢٦٥، ٢٧٦، ٢٧٧	المعادلات التربيعية: ٤٥
٢٨٣، ٢٩٥، ٢٩٧، ٣٠١، ٣١٢	المعادلات الجبرية: ٢٥، ٢٦، ٢٨ - ٣٠،
٣١٤، ٣٢٢، ٣٢٦، ٣٣٧ - ٣٣٩	٤١، ٤٢، ٥٧
٣٥٤، ٣٧٦، ٣٩٦، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤١١	معادلات الدرجة الثالثة: ٤٥، ٤٦، ١١٦،
النهايات القصوى: ٤٩، ٥١، ٥٥ - ٥٧	٢٦١، ٢٤٥
النيسابوري، نظام الدين: ٨٥	معادلات الدرجة الثانية: ٤٥، ٢٨١، ٤٢٩
- ه -	المعادلات ذات الحدود الأربعة: ٢٩، ٤٢،
الهندسة التحليلية: ٩، ١٠، ١٦، ٣٥، ٣٦	٢٤٥
الهندسة التفاضلية: ٣٩	المعادلات ذات الحدود الثلاثة: ٢٩، ٤٢،
الهندسة الجبرية: ٣٩	٢٤٥
	المعادلات ذات الحدين: ٢٩، ٤٢، ١٧٦،
	١٧٨، ٢٤٥
	المعادلات العددية: ٩٣

هوزيل، كريستيان: ١٠

هويغنز: ٥٤

وحدة القياس السطحية: ١٧٦، ١٧٧، ٢٥٤

وحدة القياس المجسمة: ١٧٦، ١٧٧، ١٨٣،
٢٥٤

- و -

ويكيه، فرانز: ٤١

وحدة القياس الخطية: ١٧٦ - ١٧٨، ١٨٦

- ي -

اليزدي: ٣٠، ٢٤٥

الدكتور رشدي راشد

- مدير مركز تاريخ العلوم العربية والعصر الوسيط.
- مدير أبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي - باريس.
- أستاذ في جامعة طوكيو.
- مدير تحرير مجلة العلوم والفلسفة العربية (جامعة كامبريدج).
- عضو الأكاديمية الدولية لتاريخ العلوم.
- عضو مراسل في مجمع اللغة العربية في القاهرة.
- عضو أكاديمية علوم العالم الثالث.
- ساهم في مؤلفات عدة بالفرنسية والعربية حول تاريخ الرياضيات والعلوم منها: عناصر تاريخ العلوم؛ الباهر في الجبر للسموأل؛ الرياضيات والمجتمع؛ صناعة الجبر عند ديوفانتس؛ أبحاث في تاريخ الرياضيات؛ دراسات عن ابن سينا؛ الأعمال الرياضية لشرف الدين الطوسي في الجبر والهندسة في القرن الثاني عشر؛ العلوم في عهد الثورة الفرنسية؛ تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب؛ علم الهندسة والمناظر في القرن الرابع الهجري (ابن سهل - القوهي - ابن الهيثم)، وأشرف على موسوعة تاريخ العلوم العربية (ثلاثة أجزاء).
- نشرت له عشرات المقالات العلمية بالفرنسية والانكليزية والعربية والروسية في دوريات عالمية.

مركز دراسات الوحدة العربية

بناية «سادات تاور» شارع ليون
ص.ب: ٦٠٠١ - ١١٣ - بيروت - لبنان
تلفون : ٨٦٩١٦٤ - ٨٠١٥٨٢ - ٨٠١٥٨٧
برقياً : «مرعبي» - بيروت
فاكس : ٨٦٥٥٤٨ (٩٦١١)

e-mail: info@caus.org.lb
Web Site: http://www.caus.org.lb

Bibliotheca Alexandrina



0583575



الضمن : ٩
أو